

Weigela – sortimentsonderzoek en keuringsrapport

Ir. M.H.A. Hoffman

*Weigela is een veel gebruikte sierheester in de gematigde gebieden, vooral vanwege de kleurrijke bloemen en/of bladeren. Het sortiment is de afgelopen jaren flink uitgebreid. Inmiddels zijn al meer dan 200 cultivars bekend. Het is hierdoor voor zowel kwekers als gebruikers lastig om een keuze te maken. Verder is er in praktijk veel verwarring over de juiste indeling van cultivars. Veel cultivars worden ingedeeld in een soort, met name *W. florida* en *W. praecox*, maar vallen door hybridisatie vaak niet binnen de soortgrenzen. In dit onderzoek is door PPO een nieuw classificatiesysteem ontwikkeld voor indeling van cultivars in acht cultivargroepen. Samen met de KVBC is een sterrenkeuring uitgevoerd waarbij veel nieuwe cultivars zijn vergeleken met oudere. Als eindresultaat is een lijst met aanbevolen cultivars samengesteld.*



Het onderzoek

In totaal zijn er 50 verschillende Weigela's verzameld en aangeplant op het proefveld van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) in Boskoop op veengrond. Dezelfde collectie is ook aangeplant op zandgrond in de botanische tuinen van Wageningen. De planten waren afkomstig van Nederlandse kwekerijen. Van 2003 tot 2008 zijn er waarnemingen verricht door PPO en is de collectie diverse malen gekeurd door de keuringscommissie van de KVBC. Daarnaast zijn ook de overige Weigela's, vooral oude cultivars, in de botanische tuinen van Wageningen Universiteit (Nationale Plantencollectie) geobserveerd. Ook is de Engelse nationale collectie van *Weigela* in Sheffield bezocht en beoordeeld. Met meer dan 200 verschillende soorten en cultivars, is dit één van de grootste collecties ter wereld.

Alle beoordeelde planten zijn op naam gebracht, beschreven en gefotografeerd. De cultivargroepen zijn samengesteld aan de hand van literatuuronderzoek, veldobservaties en discussies met kwekers en specialisten. Het onderzoek werd gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Weigela versus Diervilla

Weigela is nauw verwant aan *Diervilla*. In het verleden en ook recent zijn er regelmatig verschuivingen van soorten van het ene naar het andere geslacht. Zowel in het verleden als ook recent zijn er auteurs die pleiten voor geheel of gedeeltelijke integratie van de soorten van beide geslachten. Vooral *W. maximowiczii* en *W. middendorffiana* zijn onderhevig aan veel discussie. Beide soorten werden door diverse auteurs ook



92. *Weigela* proef in Boskoop

tot *Diervilla* gerekend, of in aparte geslachten geplaatst.

Nakai (1921) erkende maar één geslacht: *Dier-villa*. Hierin werden alle soorten ondergebracht. Bailey (1929) concludeerde dat *Weigela* morfo-logisch en geografisch duidelijk van *Diervilla* verschilt en beschreef een derde geslacht: *Calyp-trostigma* (waarin *W. maximowiczii* en *W. mid-dendorffiana* werden ondergebracht). Nakai (1936) onderscheidde later weer *Weigela* en *Diervilla* en bracht *W. maximowiczii* en *W. mid-dendorffiana* onder in respectievelijk twee ande-re geslachten: *Weigelastrum* en *Macrodiervilla*. Hara (1983) onderscheidde alleen *Weigela* en *Diervilla*, waarbij *W. maximowiczii* en *W. mid-dendorffiana* tot *Weigela* werden gerekend. In recent fylogenetisch onderzoek van Kim (1999) wordt geconcludeerd dat *W. maximowiczii* en *W. middendorffiana* nauwer verwant zijn aan *Dier-villa* dan aan *Weigela* en dat tenminste *W. maxi-mowiczii* eventueel als apart geslacht *Weigelastrum* onderscheiden zou kunnen worden.

Het meest gangbaar is echter nog steeds de clas-sificatie van Hara (1983), waarbij *Weigela* en *Diervilla* worden onderscheiden. Deze indeling is ook in ons onderzoek gevolgd.

De belangrijkste verschilpunten op een rij:

	Weigela	Diervilla
Verspreiding	Noordoost-Azië	Noord-Amerika
Bloemen	Op takken van vorig jaar	Aan jonge twijgen
Kroon	Regelmatig 5-lobbig	2-lippig

Taxonomie en verspreiding

Tegenwoordig worden 10 verschillende soorten van *Weigela* onderscheiden, welke allemaal van nature voorkomen in Noordoost Azië, met de hoogste concentratie in Japan (8 soorten).

Hara (1983) classificeert *Weigela*, onder andere op basis van kelkvorm en vergroeiing van de meeldraden in 4 secties:

Sect. *Weigela*: Kelk regelmatig en diep 5-lobbig, zonder kelkbuis. Meeldraden vrijstaand. Soor-ten: *W. coraeensis*, *W. decora*, *W. floribunda*, *W. hortensis* en *W. japonica*.

Sect. *Calysphyrum* A.DC.: Kelk onregelmatig 5-lobbig, met een korte kelkbuis. Meeldraden vrijstaand. Soorten: *W. florida* en *W. praecox*.

Sect. *Weigelastrum*: Kelk 2-lippig. Meeldraden vergroeid en behaard. Vruchten zonder een blij-vende kelk. Soort: *W. maximowiczii*. Deze sectie



93. *Weigela* heeft opvallende buis tot klokvormig bloemen (W. 'Red Prince')



94. *Weigela* 'Florida Variegata'

wordt soms als apart geslacht beschouwd: *Weigelastrum*.

Sect. *Calyptrostigma*: Kelk 2-lippig. Meeldraden vergroeid en behaard. Stigma's vergroeid tot een hoedje ("calyptrate"). Vruchten met een blijvende kelk. Soort: *W. middendorffiana*. Deze sectie wordt soms als apart geslacht beschouwd: *Macrodiervilla* (syn. *Calyptrostigma*).

De twee laatste secties zijn duidelijk afwijkend van de twee eerste, zoals uit voorgaande al duidelijk werd. Uit onderzoek van Kim (1999) blijkt dat de secties *Weigelastrum* en *Calyptrostigma* meer verwantschap hebben met *Diervilla* dan met de *Weigela*-soorten van de secties *Weigela* en *Calysphyrum*. Eventueel kan sectie *Weigelastrum* (*W. maximowiczii*) als apart geslacht worden beschouwd. Ook de eerste twee secties houden in het onderzoek van Kim (1999) geen stand. *W. hortensis* blijkt bijvoorbeeld uit dit onderzoek nauwer verwant aan *W. florida* dan aan *W. japonica*. Vooral de Japanse soorten *W. japonica*, *W. coraeensis* en *W. decora* blijken sterk verwant aan elkaar.

De meeste soorten van de secties *Weigela* en *Calysphyrum* zijn in praktijk moeilijk van elkaar te onderscheiden. Dit geldt helemaal voor exemplaren in tuinen en op kwekerijen omdat daar vaak sprake is van hybridisatie. *W. middendorff-*

fiana en *W. maximowiczii* (van de laatste twee secties) zijn wel goed onderscheidbaar van de rest.

Morfologie

Weigela's zijn bladverliezende heesters. De tegenoverstaande bladeren zijn getand, hebben geen steunblaadjes en zijn al dan niet gesteeld. De bloemen zijn relatief groot; ze staan solitair of met 2-7 bijeen in trosjes in de oksels van de bovenste bladeren van een scheut. De kelk heeft in principe 5 tanden en een buis, maar deze laatste is soms zeer kort of afwezig. Meestal is de kelk symmetrisch, maar bij enkele soorten 2-lippig. De kroon heeft 5 lobben, is symmetrisch of soms zwak 2-lippig; er is een vrij lange kroonbuis die geleidelijk of plotseling verbreedt. De bloemkleur is wit, roze, paars, rood of geel. Er zijn 5 meeldraden, meestal vrijstaand en kaal, maar bij sommige soorten vergroeid en/of behaard. Vruchtbeginsel 2-hokkig, met vele zaadbeginsel per hok. Doosvrucht met vele zaden.

Standplaats en gebruik

Weigela stelt gematigde eisen qua verzorging en standplaats. De planten groeien zowel in de zon als in de halfschaduw en een goed gedraineerde

en vrij voedselrijke bodem wordt erg op prijs gesteld.

Qua toepassing is er enige variatie. De meeste soorten en cultivars worden gebruikt als sierheester voor in de gemengde border of als solitair in grote of middelgrote tuinen. De sierwaarde wordt vooral bepaald door de kleurrijke bloemen en/of bladeren. De dwergvormen zoals 'Verweig' (MONET) en 'Verweig 3' (MINOR BLACK) zijn zeer geschikt als visueel aantrekkelijk potplant op terras of balkon, maar ook in kleine tuinen. *Weigela* is geen gewas dat bij uitstek geschikt is voor vakbeplanting, maar enkele vrij lage en dicht groeiende cultivars, zoals 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL), kunnen hiervoor goed gebruikt worden. Ook worden sommige cultivars gebruikt als snijheester, meestal als bladtak en sommige cultivars als bloemtak. In een gebruikswaardeproef van Berents et al (2001) kwamen 'Bokraspark' (SPARKLING FANTASY), 'Bokrashine' (SHINING FANTASY) en 'Alexandra' als beste snijtakken uit de bus.

Weigela's bloeien op het hout van het vorige jaar, zodat pas na de bloei gesnoeid moet worden. Voor verjonging kunnen erg oude takken geheel verwijderd worden en kunnen de lange jonge takken evt. iets teruggeknipt worden. Planten die niet tijdig gesnoeid worden verouderen al na enkele jaren, de bloei neemt dan af en ze worden vooral onderin erg kaal. Hierdoor is *Weigela* niet bepaald geschikt voor onderhoudsarme beplanting.

Ontwikkeling van cultivars - historisch

De eerste cultivars zijn geïntroduceerd door L. van Houtte uit Gent (België) omstreeks 1860 (bijvoorbeeld 'Groenewegenii', 'Looymansii Aurea' en 'Stelzneri'). Kort daarna volgde de Franse kweker Billiard uit Fontenay-aux-Roses (nabij Parijs) met de introductie van zo'n 20 nieuwe cultivars (bijvoorbeeld 'Gustave Malet' en 'Caméléon'). In 1867 begon een andere Franse kweker, Victor Lemoine uit Nancy, met zijn selectie en kruisingswerk. Zijn eerste producten kregen Latijnse namen (bijvoorbeeld 'Purpurata', 'Kermesina' and 'Lavallei'), maar vanaf 1875 gaf hij Franse namen. Tot 1930 introduceerde Lemoine meer dan 60 nieuwe cultivars van *Weigela*. Een aantal hiervan wordt tegenwoordig nog steeds veel gekweekt en gebruikt (bijvoorbeeld 'Abel Carrière', 'Avalanche', 'Bouquet Rose', 'Féerie' en 'Floréal'). Rond 1900 kwam er vooral vanuit Duitsland en Oost-Europa een aantal nieuwe cultivars op de markt, bijvoorbeeld 'Eva Rathke' en 'Styriaca'. Gedurende en na de tweede wereldoorlog kwamen

vanuit Noord-Amerika de eerste cultivars, zoals 'Bristol Ruby' en 'Newport Red' ('Vanicek'), en later ook vanuit Canada, bijvoorbeeld 'Dropmore Pink'. Rond 1960 werd een aantal cultivars uit Boskoop geïntroduceerd, bijvoorbeeld 'Eva Supreme', 'Rosabella' en 'Boskoop Glory'. De laatste decennia zijn er vooral in Frankrijk (INRA), Tsjechië (Silva Tarouca Research Institute, Pruhonic) en Nederland weer veel nieuwe cultivars ontwikkeld. Moderne selectiecriteria zijn vooral bladkleur en dwergvormige groeiwijze.

Indeling van cultivars – historisch

Vanaf het begin van de introductie van nieuwe cultivars in de 19^{de} eeuw was het duidelijk dat de indeling van cultivars in soorten moeilijk was en dat veel cultivars van hybride origine waren. Carrière (1875) gebruikte de term "Hybrid Group" om cultivars van hybride origine te classificeren. In catalogi van Lemoine, bijvoorbeeld uit 1904, werden de meeste cultivars gepresenteerd als hybridecultivars ("Hybrida") en sommige cultivars werden ondergebracht in soorten zoals *W. hortensis* en *W. praecox*. In de 20^{ste} eeuw waren er vele andere bronnen (bijvoorbeeld Rehder (1927), Späth (1930), Grootendorst (1968), Bailey (1976), Krüssman (1978) en Bean (1980)) die de meeste cultivars classificeerden als hybride en slechts enkelen werden ondergebracht in soorten zoals *W. florida*, *W. praecox*, *W. japonica* en *W. floribunda*. In de checklist van Howard (1965) werd helemaal geen poging meer gedaan om cultivars te classificeren, behalve als eventuele referentie zoals gegeven door de winner. Aan de andere kant werden door sommige auteurs, zoals Huxley et al (1992) en Dirr (1990), de meeste cultivars wel in soorten ondergebracht, vooral *W. florida* en *W. praecox*. In moderne lijsten zoals de Naamlijst van Houtige Gewassen en de Plantfinder wordt een deel van de cultivars weergegeven als hybride (ca. 60%) en een deel wordt ingedeeld bij een soort (ca. 40%). Enkele moderne veredelaars van *Weigela* geven hun nieuwe cultivars ook soortnamen mee, meestal *W. florida* (bijvoorbeeld 'Verweig' (MONET), 'Verweig 2' (CAPPUCINO), 'Verweig 3' (MINOR BLACK), 'Alexandra', 'Brigela' (FRENCH LACE), 'Elvera' (MIDNIGHT WINE) en 'Plangen' (PINK POPPET)). Andere veredelaars doen geen moeite en brengen hun nieuwe cultivar zonder soort aanduiding op de markt.

Uit bovenstaande mag blijken dat er onduidelijkheid en verwarring bestaat over het indelen van cultivars. De meeste cultivars hebben genen



95. *Weigela* 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL)

van twee of meerdere soorten, meestal *W. coraeensis*, *W. floribunda*, *W. florida*, *W. hortensis*, *W. japonica* en/of *W. praecox*. Duidelijke voorbeelden van onenigheid qua classificatie zijn: 'Abel Carière' (*floribunda*, *florida*, hybride), 'Bristol Snowflake' (*florida* / *japonica* / hybride), 'Minuet' (*florida* / hybride) and 'Bouquet Rose' (*florida* / *praecox* / hybride); zie onder andere Bean, 1980; Hoffman, 2005; Huxley et al, 1992, Krüssmann, 1978 en Rehder, 1927).

Een goede basis voor cultivargroepclassificatie is gelegd in het studentenonderzoek van Van Proosdij (1997) bij de botanische tuinen van Wageningen UR. In dit rapport werden op basis van bloemkleur en bladkleur negen cultivargroepen onderscheiden: Variegata Groep, Aurea Groep, Purpurea Groep, Candida Groep, Eva Rathke Groep, Biformis Groep, Héroïne Groep, Féerie Groep en Groenewegenii Groep.

Op enkele kleine veranderingen in de definitie na zijn de eerste drie groepen van de negen overgenomen in het nieuwe systeem zoals gepresenteerd in dit rapport. Boom (2000) presenteerde een classificatie in drie groepen: Roodbloemig, Rozebloemig en Witbloemig.

Nieuwe indeling van cultivars in cultivargroepen

Weigela is een goed voorbeeld van een middelsterk gedomesticeerd gewas. Bij sterk gedomesticeerde gewassen zoals Rozen, is de botanische classificatie in soorten en evt. soorthybriden al lang losgelaten. Cultivars hebben vaak twee of meer soorten als ouders. Ook bij *Weigela* is dit meer en meer het geval. Dit zorgt voor verwarring en onstabiele van namen. Bij instandhouding van het traditionele indelingssysteem zal dit in de toekomst alleen maar verergeren. Er lijkt immers geen barrière te bestaan voor het kruisen van bijvoorbeeld *W. coraeensis*, *W. floribunda*, *W. florida*, *W. hortensis*, *W. japonica* en/of *W. praecox*.

Door te kiezen voor een indelingssysteem van cultivargroepen zal niet alleen de naamgeving stabiel worden, maar het is ook veel gebruiksvriendelijker. De gekozen groepen worden immers al vaak door kwekers en andere gebruikers gehanteerd.

Er worden acht nieuwe cultivargroepen voorgesteld, waarin vrijwel alle cultivars van *Weigela* ondergebracht kunnen worden: Purpurea Groep, Dwarf Groep, Variegata Groep, Aurea Groep, White-flowered Groep, Red-flowered Groep, Pink-flowered Groep en Bicolor Groep. De groepen worden onderscheiden op grond van bladkleur, groeiwijze (dwergvormig) en bloemkleur. Een wetenschappelijke/internationale

publicatie is verschenen in Acta Horticulturae (Hoffman, 2008).

Determinatiesleutel voor cultivargroepen

- 1a. Bladeren (bruin)rood of paarsrood.
Gewoonlijk dwerg tot semi-dwergvormige
groeiwijze: **Purpurea Groep**
- 1b. Bladeren groen, bont of geel: **2**
- 2a. Dwergvormige groeiwijze; volwassen planten < 1 m hoog en breed): **Dwarf Groep**
- 2b. Geen dwergvormige groeiwijze: **3**
- 3a. Bladeren bont of (groen)geel: **4**
- 3b. Bladeren groen: **5**
- 4a. Bladeren bont: **Variegata Groep**
- 4b. Bladeren (groen)geel: **Aurea Groep**
- 5a. Bloemen rood, roze of paars, éénkleurig: **6**
- 5b. Bloemen wit of bijna wit of meerkleurig: **7**
- 6a. Bloemen rood of paarsrood: **Red-flowered Groep**
- 6b. Bloemen roze of paars: **Pink-flowered Groep**
- 7a. Bloemen wit of bijna wit: **White-flowered Groep**
- 7b. Bloemen aan dezelfde plant duidelijk twee- of meerkleurig (bijvoorbeeld wit en rood, wit en paars of geel en rood): **Bicolor Groep**

Beschrijving cultivar groepen

De volgende acht groepen worden voorgesteld en zijn conform de regels van de cultuurplantencode (ICNCP), Brickell et al. (2004).

1. Purpurea Groep

Beschrijving: Bladeren (bruin)rood of paarsrood. Gewoonlijk dwerg- tot semi-dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk 0.5-1.5 m. Bloemen kunnen verschillende kleuren hebben, maar gewoonlijk paars of rood. Standaard cultivar: 'Foliis Purpureis' Cultivars: 'Alexandra' (WINE & ROSES), 'Anika', 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL), 'Coffee Black', 'Elvera' (MIDNIGHT WINE), 'Foliis Purpureis', 'Ruby King', 'Samba', 'Tango', 'Verweig 3' (MINOR BLACK) en 'Victoria'.

2. Dwarf Groep

Beschrijving: Dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk < 1 m hoog en breed. Bladeren groen, bont of geel (niet rood of paarsrood). Bloemen van verschillende cultivars kunnen uiteenlopend gekleurd zijn. De groeiwijze wordt beïnvloed door bodem en klimaat; onder zeer gunstige omstandigheden kunnen planten tot 1.5 m hoog en/of breed worden. Standaard cultivar: 'Minuet' Cultivars: 'Ara', 'Courtanin' (NAIN ROUGE), 'Cumula', 'Full Colour', 'Minuet', 'Piccolo', 'Plangen' (PINK POPPET), 'Taura', 'Vega', 'Verweig' (MONET) en 'Verweig 2' (CAPPUCCINO).

3. Variegata Groep

Beschrijving: Bladeren bont. Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bloemen van verschillende cultivars kunnen uiteenlopend gekleurd zijn. Standaard cultivar: 'Florida Variegata'. Cultivars: 'Brigela' (FRENCH LACE), 'Caricature', 'Courtamon' (COULEUR D'AUTOMNE), 'Emerald Edge', 'Florida Variegata', 'Kolmagira' (MAGICAL RAINBOW), 'Kosteriana Variegata', 'Praecox Variegata', 'Siebold Variegata', 'Sunny Princess', 'Suzanne' en 'Milk and Honey'.

4. Aurea Groep

Beschrijving: Bladeren (groen)geel. Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bloemen van verschillende cultivars kunnen uiteenlopend gekleurd zijn.

Standaard cultivar: 'Looymansii Aurea'

Cultivars: 'Darts Yellow Lady', 'Looymansii Aurea', 'Newzako' (JEAN'S GOLD) en 'Olympiade'.

5. White-flowered Groep

Beschrijving: Bloemen wit of bijna wit. Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bladeren groen. Standaard cultivar: 'Candida' Cultivars: 'Avalanche', 'Bristol Snowflake', 'Candida', 'Héroïne', 'Mont Blanc', 'Nivea', 'Volans' en 'White Knight'.

6. Red-flowered Groep

Beschrijving: Bloemen rood of paarsrood. Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bladeren groen. Standaard cultivar: 'Bristol Ruby' Cultivars: 'Bokrarob' (LITTLE RED ROBIN), 'Bristol Ruby', 'Courtared' (LUCIFER), 'Courtavif' (RUBIVIF), 'Eva Rathke', 'Eva Supreme', 'Evita', 'Newport Red', 'Purple Rain', 'Red Prince' en 'Saturn'.

7. Pink-flowered Groep

Beschrijving: Bloemen roze of paarsroze. Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bladeren groen. Standaard cultivar: 'Rosabella' Cultivars: 'Abel Carrière', 'Aldenhams Glow', 'Boskoop Glory', 'Bouquet Rose', 'Conquête', 'Dart's Overflow', 'Darts Pink Lady', 'Dropmore Pink', 'Féerie', 'Fleur de Mai', 'Floréal', 'Gracieux', 'Groenewegenii', 'Gustave Malet', 'Lavelle', 'Madame Couturier', 'Othello', 'Pink Princess', 'Polka', 'President Duchartre', 'Rosabella', 'Rosea', 'Rumba' and 'Styriaca'.

8. Bicolor Groep

Beschrijving: Bloemen aan dezelfde plant op hetzelfde tijdstip duidelijk twee- of meerkleurig (bijvoorbeeld wit en rood, wit en paars of geel en rood). Geen dwergvormige groeiwijze; volwassen planten gewoonlijk > 1 m hoog of breed. Bladeren groen. Standaard: 'Courtalor' (CARNAVAL) Cultivars: 'Bicolor', 'Caméléon', 'Courtalor' (CARNAVAL), 'Intercol' (DART'S COLOURDREAM) en 'Versicolor'.

Overzicht 8 cultivargroepen van Weigela



1. Purpurea Groep
Alle bruin/roodbladigen



5. White-flowered Groep
Bloemen (bijna) wit



2. Dwarf Groep
Alle dwergen (excl. roodbladigen)



6. Red-flowered Groep
Bloemen rood of paarsrood



3. Variegata Groep
Alle bontbladigen (excl dwergen)



7. Pink-flowered Groep
Bloemen roze of paarsroze



4. Aurea Groep
Alle geelbladigen (excl dwergen)



8. Bicolor Groep
Bloemen meerkleurig

Botanische soorten

W. amabilis: *W. coraeensis*

W. coraeensis Thunb

Syn. *W. grandiflora* (Sieb. & Zucc.) K.Koch

W. amabilis van Houtte

Diervilla grandiflora Sieb. & Zucc.)

Verspreidingsgebied: Japan (Honshu)

Opgaande tot spreidende heester, tot 3-5 m. Takken dik, kaal en grijs. Bladeren 7-15 cm, ovaal tot omgekeerd eirond, toegespitst, gezaagd, glimmend groen van boven, aan de onderzijde lichter en bijna kaal; bladsteel ca. 1 cm. Bloemen 2-8 bijeen in korte trosjes in de bladoksels. Kelk gelijkmatig 5-lobbig, kaal of bijna kaal, lobben breed lijnvormig, buis zeer kort of afwezig. Kroon 2-4 cm, plotseling breder wordend, kaal, wit tot lichtroze, aan eind van de bloei roder wordend. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl niet buiten de kroon uitstekend.

Voorafvallend aan deze soort zijn de grote, sterk glimmende bladeren en de van wit/roze naar rood verkleurende bloemen.

Slechts enkele cultivars zijn in het verleden ingedeeld bij deze soort.

W. decora (Nakai) Nakai

Syn. *W. japonica* var. *decora* (Nakai) Okuyama

W. floribunda var. *versicolor* Rehd.

Diervilla decora Nakai

Verspreidingsgebied: C. en Z.-Japan

Heester, tot 3 m. Takken grijsbruin, kaal of met haren in 2 lengtelijnen. Bladeren 6-10 cm, omgekeerd eirond tot ovaal, toegespitst, fijn gezaagd, van boven iets glimmend en kaal, aan de onderzijde behaard op de nerven; bladsteel ca. 1 cm. Bloemen 2-3 per tros. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kort of afwezig; lobben breed lijnvormig, iets behaard. Kroon 3-3.5 cm, geleidelijk breder wordend, eerst wit tot lichtroze, later roodachtig wordend. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl iets boven de kroon uitstekend. Behoorlijk variabele soort, vooral qua bloemkleur. Voorafvallend aan deze soort zijn de witte tot lichtroze en later naar roodverkleurende bloemen.

W. florida (Bunge) A.DC.

Syn. *W. rosea* Lindley

Diervilla florida (Bunge) Sieb. & Zucc.

Verspreidingsgebied: N.-China, Korea en Japan (Kyushu)

Opgaande tot spreidende heester, tot 3 m. Jonge takken kaal of met korte haren. Bladeren 4-10 cm, (langwerpig-)omgekeerd eirond tot ovaal,



96. *Weigela decora*

toegespitst, fijn gezaagd, van boven kaal tot schaars behaard op de hoofdnerf, aan de onderzijde behaard vooral op de nerven, lichtgroen; bladsteel 0.1-0.5 cm. Bloemen 1-3 bijeen in de bladoksels. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kaal of met verspreide haren; lobben 8-12 mm, lancetvormig, toegespitst, lang-behaard. Kroon 3-4 cm lang, geleidelijk breder wordend, roze tot roodachtig, lichter aan binnenzijde, zacht behaard aan buitenzijde. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl even lang als kroon.

Dit is de bekendste soort en zeer veel cultivars zijn in het verleden ondergebracht bij deze soort. Deze erg variabele soort is vooral te herkennen aan de symmetrische kelk, waarbij de kelktanden ongeveer even lang zijn als de kelkbuis, de geleidelijk breder wordende kroonbuis (niet klokvormig) en de onbehaarde bladbovenzijde. Vanwege deze laatste twee eigenschappen verschilt de soort van *W. praecox*, die sterker behaard blad heeft en een klokvormige bloemkroon.

W. floribunda (Sieb. & Zucc.) K. Koch

Syn. *W. japonica* var. *floribunda* (Sieb. & Zucc.)

Hara

Diervilla floribunda Sieb. & Zucc.



97. *Weigela floribunda*

Verspreidingsgebied: Japan (Honshu en Shikoku)

Dicht behaarde heester tot 3 m. Jonge takken behaard, later kaal wordend. Bladeren 6-12 cm lang, (langwerpig-)eirond tot ovaal, toegespitst, gezaagd, schaars behaard van boven, aan de onderzijde dicht behaard vooral op de nerven; bladsteel 0,1-0,5 cm. Bloemen 1-3 bijeen in de bladoksels. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kort of afwezig. Kroon 3-3,5 cm lang, geleidelijk breder wordend, (bruin)rood, kort behaard aan buitenzijde. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl boven de kroon uitstekend. Vruchtbeginsel en vrucht duidelijk behaard.

Opvallend aan deze soort zijn de (bruin)rode bloemen en de vrij sterk behaarde bladeren. Slechts enkele cultivars zijn in het verleden ingedeeld bij deze soort.

W. floribunda var. *versicolor*: ***W. decora***

W. grandiflora: ***W. coraeensis***

W. hortensis (Sieb & Zucc) K. Koch

Syn. *W. japonica* var. *hortensis* (Sieb. & Zucc.) Maximowiczii

Diervilla hortensis Sieb & Zucc.



98. *Weigela florida*

Verspreidingsgebied: C. & N.-Japan en Korea

Brede heester tot 3 m. Jonge takken behaard, later kaal wordend. Bladeren 5-10 cm, eirond(-langwerpig) tot ovaal, toegespitst, fijn gezaagd, van boven schaars behaard, aan de onderzijde dicht grijs behaard; bladsteel 0,5-0,8 cm. Bloemen gewoonlijk 3 bijeen. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kort of afwezig; lobben 3-5 mm, behaard. Kroon plotseling breder wordend, 2-3 cm lang, roze tot wit.

Opvallend aan deze soort is de relatief sterke beharing van bladeren, bloemstelen en kelk.

Slechts enkele cultivars zijn in het verleden ingedeeld bij deze soort.

W. japonica Thunb.

Syn. *Diervilla japonica* (Thunb.) A.DC.

Verspreidingsgebied: Japan (Kyushu)

Brede heester, tot 3 m. Jonge takken behaard, later kaal wordend. Bladeren 5-10 cm, eirond(-langwerpig) tot ovaal, toegespitst, fijn gezaagd, van boven schaars behaard, aan de onderzijde behaard op de nerven; bladsteel 0,5-0,8 cm. Bloemen 1-3 bijeen, bijna zittend. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kort of afwezig; lobben 7-10 mm, behaard. Kroon 3-3,5 cm, geleidelijk



99. *Weigela japonica* var. *sinica*

breder wordend, wit tot lichtroze, later rood wordend. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl boven de kroon uitstekend.

Voorafvallend aan deze soort zijn de korte kroonbuis en de witte tot lichtroze naar rood verkleurende bloemen. Slechts enkele cultivars zijn in het verleden ingedeeld bij deze soort.

W. japonica var. *decora*: ***W. decora***

W. japonica var. *floribunda*: ***W. floribunda***

W. japonica var. *hortensis*: ***W. hortensis***

W. maximowiczii (S. Moore) Rehder

Syn. *Calyptrostigma maximowiczii* Makino

Diervilla maximowiczii (S. Moore)
Makino

Diervilla middendorffiana var.
maximowiczii S. Moore

Weigelastrum maximowiczii (Makino)
Nakai

Verspreidingsgebied: Japan (Honshu)

Weinig in cultuur. Lijkt erg op *W. middendorffiana*, maar bladeren minder behaard aan onderzijde, de bloemen zijn zittend, vrucht en vruchtbeginsel kaal en de kelk blijft niet zitten bij de vruchtvorming.



100. *Weigela maximowiczii*

W. middendorffiana (Carr.) K.Koch

Syn. *Calyptrostigma middendorffianum* Trautv. & Mey.

Diervilla middendorffiana Carr.

Macrodiervilla middendorffiana Nakai

Verspreidingsgebied: Japan (Hokkaido en Honshu) en O.-Siberië

Tot 1,5 m hoge heester. Takken met grijsgele, afbladderende bast; jonge scheuten met haren in 2 lengtelijnen. Bladeren langwerpig, spits tot toegespitst, fijn getand, van boven kort behaard op de nerven, van onderen dicht behaard; bladsteel zeer kort of afwezig. Bloemen alleenstaand of met 2 bijeen in bladoksel, duidelijk gesteeld. Kelk 2-lippig, met 3 boventanden en 1 of 2 ondertanden. Kroon 3,5-4 cm, lichtgeel met oranje vlekken op onderste deel; kroonbuis geleidelijk breder wordend naar boven toe. Meeldraden vergroeid en behaard. Doosvrucht kaal, met kelk die blijft zitten.

Voorafvallend aan deze soort zijn de gele bloemen en de vroege bloeitijd. De kelk en de kroon zijn min of meer 2-zijdig symmetrisch.

W. praecox (Lemoine) L.H. Bail.

Syn. *Diervilla praecox* Lemoine



101. *Weigela middendorffiana*



102. *Weigela subsessilis*

Verspreidingsgebied: Korea en Z.O. Siberië (Primorye)

Opgaande tot spreidende heester, tot 2-3 m. Jonge takken kaal of met korte haren. Bladeren 4-7 cm, (langwerpig-)omgekeerd eirond tot ovaal, toegespitst, fijn gezaagd, van boven schaars behaard op de hoofdnerf, aan de onderzijde behaard vooral op de nerven, lichtgroen; bladsteel 0.1-0.5 cm. Bloemen 1-2 bijeen in de bladoksels. Kelk gelijkmatig 5-lobbig; buis kaal of met verspreide haren; lobben 8-12 mm, lancetvormig, toegespitst, lang behaard. Kroon 3-4 cm lang, plotseling breder wordend, roze tot roodachtig, binnenzijde lichter en vaak geelachtig, zacht behaard aan buitenzijde. Meeldraden vrij van elkaar, kaal. Stijl even lang als kroon. Vroeg bloeiend.

Voorafvallend aan deze soort zijn de vrij kleine bladeren en de duidelijk klokvormige bloemen met relatief grote kroonlobben. Veel cultivars zijn in het verleden ondergebracht bij deze soort.

W. rosea: ***W. florida***

W. subsessilis (Nakai) L.H. Bailey

Syn. *Diervilla subsessilis* Nakai

Verspreidingsgebied: Korea

Weinig in cultuur. Lijkt op *W. floribunda*, maar bladeren duidelijk toelopend naar de basis, maar niet gesteeld. Bloemen in veelbloemige trossen en met vele trossen per tak; kroon geelgroen in knop, later roze tot paars, vrijwel kaal aan de buitenzijde. Vruchtbeginsel en vrucht schaars behaard.

Keuringsrapport en beschrijvingen

Waardering (*Valuation*)

- *** = uitstekend (*excellent*)
- ** = zeer goed (*very good*)
- * = goed (*good*)
- s = voor speciale doeleinden (*for special purposes*)
- o = kan vervallen (*can be eliminated*)

o ***W. 'Abel Carrière'*** (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1876)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,3 m hoog en 2,3 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: groot, 12-16 × 5.5-10 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen, vrij ruw, matig behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 10-20 cm lange as en 13-35!

(veel) bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze met donkerder vlekken (RHS cc: 54C / 62C), knoppen donkerpaarsroze, 2,5 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 3 × 1 cm; kroonlobben 1 × 0,9 cm; kelk iets roodachtig, vrij duidelijk behaard, tanden onvergroeid, 1,2 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Deze oude cultivar van Lemoine wordt vooral gekenmerkt door de paarsroze bloemen en de grote veelbloemige bloemtrossen. Ten opzichte van enkele andere roze bloeiende cultivars zoals 'Pink Princess', 'Féerie' en 'Floreal' zijn de bloemen wat donkerder paarsroze.

'Abel Carrière' werd in de proef vrij snel kaal onderin. De cultivar wordt overtroffen door 'Pink Princess' die ook een mooiere egalere paarsroze bloemkleur heeft.

** ***W. 'Alexandra'*** PBR (WINE & ROSES) (Purpurea Groep)

(H. Geers, Boskoop, 1989)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,6 m hoog en 1,8 m breed, vrij los vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.



103. *Weigela 'Alexandra'* (WINE & ROSES)

BLADEREN: middelgroot, 6-10 × 3,5-6 cm, ovaal-omgekeerd eirond, vrij fijn getand, toegespitst, (donker)bruinrood, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 3-11 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64BC), 3 cm breed (middelgroot), klok- tot trechtersvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,7 cm; kroonlobben 1 × 1,2 cm; kelk roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

De prachtige cultivar is vooral te herkennen aan het donkere bruinrode blad in combinatie met de rijke bloei met opvallende (donker)paarsroze bloemen. Deze halfhoge cultivar wordt groter dan de meeste andere roodbladige cultivars zoals bijvoorbeeld 'Bokrashine', 'Ruby Queen' en 'Verweig 3' (MINOR BLACK). Ten opzichte van de eveneens halfhoge 'Victoria' en 'Foliis Purpureis' is het blad groter, roder en mooier glanzend. Qua groeiwijze doet de cultivar onder voor bijvoorbeeld 'Bokrashine'. Echter van alle roodbladigen is dit veruit de mooist bloeiende culti-

var. Vandaar een hoge waardering voor 'Alexandra'. Ook veel gebruikt en hoog gewaardeerd als snijheester (Berents et al, 2001).

*** *W. 'Bokrashine'* ^{PBR} (NAOMI CAMPBELL) (Purpurea Groep)

(Boot & Co, Boskoop, 1996)

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1,4 m hoog en 1,7 m breed, dicht vertakt, zeer stevig; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: middelgroot, 7-10 × 3,5-5 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, bruinrood, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 7-13 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64A-60C), 2 cm breed (vrij klein), trechtersvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,6 cm; kroonlobben 0,8 × 1 cm, relatief vrij klein en vrij breed lobben staan nauwelijks uit; kelk roodachtig, kaal tot iets behaard, tanden vergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Dit is de absolute topper van de roodbladigen. Vooral door de mooie bruinrood glimmende bla-



104. *Weigela* 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL)



105. *Weigela* 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL)

deren in combinatie met de lage en dicht vertakte groeiwijze. Een groot voordeel van deze cultivar is dat de planten onderin goed blijven uitlopen en daardoor niet gauw kaal worden daar. De bloei van 'Bokrashine' is inferieur, wat op zich gunstig is voor de sierwaarde van het blad na de bloei (i.v.m. bruine vruchten die rommelig beeld geven). Ten opzichte van 'Verweig 3' (MINOR BLACK) is de plant en het blad iets minder klein en zijn de bloemen juist iets kleiner, iets lichter en duidelijk minder talrijk. 'Bokrashine' lijkt ook op 'Ruby Queen', die weliswaar rijker bloeit, maar duidelijk minder goed vertakt.

Ook veel gebruikt en hoog gewaardeerd als snijheester (Berents et al., 2001). Voor deze toepassing wordt vaak de handelsnaam SHINING FANTASY gebruikt.

W. BRIANT RUBIDOR: *W.* 'Olympiade'

o *W.* 'Bristol Ruby' (Red-flowered Groep)
(Bristol Nurseries, Bristol, Conn. (USA), ca. 1946)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,4 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: vrij groot, 10-14 × 4-7 cm, vrij smal ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode rand, vrij ruw, matig behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 10-20 cm lange as en 9-20 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: donkerrood (RHS cc: 60A), 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1,2 × 1,5 cm, relatief vrij breed; kelk iets roodachtig, vrij duidelijk behaard, tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni).

Bristol Ruby' wordt gekenmerkt door de opvallend donkerrode bloemen en vrij robuuste groei. De plant lijkt erg veel op 'Eva Supreme' die net iets lichtere bloemen heeft en vooral iets egalier en dichtere bloeit en daarmee 'Bristol Ruby' overtreft. Het is een kruising van *W. florida* met 'Eva Rathke'.

** *W.* 'Bristol Snowflake' (White-flowered Groep)

(Bristol Nurseries, Bristol, Conn. (USA), ca. 1961)

Syn. *W.* 'Snowflake'

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 1,8 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen (rood)bruin.



106. *Weigela* 'Bristol Snowflake'

BLADEREN: groot, 8-15 × 3,5-8 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, zwak behaard; bladsteel 0,5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-8 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; zeer rijk bloeiend.

BLOEMEN: wit met zwak roze randje (RHS cc: 155D), knoppen geelgroen met iets roze strepen/rand, 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1 × 1,4 cm, relatief breed; kelk lichtgroen, niet of nauwelijks behaard, tanden onvergroeid, 0,9 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Dit is de beste witbloemige cultivar. Ten opzichte van 'Candida', die ook witte bloemen heeft, blijft de plant iets lager en zijn de bloemen minder zuiver wit. Ten opzichte van 'Nivea' is 'Bristol Snowflake' veel steviger en beter winterhard en heeft het blad een gladdere textuur. Vooral door de betere groeiwijze en winterhardheid gaf de keuringscommissie de voorkeur aan 'Bristol Snowflake' boven 'Candida' en 'Nivea'.



107. *Weigela* 'Caricature'

o *W.* 'Caméléon' (Bicolor Groep)

(M. Billiard, Fontanay-aux-Roses, ca. 1868)

Syn. *W.* 'Grandiflora' Hort.

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 2 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij groot, 9-14 × 4-8 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint & rand, vrij ruw, matig behaard; bladsteel 0.5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 9-16 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: tweekleurig; de bloemknoppen donker paarsroze, de geopende bloemen paarsroze met brede witte rand (RHS cc: 64D en wit), verbloeiend naar paarsrood, 4 cm breed (groot), klokvormig, sterk geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1,1 cm; kroonlobben 1,5 × 1,5 cm; kelk iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden onvergroeid tot halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Gekenmerkt door de grote tweekleurige bloemen. Ook de relatief sterke bloemgeur viel op. Lijkt het meest op 'Courtalor' (CARNAVAL) die

door de sterkere tweekleurigheid hoger gewaardeerd werd. In de proef stond ook een plant ingezonden onder de naam *W.* 'Grandiflora', maar dit bleek ook 'Caméléon' te zijn.

o *W.* 'Candida' (White-flowered Groep)

(Thibault & Keteleer, Sceaux (F), ca. 1879)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,5 m hoog en 3 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: groot, 9-15 × 5-9 cm, ovaal-eirond, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen vrij ruw, zwak behaard; bladsteel ca. 1 cm.

BLOEIWIJZE: met 3-5 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: wit (RHS cc: 155D), knoppen geelgroen, 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1 × 1,2 cm; kelk lichtgroen, niet of nauwelijks behaard tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Gekenmerkt door de zuiver witte bloemen. Lijkt op 'Bristol Snowflake'; deze laatste groeit iets egalier en lager en heeft witte bloemen met een iets paarsroze tint. Overtroffen door 'Bristol Snowflake'.

W. CAPPUCCINO: *W.* 'Verweig 2'

s *W.* 'Caricature' (Variegata Groep)

(Pépinières des Landes (F), voor 1995)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: groot, 9-17 × 4.5-11 cm, ovaal, fijn getand, toegespitst, geelbont (groen met smalle gele rand) en zwak paarsrode tint en rand, sterk gefrommeld, niet of nauwelijks behaard; vrij opvallend rode herfstkleur; bladsteel 0.5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 7-15 bloemen per tros; vrij arm bloeiend.

BLOEMEN: lichtpaarsroze met brede witte rand (RHS cc: 65A en wit), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,9 cm; kroonlobben 1 × 1 cm; kelk lichtgroen, kaal tot iets behaard, tanden onvergroeid, 0,6 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd mid-dentijds (half mei - begin juni).

'Caricature' is onmiskenbaar door het geelbonte en gefrommelde blad. Daardoor is de cultivar met geen enkele andere te verwarren. Een echte liefhebbersplant dus. Ook opvallend is de rode herfstkleur. Het gefrommelde blad ontstaat overigens doordat het groene middengedeelte



108. *Weigela* 'Coffee Black' (knopbloeiër)

van het blad harder groeit dan de gele rand. Waarschijnlijk een mutant van 'Siebold Variegata'.

W. CARNAVAL: *W.* 'Courtalor'

s *W.* 'Coffee Black' (Purpurea Groep)
(B. Verhoef, Hazerswoude, 2000)

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1 m hoog en 1,2 m breed, vrij los vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: middelgroot, 7-11 × 3-6 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, donker bruinrood, niet of nauwelijks behaard; bladsteel 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 3-5 cm lange as en 4-7 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: donkerpaarsrood (RHS cc: 60A), 0,8 (dicht) - 1,8 (open) cm breed (vrij klein), trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,7 cm; kroonlobben 0,7 × 0,7 cm, relatief vrij klein bloemknoppen blijven dicht!; kelk roodachtig, iets behaard tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni).

'Coffee Black' is vooral te herkennen aan het donker bruinrode blad; het donkerst van alle



109. *Weigela* 'Courtalor' (CARNAVAL)

roodbladige cultivars. Daarbij blijven de donker paarsrode bloemen gesloten; alleen knopbloei dus. Hiermee is 'Coffee Black' met geen enkele andere cultivar te verwarren. De groei is erg los en onregelmatig, daarom geen sterrenwaardering voor deze cultivar, maar wel waardering als liefhebbersplant.

* *W.* 'Courtalor' (CARNAVAL) (Bicolor Groep)
(INRA, Angers (F), ca. 1985)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,3 m hoog en 2,2 m breed, vrij los vertakt, vrij slap-vrij stevig; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: middelgroot, 8-11 × 5-7 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen vrij ruw, vrij sterk behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-15 cm lange as en 9-16 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: tweekleurig; bloemknoppen donkerpaarsroze, de geopende bloemen onregelmatig wit met paarsroze rand en strepen (RHS cc: 64C en wit), verbloeiend naar paarsrood, 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1,2 × 1,5 cm, relatief vrij breed; kelk iets roodachtig, duidelijk behaard tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloem-

steel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni).

Deze cultivar valt vooral op door de tweekleurige wit/paarsroze bloemen, die verbloeien naar paarsrood. De vrij donker paarsroze bloemknoppen maken de veelkleurigheid compleet. Ook 'Caméléon' heeft een dergelijke bloemkleur, maar duidelijk minder uitgesproken. 'Intercol' (DART'S COLOURDREAM) heeft ook tweekleurige bloemen, maar deze zijn meer geelachtig in plaats van wit. De groeiwijze is vrij open en vrij slap, waardoor tijdig onderhoud vereist is. Vooral door de bijzondere bloemkleur is deze cultivar met één ster gewaardeerd. Dit is een triploïde cultivar onstaand uit een kruising van 'Abel Carrière' en een tetraploïde mutant van 'Bristol Ruby'.

o *W.* 'Courtared' (LUCIFER) (Red-flowered Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 1985)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,2 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: groot, 10-16 × 5-9 cm, ovaal-eirond, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en jong blad vrij sterk paarsrood, vrij ruw, zwak behaard; bladsteel ca. 0,6 cm.

BLOEIWIJZE: met 7-15 cm lange as en 9-21 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (paars)rood (RHS cc: 60C), 4,5 cm breed (groot), trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 1 cm; kroonlobben 2 × 1,5 cm, relatief zeer groot en vrij smal; kelk iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Vooraf gekenmerkt door de grote (paars)rode bloemen. De bloemen zijn iets minder rood (meer paars) dan van 'Eva Supreme', 'Bristol Ruby' en 'Red Prince'. De bloemkleur is (vrijwel) identiek aan die van 'Newport Red'. Deze laatste verschilt van 'Courtared' door de kleinere bloemen en bladeren. Een nadeel van 'Courtared' zijn de vrij slappe twijgen waardoor de struik snel uiteenvalt. Overtroffen door 'Newport Red' en de iets donkerder 'Eva Supreme' en 'Red Prince'. Dit is een triploïde cultivar ontstaan uit een tetraploïde mutant van 'Eva Rathke'.

W. DART'S COLOURDREAM: *W.* 'Intercol'

o *W.* 'Darts Pink Lady' (Pink-flowered Groep)
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, ca. 1987)

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1,4 m hoog en

1,5 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: groot, 10-17 × 4-8 cm, vrij smal ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen, vrij ruw, niet of nauwelijks behaard; bladsteel 0,5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (licht)paarsroze (RHS cc: 65B), 2,2 cm breed (middelgroot), klok- tot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk; kroonlobben 1 × 0,6 cm, relatief smal; kelk groen-iets roodachtig, tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vroeg (eind april - half mei).

Gekenmerkt door de brede en vrij lage groeiwijze en de (licht) paarsroze bloemen. Vooral door de groeiwijze te onderscheiden van de andere paarsroze-bloemigen zoals 'Pink Princess', 'Féerie' en 'Floreal'. Overtroffen door 'Pink Princess'. Selectie van de soort *W. hortensis*.

o *W.* 'Darts Yellow Lady' (Aurea Groep)

(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, ca. 1994)

GROEIWIJZE: brede struik, ca. 1,3 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: vrij groot, 9-14 × 3,5-7 cm, vrij smal ovaal, fijn getand, toegespitst, geelgroen en vrij sterk paarsrode tint, matig behaard; bladsteel ca. 0,4 cm.

BLOEIWIJZE: met 3-5 cm lange as en 7-13 bloemen per tros; vrij arm bloeiend.

BLOEMEN: licht paarsroze, klok- tot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,2 × 0,8 cm; kelk lichtgroen, iets behaard, tanden (half)vergroeid, 0,6 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

De belangrijkste kenmerken van deze cultivar zijn de geelgroene bladeren, de lichtpaarsroze bloemen en de brede groeiwijze. Vooral door de bloemkleur en de groeiwijze duidelijk te onderscheiden van de eveneens geelbladige 'Olympiade', die paarsrode bloemen heeft en hoger wordt. Een nadeel van 'Dart's Yellow Lady' is dat de takken vrij slap zijn waardoor de plant snel uiteenvalt. De cultivar wordt overtroffen door 'Olympiade'.

o *W.* 'Eva Rathke' (Red-flowered Groep)

(Rathke & Sohn, Pruszcz (Pruust) (Polen), ca. 1891)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,2 m hoog en 2,2 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: vrij groot, 10-14 × 5-8 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, zwak behaard; bladsteel ca. 1 cm.

BLOEIWIJZE: met 12-25 cm lange as en 15-40! (veel) bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)rood (RHS cc: 60B), 3,1 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1,2 × 1,4 cm; kelk groen-iets roodachtig, kaal tot iets behaard, tanden onvergroeid, 1,3 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni). 'Eva Rathke' is vooral te herkennen aan de grote trossen met (donker)rode bloemen. De cultivar lijkt op 'Eva Supreme', maar is iets minder hoog, heeft iets kleinere bloemen en bloeit iets later. Vooral qua groei wordt de cultivar overtroffen door 'Eva Supreme'. Volgens de winner een kruising tussen *W. floribunda* en *W. coraeensis*.

*** **W. 'Eva Supreme'** (Red-flowered Groep)
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, 1958)

GROEIWIJZE: hoge struik, ca. 2,7 m hoog en 2,5 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij groot, 10-14 × 4.5-8 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen, vrij ruw, zwak behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 9-25 cm lange as en 7-18 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)rood (RHS cc: 60AB), 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 3 × 1,2 cm; kroonlobben 1,2 × 1,6 cm, relatief breed; kelk iets roodachtig, vrij duidelijk behaard, tanden halfvergroeid, 1,2 cm lang; bloemsteel ca. 2,2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

De prachtige 'Eva Supreme' is vooral te herkennen aan de grote trossen met mooie rode bloemen en de robuuste groeiwijze. Lijkt veel op 'Bristol Ruby' die net iets donkerder bloemen heeft. Het is een zeer sterke struik die de bekende rode cultivars 'Eva Rathke' en 'Bristol Ruby' overtreft. Vormt samen met de lagere 'Red Prince' het duo van de beste roodbloemige cultivars. Een kruising van 'Eva Rathke' met 'Newport Red'.

o **W. 'Evita'** (Red-flowered Groep)
(H. Geers, Boskoop, 1981)

GROEIWIJZE: vrij lage brede struik, ca. 0,8 m hoog en 1,9 m breed, dicht vertakt, slap; twijgen (rood)bruin.



110. *Weigela* 'Eva Supreme'

BLADEREN: vrij groot, 8-12 × 4.5-7 cm, ovaal, fijn getand, toegespitst, midgroen en vrij sterk paarsrode tint, niet of nauwelijks behaard; bladsteel 0.5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-12 cm lange as en 9-15 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (paars)rood (RHS cc: 60BC), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 2 × 1 cm; kroonlobben 1 × 1 cm; kelk iets roodachtig, vrij duidelijk behaard, tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni).

De belangrijkste kenmerken van deze cultivar zijn de brede en vrij lage groeiwijze met overhangende takken en de (paars)rode bloemen. Door deze combinatie van kenmerken is deze cultivar duidelijk te onderscheiden van andere roodbloemige cultivars. Het is een zaailing van 'Eva Rathke'. De groeivorm is niet erg gewenst in de praktijk en verder wordt de plant ruimschoots overtroffen door met name 'Red Prince'.

o *W.* 'Féerie' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), 1926)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,5 m hoog en 2,4 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap-vrij stevig; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: zeer groot, 10-18 × 4.5-9 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen, vrij ruw, matig behaard; bladsteel ca. 0,4 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-15 cm lange as en 7-20 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: (licht)paarsroze (RHS cc: 65A(-D)), 4 cm breed (groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 3 × 1 cm; kroonlobben 1,8 × 1 cm, relatief groot en zeer smal; kelk groen-iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1,2 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Gekenmerkt door het zeer grote blad en de grote (licht) paarsroze bloemen met een lange en zeer smalle kroonbuis. Hiermee is de plant vrij gemakkelijk te onderscheiden van andere (licht) paarsroze bloemige cultivars zoals 'Floréal' en 'Pink Princess'. Een nadeel is de vrij slappe takken waardoor de plant vrij snel uiteenvalt, vooral bij slecht weer. 'Féerie' wordt overtroffen door 'Pink Princess'.

o *W.* 'Floréal' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1901)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: middelgroot, 7-11 × 4-6.5 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, (donker)groen en zwak paarsrode tint en rand, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,4 cm.

BLOEIWIJZE: met 7-10 cm lange as en 5-12 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: lichtpaarsroze met donkere en lichtere tinten (RHS cc: 64C tot iets lichter), 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 3 × 1 cm; kroonlobben 1 × 1,2 cm; kelk groen-iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,2 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Gekenmerkt door de lichtpaarsroze bloemen, iets lichter dan de meeste andere paarsroze cultivars zoals 'Féerie' en 'Pink Princess'. Een nadeel zijn de vrij slappe takken waardoor de plant vrij snel uiteenvalt, vooral bij slecht weer. 'Floréal' wordt overtroffen door 'Pink Princess'.

** *W.* 'Florida Variegata' (Variegata Groep)

(Desbois, Boskoop, voor 1861)

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,2 m hoog en 1,6 m breed, dicht vertakt, vrij stevig; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: middelgroot, 8-11 × 4-5.5 cm, ovaal, fijn getand, toegespitst, wit/geelbont (groen met witgele rand), zwak behaard; bladsteel 0.5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 9-16 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: lichtpaarsroze (RHS cc: 65A) soms bijna wit, donkerder paarsroze verbloeiend, 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, vrij sterk geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,8 cm; kroonlobben 1,2 × 1,2 cm; kelk lichtgroen-groen, iets behaard, tanden onvergroeid tot halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Dit is één van de meest gebruikte *Weigela*'s. 'Florida Variegata' is vooral te herkennen aan het bonte blad in combinatie met de lichtpaarsroze bloemen. Ten opzichte van 'Praecox Variegata' is het blad relatief breder en zijn de bloemen iets lichter paarsroze. Het blad is mooi regelmatig bont en heeft weinig last van zonnebrand. Het is een sterke plant die terecht veel gekweekt wordt.

o *W.* 'Foliis Purpureis' (Purpurea Groep)
(Frankrijk, voor 1857)

Syn. *W.* 'Purpurea'

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1,5 m hoog en 1,3 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen bruin.



111. *Weigela* 'Florida Variegata'

BLADEREN: klein, 4-5,5 × 3,5-4 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, ietwat dof groenrood; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 2-5 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: lichtpaarsroze (RHS cc: 65B), 2 cm breed (vrij klein), trechtervormig, zwak geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,8 cm; kroonlobben 0,8 × 0,9 cm, relatief vrij klein; kelk iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden vergroeid (2-lippig), 0,7 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Deze oude roodbladige cultivar heeft kleine groenrode bladeren en vrij kleine lichtpaarsroze bloemen. Ten opzichte van de meeste andere roodbladige cultivars is het blad dof groenrood en weinig spectaculair. Bovendien zijn de meeste andere roodbladige cultivars lager en compacter. 'Foliis Pupureis' komt nog het meest overeen met 'Victoria', die grotere en donkerder bloemen heeft. Overtroffen door moderne roodbladige cultivars zoals 'Bokrashine' (vooral qua groeiwijze en blad) en 'Alexandra' (vooral qua blad en bloem). Botanisch gezien valt deze cultivar onder *W. florida* var. *venusta*.



112. *Weigela* 'Intercol' (DART'S COLOURDREAM)

** *W.* 'Intercol' (DART'S COLOURDREAM) (Bicolor Groep)
(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, ca. 1987)

GROEIWIJZE: zeer hoge struik, ca. 3 m hoog en 2,8 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: zeer groot, 13-18 × 6-11 cm, ovaal-eirond, fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, vrij ruw, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 8-20 cm lange as en 13-22 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: witgeel/crème, later onregelmatig paarsrood (RHS cc: 158B, later onregelmatig 63BD), knoppen groengeel met roze randjes, 2,5 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 0,8 × 0,8 cm, relatief vrij klein; kelk lichtgroen, niet of nauwelijks behaard, tanden onvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd laat (juni).

Onmiskenbaar door de grote hoogte en de tweekleurige bloemen die eerst witgeel zijn en later paarsrood kleuren. Ook de bloei is opvallend laat. Hiermee is de cultivar met geen enkele andere te verwarren. 'Courtalor' (CARNAVAL) is

wit met paarsroze in plaats van witgeel. Selectie uit *W. japonica*. Door de unieke kleur en opvallende robuuste groeiwijze met twee sterren gewaardeerd.

W. LUCIFER: *W. 'Courtared'*

o *W. 'Milk and Honey'* (Variegata Groep)

(B. Verhoef, Hazerswoude, 2002)

Syn. *W. 'White Pillow'*

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 2 m hoog en 2,2 m breed, vrij los vertakt, (vrij) stevig, vrij onregelmatig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: groot, 10-16 × 5-8 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, zwak geelbont (groen met groengeel midden), zwak behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: wit (RHS cc: 155D), knoppen geelgroen, 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, matig geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1,1 × 1,1 cm; kelk lichtgroen, niet of nauwelijks behaard, tanden onvergroeid, ca. 0,9 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

'Milk and Honey' is onmiskenbaar door de witte bloemen in combinatie met het zwak geelbonte blad. Hiermee is de plant met geen enkele andere cultivar te verwarren. Helaas is de groei vrij onregelmatig en komt er regelmatig terugslag met groene scheuten voor. Daarom kreeg de plant geen sterrenwaardering.

W. MINOR BLACK: *W. 'Verweig 3'*

o *W. 'Minuet'* (Dwarf Groep)

(F. Svedja, Ottawa Research Station, Ottawa (C), 1981)

GROEIWIJZE: lage compacte struik, ca. 0,5 m hoog en 0,7 m breed, dicht vertakt, stevig maar erg onregelmatig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij klein, 4-7 × 2-3,5 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, zwak behaard; bladsteel ca. 0,2 cm.

BLOEIWIJZE: met 2-8 cm lange as en 3-5 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze (RHS cc: 64D), 2,5 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 3 × 1,2 cm; kroonlobben 1 × 1,2 cm; kelk roodachtig, iets behaard tanden vergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

'Minuet' is de eerst ontstane dwergvormig culti-

var. Behalve door de lage groeiwijze is de cultivar vooral gekenmerkt door de paarsroze bloemen. De groeiwijze is helaas erg onregelmatig en het oude blad wordt gauw lelijk. Dit heeft gemaakt dat 'Minuet' geen sterrenwaardering kreeg. Inmiddels lijkt de plant ook al overtroffen door andere groenbladige dwergen zoals 'Cumula', 'Plangen', 'Taura' en 'Vega', die overigens geen van allen in het beoordeelde sortiment waren opgenomen.

W. MONET: *W. 'Verweig'*

W. NAOMI CAMPBELL: *W. 'Bokrashine'*

* *W. 'Newport Red'* (Red-flowered Groep)

(V.A. Vanicek, Newport, Rhodes Island (USA), 1920)

Syn. *W. 'Vanicek'*

GROEIWIJZE: vrij hoge struik, ca. 2,2 m hoog en 2 m breed, vrij los vertakt, vrij stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: vrij groot, 9-12 × 5-7 cm, ovaal-eirond, vrij fijn getand, toegespitst, (donker)groen, matig behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 9-17 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsrood (RHS cc: 60C), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 1 cm; kroonlobben 1 × 1,3 cm, relatief vrij breed; kelk groen-iets roodachtig, vrij duidelijk behaard, tanden onvergroeid, 1,3 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Vooraf gekenmerkt door de vrij robuuste groeiwijze en de paarsrode bloemen. Qua bloemkleur iets minder rood (meer paars) dan 'Bristol Ruby' en 'Eva Supreme'. Lijkt qua kleur nog het meest op 'Courtared' (LUCIFER), maar deze laatste verschilt van 'Newport Red' door de grotere bloemen en bladeren.

Er is veel discussie over de juiste naam: 'Vanicek' of 'Newport Red'. De eerste lijkt ouder, maar het is niet zeker. Omdat 'Newport Red' veel bekender is, wordt tot het tegendeel bewezen is deze naam aangehouden.

o *W. 'Nivea'* (White-flowered Groep)

(Japan, voor 1860)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,9 m hoog en 1,8 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: groot, 11-16 × 6-9 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen, vrij ruw, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 1 cm.



113. *Weigela* 'Newport Red'



114. *Weigela* 'Olympiade' (BRIANT RUBIDOR)



115. *Weigela* 'Olympiade' (BRIANT RUBIDOR)



116. *Weigela* 'Pink Princess'

BLOEIWIJZE: met 10-15 cm lange as en 15-40! (veel) bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: wit (RHS cc: 155D), knoppen geelgroen, 2,8 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis $2,5 \times 1$ cm; kroonlobben $1,2 \times 0,8$ cm, relatief vrij smal; kelk lichtgroen, iets behaard, tanden onvergroeid, 1,5 cm lang; bloemsteel ca. 1,2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Vooraf gekenmerkt door de grote trossen witte bloemen en het grote blad. Ten opzichte van de andere witbloemige cultivars 'Candida' en 'Bristol Snowflake' is de bloeitijd iets later. Bovendien zijn ten opzichte van 'Bristol Snowflake' de takken minder stevig en raakt de plant eerder beschadigd door vorst in de winter. Overtroffen door 'Bristol Snowflake'. Het is een oude cultivar die al in 1860 vanuit Japan in Europa werd ingevoerd.

*** *W.* 'Olympiade' (BRIANT RUBIDOR; RUBIGOLD) (Aurea Groep)

(A. Briant, (F), ca. 1985)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 2 m hoog en 2,2 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen vrij opvallend roodbruin.

BLADEREN: vrij groot, $11-14 \times 4,5-6$ cm, vrij

smal ovaal, fijn getand, toegespitst, groengeel, zwak behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-12 cm lange as en 7-10 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)rood (RHS cc: 60B), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis $3 \times 1,2$ cm; kroonlobben $1 \times 1,2$ cm; kelk iets roodachtig, iets behaard, tanden (half)vergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Prachtige geelbladige cultivar die behalve vanwege de bladkleur opvalt door de (paars)rode bloemen, die mooi afsteken tegen het blad. Vanwege de combinatie van bladkleur en bloemkleur onmiskenbaar. Andere geelbladige cultivars, zoals 'Dart's Yellow Lady' en Looymansii Aurea' hebben paarsroze bloemen. Het is een sterke plant die bovendien niet snel last heeft van zonnebrand. Al met al reden om de hoogste waardering van drie sterren te geven. Mutant van 'Bristol Ruby'.

** *W.* 'Pink Princess' (Pink-flowered Groep) (Iowa State University, Iowa (USA), 1974)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,6 m hoog en 1,8 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: vrij groot, 8-12 × 3,5-6 cm, ovaal, fijn getand, toegespitst, (donker)groen en zwak paarsrode tint, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 2-5 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: (licht)paarsroze (RHS cc: 63CD), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 4 × 1 cm (lang); kroonlobben 1 × 1 cm; kelk groen-iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vroeg (eind april - half mei).

De mooiste paarsroze bloemige cultivar. Vooral gekenmerkt door mooie egale (licht) paarsroze bloemkleur, de lange kroonbuis en de vroege bloei. Overtreft veel oude paarsroze cultivars zoals 'Féerie' en 'Floréal'. Het verschil met deze cultivars zit vooral in de vroegere bloeitijd en de langere kroonbuis.

* **W. 'Polka'** (Pink-flowered Groep)

(F. Svedja, Ottawa Research Station, Ottawa (C), 1986)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 2 m hoog en 2 m breed, vrij los vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.



117. *Weigela* 'Polka'

BLADEREN: vrij klein, 6-8 × 3,5-5,5 cm, ovaal, vrij fijn getand en gegolfd, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode rand, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,2 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 7-13 bloemen per tros; zeer rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze met duidelijk donkerder buis en vlekken en bloemknoppen (RHS cc: 64B), 3,5 cm breed (vrij groot), klokvormig, vrij sterk geurend, honingmerk duidelijk zichtbaar; kroonbuis 3 × 1,2 cm; kroonlobben 1,2 × 1,3 cm; kelk roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden onvergroeid tot halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

'Polka' is vooral gekenmerkt door paarsroze bloemen in combinatie met de donker paarsroze bloemknoppen en kroonbuis. Dit is een duidelijk verschil met andere paarsroze cultivars zoals 'Pink Princess', 'Féerie' en 'Floréal'. Ook opvallende is de relatief sterke bloemgeur. Samen met 'Pink Princess' hoogst gewaarde paarsroze bloeiende cultivars.

*** **W. 'Praecox Variegata'** (Variegata Groep)
(herkomst onbekend, oude cultivar)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 1,9 m breed, dicht vertakt, stevig; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: vrij groot, 8-12 × 3-5 cm, vrij smal ovaal, fijn getand, toegespitst, wit/geelbont (groen met witgele rand) en zwak paarsrode tint en rand, soms iets gebobbel, matig behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 9-15 bloemen per tros; vrij rijk bloeiend.

BLOEMEN: (licht)paarsroze (RHS cc: 63CD) tot soms iets witachtig, vrij opvallend donker paarsroze verbloeiend, 4 cm breed (groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,8 cm; kroonlobben 1,6 × 1 cm, relatief vrij groot en smal; kelk lichtgroen (wit), niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 0,7 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Een prachtige bontbladige *Weigela*. Gekenmerkt door het relatief smalle bonte blad in combinatie met de (licht) paarsroze bloemen. Ten opzichte van 'Florida Variegata' is het blad relatief smaller en zijn de bloemen iets donkerder paarsroze. De plant heeft een mooie dichte, iets overhangende groeiwijze. Het blad is mooi regelmatig bont en heeft weinig last van zonnebrand. Het is een sterke plant die de hoogste waardering van drie sterren kreeg.



118. *Weigela* 'Praecox Variegata'



119. *Weigela* 'Praecox Variegata'

* *W.* 'Purple Rain' (Red-flowered Groep)
(B. Verhoef, Hazerswoude, 1998)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,6 m hoog en 1,8 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: middelgroot, 7-9 × 3,5-4,5 cm, ovaal-omgekeerd eirond, fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, matig behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-10 cm lange as en 5-16 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsrood (RHS cc: 60BC), 0,8 (dicht) - 1,5 (open) cm breed (vrij klein), kloktot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 3 × 0,8 cm; kroonlobben 0,5 × 0,7 cm, de relatief klein bloemknoppen blijven dicht!; kelk roodachtig, vrij duidelijk behaard tanden vergroeid, 1,3 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd vrij laat (eind mei - half juni).

'Purple Rain' is een halfhoge struik die zich vooral kenmerkt door paarsrode bloemen die altijd gesloten blijven; alleen knopbloei dus. Hiermee is deze cultivar met geen enkele andere cultivar te verwarren. Ook opvallend is dat de

plant een opvallende herfstkleur heeft, wat bij de meeste andere cultivars niet voorkomt.

W. 'Purpurea': *W.* 'Foliis Purpureis'

*** *W.* 'Red Prince' (Red-flowered Groep)
(Iowa State University, Iowa (USA), 1984)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,7 m hoog en 1,6 m breed, halfdicht vertakt, vrij stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij groot, 9-13 × 3-5 cm, smal ovaal, vrij fijn getanden gegolfd, toegespitst, (donker)groen en vrij sterk paarsrode tint, zwak behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 4-8 cm lange as en 5-13 bloemen per tros; zeer rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)rood (RHS cc: 60AB), 4 cm breed (groot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 3,8 × 0,9 cm (vrij lang); kroonlobben 1,3 × 1,5 cm; kelk roodachtig, iets behaard, tanden onvergroeid, 1,2 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

Deze prachtig halfhoge en zeer rijkbloeiende



120. *Weigela* 'Purple Rain' (knopbloei)



121. *Weigela* 'Purple Rain' (herfstkleur)



122. *Weigela* 'Red Prince'

cultivar is vooral te herkennen aan de grote (donker) rode bloemen. 'Red Prince' is iets minder robuust dan 'Bristol Ruby' en 'Eva Supreme' met vergelijkbare bloemkleur. Bovendien is de kroonbuis langer en smaller. Ten opzichte van 'Evita' is de cultivar hoger en relatief minder breed. Vormt samen met 'Eva Supreme' de top van het sortiment roodbloemigen. Zaailing van 'Newport Red'.

o *W.* 'Rosea' (Pink-flowered Groep)
(Onbekend, voor 1921)

GROEIWIJZE: hoge struik, ca. 2,8 m hoog en 2,2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: vrij groot, 9-14 × 4-7 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, midgroen en zwak paarsrode tint en rand, vrij ruw, zwak behaard; bladsteel ca. 0,4 cm.

BLOEIWIJZE: met 8-12 cm lange as en 15-23 (veel) bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: lichtpaarsroze met brede witte rand (RHS cc: 65A en witachtig), 3 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,7 cm; kroonlobben 1 × 1,3 cm, relatief vrij breed; kelk groen-iets roodachtig, iets behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

De identificatie van 'Rosea' bleek problematisch, omdat er meerdere klonen onder deze naam in omloop zijn. Zowel in de collectie van de botanische tuin van Wageningen als in die van Sheffield, zijn andere klonen aangetroffen. Aan de hand van de korte beschrijvingen in oude literatuur is niet te traceren welke kloon de echte is. De boven beschreven plant is de Boskoopse kloon. Gekenmerkt door grote hoogte en de lichtpaarsroze bloemen. Daar de plant geen sterrenwaardering kreeg, is verder geen moeite gedaan om dit soortechtheidsprobleem op te lossen.

W. RUBIGOLD: *W.* 'Olympiade'

W. 'Ruby King': *W.* 'Ruby Queen'

o *W.* 'Ruby Queen' ^{PBR} (Purpurea Groep)
(H. Geers, Boskoop, 1994)

Syn. *W.* 'Ruby King'

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1 m hoog en 1 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: klein, 4,5-6 × 2,5-3,5 cm, ovaal, fijn getand, toegespitst, bruinrood, zwak behaard; bladsteel ca. 1 cm.

BLOEIWIJZE: met 3-5 cm lange as en 3-7 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64BC), 1,5 cm breed (vrij klein), klok- tot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,7 cm; kroonlobben 0,5 × 0,7 cm, relatief klein en breed lobben staan nauwelijks uit; kelk roodachtig, kaal tot iets behaard tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

'Ruby Queen' is semi-dwergvormige roodbladige cultivar. De plant lijkt het meest op *W.* 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL), maar verschilt hiervan door de iets geringere afmeting van de plant en het blad. Bovendien is 'Bokrashine' duidelijk sterker vertakt. Ten opzichte van 'Verweig 3' (MINOR BLACK) is 'Ruby Queen' juist iets groter. Deze cultivar wordt door *W.* 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL) en 'Verweig 3' (MINOR BLACK) overtroffen. Soms onder de foute naam 'Ruby King' verhandeld.

o *W.* 'Rumba' (Pink-flowered Groep)

(F. Svedja, Ottawa Research Station, Ottawa (C), 1985)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,7 m hoog en 1,5 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: middelgroot, 8-11 × 3,5-7 cm, ovaal-omgekeerd eirond, vrij fijn getanden gegolfd, toegespitst, donkergroen en vrij sterk paarsrode tint, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 5-12 cm lange as en 7-21 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64BC), 2 cm breed (vrij klein), klokvormig, zwak geurend, honingmerk iets zichtbaar; kroonbuis 3 × 1 cm; kroonlobben 0,8 × 0,8 cm, relatief vrij klein; kelk iets roodachtig-roodachtig, kaal tot iets behaard, tanden (half)vergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1,2 cm lang; bloeitijd middentijds (half mei - begin juni).

'Rumba' is vooral te herkennen aan het groene blad met paarsrode tint (duidelijk rood) in combinatie met de halfhoge groeiwijze en de (donker) paarsroze bloemen. Er is geen andere cultivar die er veel op lijkt. Qua bloemkleur lijkt de cultivar nog het meest op 'Abel Carrière', maar deze is veel robuuster. Het is een kruising tussen 'Foliis Purpureis' en 'Dropmore Pink'.

o *W.* 'Samba' (Purpurea Groep)

(F. Svedja, Ottawa Research Station, Ottawa (C), 1984)

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 0,9 m hoog en 1 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij klein, 5-7 × 2-3,5 cm, vrij smal ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, groenrood, zwak behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 5-9 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64BC), 3,6 cm breed (vrij groot), klok- tot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 3 × 1 cm; kroonlobben 0,8 × 1,2 cm, relatief vrij klein en breed; kelk roodachtig, kaal tot iets behaard, tanden (half)vergroeid, 0,6 cm lang; bloemsteel ca. 1,5 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

De semi-dwergvormige 'Samba' heeft groenrood blad en (donker)paarsroze bloemen. Deze cultivar is het best te vergelijken met 'Tango', die iets hoger en steviger is. Qua bladkleur lang niet zo spectaculair als bijvoorbeeld de veel rodere 'Bokrashine' (NAOMI CAMPBELL) en 'Verweig 3' (MINOR BLACK) en qua bloemen lang niet zo mooi als 'Alexandra'. Daarom geen sterrenwaardering voor deze cultivar. Kruising tussen 'Rumba' en 'Eva Rathke'.

W. SHINING FANTASY: W. 'Bokrashine'

W. 'Snowflake': W. 'Bristol Snowflake'

o W. 'Sunny Princess' (Variegata Groep)

(B. Verhoef, Hazerswoude, ca. 1992)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 2 m breed, halfdicht vertakt, vrij slap; twijgen opvallend bruinrood.

BLADEREN: middelgroot, 7-9 × 3-5 cm, ovaal-omgekeerd eirond, fijn getand, toegespitst, geelbont (groen met gele rand) en paarsrode tint en rand, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 2 cm lange as en 5-7 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze met witachtige tint en rand (RHS cc: 64D (en witachtig)), 2,2 cm breed (middelgroot), klokvormig, zwak geurend, honingmerk vrij duidelijk zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,8 cm; kroonlobben 1 × 0,8 cm, relatief vrij smal; kelk iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

'Sunny Princess' heeft relatief smal geelbont blad en paarsroze bloemen. Hiermee lijkt deze cultivar het meest op 'Praecox Variegata'. Deze laatste heeft echter minder geel blad (geelbont tot witbont) en grotere bloemen met een relatief

breedere kroonbuis. De groeiwijze van 'Praecox Variegata' is veel steviger en mooier. Daarom geen sterrenwaardering voor 'Sunny Princess'. Het is een bonte sport uit 'Pink Princess'.

* W. 'Tango' (Purpurea Groep)

(F. Svedja, Ottawa Research Station, Ottawa (C), 1985)

GROEIWIJZE: vrij lage struik, ca. 1,2 m hoog en 1,2 m breed, halfdicht vertakt, zeer stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: vrij klein, 5,5-8 × 3-4 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, groenrood behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 3 cm lange as en 3-9 bloemen per tros; (zeer) rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze (RHS cc: 64D), 1,8 cm breed (vrij klein), trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,7 cm; kroonlobben 0,7 × 0,8 cm, relatief vrij klein; kelk iets roodachtig-roodachtig, kaal tot iets behaard tanden halfvergroeid, 1 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

De belangrijkste kenmerken van deze semi-dwergvormige cultivar zijn de groenrode bladeren en de paarsroze bloemen. Qua groeiwijze (stevigheid) en bladkleur mooier dan 'Samba' en 'Victoria'.



123. *Weigela* 'Tango'



124. *Weigela* 'Verweig' (MONET)

W. 'Vanicek': *W.* 'Newport Red'

**** *W.* 'Verweig' ^{PBR} (MONET) (Dwarf Groep)**
(B. Verhoef, Hazerswoude, 2003)

GROEIWIJZE: lage compacte struik, ca. 0,6 m hoog en 0,7 m breed, zeer dicht vertakt, zeer stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: klein, 5-6,5 × 2-3 cm, vrij smal ovaal, fijn getand, toegespitst, wit/geelbont (groen met brede witgele rand) en paarsrode tint en rand, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,2 cm.

BLOEIWIJZE: met 2 cm lange as en 5-5 bloemen per tros; rijk bloeiend.

BLOEMEN: (licht)paarsroze (RHS cc: 65A / 64D), 2 cm breed (vrij klein), trechtervormig, zwak geurend, honingmerk; kroonbuis cm; kroonlobben 0,7 × 0,9 cm, relatief vrij klein en vrij breed; kelk roodachtig; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Een spectaculaire nieuwigheid die onmiskenbaar is door de dwergvormige groeiwijze in combinatie met de bonte blad en de de (licht)paarsroze bloemen. Met geen enkele andere cultivar te verwarren. Vooral geschikt voor toepassing als potplant of in kleine tuinen. In het vrije veld valt de plant door zon, droogte en concurrentie van andere planten gauw terug. Echter



125. *Weigela* 'Verweig' (MONET)

bij de juiste verzorging een prachtige cultivar, vandaar een waardering met twee sterren. Het is een mutant uit 'Tango'.

s *W.* 'Verweig 2' ^{PBR} (CAPPUCCINO) (Dwarf Groep)

(B. Verhoef, Hazerswoude, 2003)

GROEIWIJZE: lage compacte struik, ca. 0,8 m hoog en 1,1 m breed, dicht vertakt, zeer stevig; twijgen bruin.

BLADEREN: vrij klein, 6-7,5 × 2,5-3,5 cm, vrij smal ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, geelgroen en paarsrode tint en rand, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,3 cm.

BLOEIWIJZE: met 2 cm lange as en 3-7 bloemen per tros; vrij arm bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze (RHS cc: 64D), 2 cm breed (vrij klein), klok- tot trechtervormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2,5 × 0,8 cm; kroonlobben 0,7 × 0,9 cm, relatief vrij klein en vrij breed; kelk iets roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden vergroeid, 0,6 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

Uniek door de bladkleur (geelgroen met paarsrode tint) in combinatie met de dwergvormige groeiwijze. Hiermee is de plant met geen enkele



126. *Weigela* 'Verweig 2' (CAPPUCINO)



127. *Weigela* 'Verweig 3' (MINOR BLACK)

andere cultivar te verwarren. Helaas verbrandt het blad snel door de zon waardoor de plant in het vrije veld vaak erg lelijk wordt in de loop van de het seizoen. Echter door de unieke eigenschappen wel een echte liefhebbersplant.

**** *W.* 'Verweig 3' PBR (MINOR BLACK) (Purpurea Groep)**

(B. Verhoef, Hazerswoude, 2003)

GROEIWIJZE: lage compacte struik, ca. 0,75 m hoog en 1 m breed, dicht vertakt, zeer stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: vrij klein, 5-7 × 2,5-4 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, bruinrood, niet of nauwelijks behaard; bladsteel ca. 0,5 cm.

BLOEIWIJZE: met 2 cm lange as en 3-7 bloemen per tros; zeer rijk bloeiend.

BLOEMEN: (donker)paarsroze (RHS cc: 64B), 2,5 cm breed (middelgroot), trechtersvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 1 cm; kroonlobben 1 × 0,7 cm, relatief vrij smal; kelk roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 0,7 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd mid-dentijds (half mei - begin juni).

De derde dwerg op rij van Bert Verhoef. 'Verweig 3' (MINOR BLACK) is laag en compact en heeft mooi bruinrood blad. De cultivar is duide-



128. *Weigela* 'Verweig 3' (MINOR BLACK)

lijk lager dan bijvoorbeeld 'Bokrashine' en zelfs lager dan 'Ruby Queen'. Een duidelijke aanwinst in het sortiment. Kreeg al een Zilveren medaille op Plantarium 2006.

o **W. 'Victoria'** (Purpurea Groep)
(H. Geers, Boskoop, 1988)

GROEIWIJZE: halfhoge struik, ca. 1,8 m hoog en 1,6 m breed, halfdicht vertakt, stevig; twijgen (rood)bruin.

BLADEREN: klein, 5-6,5 × 2,5-3,5 cm, ovaal, vrij fijn getand, toegespitst, ietwat dof groenrood, niet of nauwelijks behaard; bladsteel 0,5-1 cm.

BLOEIWIJZE: met 5 cm lange as en 3-7 bloemen per tros; zeer rijk bloeiend.

BLOEMEN: paarsroze (RHS cc: 64C), 2,5 cm breed (middelgroot), trechtersvormig, zwak geurend, honingmerk niet of nauwelijks zichtbaar; kroonbuis 2 × 0,8 cm; kroonlobben 0,9 × 1 cm, lobben staan nauwelijks uit; kelk roodachtig, niet of nauwelijks behaard, tanden halfvergroeid, 0,7 cm lang; bloemsteel ca. 1 cm lang; bloeitijd vrij vroeg (mei).

De middelhoge 'Victoria' heeft rood blad en paarsroze bloemen. Het was in eerste instantie zeker een verbetering van de bekende 'Foliis Purpureis', ware het niet dat ongeveer tegelijkertijd de Canadese 'Tango' werd geïntroduceerd, die vooral qua bladkleur mooier is (meer glans). Vandaar geen sterrenwaardering voor 'Victoria'.

W. 'White Pillow': **W. 'Milk and Honey'**
W. WINE & ROSES: **W. 'Alexandra'**

Cultivars uit literatuur

Onderstaande cultivars hebben niet in de proefopplant gestaan, maar zijn nog wel in de handel of aangetroffen in andere collecties. De beschrijvingen zijn ontleend aan gegevens uit de literatuur. Veel van de cultivars zijn uitgebreid beschreven in de publicaties van Achille (1995) en Van Proosdij (1997).

W. 'Ara' (Dwarf Groep)

(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 2007)

Dwergstruik, compact, 90 cm hoog en 90 cm breed. Bloemen lichtrood. Zeer geschikt voor heggen en vakken.

W. 'Avalanche' (White-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), 1909)

Groeikrachtige struik met zuiver witte bloemen.

W. 'Ballet' (Pink-flowered Groep)

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, ca. 1958)

Brede halfhoge struik met grote (donker) paarsroze bloemen kruising tussen 'Boskoop Glory' en 'Newport Red'.

W. 'Bicolor' (Bicolor Groep)

(Daisy Hill Nursery, Newry (IR), voor 1965)

Met roze en crèmewitte bloemen aan dezelfde struik.

W. 'Bokrarob' ^{PBR} (**LITTLE RED ROBIN**) (Red-flowered Groep)

(Boot & Co, Boskoop, 2007)

Vrij compacte cultivar, ruim 1 m hoog en breed. Bladeren groen. Bloemen rood. Het is een doorbloeiende cultivar die bloeit van mei t/m september.

W. 'Bokraspark' ^{PBR} (**SPARKLING FANTASY**) (Purpurea Groep)

(Boot & Co, Boskoop, 1997)

Snijheester met glimmend roodbruine bladeren. Gebruikt als bladsnijtak.

W. 'Boskoop Glory' (Pink-flowered Groep)

(Fa. J. Ramp & Zn, Boskoop, ca. 1954)

Forse struik, met grote zalmroze bloemen.

W. 'Bouquet Rose' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1899)

Syn. *W. 'Rosa Strauss'*

Bloemen groot, volledig open, roze met witachtige zoom. Bladeren groot, aan de onderzijde behaard. Vroeg bloeiend.

W. 'Brigela' ^{PBR} (**FRENCH LACE; MOULIN ROUGE**) (Variegata Groep)

(André Briant, St. Barthelemy d'Anjou (F), ca. 2000)

Bladeren geelbont. Bloemen donkerrood.

W. 'Buisson Fleuri' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1911)

Grote paarsroze bloemen in compacte trossen.

W. 'Centennial' (Red-flowered Groep)

(Waarschijnlijk uit Canada of VS)

Middelhoge struik met paarsrode bloemen. Zeer winterhard.

W. 'Congo' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1886)

Syn. *W. 'Kongo'*

Rijkbloeiende struik met paarsroze bloemen.

W. 'Conquête' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1896)

Grote open struik met uitzakkende takken. Bladeren groot. Bloemen groot, roze met lichtere plekken, trechtervormig. De bloemen zijn lichter dan van 'Abel Carrière'

W. COULEUR D'AUTOMNE: **W. 'Courtatom'**

W. 'Courtadur' (GRENADINE) (Red-flowered Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 19??)

Semi-dwergvormige struik, met vrij kleine donkerrode bloemen. Mutant van 'Bristol Ruby'

W. 'Courtamon' (FÉLINE) (Bicolor Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 19??)

Vrij lage maar zeer brede struik. Bloemen halfgroot, meerkleurig; knoppen donker paarsrood, bij openen geelwit en aan het eind verkleurend naar rood. Dit is een triploïde cultivar. Kruising tussen een tetraploïde mutant van 'Bristol Ruby' en 'Abel Carrière'.

W. 'Courtanin' (NAIN ROUGE) (Red-flowered Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 19??)

Vrij lage struik, met middelgrote rode bloemen. Bladeren vrij klein. Mutant van 'Le Printemps'

W. 'Courtatom' (COULEUR D'AUTOMNE) (Pink-flowered Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 19??)

Halfhoge struik met vrij grote lichtroze tot witte bloemen. Bladeren rood verkleurend in de herfst. Mutant van 'Le Printemps'

W. 'Courtavif' (RUBIVIF) (Red-flowered Groep)

(INRA, Angers (F), ca. 19??)

Halfhoge vrij brede struik met middelgrote rode bloemen Mutant van 'Bristol Ruby'.

W. 'Cumula' (Dwarf Groep)

(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 2007)

Dwergstruik, compact en zeer regelmatig, 75 cm hoog en 105 cm breed. Bloemen rozerood.

W. 'Dart's Overflow' (Pink-flowered Groep)

(Darthuizer Boomkwekerijen BV., Leersum, ca. 1994)

Vrij lage struik, tot 1,5 m hoog, met spreidende takken. Bloemen klein, rozerood, zeer talrijk. Bloei in juni.

W. 'Descartes' (Red-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1891)

Halfhoge, brede vrij open struik. Bloemen donker grijsrood.

W. 'Dropmore Pink' (Pink-flowered Groep)

(F.L. Skinner, Dropmore (C), 1951)

Bloemen roze. Zeer winterhard. Geselecteerd uit in Noord-Mantsjoerije verzameld materiaal.

W. 'Dwarf Red' (Red-flowered Groep)

(USA, voor 1973)

Halfhoge brede struik met vrij grote rode bloemen.

W. 'Elvera' ^{PBR} (MIDNIGHT WINE) (Purpurea Groep)

(H. Geers, Boskoop, ca. 2001)

Dwerguitvoering van 'Alexandra'. Donkerrood blad met roze bloemen. Wordt niet hoger dan 50 cm. Wordt in de USA vermarkt onder de naam Midnight Wine.

W. 'Emerald Edge' (Variegata Groep)

Bladeren bont en bloemen rood.

W. 'Espérance' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1906)

Zeer grote bloemen, bleekroze, de knoppen donkerder. Één van de vroegste bloeiers.

W. FÉLINE: **W. 'Courtamon'**

W. 'Fiesta' (Red-flowered Groep)

(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, ca. 1958)

Vrij lage, losse struik, tot 1,1 m hoog. Bloemen ca. 3 cm breed, rozerood. Kruising tussen 'Newport Red' en 'Eva Rathke'.

W. 'Fleur de Mai' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1899)

Bloemen paarsroze in dichte bloeiwijzen.

W. FRENCH LACE: **W. 'Brigela'**

W. 'Gloire de Bosquets' (Pink-flowered Groep)

(Lemoine, Nancy (F), ca. 1881)

Vrij lage maar zeer brede struik. Bloemen lichtroze, middelgroot.

W. 'Gold Rush' (Variegata Groep)

Bladeren geelbont. Bloemen roze Wellicht hetzelfde als 'Florida Variegata' of 'Praecox Variegata'.

W. 'Gracieux' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1904)

Opgaande plant met grote zalmroze bloemen;
zeer bloeirijk.

W. 'Grandiflora' (Pink-flowered Groep)
(Frankrijk, voor 1867)

Groeikrachtige struik met grote bladeren en
witachtige naar lichtroze verkleurende bloemen.

W. GRENADINE: **W. 'Courtadur'**

W. 'Grethe' (Purpurea Groep)
Vrij kleine struik met bruinrood blad.

W. 'Groenewegenii' (Pink-flowered Groep)
(Van Houtte, Gent (B), ca. 1859)
Forse struik, tot ruim 2 m hoog. Bloemen 2,5 cm
breed, donkerroze met lichtere plekken Kruising
tussen *W. florida* en *W. coraeensis*.

W. 'Gustave Malet' (Pink-flowered Groep)
(M. Billiard, Fontanay-aux-Roses, ca. 1868)
Zeer grote struik, tot 2,3 m hoog. Bloemen wijd
open, grout, ruim 3,5 cm breed, roze met lichtere
plekken. Kruising tussen *W. florida* en *W. coraeensis*

W. 'Héroïne' (White-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1896)
Middelgrote opgaande struik. Bloemen groot, tot
4 cm breed, zeer lichtroze tot wit.

W. 'Idéal' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1926)
Matig groeikrachtige struik, iets gedrongen. Rijk
bloeiend. Bloemen in grote trossen, middel-
groot, karmijnroze. Bloemen donkerder dan de
meeste andere cultivars van de Pink-flowered
Groep. Hybride van *W. praecox*

W. 'Java Red' (Purpurea Groep)
(VS?)
Bladeren donkerroodbruin en bloemen bleekroze.

W. JEAN'S GOLD: **W. 'Nezako'**

W. 'Kolmas' (MAGICAL SUNSHINE) (Variegata
Groep)
(Kolster B.V. Sijheesterkwekerij, Boskoop)
Bontbladige cultivar uit de snijheesterteelt.

W. 'Kolsunn' (SUNNY FANTASY) (Variegata
Groep)
(Kolster B.V. Sijheesterkwekerij, Boskoop)
Bontbladige cultivar uit de snijheesterteelt.

W. 'Kongo': **W. 'Congo'**

W. 'Kosteriana Variegata' (Variegata Groep)
(Engeland, voor 1881)
Halfhoge struik met bont blad en zeer lichtroze
tot witte bloemen.

W. 'Le Printemps' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1901)
Vrij forse struik met grote lichtroze tot bijna
witte bloemen. Vroeg bloeiend.

W. LITTLE RED ROBIN: **W. 'Bokrarob'**

W. 'Looymansii Aurea' (Aurea Groep)
(Van Houtte, Gent (B), ca. 1876)
Vrij lage struik, zwak groeiend, met hangende
takken. Bladeren groengeel.. Bloemen roze.
Vanweg bloemkleur duidelijk verschillend van
'Olympiade'.

W. 'Madame Lemoine' (Pink-flowered
Groep)
(M. Billiard, Fontanay-aux-Roses (F), ca. 1878)
Grote struik, tot 2 m hoog. Bloemen lichtroze,
donker verbloeiend, ca. 3 cm breed. Kruising
tussen *W. florida* en *W. coraeensis*

W. MAGICAL SUNSHINE: **W. 'Kolmas'**

W. 'Majestueux' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1930)
Grote struik met opgaande takken. Bloemen
roze.

W. 'Mansais' (White-flowered Groep)
(Frankrijk, voor 1995)
Halfhoge struik met middelgrote witte bloe-
men. Herkomst onbekend.

W. 'Marginata' (Variegata Groep)
(Voor 1900)
Halfhoge opgaande struik met zwak bont blad
(alleen de rand) en lichtroze tot witte bloemen.

W. 'Messenger' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1911)
Grote roze bloemen met ronde lobben

W. MIDNIGHT WINE: **W. 'Elvera'**

W. 'Mme Couturier' (Pink-flowered Groep)
(M. Billiard, Fontanay-aux-Roses, ca. 1868)
Laat bloeiende struik met witte bloemen die
verkleuren naar roze.

W. 'Mont Blanc' (White-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1898)
Krachtig groeiende plant. Bloemen zeer groot, zuiver wit. Kruising tussen *W. florida* en *W. hortensis*

W. MOULIN ROUGE: **W. 'Brigela'**
W. NAIN ROUGE: **W. 'Courtanin'**

W. 'Nana Purpurea' (Purpurea Groep)
Syn. *W. 'Purpurea Nana'*
Waarschijnlijk is dit een synoniem van 'Foliis Purpureis'. De onder deze naam aangetroffen planten waren steeds 'Foliis Purpureis'. Soms ook vermeld als 'Purpurea Nana'.

W. 'Nana Variegata' (Variegata Groep)
(Baudriller, 1880)
Een naam die veel in de literatuur opduikt. De planten die gedurende het onderzoek in collecties zijn aangetroffen waren steeds 'Florida Variegata' of soms 'Praecox Variegata'.

W. 'Nezako' (JEAN'S GOLD) (Aurea Groep)
(Zako Paul, Tamworth Staffs (UK), 1998)
Geelbladige cultivar die erg veel op 'Olympiade' lijkt.

W. 'Othello' (Pink-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1882)
Halfhoge struik. Bloemen alleenstaand, roze, 2 cm breed.

W. 'Perle' (White-flowered Groep)
(Lemoine, Nancy (F), ca. 1902)
Vrij grote struik. Bloemen vrij groot, 2,5 cm breed, wit met zeer lichtroze gefranjerde (!) rand. Lijkt op 'Heroine' qua bloemkleur, maar verschilt vanwege de gefranjerde rand van de kroonlobben.

W. 'Piccolo': **W. 'Plangen'**

W. 'Piccolo' (Dwarf Groep)
(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 1995)
Dwergstruik, compact, ca. even hoog als breed. Bloemen roze. Één van de genetische bronnen voor Tjechisch kruisingsprogramma voor lage compacte *Weigela*. Waarschijnlijk is dit hetzelfde als *W. 'Plangen'* (Pink Poppet)

W. PINK POPPET: **W. 'Plangen'**

W. 'Plangen' ^{PBR} (**PINK POPPET**) (Dwarf Groep)
(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), ca. 1998)
Syn. *W. 'Piccolo'* ?
Dwergstruik, compact, ca. even hoog als breed. Bloemen roze. Één van de genetische bronnen voor het Tsjechische kruisingsprogramma voor lage compacte *Weigela*.

W. 'Président Duchartre' (Red-flowered Groep)
(Baudriller, Gennes (F), 1880)
Halfhoge struik met vrij kleine rode bloemen.

W. 'Rosabella' (Pink-flowered Groep)
(Proefstation voor de Boomkwekerij, Boskoop, ca. 1958)
Relatief brede, vrij lage struik met spreidende tot hangende takken. Bloemen (licht)roze, groot, trechtervormig, tot 3,5 cm breed. Kruising tussen 'Eva Rathke' en 'Newport Red'

W. RUBIVIF: **W. 'Courtavif'**

W. 'Saturn' (Red-flowered Groep)
(Waterer, Sons & Crisp, Bagshot (UK), 1892)
Grote open rode bloemen.

W. 'Siebold Variegata' (Variegata Groep)
(Van Houtte, Gent (B), ca. 1878)
Halfhoge struik met bont blad en zeer lichtroze tot witte bloemen.

W. SPARKLING FANTASY: **W. 'Bokraspark'**

W. 'Stelzneri' (Red-flowered Groep)
(Van Houtte, Gent (B), ca. 1861)
Bloemknoppen zuiverrood, bloemen paarsrood, groot.

W. 'Styriaca' (Pink-flowered Groep)
(W. Klenert, Graz (AU), 1908)
Halfhoge, relatief brede struik met overhangende takken. Bloemen (donker)roze, met lange smalle buis. Bloemen donkerder dan de meeste andere cultivars van de Pink-flowered Groep. Waarschijnlijk een kruising tussen *W. floribunda* en *W. coraeensis*.

W. SUNNY FANTASY: **W. 'Kolsunn'**

W. 'Suzanne' (Variegata Groep)
Bladeren bont; bloemen roze en wit.

***W.* ‘Taura’** (Dwarf Groep)

(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 2007)

Dwergstruik, compact, 65 cm hoog en 65 cm breed. Bloemen rozerood.

***W.* ‘Van Houttei’** (Pink-flowered Groep)

(Desbois, Boskoop, voor 1861)

Grote brede struik met opgaande tot hangende takken. Bloemen roze met lichtere plekken, ruim 3 cm breed. Kruising tussen *W. hortensis* en *W. florida*. Lijkt op de iets donkerdere ‘Othello’.

***W.* ‘Vega’** (Dwarf Groep)

(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 2007)

Dwergstruik, compact en relatief breed, 55 cm hoog en 70 cm breed. Bloemen paarsrood.

***W.* ‘Verschaffeltii’** (Pink-flowered Groep)

(Van Houtte, Gent (B), ca. 1876)

Relatief brede, vrij lage struik. Bloemen roze met lichtere plekken. Vooral opvallend vanwege de brede groeiwijze.

***W.* ‘Versicolor’** (Variegata Groep)

(Van Houtte, Gent (B), ca. 1867)

Halfhoge struik met bont blad en witte bloemen.

***W.* ‘Volans’** (White-flowered Groep)

(Silva Tarauca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Pruhonice (CZ), voor 2007)

Semi-dwergstruik, opgaand, 1,5 m hoog en 1 m breed. Bloemen wit, met roze knoppen.

***W.* ‘Wessex Gold’** (Aurea Groep)

Bladeren groengeel.

***W.* ‘White Knight’** (White-flowered Groep)

Bloemen wit, bloemknoppen iets roze.

	Correcte naam	groep	hoog × breed	bladkleur
o	‘Abel Carrière’	Pink-flowered	2.3 × 2.3	midgroen
**	‘Alexandra’ (WINE & ROSES)	Purpurea	1.6 × 1.8	(donker)bruinrood
***	‘Bokrashine’ (NAOMI CAMPBELL)	Purpurea	1.4 × 1.7	bruinrood
o	‘Bristol Ruby’	Red-flowered	2.4 × 2	midgroen
**	‘Bristol Snowflake’	White-flowered	1.8 × 1.8	midgroen
o	‘Caméléon’	Bicolor	2 × 2	midgroen
o	‘Candida’	White-flowered	2.5 × 3	midgroen
s	‘Caricature’	Variegata	1.8 × 2	geelbont
s	‘Coffee Black’	Purpurea	1 × 1.2	donkerbruinrood
*	‘Courtalor’ (CARNAVAL)	Bicolor	2.3 × 2.2	midgroen
o	‘Courtared’ (LUCIFER)	Red-flowered	2.2 × 2	midgroen
o	‘Darts Pink Lady’	Pink-flowered	1.4 × 1.5	midgroen
o	‘Darts Yellow Lady’	Aurea	1.3 × 2	geelgroen
o	‘Eva Rathke’	Red-flowered	2.2 × 2.2	midgroen
***	‘Eva Supreme’	Red-flowered	2.7 × 2.5	midgroen
o	‘Evita’	Red-flowered	0.8 × 1.9	midgroen
o	‘Féerie’	Pink-flowered	2.5 × 2.4	midgroen
o	‘Floréal’	Pink-flowered	1.8 × 2	(donker)groen
**	‘Florida Variegata’	Variegata	2.2 × 1.6	wit/geelbont
o	‘Foliis Purpureis’	Purpurea	1.5 × 1.3	groenrood
**	‘Intercol’ (DART’S COLOURDREAM)	Bicolor	3 × 2.8	midgroen
o	‘Milk and Honey’	Variegata	2 × 2.2	zwak geelbont
o	‘Minuet’	Dwarf	0.5 × 0.7	midgroen
*	‘Newport Red’	Red-flowered	2.2 × 2	(donker)groen
o	‘Nivea’	White-flowered	1.9 × 1.8	midgroen
***	‘Olympiade’	Aurea	2 × 2.2	groengeel
**	‘Pink Princess’	Pink-flowered	1.6 × 1.8	(donker)groen
*	‘Polka’	Pink-flowered	2 × 2	midgroen
***	‘Praecox Variegata’	Variegata	1.8 × 1.9	wit/geelbont
*	‘Purple Rain’	Red-flowered	1.6 × 1.8	midgroen
***	‘Red Prince’	Red-flowered	1.7 × 1.6	(donker)groen
o	‘Rosea’	Pink-flowered	2.8 × 2.2	midgroen
o	‘Ruby Queen’	Purpurea	1 × 1	bruinrood
o	‘Rumba’	Pink-flowered	1.7 × 1.5	donkergroen
o	‘Samba’	Purpurea	0.9 × 1	groenrood
o	‘Sunny Princess’	Variegata	1.8 × 2	geelbont
*	‘Tango’	Purpurea	1.2 × 1.2	groenrood
**	‘Verweig’ (MONET)	Dwarf	0.6 × 0.7	wit/geelbont
s	‘Verweig 2’ (CAPPUCCINO)	Dwarf	0.8 × 1.1	geelgroen
**	‘Verweig 3’ (MINOR BLACK)	Purpurea	0.75 × 1	bruinrood
o	‘Victoria’	Purpurea	1.8 × 1.6	groenrood

bloemkleur	bloemdiameter	bloeitijd	Opmerkingen
paarsroze	middelgroot	mei	Overtroffen door 'Pink Princess'
(donker)paarsroze	middelgroot	mei	De mooiste roodbladige qua bloei
(donker)paarsroze	vrij klein	h.mei-b.juni	Zeer goed vertakt, ook onderin
donkerrood	vrij groot	e.mei-h.juni	Overtroffen door 'Eva Supreme'
wit met zwak roze	middelgroot	mei	De beste witbloemige; mooie groeiwijze
donker paarsroze en wit	groot	mei	Overtroffen door 'Courtalor' (CARNAVAL)
zuiver wit	vrij groot	mei	Overtroffen door 'Bristol Snowflake'
lichtpaarsroze	middelgroot	h.mei-b.juni	Bonte blad opvallend gefrommeld
donkerpaarsrood	vrij klein	e.mei-h.juni	Donkerste bladkleur van alle; knopbloei
paarsroze tot wit tot paarsrood	vrij groot	e.mei-h.juni	Bijzondere bloemkleur
(paars)rood	groot	h.mei-b.juni	Overtroffen door 'Red Prince'
(licht)paarsroze	middelgroot	e.april-h.mei	Overtroffen door 'Pink Princess'
lichtpaarsroze	middelgroot	h.mei-b.juni	Overtroffen door 'Olympiade'
(donker)rood	middelgroot	e.mei-h.juni	Overtroffen door 'Eva Supreme'
(donker)rood	vrij groot	h.mei-b.juni	De beste hoge roodbloemige
(paars)rood	middelgroot	e.mei-h.juni	Overtroffen door 'Red Prince'
(licht)paarsroze	groot	mei	Overtroffen door 'Pink Princess'
lichtpaarsroze	vrij groot	mei	Overtroffen door 'Pink Princess'
lichtpaarsroze	middelgroot	h.mei-b.juni	Mooi regelmatig bont en weinig zonnebrand
lichtpaarsroze	vrij klein	mei	Overtroffen door 'Bokrashine' en 'Alexandra'
geelwit/cream tot paarsrood	middelgroot	juni	Unieke bloemkleur en late bloei
wit	middelgroot	mei	Zwak bont; onregelmatige groei
paarsroze	middelgroot	mei	Zeer onregelmatige groei
paarsrood	middelgroot	mei	Minder rood dan bv. 'Eva Supreme'
wit	middelgroot	h.mei-b.juni	Overtroffen door 'Bristol Snowflake'
(donker)rood	middelgroot	h.mei-b.juni	De mooiste geelbladige
(licht)paarsroze	middelgroot	e.april-h.mei	Overtreft veel oude (paars)roze cv's
paarsroze met donkerder buis	vrij groot	mei	Relatieve sterke bloemgeur
(licht)paarsroze	groot	h.mei-b.juni	Mooi regelmatig bont en weinig zonnebrand
paarsrood	vrij klein	e.mei-h.juni	Knopbloei; opvallende herfstkleur
(donker)rood	groot	h.mei-b.juni	Één van de mooiste roodbloemigen
lichtpaarsroze	middelgroot	h.mei-b.juni	Verschillende klonen in omloop
(donker)paarsroze	vrij klein	h.mei-b.juni	Overtroffen door 'Bokrashine' en 'Verweig 3' (MINOR BLACK)
(donker)paarsroze	vrij klein	h.mei-b.juni	Bloemkleur donkerder dan 'Pink Princess'
(donker)paarsroze	vrij groot	mei	Overtroffen door 'Tango'
paarsroze	middelgroot	mei	Bonte sport uit 'Pink Princess'
paarsroze	vrij klein	mei	Voor al qua habitus mooier dan 'Victoria'
(licht)paarsroze	vrij klein	mei	Voor al prachtige potplant
paarsroze	vrij klein	mei	Bladkleur uniek, maar snel zonnebrand
(donker)paarsroze	middelgroot	h.mei-b.juni	Prachtige lage roodbladige cv.
paarsroze	middelgroot	mei	Overtroffen door 'Tango'

Dank aan

Met dank aan de botanische tuinen Wageningen Universiteit voor het beschikbaar stellen van hun *Weigela*-collectie en kennis. De Wageningse collectie werd vooral opgebouwd door Mirjam Lemmens-Pott. Ook hartelijk dank aan de botanische tuin in Sheffield in Engeland (Friends of the Botanical Gardens Sheffield) voor het beschikbaar stellen van hun kennis en hun *Weigela*-collectie. Vooral John Stirling heeft daarbij veel medewerking en advies gegeven. Ook dank aan Alain Cadic van het INRA in Angers (Frankrijk) voor goede adviezen voor het tot stand komen van deze publicatie. Verder was een persoonlijke rondleiding door Dhr. V. Benetka van Silva Tarouca Research Institute for Landscaping and Ornamental Gardening uit Pruhonice (Tsjechië), die ruim 20 jaar aan veredeling van compacte *Weigela*'s heeft gewerkt, erg inspirerend.

Literatuur

- ACHILLE, F. (1995): Description de la collection de *Weigela* Thunb. Du Geves de Brion – GEVES, INRA & E.N.I.T.H.P., Frans studentenrapport.
- ACHILLE, F. (1995): Caractérisation de la collection de *Weigela* Thunb. Du Geves de Brion – GEVES, INRA & E.N.I.T.H.P., Frans studentenrapport.
- BAILEY, L.H. (1929): The case of *Diervilla* and *Weigela* - *Gent.Herb.* 2: 39-54
- BEAN, W.K.(1980): Trees and shrubs hardy in the British Isles. 4th vol.. John Murray, London
- BENETKA, V. & HYHLIKOVA, M. (2008): Low and compact varieties of *Weigela* and *Potentilla* cultivated in Pruhonice – posterpresentation on First international ISHS Symposium on Woody Ornamentals in Pruhonice (Czech Republic)
- BOOM, B.K. (2000): Nederlandse Dendrologie - H. Veenman & zonen, Ede. 585 p..
- BRICKELL, C.D. ET AL. (2004): International Code of Nomenclature for Cultivated Plants - *Actae Horticulturae* nr. 647, ISHS, 123 p.
- CARRIÈRE (1875): *Revue Hort.* 1875: 211
- DIRR, M.A. (1990): *Manual of Woody Landscape Plants* - Stipes Publishing Company USA. 1007 p.
- GROOTENDORST, H.J. (1968): *Weigelia* - *Dendroflora* 5: 56-60
- HARA, H. (1983): Revision of *Caprifoliaceae* of Japan - *Ginkgoana* 5: 136-169
- HETTERSCHIED, W.L.A. & BRANDENBURG, W.A.(1995): Culton versus Taxon: conceptual issues in cultivated plant systematics - *Taxon* 44: 161-175.
- HOFFMAN, M.H.A. (2005): List of Names of Woody Plants – *Applied Plant Research*, 871 p.
- HOFFMAN, M.H.A. (2008): Cultivar classification of *Weigela* Thunb. – *Acta Horticulturae* xxx xxx
- HOWARD, R.A. (1965): checklist of cultivar names of *Weigela* - *Arnoldia* 25:49-69. Bulletin of popular information of the Arnold Arboretum, nr. 9-11
- HUXLEY ET AL. (1992): *The New R.H.S. Dictionary of Gardening*, vol. 5 - The Macmillan Press Limited, Londen en Basingstoke
- KIM, YOUNG-DONG & KIM, SUNG-HEE. (1999): Phylogeny of *Weigela* and *Diervilla* (Caprifoliaceae) based on Nuclear rDNA ITS Sequences: Biogeographic and taxonomic implications - *J.Plant Res.* 112: 331-341
- KRÜSSMANN, G. (1978): *Handbuch der Laubgehölze*, Band III, 2th edition - P. Parrey, Berlin-Hamburg.
- LORD, T. (ED) ET AL. (2005): *RHS Plantfinder 2005-2006* - Dorling, Kindersley, London. New York. Sydney
- NAKAI, T. (1921): Tentamen Systematis Caprifoliacearum Japonicarum - *J.Coll.Sci.Impl.Univ. Tokyo* 43: 107-119.
- NAKAI, T. (1936): *Weigela* and its akins in Japan proper and Korea - *Journ. Jap.Bot.* 12: 1-17
- PROOSDIJ, A.S.J. VAN (1997): *Cultivaronderzoek Weigela* - Leerstoelgroep Plantentaxonomie, LUW, Wageningen, doctoraalverslag, 139 p.
- REHDER, A. (1927): *Manual of cultivated trees and shrubs* - The Macmillan Company, New York, USA
- SCHNEIDER, C. (1930) *Die Gattung Diervilla und Weigela* - *Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* 42: 13-23
- SPÄTH, L. (1930): *Spätbuch 1720-1930* - Berlin-Baumschulenweg. 656 p.

Ir. M.H.A. (Marco) Hoffman

Wetenschappelijk onderzoeker sortiment / taxonomie bij Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO Bomen), Lisse

Summary

Applied Plant Research, Unit Nursery Stock in Lisse performed an evaluation trial of Weigela from 2003-2007 at the request of the Dutch nursery industry and in cooperation with the Royal Boskoop Horticultural Society. The main objectives of the trial were to solve classification and nomenclature problems of the cultivars and to select the best cultivars for Dutch circumstances. Especially many new cultivars have been tested.

In order to solve classification and nomenclature problems a new, more stable classification of eight cultivar groups is proposed here. The classification is mainly based on size of the plant, leaf colour and colour of the flower. The cultivar groups are: Purpurea Group, Dwarf Group, Variegata Group, Aurea Group, White-flowered Group, Red-flowered Group, Pink-flowered Group and Bicolor Group. These groups are used to classify cultivars instead of using species names, which creates much confusion about the right classification of inter-specific hybrids.

As a result of the trial all cultivars have been described and a list of recommended cultivars is given. At the end of the article a list of cultivars known from literature, including short descriptions is presented.