



# LEY'S GRÜNER TASCHENKATALOG

ab 2023

## Ley's Grüner Taschenkatalog

**Wilhelm Ley GmbH**  
**Baumschulen**  
**seit 1891**

**Hausanschrift:**

Baumschulenweg 20  
53340 Meckenheim  
DEUTSCHLAND

**Postanschrift:**

Postfach 1208  
53334 Meckenheim  
DEUTSCHLAND

Internet: [www.Ley-Baumschule.de](http://www.Ley-Baumschule.de)

E-Mail: [info@Ley-Baumschule.de](mailto:info@Ley-Baumschule.de)

Telefon: +49/ (0) 22 25/ 91 44-0

Fax: +49/ (0) 22 25/ 91 44-90

© 2023 Wilhelm Ley GmbH,  
Baumschulen, Meckenheim

# Wilhelm Ley GmbH Baumschulen/Garten-Center

Amtsgericht Bonn HRB 10124  
USt-Id.: DE 12 33 79 233

Geschäftsführer:  
Marita Ley, Wilhelm Ley

## IMPRESSUM

### © Copyright, Idee und Herausgeber:

Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

### Texte und Illustrationen:

Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

### Grafische Konzeption, Satz und Layout:

Print PrePress GmbH & Co. KG, Meckenheim

### Fotos:

Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen; PlantaPro – [www.pflanzenfotos.net](http://www.pflanzenfotos.net)

### Titelgestaltung:

Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

### Druck und Weiterverarbeitung:

DCM Druck Center Meckenheim GmbH

### Schutzgebühr:

6,50 EURO inkl. Mehrwertsteuer

### Wilhelm Ley GmbH, Baumschulen

### 14. Auflage

### Printed in Germany

### Wilhelm Ley GmbH & Co. KG

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Art des Nachdrucks, auch auszugsweise, jegliche Speicherung, auch in elektronischen Dateien und Datenbanken, jegliche andere Wiedergabe oder Nachahmung einschließlich der kompletten oder teilweisen Übersetzung, sowie der Entnahme von Abbildungen ist nicht gestattet, auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung (hierfür ist eine schriftliche Einwilligung des Herausgebers einzuholen).

Urheberrechtlich nach § 54 Abs. 1 UrhG geschützt sind:

- alle Zeichnungen und fotografische Abbildungen
- alle Pflanzenbeschreibungen, deren methodischer Aufbau, sowie die Anordnung von Text zu Abbildung

## Sehr geehrte Geschäftsfreunde,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Taschenkatalog präsentieren zu können.

Ein Katalog von der Praxis für die Praxis, -umfassend, informativ, handlich und praktisch- ergänzt und vervollständigt mit zahlreichen Farbbildern und Detailzeichnungen sowie den wichtigsten Daten unseres Grünen Sortenbuches. Sie finden neben vielen Sorten und eigenen Selektionen auch ein Sortiment „Gebiets-eigener Gehölze“ aus insgesamt sechs Herkunftsgebieten.

Unser Produkt erfährt in den Zeiten des Klimawandels eine hohe Wertschätzung. GRÜN wird für eine bessere, schönere, lebenswerte, gesunde und vor allem nachhaltig gestaltete Umwelt immer wichtiger. Hier ist uns ein persönliches Anliegen, neuste wissenschaftliche Erkenntnisse mit unserer langjährigen Erfahrung zu verbinden.

Ein eigenes Kapitel des neuen Kataloges widmen wir dem Thema Insektennährgehölze. An dieser Stelle danken wir Herrn Klaus Körber und der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau für die zur Verfügung gestellten Informationen und Unterlagen. Auch zum Thema Klimabäume liefern wir Ihnen umfangreiche Informationen zum Sortiment der Zukunft.

Die Baumschule Wilhelm Ley steht seit 1891 für „Bäume aus bester Schule“. Jeder einzelne Baum aus unseren Quartieren entspricht einem hervorragenden Qualitätsstandard aus gesicherter Herkunft. Unser Ley-Konzept ist der vollständige Produktionszyklus aus einer Hand; also vom einjährigen Sämling bis zum großen, schattenspendenden Solitär nachhaltig produziert. Die zahlreichen Anfragen aus dem In- und Ausland bestätigen uns in dieser Philosophie. Daher möchten wir an dieser Stelle all jenen danken, die an der Erfolgsgeschichte unseres Familienunternehmens mitwirken: unseren Kunden, unseren Geschäftspartnern und im Besonderen auch unseren Mitarbeitern.

Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Termin für einen Besuch in unserer Baumschule, um Sie von unserer „Leistungsfähigkeit“ zu überzeugen. Grün ist (unser) Leben.

Ihre Baumschule Ley



Marita Ley



Wilhelm Ley



Christoph Dirksen  
Geschäftsleitung

## Dear business partners,

We are delighted to present to you our new pocket catalogue.

The catalogue is made according to the principle 'from practice – for practice', comprehensive, informative, handy and practical – complemented and completed with numerous colour pictures and detailed drawings as well as all essential data from our main catalogue (Das grüne Sortenbuch). In addition to a large number of varieties and our own selections we are proud to offer you a range of local native trees and shrubs from six areas of origin.

Our products are highly appreciated in this time of climate change. Greenery is growing in importance for a better, nicer, more livable, healthy and sustainable environment. Here it is our aim to combine scientific findings with our extensive experience.

We are dedicating a whole chapter to mellifluous trees and shrubs. We'd like to take this opportunity to thank Mr. Körber and the Bavarian regional office for viticulture and horticulture (LWG) for their information and support.

On the topic of climate trees we are offering you extensive information on our range for the future.

Since 1891 the Wilhelm Ley tree nursery is known for "best schooled trees". Each and every tree from our quarters fulfills superior quality standards from secured sources. Our Ley-concept is based on a complete autonomous production cycle; from the one year old sapling to the large, shady solitary tree, all are sustainably produced.

Our growing international customer base confirms the wisdom of our philosophy. We want to take this opportunity to thank everyone involved in helping to write our family business' success story: our clients, our business partners and especially our employees.

We would be delighted to welcome you to our tree nursery in Meckenheim; come and judge our performance with your own eyes. Green is (our) life.

Yours sincerely,  
Wilhelm Ley tree nursery

## Chers partenaires commerciaux,

nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau catalogue de poche.

Un catalogue de la pratique pour la pratique, complet, informatif, fonctionnel et complété avec de nombreuses images en couleur et des dessins détaillés ainsi que les données les plus importantes de notre livre vert de variétés. En plus de nombreuses espèces et de nos propres sélections, vous trouverez également une gamme d'arbustes indigènes provenant de six régions d'origine au total.

Nos végétaux sont très appréciés en période de changement climatique. Le VERT est de plus en plus important pour un environnement meilleur, plus beau, plus vivable, plus sain et surtout durable. Notre souci personnel est de combiner les dernières découvertes scientifiques avec nos nombreuses années d'expérience.

Nous consacrons un chapitre séparé de notre nouveau catalogue au thème des arbres de pépinières qui attirent les abeilles. Nous tenons ici à remercier M. Klaus Körber et l'Institut d'État Bavarois de la viticulture et de l'horticulture pour la donnée d'informations et de documents multiples.

Par ailleurs, nous vous fournissons de nombreux renseignements sur l'assortiment de l'avenir tout en respectant le thème des arbres climatiques.

Depuis 1891, la pépinière Wilhelm Ley représente „les arbres de la meilleure école”. Chaque arbre de nos parcelles correspond à une qualité parfaite d'origine assurée.

Notre concept Ley est un cycle complet et documenté de production à partir d'une seule source, c'est-à-dire du semis d'un an à la formation de grands arbres solitaires d'ombrage, et tout cela produit de manière durable.

Les nombreuses demandes en provenance de notre pays mais aussi de l'étranger confirment cette philosophie. Nous aimerions donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de notre entreprise familiale : nos clients, nos partenaires commerciaux et, en particulier, nos employés.

Nous vous attendons avec impatience pour vous faire visiter notre pépinière à Meckenheim.

Venez découvrir la sympathie culturelle rhénane et laissez-vous convaincre de notre système de capacité de production.

Le vert est (notre) vie.

Votre pépinière Ley

■ Ley-Team	8
■ Chronik & Ausblick	12
■ Unsere Jungware	16
■ An der Pflanze	18
■ Unsere Containerware	20
■ Geradlinig	22
■ Handarbeit	24
■ Sorgfalt	26
■ Vielfalt	28
■ Naturnähe & Genauigkeit	30
■ Referenzen	32
■ Zertifizierungen	36
■ Auszug aus: FLL: Empfehlungen für Baumpflanzungen – Pflanzung	37
■ Insektennährgehölze	46
■ Gebietseigene Gehölze	56
■ Exklusiv/Ley-Selektionen	59
■ Erläuterungen • Nomenklatur	62



■ Laubgehölze	65
<hr/>	
■ Nadelgehölze	505
<hr/>	
■ Obstgehölze	567
■ Stauden	589
■ Ziergräser	645
■ Farne	651
■ Gewürzpflanzen	653
■ Wasserpflanzen	657
<hr/>	
■ Service	665
■ Planungshelfer	666
■ Blütenkalender	728
■ Vogelschutz · Vogelspeise	739
■ Gefährliche Pflanzen	741
■ Wuchs · Eigenschaften	742
■ Abkürzungen	746
■ Größenkennzeichnungen	746
■ Lieferbedingungen	747
■ Translation GB / Traduction F	754
■ Informationsmaterial	755





## Das Ley-Team



**Marita Ley**  
Geschäftsführung GmbH  
Mitinhaberin



**Wilhelm Ley**  
Geschäftsführung GmbH  
Mitinhaber



**Christoph Dirksen**  
Geschäftsführung GmbH & Co. KG,  
Produktionsleitung, Prokurist  
Tel.: 9144-0  
c.dirksen@ley-baumschule.de



**Camilla Bublies**  
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit,  
Mitinhaberin  
Tel.: 9144-10  
c.bublies@ley-baumschule.de

**Anja Dichmann**

Sekretariat

Tel.: 9144-0

a.dichmann@ley-baumschule.de

**Roswita Meier**

Sekretariat

Tel.: 9144-0

r.meier@ley-baumschule.de

**Johann Freese**Beratung, Koordination  
Verkauf

Tel.: 9144-67

j.freese@ley-baumschule.de

**Katrin Vitus**Auftragsverwaltung, Beratung,  
Verkauf Frankreich

Tel.: 9144-32

k.vitus@ley-baumschule.de

**Sabine Bockstiegel**

Einkauf

Tel.: 9144-35

s.bockstiegel@ley-baumschule.de

**Felix Puschra**

Einkauf

Tel: 9144-45

f.puschra@ley-baumschule.de

**Sigrid Klosterberg**

Buchhaltung

Tel.: 9144-52

s.klosterberg@ley-baumschule.de

**Dieter Kinnert**

Buchhaltung

Tel.: 9144-13

d.kinnert@ley-baumschule.de

**Christoph Demary**

Personalbuchhaltung

Tel.: 9144-42

c.demary@ley-baumschule.de



**Ingo Drautzburg**

Beratung, Verkauf

Tel.: 9144-33

[i.drautzburg@ley-baumschule.de](mailto:i.drautzburg@ley-baumschule.de)



**Rolf Gußmann-Dahs**

Beratung, Verkauf

Tel.: 9144-44

[r.gussmann-dahs@ley-baumschule.de](mailto:r.gussmann-dahs@ley-baumschule.de)



**Ingrid Esfandiari**

Beratung, Verkauf

Tel.: 9144-39

[i.esfandiari@ley-baumschule.de](mailto:i.esfandiari@ley-baumschule.de)



**Steffen Weber**

Beratung, Verkauf

Tel: 9144-53

[s.weber@ley-baumschule.de](mailto:s.weber@ley-baumschule.de)



### **Peter Wolber**

Beratung, Außendienst

Tel.: 9144-63

[p.wolber@ley-baumschule.de](mailto:p.wolber@ley-baumschule.de)



### **Maxim Schmidt**

Beratung, Verkauf Osteuropa

Tel.: 9144-38

[m.schmidt@ley-baumschule.de](mailto:m.schmidt@ley-baumschule.de)



### **Markus Radermacher**

Beratung, Verkauf,

Logistik

Tel.: 9144-41

[m.radermacher@ley-baumschule.de](mailto:m.radermacher@ley-baumschule.de)



### **Wolfgang Umbreit**

Quartier-/Bestandsverwaltung,

Logistik

Tel.: 9144-34

[w.umbreit@ley-baumschule.de](mailto:w.umbreit@ley-baumschule.de)

## Bäume aus bester Schule

**1891** Wilhelm Ley gründet in Meckenheim auf einem halben Hektar Land – das entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes – eine Baumschule für Obstgehölze und Rosen.

**1918** Bernhard Wilhelm Ley übernimmt in 2. Generation den Betrieb. Für die Anzucht von Obstgehölzen steigert er die Produktionsfläche auf 50 Hektar.

**1956** Mit den Brüdern Karl Ley, Gärtnermeister und Fritz Ley, Gärtnermeister steigt die 3. Generation in das Familienunternehmen ein und setzt es auf Erfolgskurs. In knapp 5 Jahren verdreifacht sich die Produktionsfläche auf 150 Hektar.

**1960er-Jahre** Angeregt durch Karl Ley wird die Produktion auf Laubgehölze, Solitärsträucher und Koniferen ausgeweitet. Das Unternehmen



Antrag von 1922: Wilhelm Ley beantragt 1922 die Zulassung seiner Baumschule als „Lehrgärtnerei“ bei der Landwirtschaftskammer für die Rheinprovinz, nachdem er zuvor schon Lehrlinge zu Gehilfen ausgebildet hatte.



Der Gründer:  
Wilhelm Ley, 1850–1921



Bernhard Wilhelm Ley  
1890–1956



Karl Ley  
1922–2004



Chronik & Ausblick

spezialisiert sich auf die Anzucht von Alleebäumen mit Züchtung eigener Selektionen, unter anderem von Blüten-, klein- und schmalkronigen Bäumen. Mit der Anzucht über die Veredlung bis zum Solitär ist von nun an die Sortenechtheit aller Bäume garantiert.



**1971** Auf Initiative von Fritz Ley entsteht als eigenständiger Betriebszweig „Der Sängertof“, eines der ersten Garten-Center Deutschlands.

**1980er- und 1990er-Jahre** Mit Wilhelm Ley, Dipl. Gartenbauingenieur, Karl-Friedrich Ley, Gärtnermeister, Monica Ley-Pilhatsch, Kauffrau, Marita Ley, Kauffrau, steigt die 4. Generation ins Unternehmen ein.

**1992** Die Baumschule Wilhelm Ley zieht um: vom Baumschulenweg 9 in den Baumschulenweg 20. Und legt damit den Grundstein für weiteres Wachstum.

**1998** Ökologie und Nachhaltigkeit werden großgeschrieben. Als ökologische Ausgleichsfläche wird ein streng gegliedertes Arboretum mit über 370 verschiedenen Pflanzen angelegt. Unter anderem konzipiert als Lehrpfad für die auszubildenden Gärtner der Fachrichtung Baumschule und als Prüfungsfläche für die jährlich stattfindenden Gärtnerabschlussprüfungen.



Fritz Ley  
1926–2001



Monica Ley-Pilhatsch  
1956–1996



Karl-Friedrich Ley  
1959–2015

**2004** Durch Umstrukturierung zur Wilhelm Ley GmbH & Co. KG werden die beiden langjährigen Mitarbeiter Wilfried Demary, Kaufmann, und Christoph Dirksen, Gärtnermeister, in die Geschäftsführung berufen.

**2011** Als erstes Unternehmen bundesweit erhält die Baumschule Ley das Zertifikat der „Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener Gehölze – ZgG“, an deren Umsetzung das Unternehmen in den zuständigen Bundesministerien in Berlin und Bonn maßgeblich beteiligt war.

**2016** Seit 125 Jahren verwurzelt in Meckenheim. Die Baumschule Ley feiert Jubiläum. Mit Camilla Bublies, Dipl. Agraringenieurin, und Katharina Ley, Gärtnerin und Betriebswirtin, ist inzwischen die 5. Generation in der Baumschule bzw. im Sängershof aktiv.

**2020** Die Produktionsfläche ist inzwischen auf über 500 ha gewachsen. Pro Saison werden rund 450.000 Pflanzen auf- und verschult. Die Auslieferung erfolgt europaweit mit Speditionen sowie eigener LKW-Flotte. Das Unternehmen beschäftigt rund 120 Mitarbeiter in der Produktion, darunter 15 Auszubildende der Fachrichtung Baumschule und 20 Mitarbeiter in der Verwaltung. Seit den 1920er Jahren hat die Baumschule Ley über 500 Gärtner ausgebildet. Damals wie heute ist das Unternehmen gewappnet für neue Herausforderungen und Aufgaben, die die Zukunft mit sich bringen wird. Hier sehen wir großes Potential, unsere langjährige Erfahrung mit unseren Plänen, Ideen und Visionen erfolgreich zu verbinden. Das ist für uns Ansporn und Motivation!







Durch eigene Veredelung und Vermehrung von über 90% unserer Aufschulware ist es möglich, beste Jungpflanzen in höchster Qualität zu produzieren. Daraus ergibt sich eine 100%ige Sortenechtheit unserer Produktion.



Handwerkliches Geschick – Korrekte Anwendung der Vermehrungsmethoden durch hochmotivierte Mitarbeiter führt zu perfekten Veredlungsergebnissen.



Unsere Jungware



Effiziente Düngung durch optimale Bedarfsermittlung spart Ressourcen und schont die Umwelt.



Unerlässlich – Verschulen vom Jungbaum bis zum großen Alleebaum mit Ballen unterstützt durch modernste Technik. Für unsere Mitarbeiter eine tolle Herausforderung.



## An der Pflanze





Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment an Alleebäumen im Container, unsere ALICO's. Es werden ausschließlich 3-mal verschulte Bäume aus eigenen Beständen getopft.



ALICO – Höchstmögliche Alleebaumqualität im Container.



# Unsere Container-Ware





Ein umfangreiches Solitärgehölzsortiment in verschiedensten Größen und Qualitäten steht ebenfalls aus bester Schule bereit.



Kontinuität in der Aufschulung garantiert jedem Kunden die wiederkehrende Verfügbarkeit unseres Grüns. Gesicherte Pflanzengesundheit, früher und heute, ermöglichen gleichmäßig hohe Qualität in allen Jahrgängen unserer Produktion.



Geradlinig





Neben modernster Technik benötigt man vor allem auch weiterhin fachlich versiertes und motiviertes Personal, da unsere Pflanzen nach wie vor in vielen „Handarbeitsschritten“ geschult werden. Baumschuler sind gefragt!



# Handarbeit





Wir behandeln unsere Pflanzen fürsorglich, von Anfang an! Die schonende Rodung im Feld – sowohl von Hand als auch mit modernsten Maschinen – und der innerbetriebliche Transport tragen zu einer perfekten Versandabwicklung bei.



Umpflanzen von Großbäumen mit schwerem Gerät gehört mit in unser Repertoire.



Sorgfalt





Wir erfüllen beinahe jeden Kundenwunsch! Ein riesiges Pflanzensortiment steht auf über 500 ha zur Verfügung. Auch Sonderwünsche sind machbar!





Vielfalt





Unsere nachhaltige Produktion schont die Umwelt und somit unsere wichtigen Ressourcen. Mit der Einsaat von Blühstreifen sorgen wir nicht nur für Futter für Wildbienen und andere Insekten, sondern wir fördern damit Nützlinge, die uns bei der Arbeit unterstützen.



Durch Einsatz modernster Technik, wie beispielsweise unser GPS-System, können wir unsere Flächenleistung optimieren und wichtige Ressourcen einsparen. Die hierdurch entstandene Entlastung von Natur, Mensch und Maschine lässt uns die naturgegebenen Produktionszeitfenster effektiver nutzen.



Naturnähe &  
Genauigkeit







Giuseppe Penone · Tra scorza e scorza · Château de Versailles



Rheinboulevard · Köln 2018



Hauptstraße Meckenheim



Kameha Grand · Bonn



Neues Gewerbegebiet „Unternehmerpark Kottenforst“



Landeshauptstadt München



QUALITÄT IST UNSERE NATUR



www.sgs-tuev-saar.com/zgg

**Wir sind T•A•G Betrieb und bieten unseren Auszubildenden eine TOP AUSBILDUNG GARTENBAU**

**wir bilden aus**

**gärtner!**  
ein beruf voller leben

[www.beruf-gaertner.de](http://www.beruf-gaertner.de)

**GLOBALG.A.P.**

GGN: 405618601641

**PQ VOL**



## Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf den folgenden Seiten finden Sie einen kurzen Überblick über die wichtigsten Punkte zum Thema Pflanzung. Unsere Empfehlungen werden ergänzt durch Auszüge aus „Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), mit der wir seit Jahren in einem sehr guten und engen Kontakt stehen.

Ihre Sonderveröffentlichung zum Thema Baumpflanzung ist für uns nach wie vor hochaktuell und spiegelt unsere fachliche Ansicht hervorragend wider.

Wir empfehlen Ihnen daher, sich an diesen Richtlinien zu orientieren.

Unser Dank gilt an dieser Stelle der FLL und deren Präsidium für die Überlassung der nachfolgenden Auszüge, um Ihnen diese wichtigen Pflanzempfehlungen weitergeben zu können.

Denn so ist es möglich, mit den von uns gelieferten, hochwertigen Bäumen ein hervorragendes Anwachsergebnis zu erreichen und auch für die Zukunft eine langlebige Pflanzung zu schaffen.

Viel Spaß beim Lesen und der erfolgreichen Umsetzung.

Ihre Baumschule Ley

### Auszüge aus: Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege

#### Herausgeber:

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung  
Landschaftsbau e. V. – FLL  
Friedensplatz 4, 53111 Bonn

Tel.: 0228/965010-0, Fax: 0228/965010-20  
E-Mail: [info@fll.de](mailto:info@fll.de), Homepage: [www.fll.de](http://www.fll.de)

#### In Zusammenarbeit mit:

Forschungsgesellschaft für Straßen- und  
Verkehrswesen e. V. – FGSV  
An Lyskirchen 14, 50676 Köln

Tel.: 0221/93583-0, Fax: 0221/93583-73  
E-Mail: [koeln@fgsv.de](mailto:koeln@fgsv.de), Homepage: [www.fgsv.de](http://www.fgsv.de)

## Pflanzschnitt

Im Laufe der Produktion von Alleebäumen werden regelmäßig Schnittmaßnahmen an den Bäumen vorgenommen.

Aber unerlässlich ist es, auch bei uns in der Baumschule, den Baum bei einer Verpflanzung in jedem Fall zurückzuschneiden.

Ein Auslichten der Krone und das Einkürzen der langen Triebe ist eine einfache Grundformel für einen guten Pflanzschnitt.

Im Abschnitt 6.3. Pflanzschnitt der „Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1: Planung, Pflanzarbeiten, Pflege“ der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL) ist dieser Ablauf bestens beschrieben.



### 6.3 Pflanzschnitt

Bei Laubgehölzen ist abweichend zur DIN 18916 nicht nur bei wurzelnackten Pflanzen, sondern auch bei Ballen- und Containerpflanzen ein Pflanzschnitt durchzuführen.

Es ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kronen- und Wurzelvolumen herzustellen.

Beim Pflanzschnitt sind

- die artbedingten Eigenheiten zu beachten;
- der Leittrieb freizustellen;
- Konkurrenztriebe zu entfernen, ggf. nur zurückzuschneiden (z. B. um den Leittrieb durch den Schnitt nicht zu schädigen bzw. den Habitus zu erhalten);
- nach innen wachsende Äste zu entfernen;
- kreuzende und reibende Äste zu entfernen;
- beschädigte Äste einzukürzen oder zu entfernen;
- Seitenäste mit eingewachsener Rinde zu entfernen.

Bei Baumarten mit gegenständigen Knospen (z. B. *Acer*, *Fraxinus*) sind an der Schnittstelle die nach innen wachsenden Knospen zu entfernen, um Zwieselbildung zu vermeiden.

Das Anwachsen und die weitere Entwicklung kann bei einigen Arten (z. B. *Crataegus*, *Robinia*, *Salix*, *Gleditsia*) durch einen intensiven Kronenrückschnitt gefördert werden.

Der Leittrieb ist zu erhalten und erforderlichenfalls zu stäben. In Ausnahmefällen – insbesondere bei Hochstämmen mit geringen Stammumfängen – können überlange Leittriebe bei Bedarf eingekürzt werden, um ein angemessenes Verhältnis zwischen Krone und Leittrieb zu erreichen.

Zur Vorbereitung des Lichtraumprofils bei Bäumen für Verkehrsflächen ist zu prüfen, ob beim Pflanzschnitt höher aufgeastet werden muss. Diese Leistungen sind besondere Leistungen. Siehe Abschnitt Entwicklungspflege.

Darüber hinaus kann es erforderlich sein, die Seitenäste einzukürzen.

Zur Schnittführung siehe „ZTV-Baumpflege“.



## Startdüngung

Für alle Lebewesen ist eine gute Ernährung wichtig. So auch für lebende Pflanzen. Bei einer Neupflanzung von Bäumen sollte immer darauf geachtet werden, dass zusätzlich zur Bewässerung auch eine Startdüngung bei der Pflanzung vorgenommen wird.

Nur so ist die Pflanze in der Lage, sich gleich wieder zu stärken und den Verpflanzvorgang möglichst einfach zu verkraften.

Hervorragende Informationen zu diesem Thema gibt die FLL.



## 6.7 Startdüngung

Für die Anfangsentwicklung ist eine ausreichende Nährstoffversorgung notwendig.

Die Nährstoffe werden bei der Pflanzung als Startdüngung in die Verfüllung des Pflanzloches eingearbeitet und/oder oberflächlich in Ballennähe aufgebracht. Die Startdüngung erfolgt i. d. R. ohne vorherige Bodenanalyse. Bei Pflanzung in Substrate für Pflanzgruben nach Teil 2 dieser Empfehlungen, sind die Nährstoffgaben ggf. an die Zusammensetzung des Substrates anzupassen.

Es sind Mehrnährstoffdünger (Volldünger) zu verwenden, deren Kaligehalt ( $K_2O$ ) mindestens dem Stickstoffgehalt (N) entspricht.

Die Aufwandmenge orientiert sich an den Stickstoffgehalten. Als Richtwerte gelten für die Neupflanzung von Bäumen abhängig vom Stammumfang folgende Werte:

- StU 12 – 14 ca. 15 g N pro Baum ( 80 g Dünger bei 15 % N);
- StU 16 – 18 ca. 18 g N pro Baum (120 g Dünger bei 15 % N);
- StU 20 – 25 ca. 24 g N pro Baum (160 g Dünger bei 15 % N);
- StU 25 – 30 ca. 30 g N pro Baum (200 g Dünger bei 15 % N).

Bei anderen Stickstoffgehalten ist die Aufwandmenge entsprechend umzurechnen. Organische Dünger enthalten z. B. oft nur die halbe Stickstoffmenge im Vergleich zu mineralischen Düngern, wodurch sich die Aufwandmenge verdoppelt.

Bei Frühjahrspflanzungen sollten Langzeitdünger mit einer Wirkungsdauer von ca. 3 – 6 Monaten (eine Vegetationsperiode) verwendet werden. Bei der Verwendung von Kurzzeitdüngern mit einer Wirkungsdauer von ca. 3 – 12 Wochen ist die Aufwandmenge in mehreren Gaben aufzubringen.

Bei Herbstpflanzungen sollten umhüllte Langzeitdünger mit einer Wirkungsdauer von ca. 9 – 12 Monaten verwendet werden. Wird bei Pflanzung im Spätherbst (Wachstumsruhe) auf die Düngung verzichtet, muss die Startdüngung zur Anfangsentwicklung im folgenden Frühjahr erfolgen.

Hinweise zu Düngern gibt die FLL-„Düngemitteldatenbank für den Landschafts- und Sportplatzbau“.

## Anwässern

In der Regel werden Bäume mit Drahtballierung oder im Container an der Baustelle angeliefert.

Nach dem richtigen Pflanzen sollten diese Bäume noch am selben Tag intensiv gewässert werden. Oftmals ist der anstehende Oberboden oder das Substrat sehr trocken. Um nun eine gute Verbindung zwischen Ballen und Pflanzsubstrat herzustellen, ist es nötig, den Baum über einen korrekt angelegten Gießbrand ausgiebig zu wässern, dass der Wurzelballen und die angefüllte Erde durchdringend nass sind.

Auch das weitere Wässern nach der Pflanzung ist von großer Wichtigkeit! Hier sind vierzehntägige Bewässerungsintervalle mit bis zu 100 l nötig.

Die FLL erläutert hierzu unter 6.9. und 6.14 ihre Richtlinien.



## 6.9 Anwässern

Nach dem Füllen des Pflanzloches muss durchdringend angewässert werden, um den Kontakt (Bodenschluss) zwischen Ballen/Wurzeln und Boden/Substrat herzustellen. Die Wassermenge ist auf die Pflanzlochgröße und Bodenart abzustimmen.

Gießmulden sind für die Zeitdauer der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege auszubilden.

Bei der Herstellung der Gießmulden, insbesondere bei Baumpflanzungen in Substrate nach Pflanzgrubenbauweise 1 und 2 gemäß Teil 2 dieser Empfehlungen, ist zu beachten, dass sich die Innenseite des Gießrandes über dem äußeren Rand des Ballens befindet. Hierdurch wird das Gießwasser dem Ballen zugeführt und versickert nicht ungenutzt im Substrat, welches i. d. R. eine höhere Wasserdurchlässigkeit aufweist als der Ballen – siehe Abbildung 4.

Nach der Abnahme der Pflanzarbeiten sollte die Gießmulde für die Dauer der Entwicklungspflege vergrößert werden, da die Wurzeln aus dem Ballen herausgewachsen sind.




Abb. 4: Schematische Darstellung Gießrand/Gießmulde

### Wässern

Um die neu gepflanzten Bäume ausreichend mit Wasser zu versorgen, muss regelmäßig gewässert werden.

Unabhängig von den natürlichen Niederschlägen sollten Bäume im ersten Standjahr von April bis September 2-mal monatlich durchdringend gewässert werden. In Trockenperioden kann eine häufigere Bewässerung notwendig sein.

Als Richtwert für die Bewässerungsmenge können bei Hochstämmen bis ca. 25 cm Stammumfang in Abhängigkeit von der Baumart 75 bis 100 Liter Wasser pro Bewässerungsgang angenommen werden. Erforderlichenfalls ist die Wassermenge in mehreren Gaben auszubringen.

Mittels Bohrstockprobe kann überprüft werden, ob das Wasser ausreichend tief in den Boden eingedrungen ist.

## Stammschutz

Durch die starken Temperaturschwankungen, sowie Sonneneinstrahlung und Klimawandel, ist es unerlässlich geworden, nach einer Baumpflanzung direkt einen Stammschutz an den frisch gepflanzten Bäumen anzubringen. Thermische Rindenverletzungen haben nämlich in den vergangenen Jahren große Schäden an Neupflanzungen verursacht. Durch Beschattung des Baumstammes (hauptsächlich 3 Uhr Neigung) können diese Schäden minimiert, oder z.T. ganz verhindert werden.

Egal, ob durch Weißanstrich oder Riedmatten; die Wichtigkeit dieser Maßnahme ist unter Fachleuten unumstritten.

Die FLL gibt Informationen zum Stammschutz unter Punkt 6.12.



## 6.12 Stammschutz

Zur Vermeidung von Stammrissen durch Sonneneinstrahlung sind insbesondere bei empfindlichen Bäumen (z. B. *Acer*, *Aesculus*, *Tilia*), Stammschutzmaßnahmen erforderlich.

Zu hohe Temperaturen am Stamm können zu flächigem Absterben der Rinde, zu Stammrissen und in der Folge bis hin zum Absterben des Baumes führen. Stammrisse treten überwiegend an der sonnenexponierten Süd- und Südwestseite auf. Darüber hinaus können Standorte im Windschatten aufgrund der fehlenden Kühlung besonders problematisch sein.

Weniger empfindliche Bäume (z. B. *Betula*, *Corylus*, *Platanus*, *Quercus*) benötigen keinen Stammschutz gegen Sonneneinstrahlung.

Stammschutzmaßnahmen gegen Sonneneinstrahlung sind an problematischen Standorten bei empfindlichen Bäumen für die Dauer von bis zu 10 Jahren vorzusehen. Im Zuge der Jungbaumpflege aufgeastete Stammpartien sind zusätzlich zu schützen.

Als Stammschutz gegen Sonneneinstrahlung werden z. B. reflektierende Anstriche, schattierende Matten und dergleichen verwendet.

Stammschutzmatten (z. B. aus Schilf, Weide, Bambus) sollen:

- die Belüftung des Stammes ermöglichen;
- den Stamm locker umhüllen;
- bis kurz unter den Kronenansatz reichen;
- an das Dickenwachstum des Stammes angepasst werden können.

Die Stammschutzmaßnahmen gegen Sonneneinstrahlung können ggf. darüber hinaus als Schutz gegen Wildverbiss (Kaninchen, Wühlmäuse) geeignet sein.

Kunststoffmanschetten zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen durch Pflegegeräte (z. B. Fadenschneider) und gegen Wildverbiss müssen den Stamm locker umschließen. Sie müssen die Belüftung des Stammes ermöglichen, um Hitzeschäden zu vermeiden.

## „Bienenbäume“ – Auszug aus den Forschungsergebnisse der LWG Veitshöchheim

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den letzten Jahren zeigt sich ein dramatischer Rückgang von Bienen in der Natur. Mit blütenreichen Pflanzungen in Gärten, Dörfern und Städten kann den Bienen ein notwendiger Lebensraum geboten werden. Wichtig ist dabei eine gewisse Blüten-Konstanz von Frühjahr bis Herbst. Der Beitrag zeigt auf, mit welchen Gehölzen das Nahrungsangebot für Bienen von März bis September verbessert werden kann. Die Ergebnisse der Arbeiten an der LWG Veitshöchheim sind in Tabellenform dargestellt und geben Hinweise zur Gehölzwahl unter ökologischen Aspekten. Dabei wurden eigene Beobachtungen um Erfahrungsberichte von Bienenfachleuten und Imkern ergänzt und ein Abgleich der Daten erstellt. Wo es in der Literatur möglich war, konnte einzelnen Gehölzen für das Nektar- (N) bzw. Pollenangebot (P) der Wert zwischen 1 und 4 gegeben werden, wobei 4 die Bestnote ist und der Wert 1 etwas Nektar, bzw. etwas Pollen bedeutet. Der Blühzeitraum ist nicht ganz einfach festzulegen, unterliegt er doch starken Schwankungen, die von Region zu Region und von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich sein können. Es soll erwähnt werden, dass der Rückgang der Bienen stellvertretend für den Rückgang vieler Insektenarten steht, was dramatische Folgen für unser Ökosystem haben könnte.

Daher freue ich mich sehr darüber, dass die Baumschule Ley unsere Arbeit zum Schutze der Bienen unterstützt und in ihrem Katalog die an der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau gewonnenen Empfehlungen aufgreift und veröffentlicht.

Klaus Körber, LWG Veitshöchheim



## Insekten- nährgehölze



Tabelle 1: „Entwicklungstracht“, frühblühende Bäume, Februar bis April

Name Nektar-/Pollenwert N = Nektar, P = Pollen	Für Hummeln-Wildbienen: ab 12° für Honigbienen 4 ist der beste Wert, k.A. = keine Angaben
<b>Acer saccharinum: N3, P2</b> (Silberahorn)	sehr wertvoller Nektarspender mit Blüte vor dem Laubaustrieb ab Ende Februar bis in den März/April hinein; für Bienen/Wildbienen in den USA wegen hohen Nektargehalts wichtige Blüentracht für Imker; bei uns häufig in städtischen Siedlungsbereichen gepflanzt
<b>Acer rubrum: N1, P3</b> (Rotahorn)	Nektar wenig Bedeutung, wertvoller Pollen im März -April (kurz nach <i>Acer saccharinum</i> ), zweihäusig, männliche Bäume mit 60 % Anteil, weiblich 30 %, Rest ist zwittrig; <i>A. rubrum</i> blüht schon mit 6–8 Jahren; die Sorten Somerset (zwittrig) und Redpointe (weiblich) wachsen auch auf Kalk vergleichsweise gut
<b>Acer negundo: P3</b> (Eschenahorn)	bei Hitze und Trockenheit zäh, schnittverträglich, guter Pollenlieferant im März, kein Nektar, zweihäusig, Pionier mit sehr früher Blüte
<b>Alnus: k.A.</b> (Erle) in Arten und Sorten	die heimischen Erlen sind gute Pollenspender im März; <i>Alnus x spaethii</i> blüht im Dezember/Januar und wird als Allergieverursacher kontrovers diskutiert
<b>Cornus mas: N3, P3</b> (Kornelkirsche)	kleinkroniger Baum oder Großstrauch, sehr frühe Blüte im Februar/ März, als guter Pollenlieferant bedeutend
<b>Corylus colurna: k.A.</b> (Baumhasel)	liefert ähnlich der Haselnuss mäßig bis gut Pollen ab Februar bis März und bildet keinen Nektar
<b>Populus: P3</b> (Pappelarten/-sorten)	liefern gut Pollen im Zeitraum März/April, plus Propolis (Kittharz mit antibakterieller Wirkung) von den klebrigen Pappelknospen
<b>Populus tremula Erecta: k.A.</b> (Zitterpappel)	die Zitterpappel wird generell ökologisch gut bewertet, <i>Erecta</i> ist in München eine schlanke und hohe Säule
<b>Salix caprea: N4, P4</b> (Salweide)	Wichtige Entwicklungstracht-Pflanze im März/April; sehr viel Pollen und Nektar ab März, zweihäusig
<b>Salix daphnoides: N4, P4</b> (Reifweide)	sehr viel Pollen ab März, gilt als eine Weide, die gut mit Trockenheit zurecht kommt
<b>Salix alba/S. alba Tristis: N3, P3</b> (Silberweide/Trauerweide)	viel Pollen und Nektar im April, die „große“ heimische Weidenart ist ebenfalls zweihäusig.
<b>Prunus armeniaca: N2, P2</b> (Aprikose) <b>P. dulcis: (Mandel) N3, P3</b>	in geschützten Lagen durch sehr frühe Blüte eine Ergänzung im Nahrungsangebot
<b>Prunus subhirtella Accolade: N3, P2</b>	eine der frühesten Zierkirschen im März, wird gut befliegen, Großstrauch bis kleiner Baum
<b>Prunus sargentii</b> (Bergkirsche) plus Sorte Rancho: N3, P2	zwei baumartige Zierkirschen, können ab dem frühen März im Siedlungsbereich blühen
<b>Prunus cerasifera Nigra: k.A.</b> (Kirschpflaume, Blutspflaume)	häufig in Vorgärten und im innerstädtischen Bereich gepflanzt und gelten als ziemlich anspruchslos. Eine gute frühe Bienenweide

**Tabelle 1a: „Entwicklungstracht“, frühblühende Sträucher, Februar bis März, vor dem Obst**

Name	Nektar-/Pollenwert N = Nektar, P = Pollen	Für Hummeln-Wildbienen: ab 12° für Honigbienen 4 ist der beste Wert, 1 entsprechend weniger
<b>Lonicera purpusii</b> (Winter-Duftgeißblatt)	Hummeln, Wildbienen, Honigbienen wenn warm	problemloser Strauch, der je nach Witterung schon ab Januar lange blühen und intensiv duften kann
<b>Cornus mas</b> (Kornelkirsche) <i>Jolico</i> und <i>Kasanlaker</i> sind gute Fruchtsorten	N3, P3 versch. Sandbienenarten Honigbienen wenn warm	Großstrauch mit sehr früher Blüte im Februar/März, guter Pollenlieferant, Vogelnährgehölz
<b>Corylus avellana</b> (Haselnuss)	N2,	Windbestäubung, aber eine wichtige Pollenquelle für Insekten ab Februar, kein Nektar, Fremdbefruchtung
<b>Populus tremula</b> (Zitterpappel)	P3	wird allgemein ökologisch gut bewertet, kann durchaus als Großstrauch gezogen werden
<b>Salix caprea</b> (Salweide, Palmweide)	N4, P4 Sand und Furchenbienen Bienen, Hummeln, Falter	sehr wichtig im März/April; sehr viel Pollen und Nektar, zweihäusig mit der <i>Mas</i> als männlicher Sorte
<b>Salix daphnoides Praecox</b> (Reifweide)	N4, P4 Bienen, Hummeln, Falter	sehr viel Pollen ab März, gilt als eine Weide, die auch bei Trockenheit gut zurecht kommt
<b>Salix aurita</b> (Öhrchenweide)	Sand- und Furchenbienen	Vergleichsweise niedrige und buschige Weide für kleine Räume
<b>Salix purpurea</b> (Purpurweide, Korbweide)	N4, P4 Bienen, Hummeln, Falter	sehr viel Pollen und Nektar im April
<b>Prunus subhirtella Accolade</b>	N3, P2, Bienen, Hummeln Wildbienen	eine der frühesten Zierkirschen im März, wird gut befliegen, Großstrauch
<b>Prunus cerasifera Nigra</b> (Kirschpflaume, Blutspflaume)	Bienen, Wildbienen, Hummeln	häufig in Vorgärten und im innerstädtischen Bereich gepflanzt und gelten als ziemlich anspruchslos; gute, frühe und häufige Bienenweide
<b>Prunus spinosa</b> (Schlehe)	breites Spektrum an Wildbienen, Honigbiene, Hummeln, Falter	sehr weitverbreitet, in der freien Landschaft mit vernetzender Funktion, Vogelnährgehölz



**Tabelle 2: „Frühtracht“, Rosengewächse zur Obstblüte, Mitte April bis Mitte Mai**

Name Nektar-/Pollenwert	Anmerkungen: Obstgehölze in zeitlicher Abfolge
Familie der Rosengewächse	Obstbäume und nahe Verwandte aus dem Garten
<b>Prunus persica: N2, P2</b> (Pfirsich)	in der Blütezeit kurz vor den Kirschen, ein guter Pollenspender, Nektar von untergeordneter Bedeutung
<b>Prunus avium: N4, P4</b> (Süßkirsche)	die Kirsche eröffnet ab Mitte April die Saison der Obstbäume für den Imker; sie ist ein sehr guter Nektar- und Pollenlieferant
<b>Prunus cerasus: N4, P4</b> (Sauerkirsche)	in der Blütezeit später als die Süßkirsche ist die Sauerkirsche ebenfalls eine sehr gute Bienenweide
<b>Prunus: N3, P2</b> (Zierkirschen allgemein)	Bei den Zierkirschen gibt es ein fast unüberschaubares Sortiment, welches unmöglich detailliert angesprochen werden kann. Grundsätzlich ist zu sagen, dass in puncto Bienenfreundlichkeit ungefüllt blühende Sorten den stark gefüllt blühenden Sorten vorzuziehen sind
<b>Prunus padus: k.A.</b> (Traubenkirsche)	gilt als gering Nektar und Pollen spendend, wird aber im April gut befliegen.
<b>Prunus domestica: N2, P2</b> (Pflaume/Zwetschge)	Blütezeit tendenziell etwas nach Kirsche, Pollen als auch Nektar werden geringer als bei Kirsche bewertet
<b>Amelanchier lamarckii: N2, P1</b> (Felsenbirne)	liefert Pollen und Nektar im April im Blütenzeitraum zusammen mit der Süßkirsche
<b>Pyrus communis: N2, P3</b> (Birne)	Blütezeit kurz vor bzw. mit dem Apfel, gilt als guter Pollen- und Nektarspender
<b>Pyrus calleryana</b> <b>Chanticleer: k.A.</b>	in den letzten Jahren häufig gepflanzter Straßenbaum mit typischen Blüten der Birne
<b>Malus domestica: N4, P4</b> (Kultur-Apfel)	relativ lange Blüte mit sehr viel Nektar und Pollen, durch geeignete Sortenwahl kann das Blühfenster verlängert werden
<b>Malus: N3, P3</b> (Zieräpfel allgemein)	besonders hervorzuheben ist die Sorte Evereste, sehr blühstark, wird als Befruchter für Obstbäume eingesetzt; grundsätzlich gilt: jeder Zierapfel, der Früchte ansetzt, ist vermutlich eine gute Bienenweide
<b>Malus trilobata: k.A.</b> (Dreilappiger Zierapfel)	blattgesund mit schlankem Wuchs, die Herbstfarbe ist orangerot, weiße Blüte ähnlich Apfel, Früchte grünrot
<b>Malus tschonoskii: k.A.</b> (Woll-Apfel)	leicht behaartes, gesundes großes Blatt, im Herbst orange, mit schmalen Wuchs und grünen Äpfeln
<b>Cydonia oblonga: k.A.</b> (Quitte)	kann als sehr gute Trachtpflanze eingestuft werden, die mit späten Äpfeln blüht



Tabelle 2a: „Frühtracht“, Sträucher zur Obstblüte, Mitte April bis Mitte Mai

Name	Nektar-/Pollenwert	Gehölze in zeitlicher Blütenabfolge
<b>Prunus</b> (Zierkirschen allgemein)	N3, P2 Bienen, Hummeln, Wildbienen	mittelfrüh blühend wie Amanogawa als Säule oder Fukubana in kräftigem rosa, ungefüllt blühende sind besser
<b>Malus floribunda</b>	N3, P3 Insektenmagnet	Ein sehr früh blühender Apfel mit gut Nektar und Pollen, Wuchsstärke kann durch Unterlage beeinflusst werden
<b>Acer griseum</b> (Zimtahorn)	Bienen, Hummeln	in der Blüte kurz vor Feldahorn, gelbgrüne Blüten, guter Beflug
<b>Acer japonicum</b> <b>Aconitifolium</b>	Bienen, Wildbienen	Rötliche Blüten, gelbe Staubgefäße, asiatische Ahorne mit gutem Beflug
<b>Amelanchier</b> <b>lamarckii</b> (Felsenbirne)	N2, P1, Honigbienen Wildbienen, Hummeln	Pollen und Nektar im Blütenzeitraum der Süßkirsche, Vogelnährgehölz
<b>Amelanchier alnifolia</b> <b>Obelisk</b> (Säulenform)	Beflug wie bei A. lamarckii	Hübsche, aufrecht wachsende Gartenform, auch als Hecke denkbar
<b>Aronia melanocarpa</b> <b>Viking plus Nero</b> (Apfelbeere)	N2, P2 Bienenpflanze	eine ganz robuste „Superfruit“ mit wertvollen Inhaltsstoffen, Vogelfutter
<b>Chaenomeles</b> <b>japonica</b> (Scheinquitte, Zierquitte)	N2, P3 Bienen, Hummeln	Rosengewächs mit rot, rosa, orange oder weißen Blüten und den gelben, harten Früchten im Herbst
<b>Cercis chinensis</b> <b>Avondale</b> (Chinesischer Judasbaum)	Hummeln, Bienen	kompakt, schon als junge Pflanze reichblühend, blüht mit Birnen und damit deutlich vor <i>Cercis siliquastrum</i>
<b>Kerria japonica</b> <b>Golden Guinea</b> (Ranunkelstrauch)	N2, P2, Honigbienen, Wildbienen, Hummeln	Nachblüte möglich, die häufigere, aber gefüllte <i>Pleniflora</i> wird nicht befliegen
<b>Buxus sempervirens</b> (Buchsbaum)	N2, P3 Bienenpflanze	unscheinbare Blüten im April, sind versteckt und werden gut befliegen, eine gärtnerische Tragödie
<b>Mahonia aquifolium+</b> <b>Apollo</b> (Mahonie)	N2, P3, Honigbienen, Wildbienen, Hummeln	immergrüner Strauch mit üppiger, gelber Blüte, die sehr gut befliegen wird
<b>Osmanthus x burkwoodii</b> (Duftblüte)	wird insgesamt reichlich befliegen	nur an geschützten Standorten, Blüte mit Kirsche, denkbarer Buchs-Ersatz
<b>Pyrus salicifolia</b> <b>Pendula:</b> (weidenblättrige Birne)	Bienen, Hummeln wie bei Kulturbirnen	graulaubiger Strauch mit Blüten wie Birne, hängender Wuchs, trendig

Tabelle 3: „Frühtracht“, Ahorn und Kastanien erweitern die Obstblüte

Name Nektar-/Pollenwert	Acer und Aesculus in zeitlicher Blütenabfolge
<b>Acer opalus:</b> k.A. (Italienischer Ahorn)	ein Fest für Bienen im März/April, etwas früher aber ähnlich dem Spitzahorn, wird sehr gut befliegen; sehr hitzeverträglich, erinnert vom Laub an den Bergahorn
<b>Acer platanoides:</b> N3, P2 (Spitzahorn und Sorten)	sehr gute Bienenweide ab Ende März, kurz vor und mit dem frühen Obst, Nektar in großen Tropfen für Bienen gut zugänglich; Blatthonigspende ab Mai bis Juli möglich, wichtige Bienenweide in der Stadt, die sehr schön vor den Blättern blüht, mäßig Pollen
<b>Acer x truncatum Pacific Sunset</b> k.A.	Blüte und Blatt ähnlich Spitzahorn, tolle Herbstfarbe in Rot, könnte hitzeverträglicher als der Spitzahorn sein
<b>Acer monspessulanum:</b> N4, P2 (Burgen/Schlösser-Ahorn)	sehr gut bisher bei Hitze und Trockenheit, gute und frühe Bienenweide im April zusammen mit der Kirsche
<b>Acer x zoeschense Annae:</b> k.A. (Zoeschenser Ahorn)	Kreuzung aus Feldahorn und kaukasischem Ahorn, Blüte kurz vor dem Feldahorn, schönes glänzendes Blatt, breiter Schattenwuchs, wärmeliebig
<b>Acer campestre:</b> N2, P2 (Feldahorn und Sorten Elsrijk, Huibers Elegant, Columnaris)	ein ganz robuster Kleinbaum, auch bei Hitze, Blütezeit Anfang Mai mit Apfel und etwas vor dem Bergahorn, ein guter Nektar- und Pollenspende, zweihäusig
<b>Acer pseudoplatanus:</b> N4, P2 (Bergahorn und Sorten)	Verlierer der Erderwärmung, aber eine sehr gute Bienenweide im Mai kurz nach dem Apfel, braucht einen Top-Standort, Blatthonig ähnlich Spitzahorn, blüht häufig zusammen mit Kastanie und dem Raps
<b>Acer tataricum ginnala:</b> k.A. (Feuerahorn)	an unserem Standort der späteste Ahorn, 2018 kein übermäßig starker Beflug, kleinkroniger Baum
<b>Aesculus hippocastanum:</b> N3, P3 (Rosskastanie)	Miniermotte tritt erst nach der Blüte auf; im April/Mai guter Pollenspende mit hochkonzentriertem Nektar, Biene erkennt nur den gelben Fleck der Blüte; liefert an den Knospen viel Kittharz-Propolis, alle Geschlechter auf einer Blütenrispe möglich; Kastanien sind Hummelweiden mit Gesundheitsproblemen
<b>Aesculus x carnea:</b> N3, P3 (Rotblühende Kastanie)	blüht ca. 1 bis 2 Wochen später als A. hippocastanum und wird ebenfalls gut von Hummeln befliegen, weniger Probleme mit der Motte
<b>Aesculus flava Vestida:</b> k.A. (Gelbblühende Kastanie)	Blütezeit kurz nach den rotblühenden Kastanien, wird befliegen, bei Hitze und Trockenheit mit Problemen
<b>Nyssa sylvatica:</b> N3, P2 (Wald-Tupelobaum)	unscheinbare grünliche Blüten im April bis Mai, die Bäume sind zweihäusig oder polygam; Nyssa liefert einen der wertvollsten Nektare für den berühmten Tupelo-Honig, saure, humose und feuchte Böden sind ganz wichtig, für trockene Kalkböden ungeeignet, ein hervorragendes Gartengehölz mit toller roter Herbstfärbung, am Naturstandort ein ganz wichtiger Baum für Bienen, Insekten und Vögel

**Tabelle 4a: „Frühsommertracht“ nach Obstblüte, von Mitte Mai bis Ende Juni**

Name Nektar-/Pollenwert	Anmerkungen: Schwerpunkt Robinie und vor Linde
<b><i>Crataegus laevigata/monogyna</i>: N2, P2</b> (Weißdorn)	wird befliegen, allerdings bei Konkurrenz durch z. B. <i>Robinia</i> mit nur mäßigem Blütenbesuch, Feuerbrand
<b><i>Crataegus lavallei</i> Carrierei: k.A.</b> (Apfeldorn)	der trockenverträgliche Hausbaum, der extrem stark befliegen wird, Insektenmagnet mit schönen Früchten
<b><i>Sorbus aucuparia</i>: N2, P2</b> (Eberesche, Vogelbeere)	weiße Blüte Mai bis Anfang Juni, nicht gut auf Kalk und bei Hitze, liebt es eher sauer und kühl-feucht, dient einem breiten Insektenspektrum als Nahrungsquelle
<b><i>Sorbus aria</i>: N2, P2</b> (Gewöhnliche Mehlbeere)	kalkverträgliche Art, gut auf kargen und hitzigen Böden, an der Straße problematisch, Beflug Mai/Juni
<b><i>Sorbus intermedia</i>: N2, P2</b> (Schwedische Mehlbeere)	Naturbastard aus Vogel- und Mehlbeere, an natürlichen Standorten gut bei Hitze/Trockenheit, siehe <i>S. aria</i>
<b><i>Sorbus torminalis</i>: N3, P2</b> (Elsbeere)	kalkliebende heimische Art mit gezacktem Blatt, kann Hitze und Trockenheit, guter Beflug, primär Waldbaum
<b><i>Sorbus domestica</i>: N4, P2</b> (Speierling)	hat nach Literaturangaben den höchsten Nektargehalt bei <i>Sorbus</i> , für Liebhaber gibt es Fruchtsorten wie den Sossenheimer Riesen, kann Pilzprobleme haben
<b><i>Sorbus thuringiaca Fastigiata</i></b> (Thüringische Eberesche)	Naturbastard aus Vogel und Mehlbeere, ganz kompakte eiförmige Krone, hitzeverträglicher <i>Sorbus</i>
<b><i>Sorbus commixta</i> Dodong: k.A.</b> (Koreanische Eberesche)	sehr interessanter kleinkroniger Baum, große, weiße Blüte, viele Früchte, tolle Herbstfarbe in Orangerot, gesund, in der extremen Trockenheit stark gelitten
<b><i>Sorbus latifolia</i> Henk Vink: k.A.</b> (Breitblättrige Mehlbeere)	Kreuzung aus Mehl- und Elsbeere, bei uns im Versuch gesund, schöner Wuchs, bei Hitze vielversprechend
<b><i>Laburnum watereri</i> Vossii: N1, P2</b> (Goldregen)	Blütezeit mit den späten Kastanien, wird auffallend stark von Hummeln befliegen
<b><i>Fraxinus ornus</i>: P3</b> (Blumenesche)	kein Eschensterben, duftende Blüten vor und mit der Robinie, pollenreich, meist zwittrig, es gibt aber auch männliche bzw. weibliche Bäume, die angebotenen Sorten ( <i>Meczek, Louisa Lady, Obelisk...</i> ) blühen alle
<b><i>Paulownia tomentosa</i>: k.A.</b> (Blauglockenbaum)	wird teilweise stark von Bienen befliegen, Blüte 2018 mit <i>Sorbus</i> vor <i>Robinia</i> , an warmen Standorten invasiv, verträgt Trockenheit vergleichsweise sehr gut
<b><i>Robinia pseudoacacia</i>: N4, P2</b> (Scheinakazie)	blüht ca. 2 Wochen Ende Mai/Anfang Juni, in der Stadt ein hervorragender Honigbaum, Nektar hat viel Fruktose, deswegen bleibt der Honig lange flüssig, Blüte bei Starkregen oder Spätfrost gefährdet, optimal auf sandigen, trockenen oder auch steinigen Böden in Sonne und Hitze; invasives Potential, zwischen Robinien und Linden gibt es häufig eine Blütenlücke
<b>Bessoniana</b>	kaum Dornen, die Sorte blüht weniger als die Art
<b>Nyrsegi</b>	blüht mit kürzerer Blütezeit, schöne Krone

Name Nektar-/Pollenwert	Anmerkungen: Schwerpunkt Robinie und vor Linde
Semperflorens	kaum Dornen, mit Nachblüten im August, September
Unifolia (=Monophylla)	Blühverhalten wie die Art, dornenlos, später Laubfall

Tabelle 4b: „Frühsommertracht“ nach Obstblüte, bis zur Robinie

Name	Nektar-/Pollenwert	Blütezeit: Ende Obst-Flieder-Robinie
<b>Acer tataricum ginnala</b> (Feuerahorn)	Bienen	Bei uns der späteste Ahorn, 2018 kein übermäßig starker Beflug, mit Flieder
<b>Aesculus pavia Rosea Nana</b> (Zwergkastanie)	Hummeln	wird gut befliegen, weniger Probleme mit der Miniermotte
<b>Aesculus flava Vestida</b> (Gelbblühende Kastanie)	Hummeln, Bienen	Blütezeit kurz nach den rotblühenden Kastanien, wird befliegen, bei Hitze und Trockenheit mit Problemen
<b>Caragana arborescens</b> (Erbsenstrauch)	N2, P2, Bienen, Wildbienen, Hummeln	<i>Lorbergii</i> mit fein geschlitztem Laub, <i>Walker</i> bzw. <i>Pendula</i> als Hängeform, alle werden wirklich gut befliegen
<b>Laburnum watereri Vossii</b> (Goldregen)	N1, P2 Hummeln, Bienen, Wildbienen	Blütezeit mit später Kastanie bis zur Robinie, wird auffallend stark von Hummeln befliegen
<b>Abelia mosanensis</b> (Koreanische Abelie)	N3, P1, Wildbienen, Bienen, Hummeln	frosthärter als <i>Abelia grandiflora</i> , duftende Blüten mit Goldregen, guter Beflug
<b>Cercis canadensis</b> (amerikanischer Judasbaum)	Hummeln, Bienen, Wildbienen	<i>Forest Pansy</i> ist rotlaubig, <i>Ruby Falls</i> eine rotlaubige und <i>Lavender Twist</i> eine grünlaubige Hängeform
<b>Cercis siliquastrum</b> (Judasbaum)	N2, P2, Hummeln Bienenpflanze	blüht etwas später als <i>C. canadensis</i> , mit Flieder und wird gut befliegen
<b>Crataegus laevigata/monogyna</b> (Weißdorn)	N2, P2 Bienen, Wildbienen, Hummeln, Käfer	bei Konkurrenz durch z. B. <i>Robinia</i> mit nur mäßigem Blütenbesuch, Bindeglied zwischen Obstblüte und Robinie bzw. Lindenblüte, wichtiger Fruchtstrauch
<b>Fraxinus ornus</b> (Blumenesche)	P3	kein Eschensterben, duftende Blüten vor und mit der Robinie, pollenreich, zwittrig oder männliche bzw.



**Tabelle 5: „Sommertracht“-Bäume im Blütezeitraum Juli bis Anfang September**

Name Nektar-/Pollenwert	Spätsommertracht – da gibt es nicht sehr viel!
<p><b>Tilia tomentosa: N3, P1</b> (Silberlinde und Sorten)</p>	<p>Gut bei Hitze, bei Dürre wie alle Linden mit großen Problemen, späte und gute Blüte im Juli, deutlich nach der Winterlinde; tote Hummeln, weil die Blüten noch duften obwohl kein Nektar mehr vorhanden ist; Hummeln haben im Unterschied zur Honigbiene keine Vorräte im Bienenvolk und müssen deshalb oft kläglich verhungern, <i>Brabant</i> und <i>Szeleste</i> sind die gängigen Sorten, die letztgenannte ist etwas frosthärter</p>
<p><b>Koelreuteria paniculata: N3, P2</b> (Blasenbaum) Englisch: Golden-Rain-Tree</p>	<p>in Südeuropa ein weitverbreiteter Straßenbaum, der Hitze und arme Böden bevorzugt, dann ist <i>Koelreuteria</i> auch frosthart, Blütezeit der einhäusigen Pflanze ist im späten Juli bis August zusammen mit <i>Sophora</i>, die gelben, offenen Rispen des Blasenbaumes werden sehr gut beflogen und bieten ein ausgewogenes Nahrungsangebot; häufig malerisch mehrstämmig Großsträucher oder mittlere Bäume mit orange-roter Herbstfärbung; die Bäume reagieren mit ihren Wurzeln empfindlich auf Verdichtungen und dürfen auf keinen Fall zu tief gepflanzt werden; sät sich in wärmeren Regionen selber gut aus, es gibt allerdings kaum im Angebot der Baumschulen, eine Sorte <i>September</i>, die bei uns in diesem Zeitraum üppig Blüten ausbildet</p>
<p><b>Sophora japonica: N4, P2</b> (= <i>Styphnolobium japonica</i>) (Schnurbaum)</p>	<p>Bedeutung für den Imker vergleichbar mit der nahe verwandten Robinie, hoher Nektarwert, Pollen spielt untergeordnete Bedeutung, blühstark und sehr späte Sommertracht so ab Mitte/Ende Juli/August im gleichen Zeitfenster oder sogar etwas später als der Bienenbaum <i>Tetradium danielii</i>; auf armen, heißen Standorten auch 2018 ein Top Klimagehölz und guter Stadtbaum; nasse, schwere, moorige Standorte sind ungeeignet, <i>Regent</i> blüht als Jungbaum früher als die reine Art, eine sehr empfehlenswerte Leguminose</p>
<p><b>Tetradium danielii: N4, P4</b> (= <i>Euodia hupehensis</i>) (Bienenbaum, Stinkesche)</p>	<p>der Bee-Bee-Tree gilt bei den Imkern als üppige Hochsommer-Tracht-pflanze, als späte Bienenweide mit reichlich Nektar und Pollen im Juli bis August, der Wuchs der Bäume ist eher breit, Spätfrostprobleme führen dazu, dass diese Baumart nicht überall in Deutschland gut wachsen kann; <i>Sophora</i> stellt für die Bienen im Vergleich zu <i>Tetradium</i> die zuverlässigere Alternative dar</p>
<p><b>Tilia henryana: k.A.</b> (Heinrichs Linde)</p>	<p>eine im späten August bis in den September hinein spät blühende und stark duftende Linde mit gezacktem Blatt, kein Straßenbaum aber interessant für duftende Gärten, in Holland wird die Sorte <i>Arnolds Select</i> wegen des schöneren Wuchses favorisiert</p>





## Gebietseigene Gehölze

### Bundesnaturschutzgesetz

Seit dem 1. März 2020 ist nach zehnjähriger Übergangsfrist das neue Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz fordert, dass in der freien Natur keine gebietsfremden Arten ausgebracht werden dürfen (§ 40 Absatz 4 im BNatSchG), sondern ausschließlich Arten, deren Saatgut aus dem vorgesehenen Pflanzgebiet stammt.

Nicht in den Bereich „**Freie Natur**“ und daher vom BNatSchG ausgenommen sind Pflanzungen in folgenden Bereichen: innerstädtische Bereiche, überbaute Gebiete, Siedlungen, Sportplätze und Golfplätze. Hier ist es wesentlich sinnvoller, bewährte Arten und Sorten zu bevorzugen, die durch jahrelange Anzucht und Selektion deutlich besser an die Gegebenheiten angepasst sind und die für sie vorgesehene Funktionen und Aufgaben zielführender erfüllen können. Auch ist die Veränderung durch den fortschreitenden Klimawandel nicht zu unterschätzen, wodurch bisher gebietseigene Arten weniger Chancen einer zufriedenstellenden Entwicklung haben könnten.

### Sonderfall Straßenbegleitgrün

Straßenbegleitgrün an klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen untersteht in den meisten Fällen besonderen Erfordernissen der Funktionssicherung, der durch Verwendung von gebietseigenen Gehölzen zumeist nicht genügt werden kann.

Diese Sonderstandorte sind: unmittelbarer Straßenseitenraum, Mittel- und Trennstreifen, Lärmschutzwände, Steilwälle und Stützbauwerke. Aus unserer Erfahrung ist zur Erfüllung der Funktionssicherung die Verwendung der vom Gärtner teilweise seit Jahrhunderten gezüchteten Sorten zu empfehlen, weil diese meistens verschiedenste Eigenschaften mit sich bringen, die gebietseigene Arten nicht immer erfüllen können. Diese Eigenschaften sind: Erreichen des Lichtraumprofils, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verträglichkeit gegenüber Emissionen und Salzfrachten.

Wenn durch Pflanzung gebietseigener Herkünfte diese oben genannten Faktoren nicht erfüllt werden können, dann dürfen gebietsfremde Herkünfte lt. Gesetzgeber genehmigungsfrei verwendet werden.

Wir sind der Meinung, dass zusätzlich noch die Aspekte Klimawandel, Fruchtbehang und Kronenprofil für die Auswahl der geeigneten Pflanze von Bedeutung sein können.

Wir beraten Sie gerne!

## Sonderfall Obst

Die Erhaltung alter Obstsorten und traditioneller Kulturlandschaften in der freien Natur ist ein weiterer Sonderfall. Der Sortenerhalt und der Schutz dieser Kulturlandschaften leisten einen Beitrag zum Schutz der biologischen Vielfalt. Daher sind diese vom Genehmigungsvorbehalt nicht betroffen und sind ohne den Zusatz „gebietseigen“, „autochthon“ o.ä. auszusprechen.

## Vorkommensgebiete 1 bis 6



In Bezug auf die Anzucht gebietseigener Pflanzen hat der Gesetzgeber 6 Vorkommensgebiete festgelegt (siehe Karte).



## ZgG® – Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener Gehölze im Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.

Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. hat ein von der Saatguternte über die Produktion bis zum Verkauf an den Endkunden durchgängiges und nachprüfbares, in Deutschland einheitliches Zertifizierungssystem entwickelt. Alle nach diesem Zertifizierungsschema zertifizierten Betriebe erhalten das ZgG®-Zertifikat und können sich somit an der Produktion und/oder Vermarktung der dem BNatSchG unterliegenden Gehölzarten beteiligen.

### Marktverfügbarkeit

Wir empfehlen Ihnen, für Ihre Ausschreibungen zur Bepflanzung der freien Natur schon im Vorfeld eine Abfrage der tatsächlich am Markt verfügbaren Arten, Mengen und Qualitäten zu tätigen. **Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass es sinnvoll ist, gebietsheimische Gehölze separat auszuschreiben.** Schon jetzt steht beispielsweise fest, dass ausreichende Mengen von *Corylus avellana* aus den verschiedenen Vorkommensgebieten nicht verfügbar sein werden. *Salix ssp.* sind generell ausgenommen, da diese lediglich über Steckholz vermehrt werden. Bei *Malus sylvestris* stehen im Prinzip keine Erntebestände zur Verfügung.

### Produktion • Eigene Bestände

Wir, als Baumschule mit eigener Jungbaumanzucht und lückenloser Dokumentation unserer Aufschulung, haben uns auf die Anforderungen des Gesetzgebers eingestellt und sind in der Lage, Ihnen ein Sortiment gebietseigener Pflanzen aus den sechs Vorkommensgebieten aus eigener Anzucht vor allem auch in der Qualität „Hochstamm 3xv“ anzubieten.

**ACER platanoides 'Allershausen' ©**

Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 4



- Höhe:** 20–30 m  
**Wuchs:** Krone dicht geschlossen, oval  
**Laub:** fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung gelb  
**Blüte:** April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft  
**Frucht:** bis zum Winter  
**Standort:** frisch, sandig-lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
**Sonstiges:** bisher keinerlei Beeinträchtigungen durch Frost und andere Einflüsse

# MALUS JFS 'Royal Raindrops'<sup>®</sup> -PBR- ('JFS-KW5') ©


 Exklusiv!

- Höhe:** 6–8 m; 4–5 m breit
- Wuchs:** breit aufrecht
- Laub:** dreilappig gezackt; sehr gesund; ab Austrieb glänzend dunkelschwarzrot; Herbstfärbung bronzeorangelila
- Blüte:** strahlend magentapink
- Frucht:** ab Spätsommer auffallend; rot, klein, rund; lange bis in den Winter haftend
- Standort:** frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig
- Sonstiges:** sehr resistent; anpassungsfähig; hitze- und trockenheitsverträglich; bisher in Europa exklusiv von Ley vermehrt

## ACER rubrum L. JFS 'Redpointe'<sup>®1</sup> -PBR- (Frank Jr.) ©



- Höhe:** 12–15 m; 8–9 m breit
- Wuchs:** Krone hoch pyramidal, sehr gleichmäßig und symmetrisch; mit dominantem Leittrieb bis in die Spitze und ideal abgewinkelter Seitenverzweigung
- Laub:** drei- bis fünfklappig; im gesamten Sommer über frisch grün; langanhaltende Herbstfärbung; brillant leuchtend rot
- Blüte:** März; rot; auffallend
- Frucht:** Stiele länger als Blüten
- Standort:** feucht, sandig bis lehmig, verträgt einen pH-Wert bis 8; sonnig
- Sonstiges:** in den USA bis pH 8 getestet und chlorosefrei! Gilt dort als die Nachfolgesorte für 'Red Sunset' schlechthin. Ley ist offizieller Lizenznehmer dieser Sorte für Europa.

## Erläuterungen

Die Größenangabe erfolgt in „Ley's Grüner Taschenkatalog ab 2021“ gemäß den aktuellen Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen der FLL e.V., für hochwachsende Arten und Sorten in der Höhe ab Erdboden, für breitwachsende in der gemittelten Breite. Bei zwei Größenangaben wird die Breite zuerst genannt.

® rechtlich geschützte Marke

© rechtlich geschützte Sorte; unerlaubter Nachbau verboten!



Das Bienen-Symbol weist auf ein Insektennährgehölz hin. Wir berufen uns hier auf unsere Erfahrung, sowie auf die Empfehlungen von Klaus Körber in dem Werk „Bienenbäume“ der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Markiert sind nur Gehölzarten, die als wertvolle Trachtpflanzen gelten. Meist trifft dies ebenfalls auf die dazugehörigen Sorten zu.



Produziert in ZgG-zertifiziertem Betrieb. Gehölz mit Herkunftsgarantie des Saatgutes aus einem der 6 Vorkommensgebiete.



Bäume die das Klimabaum-Symbol tragen, haben sich in jahrelanger Praxis und unter genauer Beobachtung gut bewährt. Durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem im Hinblick auf Trockenstress, Hitze und extreme Witterung zeigen sie sich robust und widerstandsfähig.

## Nomenklatur

Die im Taschenkatalog verwendete Nomenklatur entspricht den handelsüblichen Gepflogenheiten. Als Quelle dienen: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. „Namensliste der Gehölze“ (letzte Ausgabe, 1999), Zander „Handwörterbuch der Pflanzennamen“ (16. Auflage, 1999), Gerd Krüssmann „Die Baumschule“ (6. Auflage, 1997) und Wilhelm Ley „Das Grüne Sortenbuch“ (3. Auflage, 2002).

## Illustrationen – Wuchsformen und Detailzeichnungen

Die Wuchsform – stellt das üblicherweise zu erwartende Wachstum nach 15 Altersjahren (innere Zone) und 25 Altersjahren (äußere Kontur) dar.

Die Detailzeichnung – in mehreren Maßstabsvarianten eingearbeitete Abbildungen.

## Die Entwicklung des Baumes im Vergleich zu einem zweistöckigen Haus

### Maßstab:


hier: Höhe in Meter

### Die äußere Zone:

Die Pflanze nach 25  
Altersjahren

### Die innere Zone:

Die Pflanze nach 15  
Altersjahren




*Acer platanoides* 'Columnare Typ Ley II'

## Die Entwicklung des Baumes im Vergleich zu einer menschlichen Figur

### Maßstab:

hier: Höhe in Meter




*Cornus kousa*

Gerade unsere Detailzeichnungen lassen die wichtigsten Merkmale einer Pflanze sehr gut erkennen:

- die verschiedenen Maßstabsvarianten: bei kleineren Gehölzen wird das Haus durch eine Menschenfigur ersetzt
- sortentypische Merkmale, wie z. B. *Quercus petraea*: gestieltes Blatt, ungestielte Früchte, Größe von Blüten und Blättern




**Maßstab:**  
hier: Größe in  
Zentimeter




*Quercus petraea*

**Maßstab:**  
hier: Größe in  
Zentimeter



*Liriodendron tulipifera*

**Maßstab:**  
hier: Größe in  
Zentimeter



*Malus 'Makamik'*



Laubgehölze



**ABELIA - Caprifoliaceae - ABELIE****grandiflora, Großblütige Abelie**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: halbrund, breitbuschig bis buschig aufrecht  
 Laub: eiförmig, spitz, leicht gesägt; im Austrieb bronzefarben, später dunkelgrün; Herbstfärbung purpurfarben  
 Blüte: Juli bis September; weißrosa, purpurfarben überhaucht; leicht duftend  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig, humos, lehmig, Kalk vertragend; sonnig  
 Sonstiges: windgeschützt; Winterschutz empfohlen



Abelia grandiflora

**Sträucher**

Co.	20- 30	20,50
	30- 40	25,50
	40- 60	31,60

**Solitär**

	60- 80	59,00
Cont.	80-100	80,50
	100-125	110,50



Abelia grandiflora

**ABELIOPHYLLUM - Oleaceae - SCHNEEFORSYTHIE, WEISSE FORSYTHIE****distichum, Rosenforsythie**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breitbuschig, später überhängend, lockerbuschig bis offen  
 Laub: schmal eiförmig, ganzrandig, zugespitzt  
 Blüte: Februar bis März; weiß in kurzen Trauben; starker Mandelduft  
 Frucht: braune, breite Nüsse  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, locker, sandig humos, Kalk liebend; vollsonnig bis sonnig  
 Sonstiges: windgeschützt; Frosthärte steigt im Alter an




Abeliophyllum distichum

**Sträucher**

Co.	40- 60	29,20
	60- 80	48,10

**Solitär**

3xv	mB	80-100	72,60
		100-125	98,50
		125-150	137,00



Abeliophyllum distichum

**Auskünfte**

Haben Sie Fragen, die weder im Taschenkatalog noch in unserem „Das Grüne Sortenbuch“ beantwortet werden?  
 Gerne nehmen wir uns Ihrer Anfragen an und versuchen diese schnellstmöglich zu beantworten.



Acanthopanax sieboldianus

## ACANTHOPANAX - Araliaceae - FINGERARALIE

**sieboldianus**, Stachelpanax, Stachelkraftwurz

Synonym: Eleutherococcus sieboldianus

Höhe: 1-3 m

Wuchs: mehrstämmig, aufrecht, unregelmäßig, bizarr

Laub: meist fünfzählig, handförmig, Blättchen verkehrt eiförmig bis lanzettlich, gesägt

Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Kugeldolden, unscheinbar

Frucht: rundlich, schwarz

Standort: frisch bis feucht, sandig, lehmig, tonig, kalktolerant; vollsonnig bis schattig

Sonstiges: am Blattansatz bedornt

### Sträucher

Co.	60-100	24,80
-----	--------	-------

### Solitär

Co.	100-125	57,10
	125-150	78,50
	150-175	108,00
	175-200	149,00



Acer buergerianum

## ACER - Aceraceae – AHORN

**buergerianum**, Dreizahn-Ahorn

Höhe: 8-10 m

Breite: 4-5 m

Wuchs: kompakt aufrecht

Laub: dreilappig, 4-8 cm breit, 10 cm lang; oben dunkelgrün, unten blaugrün; gekerbt

Blüte: gelblich; breite Doldenrispe im Mai

Frucht: aufrechte Fruchtlügel, parallel

Standort: frisch, durchlässig, sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Heimat sind die Bergwälder in Japan; gute rote Färbung im Herbst

### Hochstämme


3xv.	m.Db.	12- 14		475,00
		14- 16		670,00
		16- 18		910,00
		18- 20		1.180,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.640,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.775,00
		25- 30			2.220,00
		30- 35			2.760,00



Acer buergerianum



Acer buergerianum

**campestre, Feld-Ahorn, Maßholder**Baum  
des Jahres  
2015

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: rundlich bis kegelförmig  
 Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; grüngelb; wenig auffallend  
 Frucht: August bis November  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig  
 Sonstiges: Jungtriebe mit starken Korkleisten




Acer buergerianum

**verpflanzte Heister**

o.B.	80-100	12,05	10,70	9,70
	100-125	14,55	12,90	11,80
	125-150	18,50	16,30	14,80
m.B.	100-125	19,90	17,60	16,00
	125-150	23,60	20,80	18,90
	150-175	27,70	24,50	22,20
	175-200	33,30	29,40	26,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-150	200-250	114,00
			250-300	161,00
			300-350	234,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	355,00
			300-350	510,00
			350-400	730,00
			400-500	1.120,00
5xv.	m.Db.	200-300	250-300	485,00
			300-350	865,00
			350-400	1.210,00
			400-500	1.690,00
5xv.	m.Db.	300-400	350-400	1.790,00
			400-500	2.340,00
			500-600	3.230,00
			600-700	4.410,00
			700-800	6.050,00



Acer campestre

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00



Acer campestre


**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00



Acer campestre



→ **campestre**

Acer campestre

5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00

**campestre 'VkG 1 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigener  
Feld-Ahorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 10-15 m

Wuchs: rundlich bis kegelförmig

Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai; grüngelb; wenig auffallend

Frucht: August bis November

Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig

Sonstiges: Jungtriebe mit starken Korkleisten

**verpflanzte Heister**

o.B.	100-125	17,10	15,10	13,65
	125-150	21,70	19,20	17,40

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	298,00	263,00
		14- 16	410,00	360,00
		16- 18	560,00	495,00
		18- 20	750,00	660,00
		20- 25	990,00	875,00

**campestre 'Anny's Globe'**, Kugel-Feldahorn

Höhe: 3-5 m

Wuchs: dichte, runde Krone

Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai; grüngelb; Rispe

Frucht: unauffällig; rotgrün

Standort: verträgt trockenen Boden gut; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	100-150	400-500	1.610,00
		25-30			2.025,00



Acer campestre



Acer campestre 'Anny's Globe'



**campestre 'Elsrijk', Feld-Ahorn 'Elsrijk'**

- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: eiförmig  
 Laub: dreilappig; jung gelblich grün, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; gelbgrüne Doldentrauben  
 Frucht: August bis November  
 Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig  
 Sonstiges: schmalkronige Selektion




Acer campestre 'Elsrijk'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00



Acer campestre 'Elsrijk'

**campestre 'Fastigiata', Säulen-Feld-Ahorn 'Fastigiata'**

- Höhe: 7-9 m  
 Wuchs: säulenförmig, dicht  
 Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelborange, dichte Belaubung  
 Blüte: Mai; unscheinbare gelbgrüne Rispen  
 Frucht: Fruchtlügel ab August/September  
 Standort: sonnig bis lichter Schatten  
 Sonstiges: schmalkronige Selektion



Acer campestre 'Elsrijk'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00



Acer campestre 'Fastigiata'





Acer campestre 'Green Column'

## campestre 'Green Column', Säulen-Feld-Ahorn 'Green Column'

Höhe: 7-9 m  
 Wuchs: anfangs straff aufrecht, im Alter kegelförmig  
 Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; gelbgrüne Rispen  
 Frucht: unauffällig; rotgrün  
 Standort: sonnig bis lichter Schatten  
 Sonstiges: schmalkronige Selektion

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
		18- 20	900,00	795,00
		20- 25	1.180,00	1.040,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00	1.110,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.460,00
		25- 30			1.840,00

## campestre 'Huibers Elegant', Feld-Ahorn 'Huibers Elegant'



Acer campestre 'Huibers Elegant'

Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: dichte, eiförmige Krone  
 Laub: dreilappig; grün, Herbstfärbung gelb, dichte Belaubung  
 Blüte: Ende April; gelbgrüne Rispen  
 Frucht: Fruchtlügel ab August/September; grünbraun  
 Standort: sonnig bis lichter Schatten  
 Sonstiges: kleinkronige Selektion

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00

**campestre 'Lienco', Feld-Ahorn 'Lienco'**

- Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: dichte, eiförmige Krone  
 Laub: dreilappig; grün, im Austrieb bronze, im Herbst gelb  
 Blüte: im Mai; gelbgrüne Rispen  
 Frucht: Fruchtlügel, unauffällig; rotgrün  
 Standort: sonnig bis lichter Schatten  
 Sonstiges: klein, kompakte Selektion

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	970,00	855,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00

**campestre 'Nanum', Kugel-Feldahorn, Kleiner Feld-Ahorn**

Synonym: A. campestre 'Compactum'

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit eiförmig bis rundlich  
 Laub: deutlich kleiner als bei A. campestre  
 Blüte: Mai; grüngelb; Rispe  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20-25	100-150	400-500	1.610,00
		25-30			2.025,00



Acer campestre 'Lienco'



Acer campestre 'Nanum'




Acer campestre 'Nanum'



Acer campestre 'Nanum'



Acer capillipes



Acer capillipes

## capillipes, Roter Schlangenhaut-Ahorn

Höhe: 6-10 m  
 Wuchs: breit trichterförmig  
 Laub: dreilappig, 6-10 cm; rot geadert, roter, dünner Blattstiel;  
 Herbstfärbung karminrot  
 Blüte: Mai; gelblich  
 Frucht: zierlich, stumpfwinklig  
 Standort: frisch, durchlässig; sonnig  
 Sonstiges: Rinde olivgrün, weiße Längsstreifen

### Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	180,00
		150-200	265,00
		200-250	370,00

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00

## cappadocicum 'Rubrum', Rottriebiger Kolchischer Ahorn

Synonym: A. colchicum 'Rubrum', A. laetum 'Rubrum'


Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: erst trichterförmig, später rundlich, ähnlich Spitz-Ahorn  
 Laub: fünfzipflig, 8-14 cm lang; Austrieb rot, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Ende Mai, Anfang Juni; hellgelb  
 Frucht: breitwinklig  
 Standort: frisch, durchlässig; sonnig bis halbschattig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00



Acer cappadocicum 'Rubrum'



Acer cappadocicum 'Rubrum'

**davidii**, Davids-Ahorn

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: kleinwüchsiger Baum  
 Laub: eilänglich, 8-15 cm, ungeteilt; dunkelgrün, glänzend, Herbstfärbung gelb und rot  
 Blüte: gelbliche Trauben im Mai mit rotem Hauch  
 Frucht: klein und grün  
 Standort: kalkfreie Böden  
 Sonstiges: grünweiß gestreifte Rinde

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	265,00
4xv.	m.Db.	200-250	495,00
		250-300	660,00
		300-350	875,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00

**freemania 'Autumn Blaze'**, Herbst-Flammen-Ahorn  
'Autumn Blaze'

- Höhe: bis 25 m hoch  
 Wuchs: großer Baum mit anfangs schmaler, später rundlicher Krone; schnellwüchsig  
 Laub: sommergrüne, tief geschlitzte, 5-lappige Blätter; im Herbst gelborange bis leuchtendrot; haften lange am Baum  
 Blüte: unscheinbar; männlich  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig; gut hitzeverträglich  
 Sonstiges: gut frosthart; keine Herbstfärbung auf zu kalkhaltigen Böden


**freemania 'Celebration®'**, Freemanii-Ahorn 'Celebration®'

Synonym: A. freemania 'Celzam'

- Höhe: 12-15 m, bis 8 m breit  
 Wuchs: breit aufrecht, kompakt  
 Laub: tief gelappt; frühe, gelblich grüne bis rote und goldene Herbstfärbung  
 Blüte: unscheinbar; männlich  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig; gut hitzeverträglich  
 Sonstiges: bisher frosthart; gedeiht auf verdichteten Böden; in den USA oft verwendeter Straßenbaum



Acer davidii



Acer davidii



Acer freemania 'Autumn Blaze'





Acer freemannii 'Celebration'®

## → freemannii 'Celebration'®

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	2.470,00
		35- 40			3.060,00
		40- 45			3.780,00



Acer freemannii 'Celebration'®

**ginnala, Feuer-Ahorn**

Synonym: A. tataricum ginnala

Höhe: 4-7 m

Wuchs: breitbuschig bis rundlich

Laub: dreilappig; Austrieb rot, Herbstfärbung feurig rot

Blüte: Mai; gelblich weiß

Frucht: August bis November; rötlich

Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, locker, humos; sonnig bis wechselschattig



Acer ginnala

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.		60-100	5,95	4,30	3,90
4 Tr.	o.B.		100-150	8,25	6,20	5,55
	Co.		60-100	10,20	9,00	8,15

**Solitär**

3xv.	m.B.		125-150	68,90	60,90
			150-200	89,00	78,50
			200-250	107,00	
			250-300	152,00	
4xv.	m.Db.		150-200	300-350	485,00
				350-400	695,00
5xv.	m.Db.		200-300	300-350	945,00
				350-400	1.320,00
				400-500	1.850,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00	350,00
		14- 16		545,00	480,00
		16- 18		750,00	660,00
4xv.	m.Db.	18- 20		1.050,00	
		20- 25		1.390,00	



Acer ginnala

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00

**griseum, Zimt-Ahorn, Weißgrauer Ahorn**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: locker, kegelförmig  
 Laub: dreizählig; Austrieb hellorangebraun; Herbstfärbung karminrot, orange, gelb  
 Blüte: Ende Mai; gelb  
 Frucht: breitwinklig, über Winter hängen bleibend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sandig humos, lehmig, anspruchslos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: auffallende, zimtfarbene, abblätternde Borke; Schnitt vermeiden



Acer ginnala

**Solitär**

3xv.	m.B.		100-125	184,00
			125-150	254,00
4xv.	m.Db.		150-175	450,00
			175-200	640,00
			200-250	895,00

**Hochstämme**

4xv.	m.Db.	12- 14		560,00
		14- 16		795,00
		16- 18		1.080,00
5xv.	m.Db.	18- 20		1.460,00
		20- 25		2.040,00
		25- 30		2.830,00



Acer griseum

**japonicum 'Aconitifolium', Japanischer Feuer-Ahorn**

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: kurzstämmig, breitbuschig  
 Laub: fiederlappig; Herbstfärbung karminrot bis scharlachrot  
 Blüte: April bis Mai; purpurn vor Austrieb  
 Frucht: August bis November; rötlich  
 Standort: frisch, sandig humos, durchlässig, schwach sauer; eher sonnig  
 Sonstiges: Zierwert durch filigrane Blattform und Herbstlaub




Acer griseum

**Sträucher**

m.B.	30- 40	53,30	47,10
	40- 60	72,50	64,10
	60- 80	116,50	103,00
	80-100	170,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	60-100	100-125	390,00
			125-150	530,00
			150-175	750,00



Acer japonicum 'Aconitifolium'





Acer japonicum 'Aconitifolium'

## → japonicum 'Aconitifolium'

5xv.	m.Db.	100-150	150-175	1.080,00
			175-200	1.500,00
			200-250	2.100,00

## monsessulanum, Montpellier-Ahorn, Französischer Ahorn, Dreilappiger Ahorn, Burgen-Ahorn



## Synonym: A. trilobatum

Höhe: 4-8 (-10) m

Wuchs: sparrig verzweigt, breit eiförmig bis rundlich


Laub: dreilappig, klein, zierlich; dunkelgrün; Herbstfärbung leuchtend gelb, teils orange

Blüte: April; gelbgrün; auffallend

Frucht: parallel zueinanderstehende Fruchtlügel

Standort: trocken bis feucht, locker, sandig, lehmig, steinig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: im Mittelalter häufig um Burgen gepflanzt



Acer monsessulanum

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	345,00	
		200-250	485,00	
4xv.	m.Db.	100-150	250-300	865,00
			300-350	1.210,00
			350-400	2.100,00
5xv.	m.Db.	150-200	350-400	2.100,00
			400-500	2.910,00

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	400-500	3.060,00
		30- 35			3.780,00
		35- 40			4.650,00



Acer monsessulanum



Acer neglectum 'Annae'

**neglectum 'Annae', Roter Feld-Ahorn, Zoeschener Ahorn**Synonym: *A. zoeschense* 'Annae'

- Höhe: 4-6 (-8) m  
 Wuchs: breitbuschig, kurz- oder mehrstämmig  
 Laub: fünfflappig; Austrieb dunkelrot  
 Blüte: Mai; gelbgrün; wenig auffallend  
 Frucht: August bis November  
 Standort: frisch, sandig lehmig, durchlässig; sonnig bis absonnig

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-200	145,00
			200-250	204,00
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	298,00
			200-250	420,00
			250-300	600,00
			300-350	845,00

**negundo, Eschen-Ahorn**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: rundlich, dick- oder mehrstämmig  
 Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; weißlich gelb  
 Frucht: September bis Februar  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, kalkhaltig, anspruchsarm; sonnig bis wechselschattig  
 Sonstiges: schnell wachsendes Pioniergehölz

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00



Acer neglectum 'Annae'



Acer negundo




Acer negundo



Acer negundo 'Aureo-Variegatum'





Acer negundo 'Aureo-Variegatum'

## negundo 'Aureo-Variegatum', Gelbbunter Eschen-Ahorn

Synonym: A. negundo 'Aureomarginatum'

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breitbuschig, meist mehrstämmig  
 Laub: gefiedert; dunkelgrün mit goldgelben Flecken  
 Blüte: März bis April; gelblich weiß  
 Frucht: September bis Februar  
 Standort: frisch; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen



Acer negundo 'Flamingo'

## negundo 'Flamingo', Buntlaubiger Eschen-Ahorn

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: eiförmig, lockerbuschig  
 Laub: gefiedert; weiß und rosa gefleckt oder gerandet  
 Blüte: unscheinbar  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: frisch, kräftig; sonnig  
 Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen



Acer negundo 'Odessanum'

## negundo 'Odessanum', Goldgelber Eschen-Ahorn

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: gefiedert; goldgelb; Austrieb rosa  
 Blüte: März bis April; gelblich weiß  
 Frucht: September bis Februar; hängende Trauben  
 Standort: frisch, kräftig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen



Acer negundo 'Variegatum'

## negundo 'Variegatum', Silberbunter Eschen-Ahorn

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: rundlich bis breit aufrecht  
 Laub: gefiedert; weiß gefleckt oder gerandet  
 Blüte: März bis April; gelblich weiß; zweihäusig  
 Frucht: September bis Februar; hängende Trauben  
 Standort: frisch, kräftig; sonnig  
 Sonstiges: grüne Rückmutationen sofort entfernen

### Sträucher

Co.	60-100	24,80	21,90
-----	--------	-------	-------

### Solitär

3xv.	m.Db.	100-125	67,10	59,30
		125-150	86,50	76,50
		150-200	114,00	100,50

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
4xv.	m.Db.	100-150	200-250	194,00	
			250-300	276,00	
			300-350	385,00	
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	355,00	
			250-300	530,00	
			300-350	795,00	
			350-400	1.180,00	

### Hochstämme (nur *Acer negundo* 'Flamingo')

3xv.	m.Db.	14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

### Solitär-Bäume

5xv.	m.Db.	25- 30	100-150 breit	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	25- 30	150-200 breit	2.340,00
		30- 35		2.910,00
		35- 40		3.580,00

## opalus, Schneeballblättriger Ahorn, Italienischer Ahorn

Synonym: *A. italum*, *A. opulifolium*

Höhe: 10-12 m

Wuchs: kleiner knorriger Baum, unregelmäßige Krone

Laub: rötlicher Austrieb, später dunkelgrün, im Herbst orange bis rot

Blüte: schöne, zierende gelbe Doldentrauben

Frucht: Fruchtlügel

Standort: sonnig bis absonnig

Sonstiges: empfindlich bei Spätfrösten; wärmeliebend

### Solitär


3xv.	m.B.	150-200	280,00
		200-250	400,00
		250-300	560,00

### Hochstämme

4xv.	m.Db.	12- 14	450,00
		14- 16	600,00
		16- 18	820,00
5xv.	m.Db.	18- 20	1.210,00
		20- 25	1.690,00




*Acer negundo* 'Variegatum'



*Acer opalus*



Acer palmatum



Acer palmatum

## palmatum, Fächer-Ahorn

Höhe: 3-5 m

Wuchs: aufrecht, zierlich

Laub: meist fünfflappig; Herbstfärbung rot

Blüte: Mai; purpurfarben

Frucht: September bis Dezember

Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; absonnig bis wechselschattig; windgeschützt

Sonstiges: in der Jugend leicht frostgefährdet

### Sträucher

m.B.	40- 60	24,20	21,40
	60- 80	30,70	27,10
	80-100	48,10	42,50

### Solitär

3xv.	m.Db.		100-125	120,00
			125-150	170,00
			150-175	235,00
4xv.	m.Db.	100-150	175-200	325,00
			200-250	460,00
			250-300	640,00
5xv.	m.Db.	150-200	250-300	1.020,00
			300-350	1.460,00
			350-400	2.040,00



Acer palmatum 'Atropurpureum'

## palmatum 'Atropurpureum', Roter Fächer-Ahorn

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breitbuschig, aufrecht, zierlich

Laub: fünfflappig; purpurn bis schwärzlich

Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt

## palmatum 'Bloodgood', Fächer-Ahorn 'Bloodgood'

Höhe: 4-6 m

Wuchs: trichterförmig, lockerbuschig

Laub: fünfflappig; im Austrieb leuchtend rot, später schwarzrot

Blüte: Mai; purpurfarben

Frucht: September bis Dezember; rot

Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt

Sonstiges: Fächer-Ahorn mit den dunkelsten Blättern

### Sträucher

m.B.	40- 60	34,20	30,20
	60- 80	45,60	40,30
	80-100	63,80	56,40



Acer palmatum 'Bloodgood'

**Solitär**

3xv.	m.Db.		100-125	185,00
			125-150	260,00
4xv.	m.Db.	100-150	150-175	640,00
			175-200	920,00
			200-250	1.320,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	2.100,00
			250-300	2.910,00
			300-350	3.970,00

**palmatum 'Deshojo', Fächer-Ahorn 'Deshojo'**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit- bis lockerbuschig, düntriebbig  
 Laub: fächerflappig; Austrieb leuchtend karminrot, später hellgrün; Herbstfärbung unscheinbar  
 Blüte: Mai; purpurfarben  
 Frucht: September bis Dezember; rot  
 Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig; windgeschützt  
 Sonstiges: 'Deshojo' hat von allen Fächer-Ahornsorten den attraktivsten Blattaustrieb

**Sträucher**

Co.	60- 80	89,00
	80-100	123,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	298,00
		125-150	420,00
5xv.	m.Db.	150-175	845,00
		175-200	1.210,00

**palmatum 'Dissectum', Grüner Schlitz-Ahorn**


Synonym: A. palmatum 'Dissectum Viridis'

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breit, kuppelförmig, überhängend  
 Laub: geschlitzt; grün; Herbstfärbung goldgelb mit rötlichen Tupfen  
 Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

**palmatum 'Dissectum Atropurpureum', Schlitz-Ahorn 'Ornatum'**

Synonym: 'Dissectum Ornatum'


- Höhe: 2-3 m, deutlich breiter  
 Wuchs: gedrungen, flach rund  
 Laub: geschlitzt; im Austrieb rot, später dunkelrot; Herbstfärbung karminrot  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig



Acer palmatum 'Deshojo'




Acer palmatum 'Dissectum'



Acer palmatum 'Dissectum'



Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum'



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

→ palmatum 'Dissectum Atropurpureum'

**palmatum 'Dissectum Garnet'**, Dunkelroter Schlitz-Ahorn

Synonym: A. palmatum 'Garnet'

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: breit, abgeplattet

Laub: geschlitzt; dunkelrot; Herbstfärbung rotorange

Standort: frisch, sandig lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig



Acer palmatum 'Dissectum Garnet'

**palmatum 'Dissectum Inabashidare'**, Schlitz-Ahorn 'Inabashidare'

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: breit aufrecht

Laub: grob geschlitzt; purpurrot

Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

**palmatum 'Dissectum Nigrum'**, Schwarzroter Schlitz-Ahorn


Synonym: A. palmatum 'Dissectum Ever Red'

Höhe: 1-2 m, deutlich breiter

Wuchs: gedungen, halbkugelig

Laub: geschlitzt; erst tiefrot, später bronzegrün; Herbstfärbung rot

Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig bis wechselschattig



Acer palmatum 'Osakazuki'

**Sträucher**

m.B.	25- 30	38,00	33,60
	30- 40	50,60	44,70
	40- 50	67,10	59,30
	50- 60	89,00	78,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	60- 70	240,00
		70- 80	335,00
		80-100	470,00
5xv.	m.Db.	100-125	1.050,00
		125-150	1.500,00

**palmatum 'Osakazuki'**, Fächer-Ahorn 'Osakazuki'

Höhe: 4 (-6) m

Wuchs: breitbuschig, aufrecht

Laub: siebenlappig, groß, ledrig; grasgrün und matt glänzend; Herbstfärbung intensiv karminrot

Standort: frisch, sandig bis lehmig, locker, durchlässig; sonnig



Acer palmatum 'Osakazuki'

**Sträucher**

m.B.	60- 80	89,00
	80-100	114,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	291,00
		125-150	420,00
5xv.	m.Db.	150-175	865,00
		175-200	1.210,00

**pensylvanicum, Streifen-Ahorn**

Höhe: 7- 9 (-12) m

Wuchs: aufrecht, zu Mehrstämmigkeit neigend

Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai; gelbe, hängende Blütentrauben

Frucht: sichelförmig

Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: Zierwert durch weiße Rindenstreifen

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	180,00	
		150-200	265,00	
		200-250	370,00	
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	730,00
		300-350	1.050,00	
		350-400	1.500,00	

**platanoides, Spitz-Ahorn**

Höhe: 20-30 m

Wuchs: Krone dicht geschlossen, kegelig bis kugelig

Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orange-gelb

Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft

Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter

Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Heister**


o.B.	150-200	19,50	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,90	26,40	

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	
5xv.	m.Db.	600-700	2.160,00	
		700-800	2.980,00	



Acer pensylvanicum



Acer pensylvanicum

Baum  
des Jahres  
1995

Acer platanoides



Acer platanoides

→ **platanoides****Solitär, mehrstämmig**

5xv.	m.Db.	40-50	200-300	500-700	2.220,00
		50-60			2.760,00
		60-70			3.410,00
6xv.	m.Db.	70-80	300-400	700-900	4.650,00
		80-90			5.750,00
		90-100			7.110,00
		100-120			8.950,00

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12-14			247,00	218,00
		14-16			335,00	293,00
		16-18			460,00	405,00
		18-20			600,00	530,00
4xv.	m.Db.	20-25			795,00	700,00
		20-25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	500-700	1.110,00
		25-30			1.390,00
		30-35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.730,00
		30-35			2.160,00
		35-40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30-35	200-300	700-900	2.340,00
		35-40			2.910,00
		40-45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40-45	300-400	700-900	4.410,00
		45-50			5.450,00
		50-60			6.750,00
		60-70			8.450,00
7xv.	m.Db.	45-50	400-600	700-900	6.750,00
		50-60			8.450,00
		60-70			10.500,00
		70-80			12.990,00

**platanoides 'VkG 1 bis 3 und 4/5/6 - ZgG®',**  
 Gebietseigener Spitz-Ahorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 3  
 und 4/5/6

Höhe:	20-30 m
Wuchs:	Krone dicht geschlossen, kegelig bis kugelig
Laub:	fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orange-gelb
Blüte:	April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft
Frucht:	bis zum Winter
Standort:	frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Acer platanoides



Acer platanoides



Acer platanoides



Acer platanoides

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

ACER

**verpflanzte Heister**

o.B.	125-150	20,50	18,10	16,40
	150-200	25,50	22,50	20,40

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	272,00	244,00
		14- 16	369,00	325,00
		16- 18	506,00	450,00
		18- 20	660,00	580,00
		20- 25	875,00	765,00

**platanoides 'Allershausen' ©,**  
**Spitz-Ahorn 'Allershausen' ©**


Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 4

Höhe: 20-30 m

Wuchs: Krone dicht geschlossen, oval

Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung gelb

Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft

Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter

Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: bisher keinerlei Beeinträchtigungen durch Frost und andere Einflüsse



Acer platanoides 'Allershausen' ©



Acer platanoides 'Autumn Blaze'

**platanoides 'Autumn Blaze',**  
**Spitz-Ahorn 'Autumn Blaze'**

Höhe: bis 15 m


Wuchs: kegelförmig, abgeflachter Wipfel

Laub: fünfflappig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: April; eigelblich; auffallend; süßlicher Duft

Frucht: bis zum Winter haftend

Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Acer platanoides 'Autumn Blaze'

**platanoides 'Cleveland', Spitz-Ahorn 'Cleveland'**

Höhe: 12-15 m


Wuchs: Krone kompakt eiförmig

Laub: Herbstfärbung gelborange

Blüte: April; gelbgrün

Frucht: bis zum Winter haftend

Standort: frisch, sandig lehmig, humos; gut hitzeverträglich; sonnig



Acer platanoides 'Cleveland'

**Hochstämme, Alleebäume**


3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00







Acer platanoides 'Cleveland'

Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley I'Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley I'Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley I'

## → platanoides 'Cleveland'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00

**platanoides 'Columnare Typ Ley I',****Säulen-Ahorn 'Typ Ley I'**

Höhe:	bis 10 m
Wuchs:	schmal säulenförmig
Laub:	fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb
Blüte:	April; gelbgrün; Dolden
Frucht:	geflügelte Früchte bis zum Winter
Standort:	trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		305,00	265,00
		14- 16		415,00	365,00
		16- 18		575,00	510,00
		18- 20		750,00	655,00
		20- 25		995,00	870,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	25- 30	100-150	400-500	2.040,00
		30- 35			2.540,00
		35- 40			3.150,00
5xv.	m.Db.	30- 35	100-150	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	150-200	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.330,00

## platanoides 'Columnare Typ Ley II', Säulen-Ahorn 'Typ Ley II'



- Höhe: bis 12 m  
 Wuchs: spitz kegel- bis säulenförmig  
 Laub: fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelbgrün; Dolden  
 Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
4xv.	m.Db.	25- 30	100-150	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	150-200	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00

## platanoides 'Columnare Typ Ley III', Säulen-Ahorn 'Typ Ley III'


- Höhe: bis 15 m  
 Wuchs: kegelförmig  
 Laub: fünflappig; groß, gesund, frischgrün und etwas ledrig; Austrieb rötlich marmoriert, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelbgrün; Dolden  
 Frucht: geflügelte Früchte bis zum Winter  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00



Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley II'




Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley II'



Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley II'



Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley III'

Acer platanoides  
'Columnare Typ Ley III'

## → platanoides 'Columnare Typ Ley III'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	500-700	1.110,00
		25-30			1.390,00
		30-35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.730,00
		30-35			2.160,00
		35-40			2.680,00
5xv.	m.Db.	35-40	300-400	700-900	2.910,00
		40-45			3.580,00
		45-50			4.410,00
		50-60			5.450,00



Acer platanoides 'Crimson Sentry'

**platanoides 'Crimson Sentry', Rotblättriger Säulen-Ahorn**

Höhe: bis 10 m


Wuchs: mittelgroß, schmalwüchsig, dicht verzweigt

Laub: im Austrieb scharlachrot, anschließend schwarzrot

Blüte: April/Mai; gelbgrün; Trugdolden

Frucht: geflügelte Früchte in Büscheln

Standort: sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig



Acer platanoides 'Deborah'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12-14		340,00	300,00
		14-16		475,00	420,00
		16-18		680,00	600,00
		18-20		900,00	795,00
		20-25		1.110,00	980,00
4xv.	m.Db.	20-25		1.270,00	1.110,00

**platanoides 'Deborah', Blut-Ahorn 'Deborah'**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: breit kegelförmig, gleichmäßig

Laub: Austrieb dunkelrot; Herbstfärbung orangegelb

Blüte: gelblich mit tiefroten Knospenblättern

Frucht: geflügelte Früchte

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: gegenüber A. p. 'Schwedleri' stark verbesserte Sorte



Acer platanoides 'Deborah'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12-14		270,00	240,00
		14-16		370,00	330,00
		16-18		510,00	450,00
		18-20		680,00	600,00
		20-25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20-25		945,00	895,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.210,00 1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	2.040,00 2.540,00 3.150,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	300-400	500-700	2.600,00 3.230,00 3.970,00
6xv.	m.Db.	40- 45 45- 50 50- 60	300-400	700-900	4.770,00 5.900,00 7.300,00



Acer platanoides 'Deborah'

**platanoides 'Drummondii', Weißbunter Spitz-Ahorn**

Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: breit eiförmig bis hochgewölbt  
 Laub: weißlich gelb gerandet, später fast weiß  
 Blüte: April; gelbgrün; auffallend; süßlicher Duft  
 Standort: anspruchsvoll, feucht; sonnig bis wechselschattig  
 Sonstiges: interessant durch die Laubfärbung

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			475,00 670,00 910,00 1.180,00 1.540,00	420,00 590,00 800,00 1.040,00 1.340,00
4xv.	m.Db.	20- 25			1.640,00	



Acer platanoides 'Drummondii'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.775,00 2.220,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	2.760,00 3.320,00 3.970,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	300-400	500-700	4.410,00 5.300,00 6.600,00




Acer platanoides 'Drummondii'

**platanoides 'Emerald Queen',****Kegelförmiger Spitz-Ahorn**

Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: jung schmal eiförmig, später breit eiförmig  
 Laub: zuerst hellrosarot; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelbgrün  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis wechselschattig  
 Sonstiges: robuster Straßenbaum

Acer platanoides  
'Emerald Queen'

Acer platanoides  
'Emerald Queen'

## → platanoides 'Emerald Queen'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Acer platanoides 'Eurostar'®

**platanoides 'Eurostar'®, Spitz-Ahorn 'Eurostar'®**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: aufrecht, pyramidenförmig, sehr dicht, dünne Äste

Laub: glänzend hellgrün; Herbstfärbung gelb

Blüte: gelb; erscheinen relativ spät

Frucht: relativ wenig und nicht jährlich fruchtend

Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: wenig anfällig; gutes Wachstum

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00	630,00
		20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.890,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.830,00
		35- 40			3.490,00
		40- 45			4.300,00



Acer platanoides 'Eurostar'®



Acer platanoides 'Eurostar'®

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
6xv.	m.Db. 40- 45	300-400	700-900	5.300,00	
	45- 50			6.600,00	
	50- 60			8.150,00	

## platanoides 'Faassen's Black', Schwarzer Spitz-Ahorn

Höhe: 15 bis 20 m  
 Wuchs: breitkegelig bis rundlich  
 Laub: fünfflappig; Austrieb leuchtend rot, dann schwarzrot  
 Blüte: April; gelb, dunkelrote Knospenblätter  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch, sandig lehmig, humos, gut kalkverträglich; sonnig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00	350,00
		14- 16		545,00	480,00
		16- 18		750,00	660,00
		18- 20		945,00	835,00
		20- 25		1.240,00	1.080,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.390,00	

### Solitär-Bäume


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.580,00
5xv.	m.Db.	30- 35	300-400	500-700	3.230,00
		35- 40			3.970,00
		40- 45			4.900,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.050,00
		45- 50			7.500,00
		50- 60			9.450,00

## platanoides 'Farlake's Green', Spitz-Ahorn 'Farlake's Green'


Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: jung straff aufrecht, später rundliche Krone  
 Laub: olivgrün; wie A. platanoides  
 Blüte: April; gelb  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig und wechselschattig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00




Acer platanoides 'Faassen's Black'



Acer platanoides 'Faassen's Black'



Acer platanoides 'Farlake's Green'




Acer platanoides 'Farlake's Green'

## → platanoides 'Farlake's Green'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Acer platanoides 'Globosum'



Acer platanoides 'Globosum'

**platanoides 'Globosum', Kugel-Ahorn**

Höhe: 5-7 m

Wuchs: jung kugelig, später verflachend

Laub: Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelborange

Blüte: April; gelb

Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend

Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich, extremes Stadtklima vertragend; sonnig

**FORMBÄUME****Solitär-Halbstämme, Stammhöhe 1,0 - 1,25 m**


3xv.	m.Db.	14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
		20- 25	995,00
		25- 30	1.280,00

**Hochstämme, Stammhöhe 2,00, 2,40, 3,00 und 4,00 m**

3xv.	m.Db.	10- 12	230,00	200,00
		12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00	695,00
		20- 25	1.050,00	930,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.320,00
		25- 30		1.640,00
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	1.640,00
		25- 30		2.040,00
		30- 35		2.540,00



Acer platanoides 'Globosum'

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
5xv.	m.Db. 30- 35	200-300	2.760,00		
			3.320,00		
			4.070,00		
5xv.	m.Db. 35- 40	300-400	4.070,00		
			5.050,00		
			6.250,00		
			7.690,00		

## platanoides 'Olmsted', Spitz-Ahorn 'Olmsted'

- Höhe: 12-14 m  
 Wuchs: jung schmal eiförmig, später breit eiförmig  
 Laub: groß; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelb  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: möglicherweise eine 'Columnare'-Selektion

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

3xv.	m.Db. 12- 14	270,00	240,00
		370,00	330,00
		510,00	450,00
		680,00	600,00
4xv.	m.Db. 20- 25	945,00	835,00

### Solitär-Bäume


4xv.	m.Db. 20- 25	60-100	400-500	1.210,00
				1.500,00
5xv.	m.Db. 25- 30	100-150	500-700	1.840,00
				2.290,00
				2.830,00
5xv.	m.Db. 30- 35	150-200	500-700	2.540,00
				3.150,00
				3.880,00
6xv.	m.Db. 40- 45	150-200	500-700	4.790,00
				5.900,00
				7.300,00



Acer platanoides 'Olmsted'



Acer platanoides 'Olmsted'



Acer platanoides 'Olmsted'

## platanoides 'Reitenbachii', Spitz-Ahorn 'Reitenbachii'

- Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: Krone rundlich, außen locker  
 Laub: im Austrieb rosa, zum Spätsommer ein dunkles, grünliches Rot;  
 Herbstfärbung orangefarben  
 Blüte: April; grüngelb mit roten Knospenschuppen  
 Frucht: bis zum Winter  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, Kalk vertragend; sonnig bis  
 wechselschattig



Acer platanoides 'Reitenbachii'





Acer platanoides 'Reitenbachii'

## → platanoides 'Reitenbachii'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00	630,00
		20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.460,00
		25- 30			1.840,00
		30- 35			2.290,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.040,00
		30- 35			2.540,00
		35- 40			3.150,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.050,00
		45- 50			7.500,00
		50- 60			9.450,00
		60- 70			11.700,00



Acer platanoides 'Royal Red'

**platanoides 'Royal Red', Spitz-Ahorn 'Royal Red'**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: Krone breitkegelig, aufgelockert


Laub: rot, schwächer vergrünend als andere rotlaubige Spitz-Ahornsorten

Blüte: April; gelb mit roten Kelchblättern

Frucht: weniger als die Art fruchtend

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig

Sonstiges: Rinde an einjährigen Trieben dunkelbraunrot, später hellbraun




Acer platanoides 'Royal Red'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00	350,00
		14- 16		545,00	480,00
		16- 18		750,00	660,00
		18- 20		945,00	835,00
		20- 25		1.240,00	1.080,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.390,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.050,00
		45- 50			7.500,00
		50- 60			9.450,00
		60- 70			11.700,00



Acer platanoides 'Royal Red'

**platanoides 'Rubicundus'® Typ I' (S),****Säulen-Ahorn 'Rubicundus'® Typ I' (S)**

Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 10

- Höhe: bis 10-12 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig  
 Laub: fünflappig; groß, gesund; blutroter Austrieb, ohne Marmorierung, später vergrünend; Herbstfärbung gelb bis braun  
 Blüte: April; gelbgrün; Dolden  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, schwach sauer bis stark alkalisch; sonnig bis halbschattig

Acer platanoides 'Rubicundus'®  
Typ I' (S)**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	970,00	855,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	1.320,00
					1.640,00
					2.040,00
5xv.	m.Db.	25- 30	100-150	400-500	1.980,00
					2.470,00
					3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	100-150	500-700	2.540,00
					3.150,00
					3.880,00

**platanoides 'Schwedleri', Blut-Ahorn**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Krone breitkegelig, dicht geschlossen  
 Laub: Austrieb leuchtend blutrot, später olivgrün; Herbstfärbung orangeroet  
 Blüte: April; gelb; reichlich  
 Frucht: bis zum Winter  
 Standort: frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; Stadtklima vertragend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00



Acer platanoides 'Schwedleri'



Acer platanoides 'Schwedleri'

## → platanoides 'Schwedleri'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.210,00
		25-30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.840,00
		30-35			2.290,00
		35-40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30-35	300-400	500-700	2.540,00
		35-40			3.150,00
		40-45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40-45	300-400	700-900	4.770,00
		45-50			5.900,00
		50-60			7.300,00




Acer platanoides 'Summershade'

**platanoides 'Summershade', Schatten-Ahorn**

Höhe: bis 15 m  
 Wuchs: Krone breit oval, auffallend locker  
 Laub: groß; hellgrüner Austrieb, Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: April; gelbgrün  
 Frucht: deutlich weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich und anspruchsärmer als A. platanoides; sonnig bis halbschattig

**platanoides 'Superform', Spitz-Ahorn 'Superform'**

Höhe: bis 22 m  
 Wuchs: Krone ausladend, betont lockerwüchsig  
 Laub: groß; hellgrüner Austrieb, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelbgrün  
 Frucht: weniger als die Art fruchtend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich und weniger anspruchsvoll als A. platanoides; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Wuchsform ähnelt A. platanoides 'Summershade'



Acer platanoides 'Summershade'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12-14		247,00	218,00
		14-16		335,00	293,00
		16-18		460,00	405,00
		18-20		600,00	530,00
		20-25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20-25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	500-700	1.110,00
		25-30			1.390,00
		30-35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.730,00
		30-35			2.160,00
		35-40			2.680,00



Acer platanoides 'Superform'

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
5xv.	m.Db. 30- 35 35- 40 40- 45	200-300	700-900	2.340,00	
				2.910,00	
				3.580,00	
6xv.	m.Db. 40- 45 45- 50 50- 60 60- 70	300-400	700-900	4.410,00	
				5.450,00	
				6.750,00	
				8.450,00	

## pseudoplatanus, Berg-Ahorn

- Höhe: 20-30(-40) m  
 Wuchs: Krone breit rund, sehr ausladend, im Alter knorrig  
 Laub: fünfflappig; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: Mai bis Juni; auffallend  
 Frucht: ab Sommer rötlich bis leuchtend rot, zur Reife braun  
 Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig




Acer pseudoplatanus

### verpflanzte Heister

o.B.	150-200	19,50	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,90	26,40	

### Solitär, mehrstämmig

3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	
5xv.	m.Db.	600-700	2.160,00	
		700-800	2.980,00	



Acer pseudoplatanus

### Solitär, mehrstämmig

5xv.	m.Db. 40- 50 50- 60 60- 70	200-300	500-700	2.220,00
				2.760,00
				3.410,00
6xv.	m.Db. 70- 80 80- 90 90-100 100-120	300-400	700-900	4.650,00
				5.750,00
				7.110,00
				8.950,00




Acer pseudoplatanus

### Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche

3xv.	m.Db. 12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25	247,00	218,00
		335,00	293,00
		460,00	405,00
		600,00	530,00
		795,00	700,00
4xv.	m.Db. 20- 25	845,00	745,00

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db. 20- 25 25- 30 30- 35	150-200	400-500	1.110,00
				1.390,00
				1.790,00



Acer pseudoplatanus





Acer pseudoplatanus

→ **pseudoplatanus**

5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.790,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00
7xv.	m.Db.	60- 70	400-600	700-900	10.500,00
		70- 80			12.990,00



Acer pseudoplatanus

### pseudoplatanus 'VKG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigener Berg-Ahorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe:	20-30(-40) m
Wuchs:	Krone breit rund, sehr ausladend, im Alter knorrig
Laub:	fünflappig; Herbstfärbung goldgelb
Blüte:	Mai bis Juni; auffallend
Frucht:	ab Sommer rötlich bis leuchtend rot, zur Reife braun
Standort:	feuchtfriech, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Heister**

o.B.	125-150	20,50	18,10	16,40
	150-200	25,50	22,50	20,40

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	272,00	244,00
		14- 16	369,00	325,00
		16- 18	506,00	450,00
		18- 20	640,00	580,00
		20- 25	875,00	765,00

Acer pseudoplatanus  
'Atropurpureum'

### pseudoplatanus 'Atropurpureum',

Rotbrauner Berg-Ahorn; Synonym: A. p. 'Spaethii'

Höhe:	20-25 m
Wuchs:	breit kegelförmig, ausladend
Laub:	Austrieb rotbraun, unterseits tiefrot
Blüte:	Mai bis Juni
Frucht:	ab Sommer; dunkelrot
Standort:	feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	780,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

Acer pseudoplatanus  
'Atropurpureum'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.890,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00

**pseudoplatanus 'Bruchem', Berg-Ahorn 'Bruchem'**

Höhe: 25-30 m

Wuchs: Krone eiförmig, oben spitz, kompakt

Laub: fünfflappig, breiter als lang; Nerven rotbraun

Blüte: Mai bis Juni; auffallend

Frucht: ab Sommer rötlich

Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	395,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	795,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.790,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	2.910,00
		40- 45			3.580,00
		45- 50			4.410,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00

**pseudoplatanus 'Erectum', Berg-Ahorn 'Erectum'**

Synonym: ps. 'Nachtegalplein'

Höhe: 15-25 m

Wuchs: jung schmal eiförmig, später eiförmig, kräftiger Jungwuchs

Laub: kurz gelappt; Blattstiele rot; bis 30 cm


Blüte: Mai bis Juni; auffallend

Frucht: schon jung auffallend und reichlich


Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich, windfest; sonnig bis halbschattig



Acer pseudoplatanus 'Bruchem'




Acer pseudoplatanus 'Bruchem'



Acer pseudoplatanus 'Erectum'



→ Acer pseudoplatanus 'Erectum'



Acer pseudoplatanus 'Negenia'

→ **pseudoplatanus 'Erectum'****pseudoplatanus 'Negenia',** Kegelförmiger Berg-Ahorn

Höhe: 20-30 m

Wuchs: dichter als A. pseudoplatanus, kegel- bis eiförmig

Laub: fünfplappig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: Mai bis Juni

Frucht: ab Sommer; rötlich

Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**pseudoplatanus 'Rotterdam',**

## Breit Kegelförmiger Berg-Ahorn

Höhe: 20-25 m


Wuchs: Krone säulen-, später kegelförmig

Laub: fünfplappig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: Mai bis Juni,

Frucht: ab Sommer; rötlich

Standort: feucht bis frisch, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		895,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.790,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00

**pseudoplatanus 'Wilhelm' ©, Berg-Ahorn 'Wilhelm' ©**

## Sortenschutz-Kenn-Nr. AHO 8

Höhe: 25-30 m

Wuchs: eiförmig; durchgehender Stamm, im oberen Kronenbereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste aufgeteilt

Laub: fünfplappig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: Mai bis Juni; auffallend

Standort: feucht frisch, kalkverträglich; sonnig

Sonstiges: stärker wachsend als die Art; bisher keine Schädigungen bekannt



Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'



Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14			270,00	240,00
		14- 16			370,00	330,00
		16- 18			510,00	450,00
		18- 20			680,00	600,00
		20- 25			895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00	
		25- 30			1.500,00	
		30- 35			1.840,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00	
		30- 35			2.290,00	
		35- 40			2.830,00	

**rubrum 'Redpointe'®,  
Rot-Ahorn 'Redpointe'**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: Krone breit pyramidal, aufgelockert

Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung orange bis rot; später Laubfall im Oktober

Blüte: März; rot; auffallend

Frucht: Stiele länger als Blüten

Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig

Sonstiges: Herbstfärbung am stärksten auf sauren Böden

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14			390,00	
		14- 16			530,00	
		16- 18			710,00	
		18- 20			945,00	
4xv.	m.Db.	20- 25			1.320,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.350,00	
		20- 25			1.730,00	
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.890,00	
		25- 30			2.350,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.630,00	
		30- 35			3.250,00	
		35- 40			4.015,00	
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	4.230,00	
		40- 45			4.945,00	
		45- 50			6.095,00	



Acer pseudoplatanus 'Wilhelm' ©



Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-




Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-



Acer rubrum 'Redpointe'® -PBR-





Acer rubrum 'Armstrong'

**rubrum, Rot-Ahorn**

- Höhe: 10-12 m  
 Wuchs: Krone aufrecht, dicht  
 Laub: bis fünfplappig, steif; Herbstfärbung ab September leuchtend orange bis rot  
 Blüte: März; mäßig auffallend  
 Frucht: Stiele länger als Fruchtblügel  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig

**rubrum 'Armstrong', Schmalkroniger Rot-Ahorn**

- Höhe: 10-12 m  
 Wuchs: Krone straff aufrecht, fein verzweigt, schmalkronig  
 Laub: bis fünfplappig; Herbstfärbung gelb bis orange  
 Blüte: März; rotorange  
 Frucht: Stiele länger als Fruchtblügel  
 Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig



Acer rubrum 'Armstrong'

**rubrum 'October Glory', Rot-Ahorn 'October Glory'**

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Krone breit pyramidal, aufgelockert  
 Laub: drei- bis fünfplappig; Herbstfärbung orange bis rot; später Laubfall im Oktober  
 Blüte: März; rot; auffallend  
 Frucht: Stiele länger als Fruchtblügel  
 Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig




Acer rubrum 'Red Sunset'

**rubrum 'Red Sunset', Rot-Ahorn 'Red Sunset'**

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Krone pyramidal bis eiförmig, regelmäßig  
 Laub: drei- bis fünfplappig; Herbstfärbung orange bis tiefrot  
 Blüte: März; rot; auffallend  
 Frucht: Stiele länger als Fruchtblügel  
 Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig  
 Sonstiges: Stammschattierung im Frühjahr sinnvoll

**rubrum 'Scanlon', Rot-Ahorn 'Scanlon'**

- Höhe: 10-12 m  
 Wuchs: schmal eiförmig  
 Laub: dunkelgrün; glänzend; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: März; mäßig auffallend  
 Frucht: Stiele länger als Fruchtblügel  
 Standort: feucht, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig



Acer rubrum 'Scanlon'

**rubrum 'Somerset', Rot-Ahorn 'Somerset'**

- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: breit oval  
 Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung tiefdunkelrot mit frischgrünen Triebspitzen; auffälliger Blickfang  
 Blüte: März; nur männliche Blüten; auffallend  
 Frucht: keine  
 Standort: feucht, sandig bis lehmig, etwas kalkempfindlich  
 Sonstiges: langanhaltende, beeindruckende tief dunkelrote Herbstfärbung; verträgt höheren pH-Wert als andere Acer rubrum-Sorten

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	189,00
		200-250	268,00
		250-300	370,00
		300-350	530,00

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.270,00
		20- 25			1.610,00
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	3.680,00
		40- 45			4.520,00
		45- 50			5.800,00

**rufinerve, Rostbart-Ahorn**

- Höhe: Solitärsträucher bis 6 m  
 Wuchs: Äste betont aufrecht, trichterförmig  
 Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb bis rot  
 Blüte: Mai; auffallend  
 Frucht: August bis November  
 Standort: frisch, lehmig, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt schwach alkalische Böden, kein Stadtklima

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	180,00
		150-200	265,00




Acer rubrum 'Scanlon'



Acer rubrum 'Somerset'



Acer rubrum 'Somerset'



Acer rufinerve



Acer rufinerve

## → rufinerve

4xv.	m.Db.	150-200	200-250	510,00
			250-300	750,00
			300-350	1.080,00
			350-400	1.540,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.890,00



Acer saccharinum

**saccharinum, Silber-Ahorn**

Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: Krone hochgewölbt, kegelförmig bis verkehrt eiförmig, locker  
 Laub: fünfflappig; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung leuchtend gelb  
 Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend  
 Frucht: schon im Juni abfallend  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis sandig lehmig, humos; sonnig

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	785,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.790,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00



Acer saccharinum



Acer saccharinum

**saccharinum 'Pyramidale', Schmäler Silber-Ahorn**

Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: Krone eiförmig, dichter als A. saccharinum  
 Laub: dreilappig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig

**saccharinum 'Wieri', Geschlitzter Silber-Ahorn**

Synonym: A. s. 'Laciniatum'

Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: Krone locker, breit ausladend, Zweige durchhängend  
 Laub: fünfflappig, tief gelappt; Herbstfärbung leuchtend gelb  
 Blüte: März; gräulich gelb bis rot; auffallend  
 Standort: feucht bis frisch, sandig humos; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.790,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.790,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00

**saccharum, Zucker-Ahorn**

Höhe: 20-25 m  
 Wuchs: Krone oval bis rundlich  
 Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung gelb, orange bis rot; auffallend  
 Blüte: April; grünlich gelb  
 Frucht: ab Sommer; Fruchtlügel spitzwinklig gespreizt  
 Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, durchlässig, humos; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: Laub ähnlich Spitz-Ahorn, jedoch ohne Milchsaft

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.890,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.980,00
		25- 30	2.470,00
		30- 35	2.980,00



Acer saccharinum 'Pyramidale'



Acer saccharinum 'Wieri'



Acer saccharinum 'Wieri'



Acer saccharum



Acer shirasawanum 'Aureum'

## shirasawanum 'Aureum', Japanischer Gold-Ahorn

Synonym: A. japonicum 'Aureum'

Höhe: 2-3 m  
Wuchs: rundlich, kurz- oder mehrstämmig  
Laub: fiederlappig; goldgelb  
Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos, locker; absonnig oder wechselschattig

### Solitär

3xv.	m.B./Co.	25- 30	59,00
		30- 40	80,50
		40- 50	110,00
4xv.	m.B./Co.	60- 80	145,00
		80-100	210,00
		100-125	298,00

Acer truncatum x platanoides  
'Norwegian Sunset'®

## truncatum x platanoides 'Norwegian Sunset'®,


'Keithsform'-Ahorn

Höhe: 12-15 m  
Wuchs: aufrecht oval  
Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung orangerot bis rot  
Blüte: April; grünlich gelb in aufrechten Dolden  
Frucht: Fruchtlügel bis in den Winter  
Standort: feucht, vorübergehend trocken; sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis halbschattig; gut hitzeverträglich  
Sonstiges: verträgt auch belastete Standorte

## truncatum x platanoides 'Pacific Sunset'®,

Chinesischer Wald-Ahorn

Höhe: 10-12 m  
Wuchs: mittelgroßer Baum mit rundlichem Kronenaufbau  
Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung orangerot bis rot  
Blüte: Mai; grünlich gelb  
Frucht: Fruchtlügel bis in den Winter  
Standort: feucht, vorübergehend trocken; sandig bis lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis halbschattig; gut hitzeverträglich  
Sonstiges: verträgt auch belastete Standorte

Acer truncatum x platanoides  
'Norwegian Sunset'®Acer truncatum x platanoides  
'Pacific Sunset'®

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
		18- 20	900,00	795,00
		20- 25	1.110,00	980,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00	

Stamm-  
umfang


Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

ACTINIDIA

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20 20- 25	100-150	400-500	1.080,00 1.350,00
4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.610,00 2.025,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	2.290,00 2.830,00 3.490,00
5xv.	m.Db.	35- 40 40- 45 45- 50	200-300	700-900	3.580,00 4.410,00 5.450,00



Actinidia arguta

**ACTINIDIA - Actinidiaceae - STRAHLENGRIFFEL****arguta**, Gelber Strahlengriffel, Scharfzähniger Strahlengriffel


Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: stark windender Schlingstrauch  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; im Laub versteckt; duftend; zweihäusig  
 Frucht: Oktober; stachelbeerähnlich; essbar  
 Standort: frisch, lehmig, durchlässig, nahrhaft; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: hoher Vitamin-C-Gehalt der Früchte



Actinidia arguta

**chinensis** - siehe Obstteil**kolomikta**, Rosa Strahlengriffel, Amur-Strahlengriffel

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: schwach windender Schlingstrauch  
 Laub: breit elliptisch; Blattspitzen der männlichen Pflanzen auffallend rosa bis rötlich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; duftend; zweihäusig  
 Frucht: ab Oktober; kugelig; süß; essbar  
 Standort: frisch, lehmig, nahrhaft; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: da sich die männlichen Exemplare intensiver rosa färben, sind nur sie in Kultur



Actinidia kolomikta

**Kletterpflanzen**

m.Tb.		40- 60	23,00	20,30
		60-100	36,00	31,80

**Solitär**

3xv.	Co.	100-150	68,90	60,90
		150-200	91,00	80,50



Actinidia kolomikta

**AESCULUS - Hippocastanaceae - KASTANIE****carnea, Purpur-Kastanie**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Krone rundlich  
 Laub: fünfteilig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; hellrot  
 Frucht: selten

Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: Blütenbaum ab 10. Lebensjahr

**carnea 'Briotii', Scharlach-Kastanie**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Krone rundlich bis breit; etwas langsamer als A. carnea  
 Laub: fünfteilig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; leuchtend blutrot  
 Frucht: kugelig, weich stachelig; wenig ausgebildet

Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: Blütenbaum ab 10. Lebensjahr

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12-14	340,00
		14-16	475,00
		16-18	680,00
		18-20	900,00
4xv.	m.Db.	18-20	970,00
		20-25	1.270,00


**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	100-150	400-500	1.610,00
		25-30			2.025,00
4xv.	m.Db.	25-30	150-200	400-500	2.160,00
		30-35			2.680,00
		35-40			3.320,00
5xv.	m.Db.	30-35	200-300	400-500	2.980,00
		35-40			3.680,00
		40-45			4.520,00
6xv.	m.Db.	45-50	300-400	500-700	6.950,00
		50-60			8.650,00


**flava 'Vestita', Gelbe Pavie, Gelbe Kastanie 'Vestita'**

Synonym: A. octandra 'Vestita'

Höhe: 12-15 (-20) m  
 Wuchs: Krone zunächst breit kegelförmig, später rundlich, hochgewölbt  
 Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; hellgelb, purpurrosa gefleckt  
 Frucht: ab September; asymmetrisch, fast kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: herrlicher Blütenbaum



Aesculus carnea



Aesculus carnea 'Briotii'



Aesculus carnea 'Briotii'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

AESCULUS

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			400,00
		14- 16			545,00
		16- 18			750,00
4xv.	m.Db.	18- 20			1.050,00
		20- 25			1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00

**hippocastanum, Gewöhnliche Rosskastanie**Baum  
des Jahres  
2005

Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: Krone breit bis hochgewölbt, wuchtig  
 Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April bis Mai; weiß, gelbrot gefleckt  
 Frucht: ab September; stachelig, kugelig  
 Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: Blütenbaum

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14			247,00	218,00
		14- 16			335,00	293,00
		16- 18			460,00	405,00
		18- 20			600,00	530,00
		20- 25			795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Aesculus flava 'Vestita'



Aesculus hippocastanum



Aesculus hippocastanum



Aesculus hippocastanum  
'Baumannii'

## hippocastanum 'Baumannii', Gefüllt blühende Rosskastanie

Höhe: 20-25 m  
Wuchs: hochgewölbt  
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb  
Blüte: Mai; gefüllte, weiße Rispen  
Frucht: nicht ausgebildet  
Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

### Solitär-Bäume



4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.410,00
		45- 50			5.450,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	6.750,00
		50- 60			8.450,00
		60- 70			10.500,00

## hippocastanum 'Pyramidalis', Pyramiden-Rosskastanie

Höhe: 15-25 m  
Wuchs: Krone schmal kegel- bis säulenförmig  
Laub: bis siebenteilig; Herbstfärbung gelb  
Blüte: April bis Mai; weiß  
Frucht: ab September; stachelig, kugelig  
Standort: feucht bis frisch, lehmig, humos; sonnig  
Sonstiges: Pyramidenform

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00

Aesculus hippocastanum  
'Baumannii'Aesculus hippocastanum  
'Baumannii'Aesculus hippocastanum  
'Pyramidalis'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.320,00 1.640,00
4xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	150-200	400-500	1.980,00 2.470,00 3.060,00

**parviflora, Strauch-Kastanie**


Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: Strauch, dicht, sich durch Ausläufer ausbreitend  
 Laub: bis siebeneteilt; Austrieb leuchtend rot; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: Juli bis August; weiß  
 Frucht: ab September; eirundlich; glatt  
 Standort: frisch, lehmig, kalk- und nässeverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: wertvoller Spätsommerblüher

Aesculus hippocastanum  
'Pyramidalis'**eintriebzig**

m.B./Co.	40- 60	40,10
	60- 80	46,80

**Solitär, mehrtriebzig**

3xv.	m.B./Co.	60- 80	72,50	
		80-100	101,50	
4xv.	m.Db.	60-100	100-125	220,00
			125-150	310,00
5xv.	m.Db.	100-150	150-175	530,00
			175-200	750,00



Aesculus parviflora

**pavia, Rote Echte Pavie**

Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: geschlossene, rundliche Form  
 Laub: bis siebenlappig; Laub früh abwerfend  
 Blüte: Mai bis Juni; rote Rispen  
 Frucht: ab Sommer; eirundlich  
 Standort: bodentolerant, frisch bis gleichmäßig feucht, nährstoffreich; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: Blütenbaum



Aesculus parviflora

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	198,00
		150-175	291,00
		175-200	430,00
4xv.	m.Db.	200-250	660,00
		250-300	970,00



Aesculus pavia



Ailanthus altissima


## AILANTHUS - Simoroubaceae - GÖTTERBAUM

### altissima, Drüsiger Götterbaum



- Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: starker Jugendwuchs, oft mehrstämmig  
 Laub: gefiedert, groß; mattgrün; Blattfall in wenigen Tagen  
 Blüte: Juni bis Juli; strenger Geruch  
 Frucht: ab August bis Winter; orangerot  
 Standort: sandig lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: anspruchslose Pionierpflanze

**HANDELSVERBOT DA INVASIVE ART!**



Akebia quinata

## AKEBIA - Lardizabalaceae - KLETTERGURKE

### quinata, Fünfblättrige Klettergurke

- Höhe: 4-8 m  
 Wuchs: hoch schlingend, rasch wachsend  
 Laub: fingerteilig  
 Blüte: Mai; bräunlich violett; einhäusig; männliche Blüten deutlich kleiner; süßlich duftend  
 Frucht: August bis September; helllila; gurken- bis bananenförmig; essbar  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, durchlässig; sonnig bis halbschattig

#### Kletterpflanzen

m.Tb.	40- 60	13,00
	60-100	17,50

#### Solitär

3xv.	Co.	100-150	38,00
		150-200	51,90



Akebia quinata

## ALBIZIA - Leguminosae - SEIDENAKAZIE

### julibrissin 'Ombrella®', Seidenbaum 'Ombrella®'

- Höhe: in mediterranen Regionen 7-10 m  
 Wuchs: ganz flach schirmförmig  
 Laub: doppelt gefiedert; nachts zusammengefaltet; auffallend  
 Blüte: Juli bis September; karmesinrot, in Köpfchen, seidige Staubfäden; duftend  
 Frucht: ab Herbst; Hülsen, hellbraun  
 Standort: durchlässig, lehmig, Kalk liebend; vollsonnig, Wärme liebend, geschützt  
 Sonstiges: nur in milden Regionen frosthart

#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00



Albizia julibrissin 'Ombrella®'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreis in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

ALNUS

4xv.	m.Db.	18-20	970,00
		20-25	1.270,00
		25-30	1.690,00

## ALNUS - Betulaceae - ERLE

### cordata, Italienische Erle

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: schmalkegelig bis eiförmig  
 Laub: breit herzförmig, bis 10 cm; glänzend ledrig; Laubfall ab November  
 Blüte: März bis April; männliche Blüten in hängenden Kätzchen; auffallend  
 Frucht: bis über Winter am Baum; auffallend  
 Standort: frisch, kalkverträglich; sonnig

#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12-14	247,00	218,00
		14-16	335,00	293,00
		16-18	460,00	405,00
		18-20	600,00	530,00
		20-25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20-25	845,00	745,00

#### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.110,00
		25-30			1.390,00
		30-35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.730,00
		30-35			2.160,00
		35-40			2.680,00

### glutinosa, Schwarz-Erle, Rot-Erle

Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Stamm gerade bis Wipfel, spitz kegelförmig, auch mehrstämmig  
 Laub: eiförmig; lange haftend; hoher Stickstoffgehalt  
 Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: eiförmige Zapfen  
 Standort: sandig bis torfig, gut Nässe vertragend, Kalk meidend; sonnig  
 Sonstiges: langlebig, ca. 150 Jahre

Baum  
des Jahres  
2003

#### verpflanzte Heister


o.B.	150-200	19,50	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,20	26,40	

#### Solitär, mehrstämmig

3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	
		600-700	2.160,00	



Albizia julibrissin 'Ombrella®'



Alnus cordata




Alnus cordata




→ Alnus glutinosa



Alnus glutinosa



Alnus glutinosa



Alnus glutinosa



Alnus glutinosa

## → glutinosa

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	25- 30		1.110,00	980,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
4xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00

**glutinosa 'VkG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigene Schwarz-Erle, Rot-Erle aus Vorkommensgebiet 1 bis 6**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: Stamm gerade bis Wipfel, spitz kegelförmig, auch mehrstämmig

Laub: eiförmig; lange haftend; hoher Stickstoffgehalt

Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar

Frucht: eiförmige Zapfen

Standort: sandig bis torfig, gut Nässe vertragend, Kalk meidend; sonnig

Sonstiges: langlebig, ca. 150 Jahre

**verpflanzte Heister**

o.B.	125-150	20,50	18,10	16,40
	150-200	25,50	22,50	20,40

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		272,00	244,00
		14- 16		369,00	325,00
		16- 18		506,00	450,00
		18- 20		660,00	580,00
		20- 25		875,00	765,00

**incana, Grau-Erle, Weiß-Erle**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Krone erst spitzkegelig, später breit bis rundlich; rasch  
 Laub: eiförmig; lang haftend  
 Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: eiförmige Zapfen  
 Standort: frisch bis trocken, sandig bis lehmig, Kies, Schutt, Ton, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: kurzlebig, ca. 50 Jahre

Baum  
des Jahres  
2003


Alnus incana

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	19,50	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,90	26,40	

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	
		600-700	2.160,00	



Alnus incana

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	25- 30	1.110,00	980,00



Alnus incana

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
4xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00



Alnus incana



Alnus spaethii

## incana 'VKG 6 - ZgG®', Gebieteigene Grau-Erle, Weiß-Erle aus Vorkommensgebiet 6




Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Krone erst spitzkegelig, später breit bis rundlich; rasch  
 Laub: eiförmig; lange haftend  
 Blüte: März; männliche Kätzchen auffällig, weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: eiförmige Zapfen  
 Standort: frisch bis trocken, sandig bis lehmig, Kies, Schutt, Ton, gut kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: kurzlebig, ca. 50 Jahre

### verpflanzte Heister

o.B.	125-150	20,50	18,10	16,40
	150-200	25,50	22,50	20,40

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12-14		272,00	244,00
		14-16		369,00	325,00
		16-18		506,00	450,00
		18-20		660,00	580,00
		20-25		875,00	765,00



Alnus spaethii

## spaethii, Purpur-Erle



Höhe: 10-20 m  
 Wuchs: spitz kegelförmig, später annähernd eiförmig  
 Laub: dunkelgrün, Austrieb violettpurpurn; lanzettlich bis eiförmig  
 Blüte: Januar/Februar; männliche Kätzchen braungelb, auffällig; weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: eiförmige Zapfen  
 Standort: frisch, lehmig, kalkverträglich  
 Sonstiges: später Laubfall ab November; für Erlen untypische Blattform

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12-14		247,00	218,00
		14-16		335,00	293,00
		16-18		460,00	405,00
		18-20		600,00	530,00
		20-25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20-25		845,00	745,00



Alnus spaethii

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.110,00
		25-30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.730,00
		30-35			2.160,00
		35-40			2.680,00
		40-45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40-45	300-400	500-700	4.410,00
		45-50			5.450,00
6xv.	m.Db.	45-50	300-400	700-900	6.750,00
		50-60			8.450,00



Alnus spaethii

**AMELANCHIER - Rosaceae - FELSENBIRNE****arborea 'Robin Hill',**

Baumartige Felsenbirne 'Robin Hill'



Höhe: 6-8 m

Wuchs: Großstrauch oder kleiner Baum; Krone breit eiförmig, später rundlich eilänglich, Grund herzförmig

Laub: im Austrieb dicht weißwollig

Blüte: März/April; rosa Knospen, weiße Trauben; duftend

Frucht: ab Juni; schwärzlich purpurn; fade; früh abfallend

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig



Amelanchier arborea 'Robin Hill'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00	360,00
		12- 14	530,00	465,00
4xv.	m.Db.	14- 16	795,00	
		16- 18	1.080,00	
		18- 20	1.390,00	

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	1.980,00	
		25- 30	2.470,00	



Amelanchier arborea 'Robin Hill'

**'Ballerina', Kupfer-Felsenbirne 'Ballerina'**Synonym: *A. laevis/ lamarckii* 'Ballerina'

Höhe: 6-8 m


Wuchs: mehrstämmiger Großstrauch oder kleiner Baum mit breitförmiger Krone

Laub: eilänglich; Herbstfärbung orangerot

Blüte: April/Mai; reinweiße, sternförmige Einzelblüten in bis zu 10 cm langen, überhängenden Trauben

Frucht: ab Juli; Beeren; purpurschwarz; süß, saftig; essbar

Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig



Amelanchier arborea 'Robin Hill'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	114,00	100,00
		125-150	157,00	138,00
		150-175	216,00	
		175-200	298,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00	360,00
		12- 14	530,00	465,00
4xv.	m.Db.	14- 16	795,00	
		16- 18	1.080,00	
		18- 20	1.390,00	




Amelanchier 'Ballerina'





Amelanchier laevis



Amelanchier laevis

→ 'Ballerina'

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20-25	100-150	1.980,00
		25-30		2.470,00
		30-35		3.060,00

**laevis, Hängende Felsenbirne, Kahle Felsenbirne**



Höhe: 2,5-3,5 m  
 Wuchs: mehrstämmiger Strauch, Zweige dünn; langsam  
 Laub: eilänglich; Herbstfärbung orange  
 Blüte: April; weiß  
 Frucht: kugelig; purpurn bis schwarz; essbar  
 Standort: kühl, feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	29,90	25,15
	Co.	60-100	33,30	29,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	129,00
		125-150	194,00
4xv.	m.Db.	150-175	260,00
		175-200	370,00
		200-250	585,00
		250-300	820,00

**lamarckii, Kupfer-Felsenbirne**



Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: mehrstämmiger Großstrauch, locker  
 Laub: Austrieb Bronze; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: April; cremeweiß in aufrechten Trauben  
 Frucht: August bis September; Beeren purpurn bis schwarz; essbar  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig, humos; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	7,95	5,90	5,30
		100-150	10,50	8,30	7,50
	Co.	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	96,50	85,00
		150-175	137,00	121,00
		175-200	194,00	171,00
		200-250	260,00	
4xv.	m.Db.	100-150	200-250	315,00
		250-300		485,00
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	430,00
		250-300		640,00
		300-350		920,00



Amelanchier lamarckii

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

## AMELANCHIER

5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.690,00
			350-400	2.410,00
			400-450	3.410,00
			450-500	4.770,00

**Solitär-Schirm, mehrstämmig**

4xv.	m.Db.	100-150	200-250	730,00
			250-300	1.050,00
5xv.	m.Db.	150-200	250-300	1.180,00
			300-350	1.690,00
6xv.	m.Db.	200-300	300-350	2.760,00
			350-400	4.410,00

**Hochstämme -veredelt-**

3xv.	m.Db.	10- 12	340,00
		12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	1.890,00
		25- 30	2.340,00
		30- 35	2.910,00
5xv.	m.Db.	30- 35	3.230,00
		35- 40	3.970,00
		40- 45	4.900,00

**Hochstämme -wurzelecht-**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00
		25- 30	2.470,00

**rotundifolia**, Gemeine Felsenbirne, FelsenmispelSynonym: *A. ovalis*, *A. vulgaris*, *Crataegus rotundifolia*

Höhe: 1-3 m

Wuchs: locker aufrecht, im Alter eher rundlich

Laub: dunkelgrün, unterseits heller und im Austrieb flockig behaart;  
Herbstfärbung orangert

Blüte: vor Laubaustrieb Ende April/Mai; in weißen kurzen Trauben

Frucht: dunkelblau bis schwarz; kugelförmig; essbar, süßlich

Standort: trocken frisch, stark alkalisch bis sauer; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: frosthart; stadtklimafest



Amelanchier lamarckii



Amelanchier lamarckii



Amelanchier rotundifolia



Amelanchier rotundifolia



Amorpha fruticosa

→ **rotundifolia**

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	40- 60	7,95	5,90	5,30
		60-100	10,50	8,30	7,50

**Sträucher**

Co.	60-100	17,50	15,40	14,00
-----	--------	-------	-------	-------

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	96,50	85,00
		150-175	137,00	121,00
		175-200	194,00	171,00
		200-250	276,00	



Amorpha fruticosa

**AMORPHA - Leguminosae - AMORPHE**

**fruticosa, Falscher Indigo, Bastardindigo**




Höhe: 2-4 m  
 Wuchs: Strauch, sparrige Grundäste, breit ausladend  
 Laub: gefiedert  
 Blüte: Juni bis August; violettblaue Schmetterlingsblüte  
 Frucht: Fruchthülsen bis Winter  
 Standort: trocken bis frisch, sandig, auch salzhaltig, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	5,00	3,52	3,20
4 Tr.	o.B.	100-150	6,70	4,95	4,50

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	59,00
		150-200	80,50
	m.Db.	200-250	116,50
		250-300	161,00



Aralia elata

**ARALIA - Araliaceae - ARALIE, ANGELIKABAUM**

**elata, Stachel-Aralie**



Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: Großstrauch, mehrstämmig, straff aufrecht  
 Laub: doppelt gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: August; elfenbeinweiß  
 Frucht: auffallend; kugelige, schwarze Einzelfrüchte  
 Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos; sonnig

**Solitär, eintriebzig**

3xv.	m.Db.	125-150	46,80
		150-200	63,80
		200-250	86,50



Aralia elata

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

ARISTOLOCHIA

**Solitär, mehrtriebzig**

3xv.	m.Db.	125-150	120,00
		150-200	179,00
		200-250	268,00
4xv.	m.Db.	250-300	420,00
		300-350	600,00

**ARISTOLOCHIA - Aristolochiaceae - OSTERLUZEI****macrophylla, Großblättrige Pfeifenwinde**Synonym: *Aristolochia durior*

- Höhe: 6-10 m  
 Wuchs: hochwindender Schlingstrauch  
 Laub: herzförmig, groß; lange haftend  
 Blüte: Juli bis August; pfeifenartig; purpurbraun; verborgen  
 Frucht: vielsamige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig, halbschattig bis schattig

**Kletterpflanzen**

m.Tb.	40-60	23,00	20,30
ab 2 Tr.	m.Tb.	60-100	32,40 28,60

**Solitär**


3xv.	Co.	100-150	68,90
		150-200	96,50
		200-250	137,00

**ARONIA - Rosaceae - APFELBEERE****melanocarpa, Schwarzfrüchtige Kahle Apfelbeere**Synonym: *Sorbus melanocarpa*

- Höhe: bis 1,5 m  
 Wuchs: Kleinstrauch; Ausläufer treibend; aufrechter langsamer Wuchs; wird im Alter breiter  
 Laub: glänzend dunkelgrün, unterseits heller; Herbstfärbung leuchtend rot bis orangerot  
 Blüte: weiße Rispen im Mai nach Laubaustrieb  
 Frucht: rund; zuerst rot, später schwarz; essbar  
 Standort: anspruchslos; mäßig trocken bis nass; sauer bis schwach alkalisch  
 Sonstiges: salzverträglich und sehr frosthart; Vogelschutzgehölz

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	40-60	8,95	6,70	6,10
		60-100	11,45	9,50	8,30



Aralia elata



Aristolochia macrophylla



Aristolochia macrophylla



Aronia melanocarpa

→ **melanocarpa****Sträucher**

Co.	40- 60	13,00	11,50	10,45
	60-100	14,55	12,65	11,65

**Solitär**

3xv. m.B.	80-100	48,10	42,50	
	100-125	65,00	57,80	
	125-150	96,50	85,00	
	150-175	137,00		

**melanocarpa 'Viking', Schwarzfrüchtige Kahle  
Apfelbeere 'Viking'**

Höhe: 1-2 m

Wuchs: mehrtriebiger Kleinstrauch; Ausläufer bildend; aufrechter langsamer Wuchs; wird im Alter breiter

Laub: glänzend dunkelgrün, unterseits heller; Herbstfärbung leuchtend rot bis orangerot

Blüte: weiße Rispen im Mai nach Laubaustrieb

Frucht: rund; zuerst rot, später schwarz; essbar, süßlich

Standort: anspruchslos; mäßig trocken bis nass; sauer bis schwach alkalisch

Sonstiges: salzverträglich und sehr frosthart

**Sträucher**

Co.	40- 60	10,80	9,55	8,65
	60-100	12,05	10,65	9,65

**Solitär**

3xv. m.B.	80-100	48,10	42,50	
	100-125	65,00	57,80	
	125-150	96,50	85,00	
	150-175	137,00		

**ASIMINA - Annonaceae - PAPAU****triloba, Dreilappige Papau, Indianerbanane**

Höhe: 5-8 m

Wuchs: kegelförmig, später rundlich

Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: Mai; braunrot bis purpurfarben; Duft

Frucht: grünlich gelb; essbar, Geschmack süßlich

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, Kalk meidend; sonnig


Sonstiges: In den USA wird die Frucht Pawpaw genannt

**Solitär**

4xv. m.Db.	200-250	198,00		
	250-300	276,00		
	300-350	385,00		
	350-400	545,00		



Asimina triloba



Asimina triloba

**AUCUBA - Cornaceae - AUKUBE****japonica**, Japanische Aukube

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschiger Strauch mit geschlossenem Umriss  
 Laub: immergrün; schmal oval; lederartig  
 Blüte: März bis April; purpurbraun, Rispen; zweihäusig  
 Frucht: ab Sommer; scharlachrot; sehr lange haftend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos, locker; absonnig bis vollschattig  
 Sonstiges: stadtfest, abgasunempfindlich; schnittverträglich, Radikalschnitt vertragend



Aucuba japonica

**japonica 'Variegata'**, Buntlaubige Aukube, Metzgerpalme

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschiger Strauch mit geschlossenem Umriss  
 Laub: immergrün; schmal oval; lederartig; gelb gepunktet  
 Blüte: März bis April; purpurbraun, Rispen; zweihäusig  
 Frucht: ab Sommer; scharlachrot; sehr lange haftend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos, locker; absonnig bis vollschattig  
 Sonstiges: stadtfest, abgasunempfindlich; unverwüsthliche Kübelpflanze



Aucuba japonica 'Variegata'

**Sträucher**

Co.	40- 50	26,20
	50- 60	38,00
	60- 80	54,60

**BAMBUS****FARGESIA - Poaceae - CHINA-ROHRGRAS,  
BAMBUS, HALBROHR**

Synonym: Sinarundinaria

**murielae**, Winterharter Schirm-Bambus

Synonym: Thamnocalamus spathaceus

- Höhe: 2,5-4 m  
 Wuchs: dichtbuschig, schirmartig überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich  
 Halme: olivgrün bis dunkelgrün  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig



Bambus - Fargesia murielae



Bambus - Fargesia murielae

Bambus - Fargesia murielae  
'Jumbo'→ **murielae****murielae 'Deep Forest'**, Winterharter Schirm-Bambus  
'Deep Forest'

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: dichtbuschig, schirmartig überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich; anfangs silbrig, dann dunkelgrün  
 Halme: Triebspitzen anfangs rötlich, dann grün, später gelbgrün  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; bis ca. -25 °C frosthart

Bambus - Fargesia murielae  
'Jumbo'**murielae 'Jumbo'**, Winterharter Schirm-Bambus 'Jumbo'

Höhe: 2,5-3 m  
 Wuchs: dichtbuschig, anfangs aufrecht, später schirmartig überhängend, starkwüchsig  
 Laub: immergrün; lanzettlich  
 Halme: anfangs weiß bereift, später grün, im Alter gelblichgrün  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig

**murielae 'Simba'**, Winterharter Schirm-Bambus 'Simba'

Höhe: 2-2,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig, weit überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün  
 Halme: weißbereift, später hellgrün  
 Standort: frisch bis feucht, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; bis ca. -25 °C frosthart

**murielae 'Standing Stone'**, Winterharter Schirm-Bambus  
'Standing Stone'

Höhe: 2,5-3,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig, zuerst aufrecht, dann schirmartig überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün  
 Halme: anfangs weiß bereift, dann grün, im Alter gelblichgrün  
 Standort: frisch bis feucht, kalktolerant; halbschattig, windgeschützt; bis ca. -25 °C frosthart



Bambus - Fargesia nitida

**nitida**, Winterharter Bambus

Höhe: 2,5-4 m  
 Wuchs: straff aufrecht, dichtbuschig, schirmförmig überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich  
 Halme: olivbraun bis braunviolett  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	100-125	96,50
		125-150	107,50
		150-175	148,50
		175-200	204,00
		200-250	283,00

**PHYLLOSTACHYS - Poaceae -****BAMBUS, FLACHROHR-BAMBUS****aurea, Knoten-Bambus, Gold-Bambus;  
Kranich-Knie-Bambus**

- Höhe: 2,5-3 m  
 Wuchs: straff aufrecht, leicht bogig übergeneigt, Ausläufer treibend  
 Halme: gelblich grün bis graugrün; dicker Knoten  
 Laub: immergrün, gelbgrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig

**Solitär**


3xv.	m.B./Co.	100-150	82,50
		150-200	126,00
		200-250	175,00
		250-300	241,00
4xv.	m.B./Co.	300-350	450,00
		350-400	560,00

**aureosulcata, Gelbrindiger Bambus**

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: leicht überhängend, Ausläufer treibend  
 Halme: am Fuß zickzackförmig; dunkelgrün mit goldgelben Streifen  
 Laub: glänzend dunkelgrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig; verträgt keinen Wind

**aureosulcata 'Aureocaulis', Bambus 'Aureocaulis'**

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: gelb, in der Sonne rot  
 Laub: immergrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig; verträgt keinen Wind



Bambus - Phyllostachys aurea



Bambus - Phyllostachys aurea



Bambus - Phyllostachys aureosulcata 'Aureocaulis'



Bambus - Phyllostachys  
aureosulcata 'Spectabilis'→ **aureosulcata, aureosulcata 'Aureocaulis'****aureosulcata 'Spectabilis', Bambus 'Spectabilis'**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: grüner Sulcus auf gelbem Halm; Zickzackwuchs  
 Laub: immergrün; dunkelgrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig; verträgt keinen Wind



Bambus - Phyllostachys flexuosa

**bissetii, Grüner Bambus, Dichthalmiger Bambus**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: leicht überhängend, Ausläufer treibend  
 Halme: dunkelgrün  
 Laub: immergrün; glänzend dunkelgrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig

**flexuosa, Zickzack-Bambus**

Höhe: 2-5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, kuppelförmig, Ausläufer treibend  
 Halme: grün, später gelb und schwarz gefleckt; zickzackförmig  
 Laub: immergrün; sehr fein  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig



Bambus - Phyllostachys glauca

**glauca, Blauer Bambus**

Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: junge Halme mit Talg bereift, dadurch bläulich schimmernd  
 Laub: immergrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig; anspruchslos



Bambus - Phyllostachys nigra

**humilis, Bonsai-Bambus**


Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: bräunlich grün, Halmscheide grünrosa geädert  
 Laub: frischgrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig

**nigra, Schwarzlack-Bambus**

Höhe: 3-6 m  
 Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: olivgrün, später glänzend schwarz  
 Laub: dunkelgrün; sehr dünn; immergrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig

**nigra 'Boryana',** Japanischer Schwarzhalm-Bambus

- Höhe: 5-8 m  
 Wuchs: schlank aufrecht, kurze Ausläufer treibend, robust  
 Halme: grün, ältere Halme mit braunen Flecken  
 Laub: immergrün; fein  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig



Bambus - Phyllostachys nigra

**nigra 'Henonis',** Schlanker Bambus

- Höhe: 4-7 m  
 Wuchs: schlank aufrecht, zierlich, kurze Ausläufer treibend  
 Halme: gelbgrün  
 Laub: immergrün; fein  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig




Bambus - Phyllostachys viridiglaucescens

**viridiglaucescens,** Riesen-Bambus,  
Smaragdgrüner Bambus

- Höhe: 6-10 m  
 Wuchs: locker aufrecht, leicht bogig überhängend, Ausläufer treibend  
 Halme: grasgrün, später stumpf gelbgrün  
 Laub: immergrün; glänzend grün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig

**viridis 'Mitis',** Grün-Bambus

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: straff aufrecht, leicht übergeneigt, Ausläufer treibend  
 Halme: sattgrün, später gelblich  
 Laub: grün; immergrün  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtschantig



Bambus - Phyllostachys viridis 'Mitis'

**vivax 'Aureocaulis',** Grün-Bambus

- Höhe: bis 10 m  
 Wuchs: starkwüchsiger Bambus mit dicken Halmen, Ausläufer treibend  
 Halme: gelb mit grünen Streifen; dünnwandige Halme  
 Laub: groß, sattgrün  
 Standort: frisch bis feucht, Frosthart bis -22 °C, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	100-150	93,50
		150-200	145,00
		200-250	198,00
		250-300	276,00
		300-350	450,00
		350-400	640,00
		400-500	770,00



Bambus - Pleioblastus pumilus

## PLEIOBLASTUS - Poaceae - BAMBUS

### distichus, Palmen-Bambus

Höhe: 40 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, stark Ausläufer treibend  
 Halme: grau  
 Laub: immergrün; fest, dicht, fächerähnlich  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtsattig

### pumilus, Zwerg-Bambus

Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, stark Ausläufer treibend  
 Halme: grau  
 Laub: immergrün; lanzettlich  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtsattig



Bambus - Pleioblastus pygmaeus

### pygmaeus, Zwerg-Bambus

Höhe: 30 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, stark Ausläufer treibend  
 Halme: grün  
 Laub: sehr klein; bläulich grün  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; sonnig bis lichtsattig

#### Sträucher

m.Tb.		9,70	8,55
Co.	20-30	19,50	17,20
	30-40	29,90	26,40



Bambus - Pleioblastus pygmaeus

## PSEUDOSASA - Poaceae - BAMBUS

### japonica, Immergrüner Breitblatt-Bambus

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, Ausläufer treibend  
 Halme: dunkelgrün  
 Laub: immergrün; lanzettlich; groß; ledrig; grün; glänzend  
 Standort: feucht bis frisch, durchlässig, lehmig, kalktolerant, humos; wechselsattig

#### Solitär

3xv.	m.B./Co.	80-100	65,40
		100-125	93,50
4xv.	m.B./Co.	125-150	141,00
		150-175	204,00
		175-200	283,00
		200-250	345,00



Bambus - Pseudosasa japonica

**SASA - Poaceae - ZWERG-BAMBUS, WALD-BAMBUS****palmata**, Palmwedel-Bambus

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: aufrecht, leicht kugelförmig, stark Ausläufer treibend  
 Halme: grün, weiß gepudert  
 Laub: kräftig grün; auffallend groß  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig; wechselschattig

**tsuboiana**, Halbhoher Wald-Bambus

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: aufrecht, stark Ausläufer treibend  
 Halme: grün  
 Laub: kräftig grün; sehr groß  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, wechselschattig

**Büsche**

m.B./Co.	20- 30	19,50
	30- 40	29,90
	40- 60	43,30
	60- 80	62,10

**pumila** - siehe Ziergräser**BERBERIS - Berberidaceae - BERBERITZE, SAUERDORN****buxifolia 'Nana'**, Grüne Polster-Berberitze

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: breitbuschig, schwachwüchsig  
 Laub: immergrün; elliptisch, 1 cm lang  
 Blüte: April bis Mai; leuchtend orange-gelb; selten  
 Frucht: kaum ausgebildet  
 Standort: feucht bis trocken, nahrhaft, humos; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: schwach bedornete Rinde

**Büsche**


m.Tb.	15- 20	11,10	9,80	8,90
	20- 25	13,80	12,20	11,00
	25- 30	17,10	15,10	13,65



Bambus - Pseudosasa japonica




Berberis buxifolia 'Nana'




Berberis buxifolia 'Nana'




Berberis candidula



Berberis candidula



Berberis frikartii 'Verrucandi'



Berberis gagnepainii lanceifolia

## candidula, Immergrüne Kissen-Berberitze



Höhe: 60-80 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, breitkugelig; langsam  
 Laub: immergrün; elliptisch; 2-3 cm lang  
 Blüte: Mai; gelb; schwach duftend  
 Frucht: September bis Oktober, blau  
 Standort: feucht bis trocken, nahrhaft, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: bedornete Rinde

### Büsche

m.B./Co.	20- 25	20,50	18,10
	25- 30	24,80	21,90
	30- 40	29,20	25,80
	40- 50	42,20	37,30

## frikartii 'Verrucandi', Immergrüne Silber-Berberitze



Höhe: bis 150 cm hoch und breit  
 Wuchs: breitbuschig bis halbkugelig, dicht, geschlossen  
 Laub: immergrün; länglich; eiförmig; glänzend dunkelgrün, unterseits silbrig  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, lehmhaltig, sonnig bis schattig  
 Sonstiges: dornige Rinde

### Büsche

m.B./Co.	25- 30	15,30	13,50
	30- 40 <td>17,90 <td>15,80</td> </td>	17,90 <td>15,80</td>	15,80
	40- 50 <td>26,20 <td>23,10</td> </td>	26,20 <td>23,10</td>	23,10
	50- 60 <td>37,00 <td>32,70</td> </td>	37,00 <td>32,70</td>	32,70

### Solitär

3xv.	m.Db.	60- 80	98,50
		80-100	140,00

## gagnepainii lanceifolia, Immergrüne Lanzen-Berberitze

Höhe: 2(-3) m  
 Wuchs: innen buschig, dicht verzweigt, außen locker  
 Laub: immergrün; lanzettlich, dornig gezähnt; 8-10 cm lang  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln  
 Frucht: ab September; blauschwarz  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: bedornete Rinde

**julianae**, Immergrüne Großblättrige Berberitze

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: dichtbuschig, breit aufrecht  
 Laub: immergrün; oval lanzettlich; Winterfärbung leicht rötlich  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln; duftend  
 Frucht: ab September; blauschwarz; länglich  
 Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmhaltig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Rinde stark bedornig; undurchdringlicher Strauch



Berberis julianae

**Büsche**


m.B./Co.	30- 40	15,80	13,90
	40- 50	20,50	18,10
	50- 60	29,90	26,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60- 80	82,50	72,80
		80-100	116,50	
		100-125	165,00	
		125-150	235,00	

**hookeri**, Himalaja-Berberitze

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: in der Jugend straff aufrecht, steif, im Alter überhängend  
 Laub: immergrün; elliptisch bis lanzettlich; ilexartig  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb  
 Frucht: ab Sommer; schwarzpurpurfarben  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig, lehmig, nährstoffreich, humos;  
 sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: starke Blattdornen



Berberis julianae

**media 'Parkjuweel'**, Berberitze 'Parkjuweel'


- Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: breitbuschig, rundlich  
 Laub: halbimmergrün; verkehrt eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb; in Büscheln  
 Frucht: länglich; schwarz  
 Standort: mäßig trocken, frisch, schwach saure, nahrhafte, lehmige Böden



Berberis hookeri

**Büsche**

m.B./Co.	25- 30	13,00	11,50
	30- 40	15,80	13,90
	40- 50	20,50	18,10
	50- 60	29,90	26,40



Berberis media 'Parkjuweel'



Berberis ottawensis 'Superba'

**ottawensis 'Superba', Große Blut-Berberitze**

Synonym: B. ottawensis atropurpurea superba


Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: starkwüchsig, hochgewölbt, schirmartig  
 Laub: bräunlich rot; Herbstfärbung orangefarben durchscheinend  
 Blüte: Mai; gelbrot; Duft süßlich  
 Frucht: September bis Winter; rot  
 Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Rinde stark bedornt; undurchdringlicher Strauch

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	10,80	8,55	7,75
4 Tr.	o.B.	100-150	14,55	11,90	10,80
	Co.	60-100	14,55	12,90	11,70

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	60,50		
		125-150	78,50		
	m.Db.	150-175	110,50		
		175-200	170,00		



Berberis ottawensis 'Superba'

**stenophylla, Dotter-Berberitze, Rosmarin-Berberitze**


Höhe: bis 200 cm  
 Wuchs: breit ausladend, bogig überhängend bis zum Boden  
 Laub: winter- bis immergrün; schmal lanzettlich  
 Blüte: Mai; gelborange; in kleinen Büscheln  
 Frucht: klein, kugelig; blauschwarz bereift  
 Standort: frisch bis feucht, etwas Trockenheit vertragend, sandhaltig; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: Rinde stark bedornt

**Büsche**

	m.B./Co.	30- 40	13,00	11,80	10,70
		40- 60	15,80	13,90	12,60
		60- 80	22,30	19,70	17,90

**Solitär**


3xv.	m.Db.	80-100	120,00		
		100-125	160,00		
		125-150	220,00		



Berberis stenophylla

**thunbergii, Grüne Hecken-Berberitze**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichter, schirmartiger Strauch  
 Laub: eiförmig; grün; Herbstfärbung orangefarben  
 Blüte: Mai; rötlich gelb; in Büscheln  
 Frucht: September bis Winter; auffallend korallenrot  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig; sonnig  
 Sonstiges: dornenreiche Rinde



Berberis thunbergii

**thunbergii 'Atropurpurea', Blutrote Hecken-Berberitze**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschiger, ziemlich straff aufrechter Strauch  
 Laub: eiförmig; braunrot; Herbstfärbung leuchtend rot  
 Blüte: Mai; rötlich gelb; in Büscheln  
 Frucht: September bis Winter; auffallend korallenrot  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: dornige Rinde

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	30- 40	4,60	3,19	2,90
		40- 60	5,45	3,91	3,55
		60-100	7,50	5,50	5,00
	Co.	40- 60	10,20	9,00	8,15

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	60,50	53,50
		100-125	78,50	69,10
		125-150	116,50	103,00

**thunbergii 'Atropurpurea Nana', Kleine Blut-Berberitze**

Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: dicht, breitkugelig, später flacher  
 Laub: eiförmig; Herbstfärbung leuchtend rot  
 Blüte: Mai; rötlich gelb  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: Rinde zierlich bedornt

**Büsche**

Co.	15- 20	11,10	9,80	8,90
	20- 25	13,80	12,20	11,05
	25- 30	16,60	14,65	13,30

**thunbergii 'Bagatelle', Rote Zwerg-Berberitze 'Bagatelle'**


Höhe: bis 0,4 m  
 Wuchs: dichtbuschig, flachkugelig  
 Laub: eiförmig; schwarzrot; Herbstfärbung leuchtend rot bis orange  
 Blüte: Mai; gelb; in Büscheln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: robust, frosthart, schnittverträglich

**Büsche**

Co.	15- 20	12,35	10,90	9,90
	20- 25	15,30	13,50	12,25




Berberis thunbergii

Berberis thunbergii  
'Atropurpurea'Berberis thunbergii  
'Atropurpurea Nana'

Berberis thunbergii 'Bagatelle'





Berberis thunbergii 'Green Carpet'

**thunbergii 'Green Carpet', Grüne Teppich-Berberitze**

Höhe: 1 m  
 Wuchs: flach gedungen  
 Laub: breit elliptisch; glänzend hellgrün  
 Blüte: Mai; rötlich gelb  
 Frucht: länglich; rosa bis rot  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: Rinde dicht bedornt

**Büsche**

Co.	20- 30	13,00	11,50	10,45
	30- 40	16,20	14,70	13,30
	40- 60	19,90	17,60	16,00



Berberis thunbergii 'Kobold'

**thunbergii 'Green Ornament',****Schmale Strauch-Berberitze**

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig, mittelhoch  
 Laub: rundlich bis eiförmig; grün; Herbstfärbung bräunlich gelb  
 Blüte: Mai; gelb, außen rötlich  
 Frucht: September bis Winter; rot; zahlreich  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nährstoffreich, humos;  
 sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: dornreiche Rinde

**Büsche**

Co.	30- 40	16,20	14,70	13,30
-----	--------	-------	-------	-------



Berberis thunbergii 'Kobold'

**thunbergii 'Kobold', Kugelige Zwerg-Berberitze 'Kobold'**

Höhe: bis 0,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig, flachkugelig  
 Laub: eiförmig; Herbstfärbung leuchtend gelb bis rot  
 Blüte: Mai; gelb; in Büscheln  
 Frucht: selten  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: robust und stadtklimafest

**Büsche**

Co.	15- 20	12,35	10,90	9,90
	20- 25	15,30	13,50	12,25



Berberis thunbergii 'Red Chief'

**thunbergii 'Red Chief', Schirmförmige Berberitze**

Höhe: 4 m  
 Wuchs: aufrecht, schirmförmig überhängende Zweige; rasch  
 Laub: lanzettlich eiförmig; sommergrün; Herbstfärbung leuchtend rot  
 Blüte: Mai; gelb; in Büscheln  
 Frucht: lange haftend, rosarot  
 Standort: feucht bis mäßig trocken, sandig bis lehmig, humos; sonnig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	11,10	9,80
	40- 60	13,00	11,50

**Solitär**

3xv. m.B.	80-100	43,30
	100-125	60,50
	125-150	84,50

**verruculosa, Warzen-Berberitze**

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: buschig aufrecht, hoch gewölbt bis kugelig  
 Laub: immergrün; Winterfärbung leicht rötlich  
 Blüte: Mai bis Juni; goldgelb; auffallend  
 Frucht: ab September; bläulich schwarz  
 Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmhaltig, humos; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: dornreiche Rinde

**Büsche**

m.B./Co.	25- 30	14,90	13,15	11,95
	30- 40	17,50	15,40	14,00
	40- 50	25,60	22,50	20,40
	50- 60	36,00	31,80	

**Solitär**

3xv. m.Db.	60- 80	80,50
	80-100	114,00
	100-125	161,00

**vulgaris, Gemeine Berberitze, Sauerdorn**

- Höhe: bis 3 m  
 Wuchs: stark wachsend, breitbuschig  
 Laub: scharf dorniger Blattrand; kahl; dunkelgrün, unterseits weißlich grün; Herbstfärbung leuchtend orangerot  
 Blüte: Mai; sehr zahlreich; gelb; in hängenden Trauben  
 Frucht: längliche Beeren; essbar; säuerlich süß; reich an Vitamin C  
 Standort: trocken bis frisch; liebt alkalische Böden  
 Sonstiges: stadtklimafest; anspruchslos; schnittverträglich; frosthart

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr. o.B.	40- 60	6,75	5,00	4,55
5 Tr. o.B.	60-100	9,45	7,30	6,60

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	12,35	10,90	9,90
	60-100	15,30	13,50	12,25



Berberis thunbergii 'Red Chief'




Berberis verruculosa



Berberis verruculosa



Berberis vulgaris



Betula albosinensis

**BETULA - Betulaceae - BIRKE****albosinensis, Kupfer-Birke, Chinesische Birke**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: kegelförmig, zierlich, langsam, dünntriebig  
 Laub: eiförmig zugespitzt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; grüngelbe Kätzchen  
 Frucht: ab August bis Dezember; unauffällig  
 Standort: nahrhafte Kulturböden, durchlässig; sonnig  
 Sonstiges: kupferfarbene bis orangefarbene Rinde

**ermanii, Gold-Birke**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: kurz- oder mehrstämmig, breit eiförmig bis weit ausladend  
 Laub: eckig herzförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; gelbgrüne Kätzchen  
 Frucht: aufrechte Fruchtkätzchen  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig  
 Sonstiges: Rinde rosaweiß mit gelbem Ton

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60
	250-300	60,50	53,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.		200-250	157,00
			250-300	216,00
			300-350	315,00
4xv.	m.Db.	150-200	350-400	640,00
			400-500	895,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00
		14- 16		335,00
		16- 18		460,00
4xv.	m.Db.	18- 20		640,00
		20- 25		845,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00



Betula albosinensis



Betula albosinensis



Betula ermanii

**jacquemontii**, Himalaja-Birke, Schnee-Birke

Synonym: utilis jacquemontii, utilis

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: breit aufrecht, meist mehrstämmig  
 Laub: Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: April; Kätzchen grüngelb  
 Frucht: große Fruchtkätzchen  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig

**verpflanzte Heister**

m.B./Co.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60
	250-300	60,50	53,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.		200-250	148,50
			250-300	204,00
			300-350	283,00
4xv.	m.Db.	150-200	350-400	460,00
			400-500	660,00

**Solitär, mehrstämmig**

3xv.	m.Db.		250-300	530,00
			300-350	770,00
4xv.	m.Db.		350-400	1.150,00
			400-500	1.640,00

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14		270,00
		14- 16		370,00
		16- 18		510,00
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00
		20- 25		945,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00



Betula jacquemontii



Betula jacquemontii



Betula jacquemontii



Betula maximowicziana

## maximowicziana, Bronze-Birke, Lindenblättrige Birke

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: im Inneren wenig verzweigt, kegel- bis eiförmig, auch mehrstämmig  
 Laub: groß; lindenartig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb  
 Frucht: hängende Fruchtkätzchen  
 Standort: alle Kulturböden; frisch bis feucht, sandig, lehmig, humos; vollsonnig bis halbschattig.  
 Sonstiges: Rinde dekorativ weißlich bis aschgrau

### verpflanzte Heister

m.B.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60
	250-300	60,50	53,60

### Solitär

3xv.	m.Db.	200-250	148,50
		250-300	204,00
		300-350	283,00

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00

### Solitär-Bäume


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00

## nana, Polar-Birke, Zwerg-Birke


- Höhe: 50-100 cm  
 Wuchs: Zwergstrauch, reich verzweigt, kissen- bis nestförmig  
 Laub: fast kreisrund; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April; unscheinbar  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: nass bis feucht, torfmoorig, sandig bis lehmig, Kalk empfindlich; sonnig

### Heister

m.B./Co.	30- 40	10,50	9,25
	40- 60	13,00	11,50



Betula nana



Betula nana

**nigra, Fluss-Birke, Schwarz-Birke**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: meist mehrstämmig, breit ausladend, Spitzen bogig hängend

Laub: rautenförmig; Herbstfärbung gelb

Blüte: April; Kätzchen gelbgrün

Frucht: kurz gestielte Fruchtzäpfchen; behaart

Standort: feucht bis nass, lehmig, nährstoffreich; sonnig

Sonstiges: Rinde erst rotbraun, später schwarzbraun und kraus abrollend

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.		200-250	148,50
			250-300	204,00
			300-350	283,00
4xv.	m.Db.	150-200	350-400	460,00
			400-500	660,00
4xv.	m.Db.	200-300	400-500	945,00
			500-600	1.320,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00
		14- 16		335,00
		16- 18		460,00
4xv.	m.Db.	18- 20		640,00
		20- 25		845,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00

**papyrifera, Papier-Birke**

Höhe: 20-30 m

Wuchs: mehr- oder hochstämmig, spitzkegelig

Laub: eiförmig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: April; Kätzchen grüngelb


Frucht: hängende Fruchtkätzchen

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig; sonnig, nicht heiß

Sonstiges: Rinde leuchtend weiß, an jungen Trieben rotbraun

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60
	250-300	60,50	53,50




Betula nigra



Betula nigra



Betula papyrifera



→ Betula papyrifera



Betula papyrifera

## → papyrifera

**Solitär**


3xv.	m.Db.	250-300	204,00
		300-350	283,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00



Betula pendula

**pendula, Gemeine Birke, Sand-Birke,  
Warzen-Birke, Weiß-Birke**

Synonym: B. alba, B. verrucosa

Höhe: 20-30 m

Wuchs: variabel, von schmal eiförmig bis schirmförmig

Laub: dreieckig bis rautenförmig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb

Frucht: Fruchtkätzchen; hängend

Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig, sauer bis neutral; sonnig

Sonstiges: Rinde weißgrau

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	26,90	23,80
	200-250	35,10	31,00
	250-300	45,60	40,30

**Solitär**

3xv.	m.Db.	250-300	74,30	65,70
		300-350	101,50	89,50
4xv.	m.Db.	350-400	189,00	
		400-500	268,00	

**Solitär, mehrstämmig**

3xv.	m.Db.	200-250	204,00	180,00
		250-300	283,00	250,00
		300-350	400,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.540,00	
5xv.	m.Db.	600-700	2.290,00	
		700-800	3.150,00	



Betula pendula



Betula pendula

Baum  
des Jahres  
2000

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00

**pendula 'VKG 1 bis 3 und 4/5/6 - ZgG®',**

Gebietseigene Gemeine Birke, Sand-Birke, Warzen-Birke,  
Weiß-Birke aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

Synonym: B. alba, B. verrucosa

Höhe: 20-30 m

Wuchs: variabel, von schmal eiförmig bis schirmförmig

Laub: dreieckig bis rautenförmig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb

Frucht: Fruchtkätzchen; hängend

Standort: feucht bis trocken, sandig bis lehmig, sauer bis neutral; sonnig

Sonstiges: Rinde weißgrau

**verpflanzte Heister**

o.B.	125-150	29,20	25,80	23,40
	150-200	35,10	31,00	28,10

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		272,00
		14- 16		369,00
		16- 18		506,00
		18- 20		660,00
		20- 25		875,00

**pendula 'Dalecarlica', Schlitz-Birke, Ornäs-Birke**

Synonym: B. pendula 'Crispa'

Höhe: 10-15 m


Wuchs: schmalkronig, Zweige überhängend

Laub: tief geschlitzt; Herbstfärbung gelb

Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb

Frucht: unbedeutend

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig




Betula pendula



Betula pendula 'Dalecarlica'




Betula pendula 'Dalecarlica'



Betula pendula 'Dalecarlica'





Betula pendula 'Fastigiata'

→ pendula 'Dalecarlica'

**pendula 'Fastigiata', Säulen-Birke**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: säulenförmig bis schmal eiförmig  
 Laub: Herbstfärbung gelb; später Laubfall  
 Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	40,10
	200-250	49,30
	250-300	60,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	200-250	148,50
		250-300	204,00
		300-350	283,00
4xv.	m.Db.	350-400	460,00
		400-500	660,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00

**pendula 'Purpurea', Purpur-Birke, Blut-Birke**

Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: kurzstämmig, eiförmig, Krone locker  
 Laub: Austrieb dunkelrot, später olivbrunze  
 Blüte: März bis April; rote Kätzchen  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00



Betula pendula 'Fastigiata'



Betula pendula 'Fastigiata'



Betula pendula 'Purpurea'

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00	
		25- 30			1.640,00	

**pendula 'Tristis', Hänge-Birke**

Höhe: 12-15(-20) m  
 Wuchs: Krone locker, schmal, Zweige tief herunterhängend  
 Laub: Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig

**Solitär**

3xv.	m.B.		200-250	148,50	
			250-300	204,00	
			300-350	283,00	
4xv.	m.Db.	150-200	300-350	325,00	
			350-400	460,00	
			400-500	660,00	

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	
		14- 16		370,00	
		16- 18		510,00	
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00	
		20- 25		945,00	

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00	
		25- 30			1.500,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00	
		30- 35			2.290,00	
		35- 40			2.830,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00	2.540,00
		35- 40			2.910,00	3.150,00
		40- 45			3.580,00	3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00	
		45- 50			5.800,00	
		50- 60			7.300,00	

**pendula 'Youngii', Trauer-Birke**


Höhe: variabel, maximal 4-6 m  
 Wuchs: Schirmkrone, Zweige reichen mähenartig bis zum Boden  
 Laub: Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; Kätzchen grüngelb  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; sonnig



Betula pendula 'Purpurea'




Betula pendula 'Tristis'



Betula pendula 'Tristis'



Betula pendula 'Tristis'



Betula pendula 'Youngii'

**→ pendula 'Youngii'**
**Solitär**

3xv.	m.Db.		250-300	204,00
			300-350	283,00
4xv.	m.Db.	100-150	300-350	325,00
			350-400	460,00
			400-500	660,00
4xv.	m.Db.	150-200	400-500	895,00
			500-600	1.240,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.320,00
		25- 30	1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	2.040,00
		30- 35	2.540,00



Betula pendula 'Youngii'

**pendula 'Zwitsers Glorie', Purpur-Birke, Blut-Birke**

Höhe: bis 15 m hoch und bis 5 m breit  
 Wuchs: mittelgroßer, pyramidal wachsender Baum  
 Laub: sommergrün; 5-7 cm lang; im Herbst goldgelb  
 Blüte: März bis April; grüngelb; Kätzchen  
 Standort: sonnig; feucht bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich  
 Sonstiges: gut als Alleebaum geeignet

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.320,00
		25- 30	1.640,00

**pubescens, Moor-Birke**

Höhe: 10-20 (-25) m  
 Wuchs: mittelgroß, rundlich bis oval; veränderlich  
 Laub: eiförmig bis rundlich; Herbstfärbung gelb; auffallend  
 Blüte: März bis Mai; Kätzchen gelblich  
 Frucht: hängende Fruchtkätzchen  
 Standort: feucht bis nass, sauer; sonnige Lage, jedoch kühl; nicht hitzeverträglich  
 Sonstiges: Rinde grauweiß



Betula pendula 'Youngii'



Betula pubescens

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück**BROUSSONETIA****Solitär**

3xv.	m.Db.	250-300	72,50
		300-350	98,50

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00
		14- 16	335,00
		16- 18	460,00
		18- 20	600,00
		20- 25	795,00

## **BROUSSONETIA - Moraceae - PAPIER-MAULBEERBAUM**

**papyrifera**

Höhe: 5-7 (15) m

Wuchs: breit oval bis rund, oft mehrstämmig

Laub: breit eiförmig, sehr unregelmäßig, variabel

Blüte: Mai; grünlich; unscheinbar; zweihäusig

Frucht: ab Sommer; rot

Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, locker; vollsonnig bis absonnig; geschützt

Sonstiges: empfindlich gegen Oberflächenverdichtungen

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	345,00
		14- 16	485,00
4xv.	m.Db.	16- 18	730,00
		18- 20	970,00
		20- 25	1.280,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.640,00
		25- 30			2.290,00

## **BUDDLEJA - Buddlejaceae - SOMMERFLIEDER, SCHMETTERLINGS-STRAUCH**

**alternifolia, Hänge-Buddleie, Wechselblättriger****Sommerflieder**

Höhe: 2,5-3 m

Wuchs: lockerer Strauch mit dicken Hauptästen, Blütentriebe überhängend

Laub: lanzettlich; etwas silbergrau

Blüte: Juni; purpurila; stark duftend

Frucht: zweifächrige Kapseln; viele Samen

Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig; sonnig

**Sträucher**

Co.	40- 60	12,05	10,65	9,65
	60-100	13,40	11,85	10,75 →




Betula pubescens



Broussonetia papyrifera



Broussonetia papyrifera



Buddleja alternifolia



Buddleja alternifolia

→ alternifolia

**Solitär**

3xv.	Co.	80-100	39,00	34,50
		100-125	50,60	44,70
		125-150	65,40	57,80

**davidii-Sorten, Schmetterlingsstrauch in Sorten**

Höhe: 2-3 m

Wuchs: trichterförmig bis breit ausladend, sehr locker

Laub: unterseits graufilzig

Blüte: Juli bis Oktober; lange Rispen; große Farbskala

Frucht: Samenkapseln; über Winter haftend


Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; vollsonnig

Sonstiges: lockt Schmetterlinge an



Buddleja davidii 'African Queen'

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchsform	Frosthärte
African Queen	purpurviolett bis blauviolett	straff aufrecht	frostanfällig, treibt aus altem Holz wieder aus
Black Knight	dunkelviolett	breitbuschig	mittelstark
Cardinal	tiefpurpurrot	breit ausladend	mittel bis gut
Dart's Ornament White	weiß	aufrecht bis breitbuschig	mittelhoch
Dart's Papillon Blue	helllila	aufrecht bis breitbuschig	gering
Dart's Purple Rain	hellviolett	breitbuschig bis ausladend	mittel
Empire Blue	blauviolett	locker aufrecht	mittel
Fascination	blausosa	straff aufrecht bis breitbuschig	mittel
Ile de France	hellblauviolett	locker aufrecht	gering
Kalypso	blauviolett	locker aufrecht	mittel
Nanho Blue	blauviolett	breitbuschig, überhängend	mittel
Nanho Purple	außen purpurrot, innen violett	locker aufrecht	mittel
Nike	helllila	aufrecht	hoch
Peace	weiß, Kronröhre innen orange	breitbuschig	hoch
Pink Delight	dunkelrosa	aufrecht bis breitbuschig	hoch
Purple Prince	blauviolett	breitbuschig	hoch
Royal Red	purpurrot	straff aufrecht bis breitbuschig	mittel
White Bouquet	weiß, Kronröhre innen orange	breitbuschig	hoch
White Profusion	reinweiß	locker aufrecht	mittel



Buddleja davidii Hybride



Buddleja davidii 'Fascination'

**Sträucher**

Co.	40- 60	12,05	10,65	9,65
	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv. Co.	80-100	39,00	34,50	
	100-125	50,60	44,70	
	125-150	65,90	57,80	

**BUXUS - Buxaceae - BUCHSBAUM****microphylla 'Faulkner',**

Kleinblättriger Buchsbaum 'Faulkner'

Synonym: *B. sempervirens* 'Faulkner'

Höhe: 1,5 m

Wuchs: aufrecht, dicht, breitbuschig

Laub: immergrün; rundlich

Blüte: April bis Mai; unauffällig

Frucht: ohne Bedeutung

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, humos; sonnig bis schattig

Sonstiges: Rinde kastanienbraun. Gehölzsichtung 1994-2000: sehr gut bis gut.

**Büsche**

2xv. m.B./Co.	20- 25	11,10	9,80	
	25- 30	13,80	12,20	
3xv. m.B./Co.	30- 40	29,90	26,40	
	40- 50	42,20	37,30	

**Solitär**

4xv. m.B.	50- 60	76,50	67,40	
	60- 80	107,50	95,00	

**sempervirens arborescens, Hoher Buchsbaum**Synonym: *B. sempervirens sempervirens*

Höhe: 2-5 m

Wuchs: dichtbuschig, breit eiförmig bis kugelförmig, von außen locker bis geschlossen; langsam wachsend

Laub: ledrig; immergrün

Blüte: April bis Mai; unauffällig

Frucht: August bis September; Kapsel mit drei Kammern

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkhaltig; sonnig bis schattig

Sonstiges: ausgezeichnet schnittverträglich →



Buddleja davidii 'Nanho Blue'



Buxus microphylla 'Faulkner'



Buxus microphylla 'Faulkner'



Buxus sempervirens arborescens



Buxus sempervirens arborescens

## → sempervirens arborescens

## geschnittene Büsche

m.B./Co.	20- 25	9,20	8,10	7,35
	25- 30	11,70	10,35	9,40
	30- 40	23,60	20,80	18,90
	40- 50	33,30	29,40	

## Solitär-Büsche

3xv. m.B./Co.	50- 60	54,60	48,30	
	60- 80	76,50	67,40	

3xv. m.Db/Co.	60- 80	80-100	216,00	
		100-125	298,00	

4xv. m.Db/Co.	80-100	80-100	291,00	
		100-125	410,00	
		125-150	585,00	

5xv. m.Db/Co.	100-125	100-125	545,00	
		125-150	795,00	

6xv. m.Db/Co.	125-150	125-150	1.500,00	
		150-175	1.940,00	
		175-200	2.470,00	



Buxus sempervirens arborescens

## Kegel

3xv. m.B./Co.	40- 50	56,00		
	50- 60	78,50		
	60- 70	110,50		

4xv. m.Db/Co.	70- 80	179,00		
	80- 90	254,00		
	90-100	365,00		

5xv. m.Db/Co.	100-110	530,00		
	110-120	675,00		
	120-130	845,00		



Buxus sempervirens arborescens

## Kugeln

3xv. m.B./Co.	25- 30	44,50		
	30- 35	62,10		
	35- 40	86,50		

4xv. m.B./Co.	40- 45	129,50		
	45- 50	279,00		
	50- 55	254,00		

5xv. m.Db/Co.	55- 60	365,00		
	60- 70	545,00		
	70- 80	730,00		



Buxus sempervirens arborescens

## Würfel

4xv. m.Db/Co.	40- 45	194,00		
	45- 50	268,00		
	50- 55	370,00		

**sempervirens 'Blauer Heinz', Buchsbaum 'Blauer Heinz'**Synonym: *B. sempervirens* 'Berggarten'

- Höhe: bis 50 cm  
 Wuchs: kugelig bis eiförmig; sehr dicht; sehr kurze Internodien  
 Laub: matt; im Austrieb graugrün, später blaugrün  
 Blüte: nicht beobachtet  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: wie semp. arborescens  
 Sonstiges: für Einfassungen und niedrige Formen hervorragend geeignet

**verpflanzte Heckenpflanzen, geschnitten**

m.Tb.	10- 15	11,70	10,35
	15- 20	13,00	11,50
	20- 25	14,55	12,85
	25- 30	16,20	14,25

**sempervirens 'Bullata', Rundblättriger Buchsbaum**Synonym: *B. sempervirens* 'Rotundifolia'

- Höhe: 2-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht, kräftig  
 Laub: immergrün; rund; bläulich grün  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig

**sempervirens 'Handsworthiensis',**

Buchsbaum 'Handsworth'


- Höhe: bis 2-4 m  
 Wuchs: steif, dichtbuschig, eiförmig, selten Stamm bildend  
 Laub: immergrün; Winterfärbung etwas bräunlich  
 Blüte: April bis Mai; unauffällig  
 Frucht: August bis September; Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis schattig

**Büsche**


3xv.	m.B./Co.	30- 40	23,60	20,80
		40- 50	33,30	29,40
4xv.	m.B./Co.	50- 60	54,60	48,30
		60- 80	76,50	67,40

**Solitär**


4xv.	m.Db.	60- 80	80-100	216,00
			100-125	298,00
5xv.	m.Db.	80-100	100-125	410,00
			125-150	585,00

Buxus sempervirens  
'Blauer Heinz'Buxus sempervirens  
'Blauer Heinz'

Buxus sempervirens 'Bullata'

Buxus sempervirens  
'Handsworthiensis'






Buxus sempervirens 'Suffruticosa'

**sempervirens 'Suffruticosa', Einfassungs-Buchs**

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: buschig, dicht  
 Laub: immergrün  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: nur für Einfassungen

**Heckenpflanzen, geschnitten**

m.Tb.	10- 15	8,65	7,65	6,95
	15- 20	11,45	10,10	9,15



CalliCARPA bodinieri 'Profusion'

**CALLICARPA - Verbenaceae - SCHÖNFRUCHT****bodinieri 'Profusion', Liebesperlenstrauch**

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, feintriebig  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: Juli bis August; lilarosa; Trugdolden  
 Frucht: September bis Oktober; auffallend leuchtend lila; rund  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmhaltig; sonnig; frostgeschützt  
 Sonstiges: Fruchtansatz wird bei Pflanzung von mehreren Sträuchern erhöht

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	17,50	15,40
	60- 80	21,10	18,60

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	101,50
		100-125	133,00
4xv.	m.Db.	125-150	194,00
		150-175	276,00



CalliCARPA bodinieri 'Profusion'

**CALLUNA - Ericaceae - HEIDEKRAUT, BESENHEIDE****vulgaris-Kultursorten, Sommerheide**

- Höhe: 20-50 cm  
 Wuchs: von straff aufrecht über breit ausladend bis Teppich bildend  
 Laub: schuppenförmig anliegend; je nach Sorte grün oder gelblich; Winterfärbung teils bronzefarben  
 Blüte: August bis November; in mehreren Farben rosa, violett und rot sowie weiß  
 Frucht: braune, kleine Kapseln  
 Standort: trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig



Calluna vulgaris

Sortenname	Blütenfarbe	Höhe in cm	Laubfarbe
Alba Plena	reinweiß, gefüllt	30 - 40	grün
Allegro	purpurrot	30 - 40	grün
Alportii	dunkelkarminrot	40 - 60	grün
Annemarie	dunkelrosa, gefüllt	35 - 45	graugrün
Aurea	hellviolett, einfach	20 - 40	gelb
Boskoop	violett	30 - 40	goldgelb
C. W. Nix	karminrot, einfach	30 - 50	grün
Carmen	rosaviolett, einfach	30 - 40	dunkelgrün
County Wickl.	hellrosa, gefüllt	20 - 30	frischgrün
Darkness	karminrot, einfach	30 - 45	grün
Dark Star	rot, halb gefüllt	30 - 40	grün
Gold Haze	weiß, einfach	30 - 40	leuchtend gelb
H. E. Beale	hellrosa, gefüllt	40 - 50	grün
Hammondii	weiß, einfach	40 - 50	frisch grün
J. H. Hamilton	lachsrot, gefüllt	20 - 40	dunkelgrün
Marleen	rosaviolett	20 - 30	hellgrün
Mullion	rosaviolett, einfach	20 - 30	hellgrün
Peter Sparkes	rosa, gefüllt	40 - 50	grün
Radnor	zartrosa, gefüllt	20 - 30	grün
Red Favorite	dunkelrosa, gefüllt	20 - 30	grün
Red Star	rot, gefüllt	40 - 50	graugrün
Silver Knight	lavendelfarben, einf.	30 - 45	silbergrau



Calluna vulgaris 'Alba Plena'



Calluna vulgaris 'Allegro'

**Büsche**

m.Tb.	10- 15	2,40	2,10	1,90
	15- 20	2,80	2,45	2,20

## CALYCANTHUS - Calycanthaceae - GEWÜRZSTRAUCH

**floridus**, Echter Gewürzstrauch

Höhe: 2-3 m

Wuchs: Strauch, breitbuschig aufrecht, sparrig verzweigt

Laub: oval; matt; grün

Blüte: Juni bis Juli; dunkelrot; auffallend; stark würzig duftend

Frucht: braune Kapsel Früchte

Standort: feucht, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: angekratzte Rinde riecht nach Gewürznelken

**Sträucher**


m.B./Co.	40- 60	23,50	20,70
	60- 80	30,70	27,10

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	93,50
		100-125	126,00
4xv.	m.Db.	125-150	210,00
		150-175	298,00



Calycanthus floridus



Calycanthus floridus



Campsis radicans

## CAMPSIS - Bignoniaceae - KLETTERTROMPETE

**radicans**, Amerikanische Trompetenblume

Synonym: *Bignonia radicans*, *Tecoma radicans*

Höhe: 7-9 m

Wuchs: Schlingstrauch, dicht anschmiegend

Laub: gefiedert; bis 25 cm

Blüte: Juni bis September; auffallend; orangerot

Frucht: 8 bis 10 cm lang

Standort: Gartenböden, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst sonnig; geschützt

### Kletterpflanzen

m.Tb.	60-100	11,20	9,80
-------	--------	-------	------

### Solitär

3xv.	Co.	80-100	31,30	27,90
		100-150	44,50	39,30
		150-200	89,00	



Campsis radicans

**radicans 'Flava'**, Gelbe Klettertrompete

Synonym: *C. radicans* 'Yellow Trumpet'

Höhe: 4-5 m

Wuchs: Schlingstrauch, dicht anschmiegend

Laub: gefiedert, bis 25 cm; hellgrün

Blüte: Juni bis September; orange- bis reingelb; auffallend

Frucht: 8 bis 10 cm lang

Standort: Gartenböden, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst vollsonnig; geschützt



Campsis radicans 'Flava'

**tagliabuana 'Mme. Galen'**, Große Klettertrompete

Höhe: 7-9 m

Wuchs: Kletterstrauch, dicht anschmiegend

Laub: gefiedert; bis 40 cm

Blüte: Juni bis September; orangerot

Standort: frisch bis feucht, lehmhaltig, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; Fuß schattig, sonst sonnig; geschützt

Campsis tagliabuana  
'Mme. Galen'

### Kletterpflanzen


m.Tb.	60-100	19,00
-------	--------	-------

### Solitär

3xv.	Co.	80-100	42,00
		100-150	55,60
		150-200	90,80

**CARAGANA - Leguminosae - ERBSENSTRAUCH****arborescens**, Hoher Erbsenstrauh

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: Strauch; Grundtriebe dick, wenig verzweigt, breitbuschig bis rundlich  
 Laub: gefiedert; Blattdornen  
 Blüte: Mai; gelb; in Büscheln  
 Frucht: leicht behaarte Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig



Caragana arborescens

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	5,95	4,30	3,90
4 Tr.	o.B.	100-150	8,25	6,20	5,55
	Co.	60-100	10,20	9,00	8,15

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	41,10		
		150-200	53,30		
	m.Db.	200-250	104,00		
		250-300	141,00		

**arborescens 'Pendula'**, Hängender Erbsenstrauh

- Höhe: je nach Veredlungshöhe 1-3 m  
 Wuchs: stark überhängend, Kaskade  
 Laub: gefiedert; hellgrün; zierlich  
 Blüte: Mai; gelb; in Büscheln  
 Frucht: leicht behaarte Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig



Caragana arborescens

**Halbstämme**

3xv.	Co.	80-100	54,60		
		100-125	63,80		
		125-150	74,30		




Caragana arborescens

**CARPINUS - Betulaceae - WEIBBUCHE****betulus**, Hainbuche

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: sehr variabel, einzelstehend sind die unteren Seitenäste  
 Boden aufliegend  
 Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; oft bis zum Frühling haftend  
 Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Blüten gelb, weibliche Blüten unauffällig  
 Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern  
 Standort: sandig bis lehmig, humos, tiefgründig, kalkverträglich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: Windbestäubung

Baum  
des Jahres  
1996

Carpinus betulus



Carpinus betulus

→ betulus

**verpflanzte Heister**

o.B.		80-100	13,60	11,90	10,80
		100-125	16,90	14,70	13,30
		125-150	19,70	17,50	15,90
m.B./Cont.		100-125	23,20	20,40	18,50
		125-150	27,70	24,50	22,80
		150-175	34,80	30,90	28,00
		175-200	41,80	37,20	33,80

**Heckenpflanzen, geschnitten**

3xv.	m.B.		175-200	57,10	50,80	46,00
			200-225	64,90	57,30	52,00
			225-250	71,90	63,60	57,70
			250-275	106,20	94,00	

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60-100	200-250	96,50	85,00
			250-300	137,00	121,00
			300-350	189,00	
3xv.	m.Db.	100-150	200-250	137,00	121,00
			250-300	189,00	167,00
			300-350	276,00	
			350-400	400,00	

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.		250-300	291,00	
			300-350	420,00	
4xv.	m.Db.		350-400	795,00	
			400-500	1.110,00	
			500-600	1.540,00	

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.100,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Carpinus betulus



Carpinus betulus



Carpinus betulus

## betulus 'VkG 1 bis 3 und 4/5/6 - ZgG®', Gebietseigene Hainbuche aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

Höhe: 15-20 m

Wuchs: sehr variabel, einzelstehend sind die unteren  
Seitenäste Boden aufliegend, im Bestand mit  
durchgehendem Stamm

Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; oft bis zum Frühling haftend

Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Blüten gelb, weibliche Blüten  
unauffällig

Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern

Standort: sandig bis lehmig, humos, tiefgründig, kalkverträglich; sonnig bis  
schattig

Sonstiges: Windbestäubung

### verpflanzte Heister

o.B.	100-125	24,20	21,00	19,10
	125-150	28,40	24,70	22,50
	150-175	53,30	29,00	26,30

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	272,00
		14- 16	369,00
		16- 18	506,00
		18- 20	660,00
		20- 25	875,00

## betulus 'Fastigiata', Säulen-Hainbuche

Synonym: C. betulus 'Pyramidalis'

Höhe: 15-20 m

Wuchs: Stamm reicht in die Krone; ohne Stamm kegelförmig, später breiter

Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb; lang haftend

Blüte: März/April; einhäusig; männliche Blüten als gelbe Kätzchen, weibliche  
Blüten grün

Frucht: kleine Nüsschen an dreilappigen Hochblättern

Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Windbestäubung

## betulus 'Frans Fontaine', Säulen-Hainbuche

'Frans Fontaine'

Höhe: 6-10 m (erwartet)

Wuchs: säulenförmig bis schmal eiförmig, geschlossen

Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb


Blüte: in erster Linie männliche Blüte

Frucht: bis jetzt noch nicht beobachtet

Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig →




Carpinus betulus 'Fastigiata'



Carpinus betulus 'Fastigiata'



Carpinus betulus 'Frans Fontaine'



Carpinus betulus 'Frans Fontaine'

→ betulus 'Frans Fontaine'

**betulus 'Lucas', Säulen-Hainbuche 'Lucas'**



Höhe: ca. 10 m  
 Wuchs: schmal eiförmig, dichte Krone  
 Laub: eilänglich; dunkelgrün; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April-Mai; grüne Kätzchen  
 Frucht: grüne Fruchtkätzchen  
 Standort: lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Heister**

3xv.	m.B.		150-175	53,30	47,10
			175-200	78,50	67,10
			200-250	126,00	111,50
			250-300	179,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.		300-350	400,00	
			350-400	545,00	
			400-500	770,00	
5xv.	m.Db.	60-100	400-500	1.110,00	
			500-600	1.590,00	
5xv.	m.Db.	100-150	400-500	1.590,00	
			500-600	2.290,00	
			600-700	3.230,00	
6xv.	m.Db.	150-200	500-600	2.910,00	
			600-700	4.070,00	
			700-800	5.750,00	

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		340,00	
		14- 16		475,00	
		16- 18		680,00	
		18- 20		900,00	
		20- 25		1.110,00	

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	1.460,00
		25- 30			1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	100-150	500-700	2.160,00
		30- 35			2.680,00
		35- 40			3.320,00
		40- 45			4.520,00
6xv.	m.Db.	40- 45	150-200	500-700	5.450,00
		45- 50			6.750,00
		50- 60			8.450,00



Carpinus betulus 'Frans Fontaine'



Carpinus betulus 'Lucas'

**betulus 'Fastigiata Monument'**, Säulen-Hainbuche  
'Monument'

Synonym: C. b. 'Monumentalis'

Höhe: 4-5 m

Wuchs: Säulenform mit geschlossener und kompakter Gestalt

Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb

Blüte: noch nicht beobachtet

Frucht: noch nicht beobachtet

Standort: sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Formgehölz

**Solitär**

4xv.	m.Db./Co.	125-150	189,00
		150-175	260,00
		175-200	365,00
5xv.	m.Db.	200-225	545,00
		225-250	770,00
		250-275	1.080,00
		275-300	1.500,00

**betulus 'Pendula'**, Trauer-Hainbuche

Höhe: 4-6 m

Wuchs: anfangs waagrecht, später bizarr bogig überhängend

Laub: eilänglich; frischgrün; Herbstfärbung gelb

Blüte: April-Mai; grüne Kätzchen

Frucht: grüne Fruchtkätzchen


Standort: lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	310,00
		12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.730,00
				2.160,00
				2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.910,00
				3.580,00
				4.410,00

Carpinus betulus  
'Fastigiata Monument'Carpinus betulus  
'Fastigiata Monument'

Carpinus betulus 'Pendula'



Carpinus betulus 'Pendula'





Carya illinoensis

## CARYA - Juglandaceae - HICKORYNUSS

### illinoensis, Pekan-Nussbaum, Hickory-Nussbaum

- Höhe: 20-30 (-40) m  
 Wuchs: kegelförmig bis rundlich, langschäftig  
 Laub: unpaarig gefiedert, bis 55 cm; auffallend gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich; Kätzchen  
 Frucht: ab Sommer; Nuss  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig

#### Sträucher

m.B.	40- 60	36,00
	60- 80	51,90
	80-100	72,50

#### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	107,50
		125-150	148,50



Carya illinoensis

## CARYOPTERIS - Verbenaceae - BARTBLUME



### clandonensis 'Arthur Simmonds',

#### Bartblume 'Arthur Simmonds'



Synonym: C. clandonensis

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: locker aufrecht, breitbuschig  
 Laub: länglich lanzettlich; graugrün; aromatisch duftend  
 Blüte: Juli bis September; hellblau  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, nährstoffreich, sandig bis lehmig  
 Sonstiges: Bienenweide

### clandonensis 'Heavenly Blue',

#### Bartblume 'Heavenly Blue'

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht  
 Laub: eilanzettlich; grün; aromatisch duftend  
 Blüte: August bis Oktober; dunkelblau  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, kalkverträglich;  
 sonnig; geschützt  
 Sonstiges: gute Bienenweide

Caryopteris clandonensis  
'Arthur Simmonds'Caryopteris clandonensis  
'Heavenly Blue'

**clandonensis 'Kew Blue', Bartblume 'Kew Blue'**

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: locker aufrecht, breitbuschig  
 Laub: eilanzettlich; graugrün; aromatisch duftend  
 Blüte: September/Oktober; dunkelblau  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, nährstoffreich;  
 sonnig; geschützt  
 Sonstiges: gute Bienenweide

**Sträucher**

Co.	30- 40	11,10	9,80	8,90
	40- 60	13,80	12,20	11,05

Caryopteris clandonensis  
'Heavenly Blue'**CASTANEA - Fagaceae - MARONE,  
ESS-KASTANIE****sativa, Ess-Kastanie, Marone**Synonym: *C. vesca*

- Höhe: 15-20 (-30) m  
 Wuchs: knorriger, bis in die Spitze durchgehender Stamm, neigt zu Drehwuchs  
 Laub: länglich lanzettlich; grob gesägt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juni/Juli; einhäusig, männliche Blüten in aufrechten Ähren, weibliche  
 Blüten unscheinbar; grünlich  
 Frucht: September bis Oktober; essbar; auffallend  
 Standort: sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk meidend, sauer bis neutral; sonnig  
 bis lichtschtig  
 Sonstiges: wird bis 500 Jahre alt

**Solitär**

3xv.	m.Db.	200-250	220,00
		250-300	315,00
4xv.	m.Db.	300-350	460,00
		350-400	660,00

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
		20- 25	895,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00

Baum  
des Jahres  
2018Caryopteris clandonensis 'Kew  
Blue'

Castanea sativa



Castanea sativa



Castanea sativa

→ sativa

5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00

## sativa 'VkG 2,3,4,5,6 - ZgG®', Gebieteigene Ess-Kastanie aus Vorkommensgebiet 2,3,4,5,6



Höhe: 15-20 (-30) m  
 Wuchs: knorriger, bis in die Spitze durchgehender Stamm; neigt zu Drehwuchs  
 Laub: länglich lanzettlich; grob gesägt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juni/Jul; einhäusig; männliche Blüten in aufrechten Ähren, weibliche Blüten unscheinbar; grünlich  
 Frucht: September bis Oktober; essbar; auffallend  
 Standort: sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk meidend, sauer bis neutral; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: wird bis 500 Jahre alt

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14		320,00
		14- 16		420,00
		16- 18		590,00
		18- 20		750,00
		20- 25		990,00

Fruchtsorten - siehe Obstteil



Castanea sativa



Catalpa bignonioides

## CATALPA - Bignoniaceae - TROMPETENBAUM


### bignonioides, Trompetenbaum, Zigarrenbaum



Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Stamm und Äste knorrig, Krone erst hoch, später breit gewölbt  
 Laub: herzförmig; groß; Herbstfärbung hellgelb; Austrieb spät, Laubfall früh  
 Blüte: Juni bis Juli; weiße Rispen  
 Frucht: ab September bis Frühjahr haftend; bohnenförmige, hängende Fruchtkapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig; sonnig  
 Sonstiges: Höchstalter 100 Jahre

### Solitär

3xv.	m.Db.		150-200	157,00
			200-250	216,00
			250-300	315,00
4xv.	m.Db.	150-200	300-350	545,00
			350-400	770,00
			400-500	1.080,00



Catalpa bignonioides

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

CATALPA

5xv.	m.Db.	200-300	350-400	1.350,00	
			400-500	1.890,00	
			500-600	2.600,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	500-700	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00

**bignonioides 'Aurea', Gold-Trompetenbaum**


Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: Krone breit gewölbt, schirmartig  
 Laub: herzförmig; Herbstfärbung gelb; auffallend; früh abfallend  
 Blüte: Juni bis Juli; weiß; jedoch kaum blühend  
 Frucht: bohnenförmig; kaum fruchtend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00
		14- 16		335,00
		16- 18		460,00
		18- 20		600,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	400-500	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00




Catalpa bignonioides




Catalpa bignonioides



Catalpa bignonioides 'Aurea'



Catalpa bignonioides 'Nana'



Catalpa bignonioides 'Nana'

## bignonioides 'Nana', Kugel-Trompetenbaum

Synonym: C. b. 'Globosa'

- Höhe: je nach Veredelungshöhe  
 Wuchs: Krone ohne Schnitt rund, später abflachend  
 Laub: eiförmig zugespitzt  
 Blüte: selten  
 Frucht: selten  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft; sonnig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00
		14- 16	335,00
		16- 18	460,00
		18- 20	600,00
		20- 25	795,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.110,00
		25- 30		1.390,00
4xv.	m.Db.	25- 30	150-200	1.730,00
		30- 35		2.160,00
		35- 40		2.680,00
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.060,00
		40- 45		3.780,00
		45- 50		4.650,00
		50- 60		5.750,00

## CEANOTHUS - Rhamnaceae - SÄCKELBLUME

### delilianus 'Gloire de Versailles', Blaue Säckelblume

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht  
 Laub: eilänglich; dunkelgrün  
 Blüte: Juli bis Oktober; violett bis hellblau  
 Frucht: fleischige, später trockene Steinbeere  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, sandig kiesig; sonnig

Ceanothus delilianus  
'Gloire de Versailles'

Ceanothus pallidus 'Marie Simon'

### pallidus 'Marie Simon', Rosa Säckelblume


- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht  
 Laub: eilänglich; dunkelgrün  
 Blüte: Juli bis Oktober; lachsrosa  
 Frucht: fleischige, später trockene Steinbeere  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, sandig kiesig

### Sträucher

Co.	40- 60	16,00	13,90
	60- 80	21,70	19,20

**CELASTRUS - Celastraceae - BAUMWÜRGER****orbiculatus, Chinesischer Baumwürger**

- Höhe: bis 12 m  
 Wuchs: an Stamm, Großstrauch oder Kletterhilfe hochwindend  
 Laub: eirundlich; auffallend gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juni; grüngelb; meist zweihäusig  
 Frucht: dreiklappige, runde Kapseln; gelb, Samenschale rot  
 Standort: frisch, durchlässig; sonnig bis halbschattig



Celastrus orbiculatus

**Kletterpflanzen**

m.Tb.	60-100	7,15	6,30
-------	--------	------	------

**Solitär**

3xv.	Co.	100-150	35,70
		150-200	57,10
		200-250	79,80

**CELTIS - Ulmaceae - ZÜRSELBAUM****australis, Südlicher Zürgelbaum**

- Höhe: bis 20 m  
 Wuchs: malerisch; ausladend  
 Laub: scharf gesägt; Blattoberseite rau behaart und dunkelgrün, unterseits weich behaart und graugrün  
 Blüte: unscheinbar  
 Frucht: rund und dunkelrot; süß  
 Standort: bevorzugt lockere und nährstoffreiche Böden  
 Sonstiges: sehr trockenheitsresistent; auffallend glatter, grauer Stamm



Celastrus orbiculatus

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00



Celtis australis

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	3.410,00
		40- 45			4.190,00
		45- 50			5.200,00



Celtis australis



Celtis occidentalis

## occidentalis, Amerikanischer Zürgelbaum

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: breit ausladend, Seitenäste überhängend, malerisch  
 Laub: scharf gesägt, kurz zugespitzt; unterseits auf den Nerven schwach behaart; auffallende, goldgelbe Herbstfärbung  
 Blüte: unscheinbar  
 Frucht: kugelig; orangerot; süß  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, locker, Kalk vertragend; sonnig, Wärme liebend  
 Sonstiges: Stamm grau, tief gefurcht, Borke bildend

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	14-16		475,00
		16-18		680,00
4xv.	m.Db.	18-20		970,00
		20-25		1.270,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.460,00
		25-30			1.840,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	2.160,00
		30-35			2.540,00



Cercidiphyllum japonicum

## CERCIDIPHYLLUM - Cercidiphyllaceae - KUCHENBAUM, KATSURABAUM, JUDASBLATTBAUM

### japonicum, Lebkuchenbaum

- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: oft schmal trichterförmig, Krone breite Kegel bildend  
 Laub: herzförmig; Herbstfärbung meist goldgelb, gelegentlich rot; intensiv duftend  
 Blüte: April; vor Blattaustrieb; zweihäusig  
 Frucht: Fruchthülsen  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig




Cercidiphyllum japonicum

### Sträucher

	m.B./Co.	80-100	26,20	23,10
		100-125	38,00	33,60

### Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	65,40
		150-175	91,00
		175-200	129,00
		200-250	184,00
4xv.	m.Db.	250-300	291,00
		300-350	410,00
4xv.	m.Db.	100-150	585,00
		350-400	845,00




Cercidiphyllum japonicum

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	14- 16		670,00
		16- 18		910,00
4xv.	m.Db.	18- 20		1.240,00
		20- 25		1.640,00

**CERCIS - Leguminosae - JUDASBUM****canadensis**, Kanadischer Judasbaum

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: Großstrauch  
 Laub: breit herzförmig bis fast kreisrund, bis 12 cm; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm (Kauliflorie)  
 Frucht: ab August bis Frühjahr; braune Hülse, bis 8 cm  
 Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Schnitt verunstaltet die natürliche Wuchsform, ist aber bei jüngeren Exemplaren möglich; frosthärter als *C. siliquastrum*



Cercis canadensis

**canadensis 'Forest Pansy'**, Rotlaubiger Judasbaum

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: Großstrauch  
 Laub: purpurrot; breit herzförmig, bis 12 cm  
 Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm (Kauliflorie)  
 Frucht: ab August bis Frühjahr; braune Hülse, bis 8 cm  
 Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Schnitt verunstaltet die natürliche Wuchsform, ist aber bei jüngeren Exemplaren möglich; frosthärter als *C. siliquastrum*



Cercis canadensis



Cercis canadensis 'Forest Pansy'

**Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	43,30
	80-100	59,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	165,00
		125-150	234,00
		150-200	315,00
4xv.	m.Db.	200-250	470,00
		250-300	675,00
		300-350	945,00


**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	14- 16		715,00
		16- 18		990,00
		18- 20		1.320,00


**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	60-100	400-500	1.940,00
		25-30			2.410,00






Cercis siliquastrum



Cercis siliquastrum



Cercis siliquastrum



Chaenomeles Hybriden

**siliquastrum**, Gemeiner Judasbaum, Herzbaum

Höhe: 7-8 m

Wuchs: Großstrauch, im Weinklima baumartig, aufrecht, sparrig, Krone breit gewölbt

Laub: nierenförmig; Herbstfärbung gelb

Blüte: April; rosa; auch direkt aus altem Stamm

Frucht: ab August bis Frühjahr; flache, braune Hülsen

Standort: sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig; geschützt

Sonstiges: wird kaum von Schädlingen und Krankheiten befallen

**Sträucher**

m.B./Co.	60-80	43,30
	80-100	59,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	165,00
		125-150	234,00
		150-200	315,00
4xv.	m.Db.	200-250	470,00
		250-300	675,00
		300-350	945,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	14-16	640,00
		16-18	945,00
		18-20	1.180,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18-20	60-100	400-500	1.490,00
		20-25			1.890,00

**CHAENOMELES** - Rosaceae - ZIERQUITTE,  
SCHEINQUITTE**Hybriden**, Zierquitten

Höhe: 0,5-2m

Wuchs: unterschiedlich, von niedrig gedrungen bis locker aufrecht

Laub: spitz oval; glänzend

Blüte: April; Farbe je nach Sorte; auffallend

Frucht: ab August bis Frost; essbar

Standort: frisch, sandig lehmig; sonnig

Sonstiges: mehr oder weniger bedornt

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe in cm		
Andenken an Karl Ramcke	zinnoberrrot; blüht spät	bis 150		
Crimson & Gold	dunkelrot; Staubblätter goldgelb; einfach	bis 120		
Elly Mossel	feuerrot; groß	bis 150		
Fire Dance	signalrot; sehr groß	bis 150		
Jet Trail	silberweiß	bis 100		
Nicoline	scharlachrot	bis 100		
Nivalis	reinweiß	bis 200		
Simonii	dunkelsamtrot; halb gefüllt bis einfach	bis 80		
Vesuvius	hellrot; reich blühend	bis 100		

**Sträucher**


m.B./Co.	30- 40	15,30	13,50	12,20
	40- 60	17,10	15,10	13,70

**Solitär**

3xv.	m.B.	60- 80	44,50	39,30
		80-100	57,60	50,90

**japonica**, Niedrige ScheinquitteSynonym: *Cydonia maulei*

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, Boden deckend oder aufrecht  
 Laub: spitz oval  
 Blüte: April; mäßig auffallend  
 Frucht: ab August; rund; auffallend; stark duftend; essbar  
 Standort: Gartenböden, humos, kalkempfindlich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: etwas bedornt



Chaenomeles japonica



Chaenomeles japonica

**speciosa**, Hohe ScheinquitteSynonym: *C. lagenaria*, *Cydonia japonica*

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: Strauch; Grundtriebe aufrecht, breit ausladende Zweige, sparrig  
 Laub: spitz oval; glänzend  
 Blüte: März bis April; orange- bis ziegelrot; auffallender Blütenstrauch  
 Frucht: ab August bis Frost; gelbgrün; essbar  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig; sonnig  
 Sonstiges: etwas bedornt



Chaenomeles speciosa

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.	40- 60	5,30	3,80	3,45
		60-100	7,10	5,20	4,70
	Co.	40- 60	9,90	8,75	7,95

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	48,10	42,50
		100-125	62,10	54,90
		125-150	80,50	70,90



Chaenomeles speciosa



Chimonanthus praecox

## CHIONANTHUS - Calycanthaceae - WINTERBLÜTE

### praecox

Synonym: *C. fragans*, *Calycanthus praecox*

Höhe: 2-3 m

Wuchs: steif aufrecht, im Alter locker bis offen

Laub: lanzettlich bis eiförmig elliptisch; im Herbst lange haftend

Blüte: Dezember bis Januar, teils Februar; hellgelb, innen purpurfarben gestreift; Duft

Frucht: ab Sommer; Nüsschen, unauffällig

Standort: bodentolerant, frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, locker; sonnig, Wärme liebend; stadtfest

### Sträucher

m.B./Co.	60-80	35,10
	80-100	53,30

### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	98,50
		125-150	145,00



Chimonanthus praecox

## CHIONANTHUS - Oleaceae - SCHNEEFLOCKENSTRAUCH

**virginicus**, Virginischer Schneeflockenstrauch,  
Fransenbaum

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breitbuschig, aufrecht

Laub: oval länglich; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juni; weiße Rispen; auffallend duftend.

Frucht: eiförmig; blauschwarze Steinfrucht

Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, humos; sonnig

Sonstiges: auch Treibstrauch

### Sträucher


m.B./Co.	30-40	34,20
	40-60	39,00

### Solitär

3xv.	m.B.	60-80	86,50
		80-100	123,00
4xv.	m.Db.	100-125	175,00
		125-150	247,00



Chionanthus virginicus



Chionanthus virginicus

**CLADRASTIS - Leguminosae - GELBHOLZ****kentukea**Synonym: *C. lutea*

Höhe: 5-10 m

Wuchs: breit rundlich

Laub: unpaarig gefiedert, zu sieben bis neun Blättchen; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiß; in hängenden Trauben; duftend

Frucht: dünne, flache Hülse

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt


Sonstiges: Lebenserwartung 100-150 Jahre; geringe Krankheitsanfälligkeit

**Solitär**

3xv.	m.Db.		100-125	145,00
			125-150	198,00
			150-175	283,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	175-200	530,00
			200-250	750,00
			250-300	1.050,00
5xv.	m.Db.	150-200	250-300	1.430,00
			300-350	1.980,00
			350-400	2.760,00



Cladras tis kentukea



Cladras tis kentukea

**CLEMATIS - Ranunculaceae - WALDREBE****alpina, Alpen-Waldrebe**

Höhe: bis 2 m

Wuchs: schwachwüchsig

Laub: meist doppelt dreizählig

Blüte: April bis Juni; violett bis rötlich

Frucht: ab Juni; in Büscheln

Standort: steinig humos, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: frei von Schädlingen und Krankheiten

**Kletterpflanzen**

	m.Tb.		60-100	9,90	8,75
--	-------	--	--------	------	------

**Solitär**

3xv.	Co.		100-150	35,10	31,00
------	-----	--	---------	-------	-------

**montana 'Rubens', Anemonen-Bergrebe**

Höhe: 8-9 m, gleiche Maße auch in der Breite

Wuchs: raschwüchsiger Kletterstrauch, Triebe locker und breit

Laub: dreizählig oval; bronzegrün

Blüte: Mai bis Juni; rosarot; leicht duftend

Frucht: einsamig mit Haarschweif

Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig; sonnig



Clematis alpina



Clematis alpina



Clematis montana 'Rubens'

→ montana 'Rubens'

## montana 'Superba', Anemonen-Bergrebe 'Superba'

Höhe: 5-6 m  
Wuchs: raschwüchsig, Triebe locker breit  
Laub: dreizählig oval; bronzegrün  
Blüte: Mai/Juni; weiß; mittelgroß  
Frucht: einsamig mit langem Haarschweif  
Standort: frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, kalkverträglich; sonnig

### Kletterpflanzen

m.Tb.	60-100	9,90	8,75
-------	--------	------	------

### Solitär

3xv.	Co.	100-150	35,10	31,00
		150-200	49,00	43,50
		200-250	68,90	60,90



Clematis montana 'Superba'

## paniculata, Oktober-Waldrebe

Synonym: C. maximowicziana

Höhe: 8-10 m  
Wuchs: starkwüchsig  
Laub: oval; drei- bis siebenzählig  
Blüte: August bis Oktober; klein; weiße Rispen; auffallend; strenger Duft  
Frucht: einsamig mit Haarschweif  
Standort: frisch, sandig lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig

## tangutica, Gold-Waldrebe


Höhe: 3-5 m  
Wuchs: schwachwüchsig  
Laub: länglich lanzettlich; einfach bis doppelt gefiedert  
Blüte: ab Juni bis Herbst; gelb; auffallender Blütenstrauch  
Frucht: ab Juli bis in den Winter; fedrige Samenstände bis in den Winter haftend  
Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, durchlässig, kalkverträglich; sonnig



Clematis tangutica

## vitalba, Gemeine Waldrebe

Höhe: 8-10 m  
Wuchs: links windender Kletterstrauch  
Laub: unpaarig gefiedert; eiförmig  
Blüte: Juli bis September; gelblich weiß  
Frucht: einsamig mit Haarschweif  
Standort: mäßig trocken bis frisch, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschattig  
Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei etwa 40 Jahren



Clematis vitalba

**viticella**, Italienische Waldrebe

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: feintriebiger, zierlicher Kletterstrauch  
 Laub: elliptisch; fünf- bis siebenzählig  
 Blüte: Juni bis August; rotviolett; auffallender Blütenstrauch  
 Frucht: ab August bis Winter; einsamig mit Haarschweif  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

m.Tb.	60-100	9,90	8,75
-------	--------	------	------

**Großblumige Hybriden**

- Höhe: 1,5-5 m  
 Wuchs: durch Blattranken hochwindend  
 Laub: oval; bis fünfzählig  
 Blüte: Mai bis Oktober je nach Sorte; auffallender Blütenstrauch; rosa, rot bis violett und weiß  
 Frucht: einsamig mit Haarschweif  
 Standort: frisch, durchlässig, lehmig, humos, Kalk liebend; Fuß schattig; sonst sonnig

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe in cm
Dr. Ruppel	lilarosa, braunrote Streifen, Staubfäden goldgelb	bis 350
Duchess of Edinburgh	weiß	bis 350
Ernest Markham	magentarot, Staubfäden gelb	bis 350
Gipsy Queen	samtig dunkelpurpurn, rötliche Adern, unterseits weiß gestreift	bis 400
Hagley Hybrid	tiefrosa später hellrosa, Staubfäden braun	bis 200
Huldine	perlweiß, Staubfäden goldgelb	bis 400
Jackmanii	dunkelviolettblau, Staubfäden grün	bis 400
Lady Betty Balfour	purpurblau, gelbe Staubfäden	bis 400
Lasurstern	enzianblau, gelbe Staubfäden, rückseitig helles Mittelband	bis 300
Mme Le Coultre	weiß, Staubfäden gelb	bis 400
Nelly Moser	zartrosa, rot gestreift	bis 300
Niobe	dunkelsamtrot	bis 300
Perle d'Azur	hellrosa, Mitte rosalila	bis 350
Rouge Cardinal	samtig purpurrot, erst weiße dann braune Staubfäden	bis 300
The President	dunkelviolett, Staubfäden braun	bis 300
Ville de Lyon	karminrot, Rand dunkler, Staubfäden gelb	bis 300

**Kletterpflanzen**


m.Tb.	60-100	9,90	8,75
-------	--------	------	------

**Solitär**

3xv.	Co.	100-150	35,10	31,00
		150-200	49,00	43,50
		200-250	68,90	60,90




Clematis vitalba




Clematis viticella



Clematis 'Hagley Hybrid'



Clematis 'Huldine'

Clerodendrum trichotomum  
fargesii**CLERODENDRUM - Verbenaceae - LOSBAUM****trichotomum fargesii**

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit ausladend, sparrig rundlich  
 Laub: eiförmig; später Laubfall  
 Blüte: August/September; weißlich rosa; auffällig  
 Frucht: kugelige, hellblaue Beeren auf rosa Kelch  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, lehmig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: stark Vitamin B1-haltig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	194,00
		200-250	268,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

Clerodendrum trichotomum  
fargesii**CLETHRA - Clethraceae - SCHEINELLER****alnifolia, Scheineller, Silberkerzenstrauch**

Höhe: bis 3 m hoch  
 Wuchs: schmal kegelförmig, später breit ausladend, rundlich  
 Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung rötlich oder gelblich  
 Blüte: Juli bis September; aufrechte Blütentrauben; gelblich weiß; duftend  
 Frucht: vielsamige braune Kapseln  
 Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, humos, sauer; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**


Co.	40- 60	21,70	19,20
	60- 80	25,50	22,50

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	60,50
		100-125	78,50
		125-150	116,50
		150-175	175,00



Clethra alnifolia



Clethra alnifolia

**COLUTEA - Leguminosae - BLASENSTRAUCH****arborescens, Hoher Blasenstrauch**

Höhe: 2-3 m (-4 m)  
 Wuchs: locker aufrecht, mäßig verzweigt  
 Laub: gefiedert; frischgrün  
 Blüte: Juni bis September; gelb  
 Frucht: August bis Winter; aufgeblasene Hülse; auffallend  
 Standort: trocken bis frisch, sandig kiesig, Kalk liebend; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	5,00
4 Tr.	o.B.	100-150	10,50	8,30	7,50
	Co.	60-100	11,70	10,35	9,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	59,00		
		150-200	76,50		
		200-250	114,00		

**CORNUS - Cornaceae - HARTRIEGEL****alba**, Weißer Hartriegel, Tatarischer Hartriegel

- Höhe: 2,5-3 m  
 Wuchs: breit aufrecht, auf feuchten Standorten sich dichtbuschig ausbreitend  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: Mai; gelblich weiß  
 Frucht: rund; weißlich blau  
 Standort: frisch feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: rote Färbung der Rinde, über Winter auffallend

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	5,00	3,52	3,20
5 Tr.	o.B.	100-150	6,70	4,95	4,50
	Co.	60-100	11,70	10,30	9,40

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	57,60	50,90	
		150-200	74,30	65,70	
	m.Db.	200-250	110,50		
		250-300	165,00		

**alba 'Elegantissima'**, Weißbunter Hartriegel

Synonym: *C. alba* 'Argenteomarginata'

- Höhe: 3 m  
 Wuchs: breit aufrecht  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; unregelmäßig weißrandig; Herbstfärbung gelb bis braunrot  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß  
 Frucht: ab August; rund; weißlich blau  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Colutea arborescens



Cornus alba



Cornus alba



Cornus alba 'Elegantissima'





Cornus alba 'Kesselringii'

→ alba 'Elegantissima'

### alba 'Kesselringii', Schwarzbrauner Hartriegel

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit aufrecht, Schleppen bildend  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; gelblich weiß  
 Frucht: rund; weißlich blau  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: über Winter auffallende Rindenfärbung der Triebe, die durch Verjüngung im mehrjährigen Turnus gefördert wird




Cornus alba 'Sibirica'

### alba 'Sibirica', Rotholziger Hartriegel, Sibirischer Hartriegel

Synonym: C. alba 'Westonbirt'

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: jung straff aufrecht, später breitbuschig  
 Laub: eiförmig bis eirund; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß  
 Frucht: rund; weißlich blau  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, locker, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: auffallend rote Rinde



Cornus alba 'Sibirica'

### alba 'Spaethii', Gelbbunter Hartriegel

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: spitz elliptisch; goldgelb gerandet oder ganz goldgelb  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß  
 Frucht: weißlich blau  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: rötliche bis bräunliche Rinde



Cornus alba 'Spaethii'

#### verpflanzte Sträucher


4 Tr.	o.B.	60-100	9,35	7,10	6,45
5 Tr.	o.B.	100-150	12,55	10,10	9,15
	Co.	60-100	12,05	10,65	9,65

#### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,70	60,90
		125-150	68,90		
	m.Db.	150-175	89,00		
		175-200	126,00		
		200-250	179,00		

**alternifolia**, Niedriger Etagen-Hartriegel

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: Grundtriebe aufrecht, Äste etagenförmig, waagrecht  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend gelb bis scharlachrot  
 Blüte: Mai bis Juni; gelbweiße Schirmrispen  
 Frucht: ab September; blauschwarz  
 Standort: frisch bis feucht, humos, sandig bis lehmig, kalkfrei; lichtschtig bis sonnig  
 Sonstiges: Gehölz für Einzelstand



Cornus alternifolia

**Sträucher**

m.B./Co.	80-100	59,00
	100-125	82,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	170,00
		150-200	234,00
		200-250	325,00
5xv.	m.Db.	150-200	660,00
		250-300	895,00

**canadensis**, Teppich-Hartriegel

- Höhe: 8-15 cm  
 Wuchs: bodendeckende Polster bildend  
 Laub: oval; im Frühherbst orange bis karminrot  
 Blüte: ab Juni; weiße Hochblätter  
 Frucht: korallenrote Kugeln im Herbst  
 Standort: nass bis feucht, Moorböden, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig



Cornus canadensis

**Büsche**

m.Tb.	10- 15	7,90	7,00	6,30
-------	--------	------	------	------

**controversa**, Pagoden-Hartriegel,  
Hoher Etagen-Hartriegel


- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: straff aufrecht, Äste etagenförmig  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig  
 Blüte: Juni; weiße Schirmrispen; auffällig  
 Frucht: ab August; blauschwarz  
 Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt keine Trockenheit




Cornus canadensis

**Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	49,30
	80-100	59,00
	100-125	82,50



Cornus canadensis



Cornus controversa

→ **controversa**

**Solitär**

4xv.	m.Db.		125-150	170,00
			150-200	234,00
			200-250	325,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	660,00
			250-300	895,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.790,00
			350-400	2.470,00

**controversa 'Variegata', Weißbunter Pagoden-Hartriegel**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, streng etagenartig  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig; weiß gerandet  
 Blüte: Juni; weiße Schirmrispen; auffallend  
 Frucht: ab August; blauschwarz  
 Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfrei; sonnig, besser halbschattig; geschützt  
 Sonstiges: verträgt keine Trockenheit



Cornus controversa

**Solitär**

4xv.	m.Db.		100-125	291,00
			125-150	410,00
			150-175	585,00
4xv.	m.Db.	100-150	175-200	865,00
			200-250	1.210,00

**florida, Amerikanischer Blumen-Hartriegel**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: Mitteltriebe stammartig aufrecht, Äste locker ausladend, reich verzweigt  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot bis violett  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter  
 Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig




Cornus controversa 'Variegata'

**Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	49,30
	80-100	59,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.		100-125	133,50
			125-150	184,00
4xv.	m.Db.	60-100	150-175	283,00
			175-200	410,00
5xv.	m.Db.	100-150	200-250	920,00



Cornus florida

**florida 'Cherokee Chief',****Amerikanischer Blumen-Hartriegel 'Cherokee Chief'**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: Mitteltriebe aufrecht, kompakt, reich verzweigt  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung sehr intensiv rot bis violett  
 Blüte: Mai bis Juni; rosa bis weinrot; auffallend  
 Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: auch für große Kübel durch seine zierliche Erscheinung eine Empfehlung



Cornus florida

**florida 'Rainbow',****Buntlaubiger Amerikanischer Blumen-Hartriegel**

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: aufrecht wachsender Großstrauch  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; hell- bis dunkelgrün und gelb gefleckt, Herbstfärbung rotviolett; auffallend  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; klein  
 Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig



Cornus florida 'Rainbow'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	152,00
		125-150	210,00
4xv.	m.Db.	150-175	385,00
		175-200	545,00

**florida 'Rubra', Roter Blumen-Hartriegel**

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: Mitteltriebe aufrecht, Äste locker ausladend, reich verzweigt  
 Laub: eiförmig, elliptisch; Herbstfärbung sehr intensiv rot bis violett  
 Blüte: Mai bis Juni; rosa bis rot; auffallend  
 Frucht: August bis September; scharlachrot; eiförmig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig




Cornus florida 'Rubra'

**Sträucher**


m.B./Co.	60- 80	62,10
	80-100	70,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	149,00
		125-150	210,00
4xv.	m.Db.	60-100	150-175
		175-200	485,00
5xv.	m.Db.	100-150	200-250
			945,00



Cornus florida 'Rubra'



Cornus kousa

## kousa, Japanischer Blumen-Hartriegel

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: kurzer Stamm, breit trichterähnliche Form  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend scharlachrot bis gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter  
 Frucht: ab September; Rand rosarot; erdbeerähnlich  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: verträgt mehr Trockenheit als C. florida

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	59,00
	80-100	68,90

### Solitär

3xv.	m.Db.	100-125	149,00
		125-150	210,00
4xv.	m.Db.	100-150	150-175
		175-200	268,00
		175-200	370,00



Cornus kousa

## kousa chinensis, Chinesischer Blumen-Hartriegel

- Höhe: 5-7 (-10) m  
 Wuchs: kurzer Stamm, breit trichterförmig  
 Laub: eielliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Hochblätter; auffallend  
 Frucht: ab September; rosarot; rund; erdbeerähnlich  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: verträgt mehr Trockenheit als C. florida

## kousa chinensis 'China Girl', Blumen-Hartriegel 'China Girl'

- Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: breit trichterförmig, aufrecht  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung rot; auffallend  
 Blüte: Juni bis Juli; weiße Hochblätter; groß  
 Frucht: himbeerartig; nach warmen Sommern reicher Fruchtansatz  
 Standort: frisch bis feucht; sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig



Cornus kousa chinensis



Cornus kousa chinensis

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	59,00
	80-100	68,90

### Solitär

3xv.	m.Db.	100-125	149,00
		125-150	210,00
4xv.	m.Db.	100-150	150-175
		175-200	268,00
		200-250	370,00
		200-250	530,00

**kousa 'Milky Way', Blumen-Hartriegel 'Milky Way'**

Höhe: 4-5 m

Wuchs: breit trichterförmig, später breit rundlich, aufrecht

Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung rot; auffallend

Blüte: Juni bis Juli; rein- bis rahmweiße Hochblätter; sehr groß

Frucht: himbeerartig; rot; sehr zahlreich

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: auf Kalk und Staunässe reagiert der Strauch höchst allergisch

**kousa 'Satomi', Blumen-Hartriegel 'Satomi'**

Höhe: 4-5 m

Wuchs: breit trichterförmig, später breit rundlich, aufrecht

Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung tief purpurrot; auffallend

Blüte: Juni bis Juli; rosarote Hochblätter, unterseits rot geadert; groß

Frucht: himbeerartig; rot; zahlreich

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: in der Jugend für einen Winterschutz dankbar

**kousa 'Venus'®, Blumen-Hartriegel 'Venus'®**

Höhe: kann bis 5 m hoch werden

Wuchs: Großstrauch mit waagrecht ausgebreiteten Seitenästen

Laub: eiförmig bis elliptisch; im Herbst gelb, violett und rot; auffallend

Blüte: Ende Mai-Juni; sehr große weiße Hochblätter, teils bis 15 cm

Frucht: himbeerartig; rot; zahlreich

Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfrei; sonnig bis halbschattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	152,00
		125-150	216,00
4xv.	m.Db.	150-175	385,00
		175-200	545,00

**mas, Kornelkirsche**

Höhe: 5-7 m

Wuchs: baumartig oder Baum, breit ausladend, rundlich, sparrig verzweigt

Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich

Blüte: März, April; kleine, gelbe, kugelige Dolden

Frucht: ab August; eilängliche, rote Steinfrüchte; essbar und verwertbar


Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmig humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	40-60	7,95	5,90	5,20
		60-100	9,70	7,60	6,90
	Co.	40-60	12,90	11,40	10,40

Cornus kousa chinensis  
'China Girl'Cornus kousa chinensis  
'China Girl'

Cornus kousa 'Satomi'



Cornus mas

→ mas

**Solitär**

3xv.	m.Db.		100-125	63,80	56,40
			125-150	82,50	77,80
			150-175	123,00	
			175-200	175,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	345,00	
			200-250	495,00	
			250-300	715,00	
5xv.	m.Db.	200-300	200-250	620,00	
			250-300	865,00	
			300-350	1.180,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	335,00
		12- 14	430,00
		14- 16	580,00
4xv.	m.Db.	16- 18	860,00
		18- 20	1.110,00
		20- 25	1.460,00
		25- 30	1.940,00

**nuttallii, Westamerikanischer Blumen-Hartriegel**

Höhe: 4-7 m  
 Wuchs: mehrstämmig, breitbuschig, rundlich  
 Laub: eiförmig elliptisch; Herbstfärbung rot bis orangerot; auffallend leuchtend  
 Blüte: Mai; cremeweiße Hochblätter; auffallend  
 Frucht: ab September; rund; himbeerähnlich  
 Standort: frisch bis feucht, sandig humos, kalkempfindlich, geschützt; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**


m.B./Co.	60- 80	59,00
	80-100	76,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	157,00
		125-150	222,00
4xv.	m.Db.	150-175	325,00
		175-200	460,00

**sanguinea, Roter Hartriegel**

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit ausladend, dickichtartig durch Wurzelaufläuer  
 Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot bis gelborange  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; streng duftend  
 Frucht: schwarzviolett; kugelig




Cornus mas



Cornus mas



Cornus nuttallii




Cornus nuttallii

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	5,50	3,90	3,50
5 Tr.	o.B.	100-150	7,50	5,50	5,00
	Co.	60-100	12,10	10,70	9,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	53,50	47,20	
		150-200	69,00	61,00	
		200-250	97,00		
		250-300	137,00		



Cornus sanguinea

**sanguinea 'VKG 1 bis 6 - ZgG®', Gebieteigener Roter Hartriegel aus Vorkommensgebiet 1 bis 6**

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breit ausladend, dickichtartig durch Wurzelausläufer

Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot bis gelborange

Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; streng duftend

Frucht: kugelig

Standort: mäßig trocken bis nass, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Cornus sanguinea

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,20	4,50	4,05
5 Tr.	o.B.	100-150	8,60	6,45	5,85

**stolonifera 'Flaviramea', Gelbrindiger Hartriegel**

Synonym: sericea 'Flaviramea'

Höhe: 2-3 m

Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, äußere sich niederlegend

Laub: eilänglich; hellgrün

Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß

Frucht: ab August; runde Beeren; weiß

Standort: feucht bis frisch, lehmig; sonnig bis halbschattig




Cornus stolonifera 'Flaviramea'

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
5 Tr.	o.B.	100-150	9,70	7,50	6,80
	Co.	60-100	12,10	10,70	9,70


**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	74,30	65,70	
		150-200	96,50	85,00	
		200-250	126,00		



Cornus stolonifera 'Flaviramea'





Cornus stolonifera 'Kelsey'

**stolonifera 'Kelsey',** Niedriger Rotholz-Hartriegel,  
Zwerg-Hartriegel

Synonym: C. sericea 'Kelsey's Dwarf'

- Höhe: 60-80 cm  
 Wuchs: breitbuschig, äußere Zweige sich niederlegend und Wurzeln bildend  
 Laub: eiförmig bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot  
 Blüte: Mai bis Juni; in gelblich weißen Trugdolden  
 Frucht: ab August; reinweiß; rund  
 Standort: feucht bis frisch, lehmig, durchlässig; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	5,80	5,10	4,60
	30- 40	6,30	5,60	5,00

**CORYLOPSIS - Hamamelidaceae - SCHEIN-HASEL**

**pauciflora,** Glocken-Hasel, Schein-Hasel



- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, feinzweigig  
 Laub: herz-eiförmig; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: April/Mai; hellgelb; glockig; leicht duftend  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, humos; Kalk empfindlich; licht- bis halbschattig; geschützt

**Sträucher**

Co.	30- 40	34,20	30,20
	40- 60	44,50	39,30

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	60- 80	123,00
		80-100	175,00

**spicata,** Ährige Schein-Hasel




- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: sparrig, locker aufrecht, Zweige gewinkelt oder gedreht  
 Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; hellgelbe, hängende Trauben; duftend  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, sandig humos, leicht Kalk verträglich; licht- bis halbschattig; geschützt

**Sträucher**

Co.	40- 60	34,20	30,20
	60- 80	44,50	39,30

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	80-100	123,00
		100-125	175,00
		125-150	247,00



Corylopsis pauciflora



Corylopsis pauciflora



Corylopsis pauciflora

**CORYLUS - Betulaceae - HASELNUSS****avellana**, Wald-Hasel

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breit aufrecht, erst trichterförmig, später kugelig  
 Laub: rundlich bis breit eiförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Februar bis März; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar rötlich  
 Frucht: ab September/Oktober; braune Nüsse in zerschlitzten Becherblüten; essbar  
 Standort: trocken bis feucht, steinig bis lehmig, weite Standortamplitude; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 100 Jahren

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	60-100	6,60	4,90	4,40
5 Tr.	o.B.	100-150	9,10	6,90	6,20
	Co.	60-100	12,10	10,70	9,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	62,10	54,90	
		150-200	80,50	70,90	
		200-250	104,00		
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	247,00	
		300-350	345,00		




Corylopsis spicata



Corylus avellana

**avellana 'Vkg 1 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigener Wald-Hasel aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breit aufrecht, erst trichterförmig, später kugelig  
 Laub: rundlich bis breit eiförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Februar bis März; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar rötlich  
 Frucht: ab September/Oktober; braune Nüsse in zerschlitzten Becherblüten; essbar  
 Standort: trocken bis feucht, steinig bis lehmig, weite Standortamplitude; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 100 Jahren



Corylus avellana

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	6,00
5 Tr.	o.B.	100-150	10,15	7,90	7,15



Corylus avellana 'Contorta'

**avellana 'Contorta', Korkenzieher-Hasel**

Höhe: 2-4 m

Wuchs: breit aufrecht bis ausladend, korkenzieherartig gedrehte oder verwundene Triebe

Laub: breit rundlich, kraus und gerollt

Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Kätzchen gelb, weibliche Blüten unscheinbar

Frucht: August bis September; braune, runde Nuss (selten); essbar


Standort: frisch bis mäßig trocken, lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

m.B./Co.	40-60	25,50
	60-80	35,10
	80-100	49,30

**Solitär**

3xv.	m.Db.		80-100	70,60
			100-125	91,00
			125-150	129,50
4xv.	m.Db.	100-150	150-175	315,00
			175-200	450,00
			200-250	640,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	990,00
			250-300	1.430,00



Corylus avellana 'Contorta'

**avellana - großfruchtige Sorten - siehe Obstteil****colurna, Baum-Hasel**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: Stamm oft bis Wipfel durchgehend, fein verzweigt, Krone kegel- oder eiförmig

Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb

Blüte: März bis April; männliche Kätzchen grüngelb, weibliche Blüten unscheinbar

Frucht: August bis September; runde Nüsse; essbar

Standort: frisch bis trocken, lehmig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12-14		270,00	240,00
		14-16		370,00	330,00
		16-18		510,00	450,00
		18-20		680,00	600,00
		20-25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20-25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.210,00
		25-30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.840,00
		30-35			2.280,00
		35-40			2.830,00



Corylus colurna



Corylus colurna



	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
5xv.	m.Db. 30- 35 35- 40 40- 45	200-300	700-900	2.540,00	
				3.150,00	
				3.880,00	
6xv.	m.Db. 40- 45 45- 50 50- 60 60- 70	300-400	700-900	4.770,00	
				5.800,00	
				7.300,00	
				9.190,00	

### columna 'Granat', Rotlaubige Baum-Hasel

- Höhe: 10-12 m  
 Wuchs: Stamm bis Wipfel durchgehend, Krone kegel- oder eiförmig  
 Laub: breit eiförmig; im Austrieb dunkelrot, später vergrünend  
 Blüte: März bis April; männliche Kätzchen grüngelb, weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: August bis September; runde Nüsse; essbar  
 Standort: frisch bis trocken, lehmig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: rotlaubige Alternative zur Baum-Hasel



Corylus columna

#### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db. 12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25	305,00
		415,00
		575,00
		750,00
		970,00

#### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db. 20- 25 25- 30	1.320,00
		1.640,00

### maxima 'Purpurea', Blut-Hasel

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: trichterförmig, breit ausladend, Krone schirmartig  
 Laub: breit rundlich; schwarzrot  
 Blüte: März bis April; einhäusig; männliche Kätzchen rot, weibliche Blüten unscheinbar  
 Frucht: August bis September; runde, rotbraune Nuss; essbar  
 Standort: frisch bis trocken, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig



Corylus columna




Corylus maxima 'Purpurea'

#### verpflanzte Sträucher


3 Tr.	o.B.	40- 60	19,00	16,20
		60-100	22,30	19,30
		Co.	40- 60	24,00

#### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	71,00	62,00
		125-150	104,00	92,00
4xv.	m.Db.	100-150	137,00	
		150-200	205,00	
		200-250	310,00	



Corylus maxima 'Purpurea'



Cotinus coggygria

## COTINUS - Anacardiaceae - PERÜCKENSTRAUCH

### coggygria, Grüner Perückenstrauch



Höhe: 3-5 m

Wuchs: Äste sparrig verzweigt, breitbuschig ausladend

Laub: länglich bis eiförmig; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot; auffallend

Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Rispen

Frucht: ab August/September; perückenartige Fruchtstände; auffallend

Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

#### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	19,50	17,20
	60-100	32,40	28,60

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	56,00
		100-125	74,30
4xv.	m.Db.	125-150	101,50
		150-175	141,00
		175-200	194,00



Cotinus coggygria

### coggygria 'Royal Purple', Purpur-Perückenstrauch

Höhe: 2-3 m

Wuchs: Äste sparrig verzweigt, breitbuschig ausladend

Laub: länglich bis eiförmig; schwarzrot

Blüte: Juni bis Juli; gelblich rote Rispen

Frucht: ab August/Sept.; silbrig rote, perückenartige Fruchtstände; auffallend

Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

#### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	26,90	29,80
	60- 80	32,40	28,60

#### Solitär

3xv.	m.Db.	80-100	76,50
		100-125	104,00
4xv.	m.Db.	125-150	152,00
		150-175	210,00
		175-200	291,00



Cotinus coggygria 'Royal Purple'

**COTONEASTER - Rosaceae - FELSENMISPEL,  
ZWERGMISPEL****acutifolius**, Hecken-StrauchmispelSynonym: *C. lucidus*

Höhe: 2-3 m


Wuchs: reich verzweigt, erst straff, später breit ausladend bis schirmartig

Laub: spitz eiförmig; Herbstfärbung braunrot

Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; streng duftend

Frucht: ab September; schwarz; eirund

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig



Cotoneaster acutifolius

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40-60	5,90	4,25	3,85
5 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,20	5,55
	Co.	40-60	11,10	9,80	8,90



Cotoneaster adpressus

**adpressus**, Kissenmispel

Höhe: bis 25 cm

Wuchs: kriechend, Zweige stark bogig, Boden aufliegend

Laub: breit eiförmig; gewellter Rand

Blüte: Mai bis Juli; rosa

Frucht: August bis September; rot; kugelig

Standort: trocken bis feucht, sandig bis lehmig, nährstoffreich; große Standortamplitude, alle Kulturböden

**Büsche**

m.Tb.	15-20	5,10	4,51	4,10
	20-30	6,05	5,35	4,83
	30-40	7,50	6,60	6,00

**bullatus**, Großblättrige Strauchmispel

Höhe: 3-4 m

Wuchs: trichterförmig aufrecht, breit ausladend, locker

Laub: spitz eilänglich; runzelig; Herbstfärbung braunrot bis orange

Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß

Frucht: August bis Winter; rot; kugelig

Standort: trocken bis frisch, nährstoffhaltige Kulturböden; sonnig



Cotoneaster adpressus

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	60-100	6,10	4,40	4,00
5 Tr.	o.B.	100-150	8,45	6,30	5,70
	Co.	60-100	12,30	10,80	9,80



Cotoneaster bullatus

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	54,60	48,30
		150-200	70,60	62,40
		200-250	91,00	



Cotoneaster bullatus

**dammeri 'Cardinal', Kriechmispel 'Cardinal'**

- Höhe: 30-40 cm  
 Wuchs: niedrig überhängend  
 Laub: immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß  
 Frucht: ab August; hellrot  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	3,10	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60
	40- 60	6,25	5,50	4,96



Cotoneaster dammeri 'Cardinal'

**dammeri 'Coral Beauty', Fruchtende Kriechmispel**

- Höhe: 30-60 cm  
 Wuchs: breit wachsender, kräftiger Kriechstrauch, Triebe lang, überhängend  
 Laub: elliptisch; immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; reichlich  
 Frucht: ab August bis Frühjahr; rund; orangerot  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**dammeri 'Eichholz', Niedrige Kriechmispel**

- Höhe: 20-30 cm  
 Wuchs: niedrig kriechend, später leicht überhängend  
 Laub: elliptisch bis eilänglich; immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß  
 Frucht: August bis Winter; orangerot; rundlich; gering  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**Büsche**


m.Tb.	20- 30	3,60	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60

Cotoneaster dammeri  
'Coral Beauty'**dammeri 'Jürgl', Kriechmispel 'Jürgl'**

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: niedrig, leicht bogig ausgebreitet  
 Laub: elliptisch; immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß  
 Frucht: ab August; leuchtend rot; zahlreich  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	3,10	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60
	40- 60	6,25	5,50	4,96



Cotoneaster dammeri 'Eichholz'

**dammeri radicans**, Immergrüne TeppichmispelSynonym: *C. dammeri* 'Major'

Höhe: 10 cm

Wuchs: Boden aufliegend, dicht verzweigt

Laub: elliptisch; immergrün

Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; auffallend

Frucht: ab August bis Winter; hellrot; kugelig; groß

Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.Tb.	15- 20	2,20	1,94	1,76
	20- 30	3,10	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60



Cotoneaster dammeri 'Jürgl'

**dammeri 'Skogholm'**, Immergrüne Böschungsmispel

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: niedrig, bogig ausgebreitet

Laub: elliptisch länglich; immergrün

Blüte: Mai bis Juni; weiß


Frucht: ab August bis Winter; leuchtend rot; rund; relativ wenig

Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: wächst auch auf nährstoffarmen und feuchten Böden; sehr frosthart

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	3,10	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60
	40- 60	6,25	5,50	4,96



Cotoneaster dammeri radicans

**dammeri 'Thiensen'**, Kriechmispel 'Thiensen'

Höhe: 10-15 cm

Wuchs: kriechend, flach

Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; immergrün

Blüte: Mai bis Juni; weiß


Frucht: ab August bis Winter; hellrot; groß

Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis schattig

Sonstiges: Feuerbrand resistente Selektion der Bundesforschungsanstalt in Ahrensburg

**Büsche**

m.Tb.	15- 20	2,20	1,94	1,76
	20- 30	3,10	2,75	2,50
	30- 40	4,40	3,90	3,60




Cotoneaster dammeri 'Skogholm'





Cotoneaster dielsianus



Cotoneaster dielsianus

**dielsianus**, Graue StrauchmispelSynonym: *C. applanatus*

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit aufrecht, elegant überhängende Zweige  
 Laub: eirundlich; derb; Herbstfärbung braunrot bis gelb  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa bis weiß  
 Frucht: ab August; rot; rund; zahlreich  
 Standort: trocken bis frisch, kalkhaltig, lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,10	4,40	4,00
5 Tr.	o.B.	100-150	8,45	6,30	5,70
	Co.	60-100	12,90	10,80	9,80

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	54,60	48,30	
		150-200	70,60	62,40	
		200-250	91,00		

**divaricatus**, Sparrige Strauchmispel

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit aufrecht, fächerförmige Seitentriebe  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: ab Juni; rötlich weiß  
 Frucht: ab August bis Oktober; rot; glänzend; auffallend  
 Standort: alle Kulturböden, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt auch Schatten

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	60-100	8,45	6,30	5,70
	Co.	60-100	12,30	10,80	9,80

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	50,60	44,70	
		125-150	65,40	57,80	
		150-175	84,50		
		175-200	120,00		



Cotoneaster divaricatus



Cotoneaster divaricatus

**franchetii**, Immergrüne Fruchtmispel

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: trichterförmig aufrecht, Triebe lang überhängend  
 Laub: breit lanzettlich; wintergrün  
 Blüte: ab Juni; rötlich weiß; auffallend  
 Frucht: ab August bis Winter; orangerot; auffallend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig; licht- bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	12,70	11,20
	60- 80	14,15	12,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	44,50	39,30
		100-125	59,00	52,20
		125-150	76,50	67,40

**horizontalis**, Fächermispel

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: niedrig, fächerförmig verzweigt  
 Laub: rund; ledrig; Herbstfärbung feurig orange bis scharlachrot  
 Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß; schwacher Duft  
 Frucht: August; rund; rot; zahlreich  
 Standort: große Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt Hitze und Trockenheit sehr gut



Cotoneaster franchetii

**Büsche**


m.Tb.	20- 30	5,50	4,90	4,40
	30- 40	6,20	5,50	5,00
	40- 60	7,70	6,80	6,15

**microphyllus 'Cochleatus'**,

## Immergrüne Zwergkissenmispel

Synonym: *C. melanotrichus*

Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: flach gewölbt, sehr dicht  
 Laub: elliptisch; immergrün  
 Blüte: Mai/Juni; weiß  
 Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; kugelig; auffallend  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Cotoneaster horizontalis

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	5,50	4,90	4,40
	30- 40	6,40	5,65	5,10

**microphyllus 'Streibs Findling'**,


## Kleinblättrige Teppichmispel

Synonym: *C. dammeri* 'Streibs Findling'

Höhe: 10-25 cm  
 Wuchs: kriechend, Boden aufliegend, gedrungen  
 Laub: breit elliptisch; immergrün; würzig  
 Blüte: Mai bis Juni; rötlich weiß  
 Frucht: ab August bis Winter; rot; rundlich; gering  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Cotoneaster microphyllus  
'Cochleatus'Cotoneaster microphyllus  
'Cochleatus'**Büsche**


m.Tb.	10- 15	4,90	4,90	3,90
	15- 20	5,80	5,10	4,60
	20- 25	6,80	6,00	5,45



Cotoneaster multiflorus



Cotoneaster multiflorus



Cotoneaster praecox



Cotoneaster salicifolius floccosus

**multiflorus**, Hohe Blütenmispel

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: trichterförmig aufrecht, bogig überhängende Zweige  
 Laub: breit eiförmig; groß; Herbstfärbung rotbraun  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend  
 Frucht: ab August bis November; rundlich; kräftig rot  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
5 Tr.	o.B.	100-150	9,90	7,70	7,00
	Co.	60-100	12,70	11,20	10,15

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	125-150	65,40	57,80	
		150-175	84,50		
		175-200	120,00		
		200-250	165,00		

**praecox**, Zwergmispel 'Nan Shan'

Synonym: *C. adpressus praecox*

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: niedrig, unregelmäßig überhängend, locker verzweigt  
 Laub: oval; wellig; Herbstfärbung rot  
 Blüte: ab Mai; rosa; schwach duftend; zahlreich  
 Frucht: ab August bis Oktober; rot; kugelig  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: gute Bienenweide

**Büsche**

m.Tb./Co.	20- 30	5,45	4,80	4,36
	30- 40	7,15	6,30	5,70

**salicifolius floccosus**, Weidenblättrige Strauchmispel

- Höhe: 3 (-5) m  
 Wuchs: mehrstämmig, aufrecht, trichterförmig, breit ausladend  
 Laub: lanzettlich; immergrün  
 Blüte: ab Juni; weiß; streng duftend  
 Frucht: ab August bis Frühjahr; rundlich; orangerot  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: gute Bienenweide

**Sträucher**

m.B./Co.	80-100	18,50	16,30
	100-125	24,30	21,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150 150-175	65,40 84,50	57,80
4xv.	m.Db.	175-200 200-250	120,00 165,00	



Cotoneaster salicifolius floccosus

**salicifolius 'Herbstfeuer', Weidenblättrige Kriechmispel**

- Höhe: 40 cm  
 Wuchs: flach kriechend; Boden deckend, übereinander liegend  
 Laub: oval elliptisch; immergrün; ledrig; dunkelgrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; Schirmtrauben  
 Frucht: August bis Winter; hellrot; große Mengen  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**salicifolius 'Parkteppich', Weidenblättrige Teppichmispel**

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: Zweige aufliegend oder bogig überhängend  
 Laub: lanzettlich; immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß  
 Frucht: ab August bis Winter; hellrot; kugelig; zahlreich  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

Cotoneaster salicifolius  
'Herbstfeuer'**salicifolius 'Repens', Immergrüne Kriechmispel**

- Höhe: 40-50 cm  
 Wuchs: Zweige bogig nieder liegend, sehr dicht, schnell deckend  
 Laub: oval; immergrün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß, in dichten Schirmtrauben  
 Frucht: August bis Winter; hellrot; kugelig; zahlreich  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

Cotoneaster salicifolius  
'Parkteppich'**Büsche**

m.Tb.	20- 30	3,20	2,85	2,60
	30- 40	4,40	3,90	3,60
	40- 60	5,30	4,68	4,25

**watereri, Wintergrüne Strauchmispel**

Synonym: C. hybrida, C. watereri 'John Waterer'

- Höhe: 2,5-3,5 m  
 Wuchs: Hauptäste breit trichterförmig, Spitzen weit ausladend  
 Laub: länglich lanzettlich; winter- oder immergrün  
 Blüte: ab Juni; weiß; streng duftend  
 Frucht: ab August bis Winter oder Frühjahr; hellrot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; licht- bis halbschattig



Cotoneaster salicifolius 'Repens'



Cotoneaster watereri 'Cornubia'

**watereri 'Cornubia', Strauchmispel 'Cornubia'**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: trichterförmig, schwachbogig  
 Laub: elliptisch bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot  
 Blüte: ab Juni; große, weiße Schirmrispen  
 Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; auffallend  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig; geschützt



Cotoneaster watereri 'Pendulus'

**watereri 'Pendulus', Strauchhängemispel**

Synonym: *C. hybrida* 'Pendula'


- Höhe: ca. 80 cm, gestäbt bis 3 m hoch  
 Wuchs: ohne Hilfe Boden aufliegend, durch Hochbinden eines kräftigen Triebes Stamm bildend  
 Laub: elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; zahlreich; strenger Duft  
 Frucht: August bis Winter; leuchtend rot; auffallend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig; sonnig

**Sträucher**

m.B./Co.	80-100	17,90	15,80
	100-125	23,00	20,30

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	62,10	54,90
		150-175	80,50	
4xv.	m.Db.	175-200	114,00	
		200-250	161,00	



Cotoneaster watereri 'Pendulus'


**CRATAEGUS - Rosaceae - DORN****coccinea, Scharlach-Dorn**

Synonym: *C. pedicellata*

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: oft mehrstämmig, breit einladend, sparrig verzweigt, Krone dichtbuschig  
 Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; weiß bis rosa; streng duftend  
 Frucht: August oft bis Winter; scharlachrot; rund, groß; auffallend  
 Standort: alle Kulturböden, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: bedornt, sehr windfest und trockenheitsverträglich

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,65	6,45	5,85
		100-150	11,40	9,15	8,25
	Co.	60-100	13,00	11,50	10,45



Crataegus coccinea

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	82,50
			150-200	123,00
			200-250	175,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	280,00
			300-350	400,00

**crus-galli, Hahnen-Dorn**Synonym: *C. prunifolia* 'Splendens'

Höhe: 7-9 m

Wuchs: Äste unregelmäßig aufrecht, Krone breit und flachkronig; langsam

Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangerot

Blüte: Mai bis Juni; weiß; streng duftend

Frucht: August bis Winter oder Frühjahr; dunkelrot; rundlich

Standort: alle Kulturböden, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: bedornt



Crataegus coccinea

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
		18- 20	900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.240,00
		20- 25			1.390,00
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00

**laevigata 'Paul's Scarlet', Rot-Dorn**Synonym: *C. monogyna* 'Kermesina Plena'

Höhe: 6-9 m

Wuchs: breit kegelförmig, später annähernd rundlich

Laub: breit eiförmig; gelappt

Blüte: Mai bis Juni; rot; gefüllt; auffallend


Frucht: wird nicht gebildet

Standort: verlangt feuchtere, nährstoffhaltigere Böden als *C. monogyna*; sonnig bis wechselschattig


Sonstiges: bedornt



Crataegus crus-galli



Crataegus crus-galli



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'



Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'

→ laevigata 'Paul's Scarlet'

**laevigata 'Plena',** Gefüllter Weiß-Dorn

Synonym: C. l. 'Alboplena', C. l. 'Rubra Plena'

Höhe: 6-9 m

Wuchs: breit kegelförmig, später annähernd rundlich

Laub: breit eiförmig; gelappt

Blüte: Mai bis Juni; weiß; gefüllt; auffallend

Frucht: wird nicht gebildet

Standort: verlangt feuchtere, nährstoffhaltigere Böden als C. monogyna; sonnig bis wechsellichtig

Sonstiges: bedornt




Crataegus laevigata 'Plena'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10-12		285,00	255,00
		12-14		340,00	300,00
		14-16		475,00	420,00
		16-18		680,00	600,00
		18-20		900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18-20	100-150	400-500	1.240,00
		20-25			1.390,00
4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.730,00
		25-30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	400-500	2.410,00
		30-35			2.980,00
		35-40			3.680,00



Crataegus lavallei 'Carrierei'

**lavallei 'Carrierei',** Apfel-Dorn

Synonym: C. 'Carrierei', C. lavallei

Höhe: bis 7 m

Wuchs: Krone breit bis kugelig abgeflacht, sehr dicht

Laub: elliptisch länglich; glänzend; bis Dezember haftend; Herbstfärbung gelborange

Blüte: Mai; weiß bis rosa; streng duftend

Frucht: August bis Dezember; apfelförmig; orangerot

Standort: große Standortamplitude, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: sehr trockenheitsverträglich; wenig bedornt

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	137,00
		200-250	194,00
4xv.	m.Db.	250-300	291,00
		300-350	450,00



Crataegus lavallei 'Carrierei'



**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12			285,00	255,00
		12- 14			340,00	300,00
		14- 16			475,00	420,00
		16- 18			680,00	600,00
		18- 20			900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.240,00	1.390,00
		20- 25				
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00	2.160,00
		25- 30				
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00	2.980,00
		30- 35			2.980,00	3.680,00
		35- 40			3.680,00	4.520,00
		40- 45			4.520,00	
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	500-700	5.050,00	6.250,00
		45- 50			6.250,00	7.700,00
		50- 60			7.700,00	

**monogyna, Weiß-Dorn**

Höhe: 5-7 m

Wuchs: Hauptäste knorrig aufrecht, Seitenäste gedreht und verwinkelt, breit rundlich

Laub: eirundlich, lappig; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend

Frucht: August bis Oktober; rund; dunkelrot

Standort: trocken bis frische, durchlässige, tiefgründige, kalkhaltige Kulturböden; sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: reichlich und spitz bedornt; anfällig für Feuerbrand

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
		100-150	9,90	7,75	7,00
	Co.	60-100	11,50	10,15	9,20

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	63,80	56,40
		125-150	82,50	72,80
		150-200	123,00	108,50
		200-250	175,00	

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12			285,00	255,00
		12- 14			340,00	300,00
		14- 16			475,00	420,00
		16- 18			680,00	600,00
		18- 20			900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.240,00	1.390,00
		20- 25				



Crataegus lavallei 'Carrierei'



Crataegus monogyna



Crataegus monogyna




→ Crataegus monogyna






Crataegus monogyna 'Compacta'



Crataegus monogyna 'Compacta'



Crataegus monogyna 'Stricta'



Crataegus monogyna 'Stricta'

## → monogyna

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00

**monogyna 'VkG 1 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigener

Weiß-Dorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6



Höhe: 5-7 m

Wuchs: Hauptäste knorrig aufrecht, Seitenäste gedreht und verwinkelt, breit rundlich

Laub: eirundlich, lappig; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend

Frucht: August bis Oktober; rund; dunkelrot

Standort: trocken bis frische, durchlässige, tiefgründige, kalkhaltige Kulturböden, sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: reichlich und spitz bedornt; anfällig für Feuerbrand

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	9,65	7,45	6,75
		100-150	12,90	10,50	9,50

**monogyna 'Compacta'**, Kugel-Zwerg-Weiß-Dorn

Synonym: C. m. 'Globosa'

Höhe: je nach Veredlungshöhe; selten über 2,5 m

Wuchs: Krone flachkugelig

Laub: eirundlich; lappig; klein; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiß; wenig auffallend

Frucht: August bis Oktober; rot; selten

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, sandig bis lehmig, kalkhaltig; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: unbedornt

**Halbstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00
		14- 16	750,00
4xv.	m.Db.	16- 18	1.080,00
		18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00

**monogyna 'Stricta', Säulen-Weiß-Dorn**

Synonym: C. m. 'Fastigiata'

Höhe: 6-8 m

Wuchs: säulenförmig bis schmal aufrecht

Laub: eirund; lappig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun

Blüte: Mai/Juni; weiß

Frucht: ab August; dunkelrot; rund; gering

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, kalkhaltige Kulturböden;  
sehr hitze- und trockenheitsverträglich; sonnig bis wechelschattig

Sonstiges: wenig bedornt

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10-12		285,00	255,00
		12-14		340,00	300,00
		14-16		475,00	420,00
		16-18		680,00	600,00
		18-20		900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18-20	60-100	400-500	1.240,00
		20-25			1.390,00
4xv.	m.Db.	20-25	100-150	400-500	1.730,00
		25-30			2.160,00
4xv.	m.Db.	25-30	100-150	500-700	2.410,00
		30-35			2.980,00
		35-40			3.680,00

**mordenensis 'Toba', Kanadischer Dorn 'Toba'**

Höhe: 6-8 m

Wuchs: Krone flach rund, ausladend

Laub: breit eiförmig, tief eingeschnitten; Austrieb früh

Blüte: Mai bis Juni; weiß, später rosa

Frucht: ab August; kugelig; scharlachrot; wenig

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig; sonnig

Sonstiges: Dornen bis 1,5 cm lang

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10-12		285,00	255,00
		12-14		340,00	300,00
		14-16		475,00	420,00
		16-18		680,00	600,00
		18-20		900,00	795,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18-20	100-150	400-500	1.240,00
		20-25			1.390,00
4xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.730,00
		25-30			2.160,00




Crataegus monogyna 'Stricta'



Crataegus mordenensis 'Toba'




Crataegus mordenensis 'Toba'



Crataegus mordenensis 'Toba'



Crataegus prunifolia



Crataegus prunifolia



Crataegus prunifolia



Crataegus prunifolia



Crataegus prunifolia

## → mordenensis 'Toba'

5xv.	m.Db.	25-30	200-300	400-500	2.410,00
		30-35			2.980,00
		35-40			3.680,00

**prunifolia**, Pflaumen-DornSynonym: *C. persimilis*

Höhe: 6-7 m

Wuchs: Stamm bildend, Hauptäste straff aufrecht, Seitenäste weit ausladend, Krone kegelförmig

Laub: breit elliptisch; glänzend; Herbstfärbung gelborange bis rot

Blüte: Mai bis Juni; weiß; auffallend; streng duftend

Frucht: ab September; scharlachrot; kugelig; reichlich; schnell abfallend

Standort: etwas trocken bis frisch, lehmhaltig, Kalk liebend; sonnig bis wechelschattig

Sonstiges: Dornen bis 4 cm lang

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	8,65	6,45	5,85
			100-150	11,40	9,15	8,25
	Co.		60-100	13,00	11,50	10,45

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	82,50
			150-200	123,00
			200-250	175,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	280,00
			300-350	400,00

**CYDONIA** Fruchtsorten - siehe Obstteil**CYTISUS** - Leguminosae - GEISSKLEE, GINSTER**beanii**, Duftender Kriech-Ginster

Höhe: 30-40 cm

Wuchs: niedrig bis kriechend, Zweige liegend

Laub: linealisch; dunkelgrün

Blüte: Mai; tiefgelb

Frucht: flache Hülsen

Standort: trocken bis frisch, sandig bis humos, durchlässig; sonnig

**decumbens**, Kissen-Ginster

Höhe: bis 20 cm hoch und bis 80 cm breit

Wuchs: flach, Boden aufliegend, dichtbuschig

Laub: länglich

Blüte: Mai bis Juni; goldgelb

Frucht: braune Kapseln

Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, durchlässig; sonnig

**Sträucher**

m.Tb.	20- 30	10,20	9,00	8,15
	30- 40	12,70	11,20	10,15

**kewensis, Niedriger Elfenbein-Ginster**

- Höhe: 40-60 cm, bis 100 cm breit  
 Wuchs: locker aufrecht, später niederliegend, möglichst überhängend  
 Laub: linealisch; fast dreizählig  
 Blüte: Juni, Juli; gelblich weiß  
 Frucht: braune Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, locker, sandig; sonnig




Cytisus decumbens

**Sträucher**

m.Tb.	30- 40	14,90	13,15	11,95
	40- 60	17,10	15,10	13,65

**praecox-Sorten, Elfenbein-Ginster**

- Höhe: bis 1,5 m  
 Wuchs: breit aufrecht bis locker auseinanderfallend  
 Laub: lanzettlich; hellgrün  
 Blüte: April/Mai; gelb bis rahmweiß und rot  
 Frucht: flache Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkfrei, nährstoffarm, sandig oder lehmig; sonnig  
 Sonstiges: gutes Treibgehölz; kurzlebig



Cytisus kewensis

**Sortenname****Blütenfarbe****Größe in cm**

praecox	hellgelb	bis 150 cm hoch
praecox 'Allgold'	gelb	bis 150 cm hoch
praecox 'Hollandia'	purpurrot bis rosa	bis 200 cm hoch

**Sträucher**

m.Tb./Co.	30- 40	10,20	9,10	8,15
	40- 60	12,30	10,90	9,90
	60- 80	14,50	12,85	11,65

**purpureus, Purpur-Ginster**

- Höhe: 40-70 cm  
 Wuchs: locker aufrecht, kissenförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig; dreizählig  
 Blüte: Mai bis Juni; purpurrosa  
 Frucht: flache Hülse  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig



Cytisus praecox 'Allgold'

**Sträucher**

m.Tb.	20- 30	9,70	8,55	7,75
	30- 40	11,50	10,15	9,20



Cytisus praecox 'Hollandia'

Cytisus scoparius  
'Andreas Splendens'

## scoparius, Besen-Ginster



Höhe: um 2,0 m  
Wuchs: später breit wie hoch  
Laub: lanzettlich; grün  
Blüte: Mai bis Juni; gelb mit strengem Geruch  
Frucht: schwarze, flache Hülsen; wenig giftig  
Standort: sonnig bis vollsonnig  
Sonstiges: in strengen Wintern frostempfindlich

### Sträucher

m.Tb./Co.	40- 60	7,50	6,60	6,00
	60-100	8,20	9,00	8,10



Cytisus scoparius 'Firefly'

## scoparius-Sorten, Besen-Ginster

Höhe: 0,8-2,0 m  
Wuchs: straff aufrecht bis bogig ausladend  
Laub: lanzettlich  
Blüte: Mai/Juni; Farbe je nach Sorte  
Frucht: flache Hülsen  
Standort: trocken bis frisch, kalkfrei, nährstoffarm, sandig lehmig; sonnig  
Sonstiges: Heil- und Giftpflanze

Sortenname	Blütenfarbe	Größe
'Andreas Splendens'	goldgelb/rot	bis 150 cm hoch
'Burkwoodii'	innen blassgelb, außen rubin-rosa, übergehend ins Braune	bis 150 cm hoch
'Dorothy Walpole'	knallgelb mit kardinalroten Flügeln	bis 200 cm hoch
'Dragonfly'	Fahne butterblumengelb, Flügel kardinalrot	bis 200 cm hoch
'Erlkönig'	gelb mit rotbraun	bis 150 cm hoch
'Firefly'	Fahne butterblumengelb, Flügel kardinalrot mit gelb	bis 200 cm hoch
'Goldfinch'	gelb mit rosa, außen hellrot	bis 150 cm hoch
'Luna'	knallgelb	bis 150 cm hoch
'Palette'	leuchtend gelb	bis 150 cm hoch
'Red Wings'	Fahne weinrot mit gelbem Fleck, Flügel granatrot	bis 150 cm hoch
'Roter Favorit'	Fahne bronzerot, Flügel kardinalrot	bis 150 cm hoch

### Sträucher

m.Tb./Co.	30- 40	10,20	9,00	8,15
	40- 60	12,35	10,90	9,90
	60- 80	14,55	12,85	11,65




Cytisus scoparius 'Goldfinch'



Cytisus scoparius 'Roter Favorit'

**DABOECIA - Ericaceae - IRISCHE HEIDE****cantabrica-Sorten, Irische Heide**

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; immergrün, dunkelgrün, unterseits weißfilzig  
 Blüte: Juni bis Oktober; je nach Sorte von weiß über rosa bis purpurn  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch, sauer, nahrhaft, sandig humos  
 Sonstiges: frosthart nur in wintermilden Regionen



Daboecia cantabrica


**scotica-Sorten**

- Höhe: 25-30 cm  
 Wuchs: niedrig bleibend, breitbuschig  
 Laub: glänzend; immergrün  
 Blüte: Juni bis Oktober; je nach Sorte weiß, rosa, rot  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch, sauer, nahrhaft, sandig humos  
 Sonstiges: frosthart nur in wintermilden Regionen


Sortenname	Blütenfarbe	Höhe
cantabrica 'Alba'	reinweiß	40 cm
cantabrica 'Atropurpurea'	purpurrosa	50 cm
cantabrica 'Globosa Pink'	rosaviolett	35 cm
cantabrica 'Praegerae'	rosarot	35 cm
scotica 'William Buchanan'	karminrosa	25 cm

**Büsche**

m.Tb.	10- 15	4,05	3,58
	15- 20	4,75	4,20



Daboecia cantabrica 'Alba'



Daphne burkwoodii 'Somerset'

**DAPHNE - Thymelaeaceae - SEIDELBAST****burkwoodii 'Somerset', Mai-Seidelbast**

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht, dicht, rundlich kugelig  
 Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; erst rosa, dann weiß; stark duftend; auffallend  
 Frucht: wird bei uns nicht gebildet  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	33,30	29,40
	40- 50	39,00	34,50



Daphne burkwoodii 'Somerset'



Daphne cneorum



Daphne cneorum

## **cneorum**, Rosmarin-Seidelbast, Steinrösel



Höhe: 20-30 cm  
 Wuchs: breit polsterförmig  
 Laub: länglich lanzettlich; immergrün; giftig  
 Blüte: April bis Juni; karminrosa; süß duftend, besonders abends  
 Frucht: rotbraune Kugeln; tiefrosa; giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig kiesig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig

### **Sträucher**

m.B./Co.	8- 12	21,10
	12- 20	26,90

## **mezereum**, Seidelbast



Höhe: 1,4-1,8 m  
 Wuchs: klein, aufrecht, verzweigt  
 Laub: sommergrün; länglich lanzettlich; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; rosa; auffallend; starker Duft  
 Frucht: ab Juni; glänzend gelb; kugelig; stark giftig  
 Standort: gleichmäßig feucht, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschantig  
 Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

## **mezereum 'Alba'**, Weißer Seidelbast

Höhe: 1,0-1,2 m  
 Wuchs: klein, aufrecht, wenig verzweigt  
 Laub: sommergrün; länglich lanzettlich; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April; rahmweiß; auffallend; starker Duft  
 Frucht: ab Juni; glänzend gelb; kugelig; stark giftig  
 Standort: gleichmäßig feucht, kalkhaltig, lehmig; sonnig bis halbschantig  
 Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

## **mezereum 'Rubra Select'**, Roter Seidelbast

Höhe: 70-100 cm  
 Wuchs: trichterförmig, zierlich  
 Laub: länglich lanzettlich  
 Blüte: Februar bis März; rosarot; stark duftend  
 Frucht: ab Juni bis Herbst; rote, runde Steinfrüchte; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, kalkhaltig, lehmig; lichtschantig  
 Sonstiges: alle Pflanzenteile sind giftig

### **Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	28,40	25,10
	40- 60	33,30	29,40

**DAVIDIA - Davidiaceae - TAUBENBAUM****involutrata vilmoriniana, Kahler Taubenbaum**

- Höhe: 5-10 (-15) m  
 Wuchs: breit kegelförmig  
 Laub: breit eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße Hochblätter  
 Frucht: ab August bis Winter; lang gestielte, hängende, runde Steinfrüchte  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, lehmig humos; sonnig bis halbschattig; jung geschützt

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	185,00
4xv.	m.Db.	150-175	241,00
		175-200	355,00
		200-250	495,00



Davidia involutrata vilmoriniana

**DECAISNEA - Lardizabalaceae - BLAUSCHOTE****fargesii**

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: dicktrieblich, aufrecht, wenig verzweigt  
 Laub: unpaarig gefiedert; 50-80 cm lang; Austrieb rötlich, Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; grüngelb; hängende Trauben  
 Frucht: ab September; bohnenartige, dicke, hängende, mittelblaue Balgfrüchte; auffallend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig; lichtschtattig; geschützt

**Sträucher**


m.B./Co.	60-80	25,50
	80-100	38,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	86,50
		125-150	123,00
		150-200	175,00
4xv.	m.Db.	200-250	274,00




Decaisnea fargesii



Decaisnea fargesii

**DEUTZIA - Saxifragaceae - DEUTZIE, STERNCHENSTRAUCH****gracilis, Maiblumenstrauch**

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: buschig, aufrecht  
 Laub: elliptisch bis eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, aufrechte Rispen  
 Frucht: kugelig; braun  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, sandig lehmig; sonnig



Deutzia gracilis





Deutzia gracilis

→ gracilis

**verpflanzte Sträucher**

o.B.	20- 30	8,95	6,75	6,10
	30- 40	10,50	8,30	7,50
Co.	20- 30	11,90	10,60	9,60
	30- 40	13,40	11,85	10,75

**hybrida 'Mont Rose', Rosen-Deutzie**


Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: locker aufrecht bis überhängend  
 Laub: breit elliptisch  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa, im Verblühen fast weiß  
 Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend  
 Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	12,00	10,00	8,70
	Co.	60-100	17,90	15,80	14,35

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	65,40	57,80
	m.Db.	125-150	84,50	74,60
		150-175	126,00	



Deutzia hybrida 'Mont Rose'

**kalmiiflora, Kalmien-Deutzie**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, überhängend  
 Laub: eilänglich bis lanzettlich  
 Blüte: Juni; weißlich rosa bis rötlich gestreift; auffällig  
 Frucht: kugelig; braun  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

5 Tr.	o.B.	40- 60	11,10	8,80	8,00
		60-100	14,90	12,30	11,15
	Co.	40- 60	14,50	12,80	11,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	50,60	44,10
		100-125	65,40	57,80
	m.Db.	125-150	84,50	



Deutzia hybrida 'Mont Rose'




Deutzia kalmiiflora

**lemoinei 'Boule de Neige', Kleiner Sternchenstrauch**

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: dicht verzweigt, straff aufrecht  
 Laub: länglich bis lanzettlich  
 Blüte: Juni; rahmweiß  
 Frucht: braun; ohne Zierwert  
 Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, nie austrocknend, durchlässig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

o.B.	60-100	17,90	15,80	14,35
Co.	40-60	14,50	12,80	11,60



Deutzia magnifica

**magnifica, Hoher Sternchenstrauch**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: straff aufrecht, sparrig verzweigt  
 Laub: breit elliptisch  
 Blüte: Juni; reinweiß; locker verzweigt; auffallend  
 Frucht: rund; braun; wenig auffallend  
 Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,20	5,50
4 Tr.	o.B.	100-150	10,80	8,55	7,75
	Co.	60-100	12,30	10,90	9,90



Deutzia rosea

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	53,50	47,20
		150-200	68,95	61,00
		200-250	96,50	

**rosea, Niedriger Sternchenstrauch**

- Höhe: 80-150 cm  
 Wuchs: dichtbuschig und gedungen  
 Laub: länglich bis lanzettlich  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa, innen weiß; glockig  
 Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend  
 Standort: frisch bis feucht, nie austrocknend, durchlässig, sandig bis lehmig; sonnig



Deutzia rosea

**Sträucher**

5 Tr.	o.B.	40-60	11,10	9,80	8,00
	Co.	40-60	14,50	12,80	11,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	60-80	41,10
		80-100	50,60
		100-125	65,40




Deutzia scabra 'Candidissima'

**scabra 'Candidissima', Reichblütiger Sternchenstrauch**

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: straff aufrecht, dicht verzweigt  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig  
 Blüte: Juni bis Juli; reinweiß  
 Frucht: kugelig; braun; ohne Zierwert  
 Standort: frisch bis gleichmäßig feucht, nie austrocknend, durchlässig; sonnig

**scabra 'Plena', Gefüllter Sternchenstrauch**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: straff aufrecht, dicht verzweigt  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig  
 Blüte: Juni bis Juli; weiblich rosa; dicht gefüllt  
 Frucht: kugelig; braun; wenig auffallend  
 Standort: frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig



Deutzia scabra 'Plena'

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,20	5,50
5 Tr.	o.B.	100-150	10,80	8,55	7,25
	Co.	60-100	12,30	10,90	9,90

**Solitär**


3xv.	m.Db.	125-150	53,50	47,20
		150-200	68,90	61,00
		200-250	96,50	

**DIERVILLA - Caprifoliaceae - DIERVILLA****splendens, Buschgeißblatt**

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: straff aufrecht, krautige Triebe  
 Laub: schmal eiförmig, zugespitzt, gesägt; Herbstfärbung kupferrot  
 Blüte: Juli bis August; schwefelgelb  
 Frucht: ab September; dunkelbraun; zierend  
 Standort: anspruchslos, alle Kulturböden; trocken bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, steinig; vollsonnig bis halbschattig

**Sträucher**


Co.	30- 40	15,30	13,50
	40- 60	19,00	16,80



Diervilla splendens

**ELAEAGNUS - Elaeagnaceae - ÖLWEIDE****angustifolia, Schmalblättrige Ölweide**

- Höhe: 5-7 (-10) m  
 Wuchs: unregelmäßig, breit ausladend, überhängend  
 Laub: länglich lanzettlich; grünlich bis silbrig  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich; süßlich duftend  
 Frucht: ab Juli; silberschuppig; oval; süßlich und herb schmeckend  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig, lehmig oder sandig; sonnig  
 Sonstiges: bedornt



Elaeagnus angustifolia

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,90	5,90	5,30
4 Tr.	o.B.	100-150	10,30	8,00	7,20
	Co.	60-100	12,30	10,90	9,90

**Solitär**


3xv.	m.Db.	125-150	84,50	74,60	
		150-200	126,00	111,50	
		200-250	179,00		
		250-300	254,00		



Elaeagnus angustifolia

**commutata, Silber-Ölweide**Synonym: *E. argentea*

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: buschig aufrecht, später durch Wurzeläusläufer ausbreitend  
 Laub: eiförmig elliptisch; silbrig glänzend  
 Blüte: Mai bis Juli; silbrig; stark duftend  
 Frucht: ab August; oval länglich; silbrig; essbar  
 Standort: trocken bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, lehmig oder sandig; sonnig  
 Sonstiges: Zweige unbedornt



Elaeagnus commutata

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.	60-100	10,20	8,00	7,20
		100-150	13,80	11,30	10,20
	Co.	40- 60	12,70	11,20	10,15

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	65,40		
		125-150	84,50		



Elaeagnus ebbingei



Elaeagnus ebbingei

## ebbingei, Wintergrüne Ölweide



- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: insgesamt breitbuschig  
 Laub: winter- bis immergrün; dunkelgrün  
 Blüte: Oktober bis November; weiß; duftend  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkhaltig, sandig bis lehmig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: schwach bedornt

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	41,10
	80-100	50,60

### Solitär

3xv.	m.Db.	80-100	89,00
		100-125	126,00
		125-150	165,00

## multiflora, Essbare Ölweide



Synonym: *E. edulis*

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: jung dichtbuschig aufrecht, später breitbuschig sparrig  
 Laub: breit elliptisch; dunkelgrün; silbrig schimmernd  
 Blüte: Mai; hellgelb; süßlich duftend  
 Frucht: Juli bis August; oval; dunkelbraun; essbar; saftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, sandig; sonnig  
 Sonstiges: unbedornt

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	7,85	5,80	5,25
4 Tr.	o.B.	100-150	10,30	8,10	7,35
	Co.	60-100	10,20	9,00	8,15

## pungens 'Maculata', Buntlaubige Ölweide

- Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: buschig aufrecht, sparrig  
 Laub: immergrün; gelb panaschiert  
 Blüte: Oktober bis November; silbrig weiß; schwach duftend  
 Frucht: kaum ausgebildet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, kalkhaltig, lehmhaltig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: bedornt

### Sträucher

m.B./Co.	30- 40	34,20	30,20
	40- 60	41,10	36,30



Elaeagnus pungens 'Maculata'

**EMPETRUM - Empetraceae - KRÄHENBEERE,  
RAUSCHBEERE****nigrum**, Schwarze Krähenbeere

- Höhe: 10-50 cm  
 Wuchs: breitbuschig, kissenförmig, Polster bildend  
 Laub: immergrün; nadelartig  
 Blüte: Mai bis Juni; blassrot; unscheinbar  
 Frucht: ab Sommer; schwarz; erbsengroß  
 Standort: frisch bis feucht, sauer bis neutral, nährstoffarm, sandig, Kalk meidend; sonnig bis lichtsattig; kühl feucht

**Sträucher**

Co.	15- 20	6,20	5,50
-----	--------	------	------

**ENKIANTHUS - Ericaceae - PRACHTGLOCKE****campanulatus**, Echte Prachtglocke

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: straff aufrecht, trichterförmig  
 Laub: elliptisch; quirlig; Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot  
 Blüte: Mai; hellgelb mit rötlicher Zeichnung; glockig  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbsattig

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	29,20	25,80
	60- 80	34,20	30,20

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	96,50
		100-125	137,00
4xv.	m.Db.	125-150	222,00
		150-175	315,00
		175-200	460,00



Empetrum nigrum




Enkianthus campanulatus



Enkianthus campanulatus

**ERICA - Ericaceae - HEIDE****carnea-Sorten**, Schneeheide

- Höhe: 15-25 cm  
 Wuchs: buschig, Blütenriebe aufrecht oder niederliegend, als Gruppe Teppich bildend  
 Laub: immergrün; nadelartig  
 Blüte: Dezember bis Mai; je nach Sorte reinweiß bis rosa oder rotviolett  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: nahrhaft, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbsattig  
 Sonstiges: sehr frosthart



Erica carnea





Erica carnea 'Atrorubra'

## → carnea-Sorten

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe in cm
'Atrorubra'	karminrosa	15
'Challenger'	purpurrot	25
'Lohses Rubin'	rubinrosa	20
'March Seedling'	rosalila	20
'Myretoun Ruby'	weinrot	25
'Rubint Teppich'	rubinrot	15
'Snow Queen'	weiß	15
'Springwood White'	weiß	25
'Vivellii'	rotviolett	20
'Winter Beauty'	rosa	20




Erica cinerea 'Alba Major'

## cinerea-Sorten, Grauheide

Höhe: 15-40 cm  
 Wuchs: breitbuschige Polster bis kompakt  
 Laub: immergrün; nadelartig; dunkelgrün  
 Blüte: Mitte Juni bis Oktober; je nach Sorte weiß bis rosa oder violett; glockig  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sauer, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: frostempfindlich

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe in cm
'Alba Major'	weiß	20 – 25
'C. D. Eason'	leuchtend rot	25 – 30
'Pallas'	violett	30 – 35
'Pink Ice'	karminrosa	15 – 20
'P. S. Patrick'	blaulila bis violettrot	30 – 35



Erica tetralix

## tetralix-Sorten, Glockenheide, Moorheide

Höhe: bis 40 cm  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: immergrün; nadelartig; graugrün  
 Blüte: Juni bis September; je nach Sorte weiß bis rosa oder violett  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: feucht bis nass, sauer, mäßig nährstoffhaltig, humos; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: sehr frosthart

Sortenname	Blütenfarbe	Höhe
'Alba'	weiß	bis 30 cm
'Con Underwood'	lilarosa	bis 25 cm
'Hookstone Pink'	rosarot	bis 35 cm
'Rubinetta'	rubinrot	bis 30 cm

**vagans-Sorten, Mitsommerheide, Cornwallheide**

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: dichtbuschige Polster  
 Laub: immergrün; nadelartig; grün; glänzend  
 Blüte: August bis Oktober; je nach Sorte weiß bis rosa; glockig  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, mäßig nährstoffhaltig, humos;  
 sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

Sortenname	Blütenfarbe	Blütezeit
'Diana Hornibrook'	rosarot	Juli - September
'Mrs. D. F. Maxwell'	kirschrosa	August - Oktober

**Büsche**

m.Tb.	10- 15	3,50	3,10	2,80
	15- 20	4,20	3,70	3,40

**EUODIA - Rutaceae - STINKESCHE, HONIGESCHE****hupehensis, Hupeh-Stinkesche**


- Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: breit rund, sehr ausladend, schirmartig  
 Laub: gefiedert; bis 45 cm lang  
 Blüte: Juli bis August; weiß; Doldenrispen; duftend  
 Frucht: ab August; rotbraun; auffallend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig, sandig lehmig, lehmig; sonnig bis  
 halbschattig; wärmeverträglich  
 Sonstiges: glatte, silbrige, buchenähnliche Rinde

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	27,70
	60- 80	40,10
	80-100	50,60
	100-125	70,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	179,00
		150-200	247,00
		200-250	345,00



Erica vagans



Erica vagans 'Diana Hornibrook'




Euodia hupehensis





Euonymus alatus



Euonymus alatus



Euonymus alatus



Euonymus alatus 'Compactus'

## EUONYMUS - Celastraceae - SPINDELSTRAUCH

### alatus, Korkflügelstrauch



Synonym: E. alata

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit, dicht verzweigt  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung leuchtend karminrot, im Schatten blassrosa  
 Blüte: ab Mai; grünlich gelb; unscheinbar  
 Frucht: ab August bis September: rötlich orange; gering  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Zweige mit korkigen Leisten

#### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	34,20	30,20
	60-100	51,90	45,90

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	120,00
		100-125	170,00
4xv.	m.Db.	60-100	100-125
		125-150	198,00
			276,00
5xv.	m.Db.	100-150	150-175
		175-200	565,00
			800,00

### alatus 'Compactus', Dichter Korkflügelstrauch

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: kompakt, dicht verzweigt  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung leuchtend rot  
 Blüte: ab Mai; grünlich gelb; unscheinbar  
 Frucht: ab August bis September; rötlich orange; gering  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Zweige je nach Pflanzenherkunft mit korkigen Leisten; auch rindenglatte Typen in Kultur

#### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	40,10	35,40
	60- 80	62,10	59,90

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	137,00
		100-125	194,00
4xv.	m.Db.	80-100	100-125
		125-150	234,00
			335,00

**europaeus, Pfaffenhütchen**Synonym: *E. europaea*

Höhe: 2-3 m, selten darüber

Wuchs: sparrig, breit schirmartig

Laub: eiförmig lanzettlich; Herbstfärbung orangerot bis rot

Blüte: Mai/Juni; gelblich grün; unscheinbar

Frucht: August bis Oktober; Fruchtkapsel rosarot, Samenschale orange

Standort: feucht bis frisch, kalkhaltig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Blätter und Früchte sind giftig




Euonymus alatus 'Compactus'

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	5,00
		100-150	9,90	7,70	7,00
	Co.	60-100	13,80	12,20	11,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	65,40	57,80
		150-200	84,50	74,60
4xv.	m.Db.	200-250	114,00	
		250-300	161,00	



Euonymus europaeus

**europaeus 'VKG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigenes Pfaffenhütchen aus Vorkommensgebiet 1 bis 6**Synonym: *E. europaea*

Höhe: 2-3 m, selten darüber

Wuchs: sparrig, breit schirmartig

Laub: eiförmig lanzettlich; Herbstfärbung orangerot bis rot

Blüte: Mai/Juni; gelblich grün; unscheinbar

Frucht: August bis Oktober; Fruchtkapsel rosarot, Samenschale orange

Standort: feucht bis frisch, kalkhaltig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Blätter und Früchte sind giftig




Euonymus europaeus

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	9,65	7,45	6,75
		100-150	13,00	10,35	9,55



Euonymus europaeus




Euonymus fortunei  
'Emerald Gaiety'

## fortunei-Sorten, Immergrüne Kriechspindel

**Höhe:** kletternd, je nach Sorte 0,5-5 m, als Kriechstrauch 10-100 cm hoch, dabei sich meterlang ausbreitend  
**Wuchs:** Kriechsträucher, Boden aufliegend, bei Gelegenheit kletternd  
**Laub:** immergrün; elliptisch bis eiförmig; Färbung sortenbedingt  
**Blüte:** Juni/Juli; gräulich weiß; wenig auffallend  
**Frucht:** ab September; vierfächrige, rote Kapseln  
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: schattenverträglich

Sortenname	Laubfarbe
'Coloratus'	grün, ab Spätherbst teils purpurn
'Dart's Blanket'	grün, ab Spätherbst braunrot bis hellrot
'Radicans'	grün



Euonymus fortunei  
'Emerald'n Gold'

Büsche				
m.Tb.	20- 30	4,40	3,90	3,50
	30- 40	5,50	4,80	4,40
	40- 60	6,80	6,00	5,40

Sortenname	Laubfarbe
'Emerald Gaiety'	weiß gerandet, grün, ab Spätherbst bronzebraun
'Emerald'n Gold'	hellgelb gerandet, grün, ab Spätherbst purpurrosa
'Gracilis'	weiß gerandet, grün, ab Spätherbst teils purpurn



Euonymus fortunei radicans

Büsche				
m.Tb.	15- 20	5,50	4,80	4,40
	20- 30	6,70	5,90	5,30
	30- 40	10,50	9,25	8,40

Sortenname	Laubfarbe
'Minimus'	grün, ab Spätherbst teils purpurn

Büsche				
m.Tb.	15- 20	6,60	5,80	5,25
	20- 30	7,70	6,80	6,15
	30- 40	10,50	9,25	8,40

## fortunei 'Vegetus', Kletternde Kriechspindel

**Höhe:** kriechend 20-50 cm; kletternd bis 4 m  
**Wuchs:** Boden aufliegend oder kletternd  
**Laub:** immergrün; rundlich  
**Blüte:** Mai bis Juni; grüngelb  
**Frucht:** ab August; Kapseln gelblich; Samenschale orange  
**Standort:** mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: schattenverträglich



Euonymus fortunei 'Gracilis'

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	7,90	7,00	6,35
	30- 40	10,80	9,55	8,65
	40- 60	12,40	10,90	9,90

**planipes**, Großfruchtiges PfaffenhütchenSynonym: *E. sachalinensis*

Höhe: 2-3(-4) m

Wuchs: breit ausladend, locker, leicht überhängend

Laub: elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung karminrot

Blüte: ab Mai; gräulich gelb

Frucht: ab September; Kapsel leuchtend karminrot, Samenschale orange; auffallend

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Früchte giftig

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	42,20	37,30
	60- 80	49,30	43,60

**Solitär**


3xv. m.B.	80-100	86,50
	100-125	123,00

**Solitär**


4xv. m.Db.	60-100	125-150	260,00
		150-175	370,00
		175-200	530,00
5xv. m.Db.	100-150	200-250	920,00
		250-300	1.240,00



Euonymus fortunei 'Vegetus'



Euonymus planipes



Euonymus planipes

**EXOCHORDA - Rosaceae - PRUNKSPIERE****macrantha 'The Bride'**, Prunkspiere 'The Bride'

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: bogig ausladend, breit rundlich

Laub: eilänglich; hellgrün


Blüte: Mai; reinweiße Trauben

Frucht: braune Kapseln

Standort: frisch bis feucht, lehmig, humos; sonnig bis lichtschatig

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	17,90
	60- 80	25,90



Exochorda macrantha 'The Bride'



Exochorda racemosa

**racemosa, Buschige Prunkspiere**




Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breitbuschig, trichterförmig, später schirmförmig  
 Laub: elliptisch bis eiförmig; früh austreibend  
 Blüte: Mai; reinweiße Trauben  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig humos, kalkfrei; sonnig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

m.B./Co.	60-80	25,90	22,50
	80-100	35,10	31,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	78,00
		125-150	116,50



Exochorda racemosa

**FAGUS - Fagaceae - BUCHE**

**sylvatica, Rot-Buche**



Höhe: 30-40 m  
 Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Hauptäste dick und stark; rundkronig, dicht  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangebraun; lange haftend  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche zu zweit  
 Frucht: ab September; Bucheckern; geringe Mengen essbar  
 Standort: frischfeucht, nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig bis halbschattig; anpassungsfähig  
 Sonstiges: erste Blüte nach 15 bis 20 Jahren; sehr schattenverträglich; Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre

**verpflanzte Heister**

o.B.	80-100	19,90	17,60	16,00
	100-125	24,80	21,90	19,90

**verpflanzte Heister**

m.B.	100-125	30,70	27,10	24,60
	125-150	37,00	32,70	29,70
	150-175	45,60	40,30	36,60
	175-200	54,60	48,30	43,90



Fagus sylvatica

**Heckenpflanzen, geschnitten**

3xv.	m.B.	175-200	91,00	80,50
		200-225	104,00	92,00
		225-250	123,00	108,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60-100	200-250	157,00	138,50
			250-300	222,00	196,00
			300-350	315,00	



Fagus sylvatica

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

FAGUS


3xv.	m.Db.	100-150	200-250	175,00	
			250-300	247,00	
			300-350	355,00	

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00	630,00
		20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	820,00
		20- 25			1.080,00
4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00



Fagus sylvatica



Fagus sylvatica

**sylvatica 'Vkg 1 bis 6 - ZgG®', Gebieteigene  
Rot-Buche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6**

Höhe: 30-40 m

Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Hauptäste dick und stark; rundkronig, dicht

Laub: breit elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangebraun; lange haftend

Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugelförmigen Büscheln, weibliche zu zweit

Frucht: ab September; Bucheckern; geringe Mengen essbar

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig bis halbschattig; anpassungsfähig

Sonstiges: erste Blüte nach 15 bis 20 Jahren, sehr schattenverträglich, Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre



Fagus sylvatica

**verpflanzte Heister**

o.B.	80-100	25,50	22,20	20,20
	100-125	30,70	27,10	24,60

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14		340,00	
		14- 16		455,00	
		16- 18		630,00	
4xv.	m.Db.	18- 20		870,00	
		20- 25		1.160,00	



Fagus sylvatica



Fagus sylvatica 'Asplenifolia'



Fagus sylvatica 'Asplenifolia'

## sylvatica 'Asplenifolia', Farn-Buche

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste stark, breit ausladend  
 Laub: unterschiedlich tief geschlitzt, zum Teil linealisch  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelben Büscheln, weibliche Blüten zu zweit  
 Frucht: ab September; Bucheckern; essbar  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig

### Heister

3xv.	m.B.	125-150	120,50
		150-175	152,00
		175-200	241,00

### Solitär

4xv.	m.Db.	60-100	200-250	268,00
			250-300	385,00


## sylvatica 'Dawyck', Säulen-Buche

Synonym: F. s. 'Fastigiata'

- Höhe: 15-20 (-25) m  
 Wuchs: straff aufrecht, säulenförmig, später annähernd eiförmig  
 Laub: breit eiförmig  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit  
 Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig



Fagus sylvatica 'Dawyck'



Fagus sylvatica 'Dawyck'

### Heister

3xv.	m.B.	150-175	160,00
		175-200	210,00
		200-250	276,00

### Solitär

4xv.	m.Db.	250-300	420,00	
		300-350	600,00	
		350-400	845,00	
5xv.	m.Db.	60-100	350-400	1.400,00
			400-500	1.950,00
			500-600	2.690,00

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	10-12	310,00
		12-14	400,00
		14-16	545,00
		16-18	750,00
4xv.	m.Db.	18-20	1.050,00
		20-25	1.390,00
		25-30	1.790,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	30- 35	2.680,00
		35- 40	3.580,00
		40- 45	4.650,00
6xv	m.Db.	45- 50	6.050,00
		50- 60	7.950,00

***sylvatica* 'Dawyck Purple', Rotlaubige Säulen-Buche**

- Höhe: 15-20 (-25) m  
 Wuchs: straff aufrecht, schmal säulenförmig  
 Laub: breit eiförmig; purpurbraun  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit  
 Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Säulenform bleibt auch ohne Schnitt erhalten

**Heister**

3xv.	m.B.	150-175	160,00
		175-200	210,00
		200-250	267,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	250-300	420,00	
		300-350	600,00	
		350-400	845,00	
5xv.	m.Db.	60-100	350-400	1.400,00
			400-500	1.950,00
			500-600	2.690,00

**Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	310,00
		12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	790,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00
		25- 30	1.790,00

***sylvatica* 'Pendula', Grüne Hänge-Buche**

- Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: oft mit durchgehender Stammverlängerung, Äste weitbogig überhängend, Zweige schleppenartig  
 Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit  
 Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig




Fagus sylvatica 'Dawyck'



Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'



Fagus sylvatica 'Pendula'



Fagus sylvatica 'Pendula'








Fagus sylvatica 'Pendula'

→ *sylvatica* 'Pendula'**Heister**

3xv.	m.Db.		175-200	104,00	92,00
			200-250	129,50	115,00
			250-300	175,00	154,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	250-300	355,00	
			300-350	485,00	
			350-400	675,00	
4xv.	m.Db.	150-200	350-400	970,00	
			400-500	1.390,00	



Fagus sylvatica 'Pendula'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00	
		14- 16		545,00	
4xv.	m.Db.	16- 18		750,00	
		18- 20		1.050,00	

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.280,00
		20- 25			1.690,00
5xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.890,00
		25- 30			2.340,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	500-700	4.070,00
		40- 45			5.050,00
		45- 50			6.600,00



Fagus sylvatica purpurea

***sylvatica purpurea* (Sämling) Blut-Buche (Sämling)**Synonym: *F. s. cuprea*

Höhe: 25-30 m

Wuchs: Stamm weit durchgehend; Krone breit ausladend, rundlich

Laub: breit eiförmig; Austrieb dunkelrot, später vergrünend; Herbstfärbung rotbraun

Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit

Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; anpassungsfähig; sonnig bis halbschattig



Fagus sylvatica purpurea

**verpflanzte Heister**

	m.B.		100-125	39,00	34,50
			125-150	48,10	42,50
3xv.	m.B.		150-175	63,80	56,40
			175-200	84,50	74,60

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	200-250	204,00
			250-300	283,00
			300-350	410,00
			350-400	585,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00
4xv.	m.Db.	16- 18		750,00
		18- 20		1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.280,00
		20- 25			1.690,00
5xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.890,00
		25- 30			2.340,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00
		30- 35			2.980,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	500-700	4.070,00
		40- 45			5.050,00

***sylvatica* 'Purpurea Latifolia' (Veredlung), Blut-Buche (Veredlung)**Synonym: *F. s.* 'Atropunicea'

Höhe: 20-30 m

Wuchs: Stamm bis fast in die Krone, starke Äste, ausladend

Laub: breit elliptisch bis eiförmig; schwarzrot; Herbstfärbung orange

Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit

Frucht: ab September; Bucheckern; in geringen Mengen essbar

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig, anpassungsfähig; sonnig

**Heister**



3xv.	m.B.	100-125	62,10	54,90
		125-150	76,50	67,40
		150-175	86,50	76,50
	m.Db.	175-200	107,50	95,00
		200-250	133,50	118,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	200-250	210,00
			250-300	290,00
			300-350	410,00
			350-400	585,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00

*Fagus sylvatica purpurea**Fagus sylvatica purpurea**Fagus sylvatica*  
'Purpurea Latifolia'*Fagus sylvatica*  
'Purpurea Latifolia'

Fagus sylvatica  
'Purpurea Latifolia'→ *sylvatica* 'Purpurea Latifolia' (Veredlung)

4xv.	m.Db.	16-18			750,00
		18-20			1.050,00
		20-25			1.390,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18-20	100-150	400-500	1.280,00
		20-25			1.690,00
5xv.	m.Db.	20-25	150-200	400-500	1.890,00
		25-30			2.340,00
5xv.	m.Db.	25-30	200-300	400-500	2.410,00
		30-35			2.980,00
		35-40			3.680,00

Fagus sylvatica  
'Purpurea Latifolia'*sylvatica* 'Purpurea Pendula', Schwarzrote Hänge-Buche

Synonym: F. s. 'Atropurpurea Pendula'

Höhe:	variabel von 3-10 (-15) m
Wuchs:	schmale, schleppenartige Krone
Laub:	breit eiförmig; schwarzbraun; Herbstfärbung gelborange
Blüte:	Mai; einhäusig; männliche Blüten in kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht:	ab September; Bucheckern; essbar
Standort:	frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig

**Heister**

3xv.	m.B.	100-125	72,50	64,10
		125-150	110,50	97,50
		150-175	152,00	134,50
		175-200	198,00	175,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	60-100	200-250	400,00
			250-300	560,00

**Hochstämme, Stammbüsche (auch als Kopfveredlung verfügbar)**

3xv.	m.Db.	10-12	380,00
		12-14	475,00
4xv.	m.Db.	14-16	680,00
		16-18	950,00



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

*sylvatica* 'Riversii', Blut-Buche 'Riversii'

Höhe:	15-20 m
Wuchs:	Stamm bis in die Krone reichend; breit ausladend
Laub:	breit elliptisch bis eiförmig; sehr groß; schwarzrot; Herbstfärbung orange
Blüte:	Mai; einhäusig; männliche Blüten in rötlichen, kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit
Frucht:	ab September; Bucheckern; in Maßen essbar
Standort:	frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig, anpassungsfähig; sonnig
Sonstiges:	Blut-Buche mit konstant roter Belaubung




Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			400,00
		14- 16			545,00
4xv.	m.Db.	16- 18			750,00
		18- 20			1.050,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.280,00
		20- 25			1.690,00
5xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.890,00
		25- 30			2.340,00



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

**sylvatica 'Swat Magret', Blut-Buche 'Swat Magret'**

Höhe: 20-30 m

Wuchs: Stamm bis in die Krone; Hauptäste stark, dick; Krone breit ausladend, dicht, geschlossen

Laub: groß; schwarzrot; kaum Herbstfärbung

Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelben kugeligen Büscheln, weibliche Blüten zu zweit

Frucht: ab September; Bucheckern; in Maßen essbar

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig bis lehmig, anpassungsfähig; sonnig

**Heister**

3xv.	m.B.		100-125	62,10	54,90
			125-150	76,50	67,40
			150-175	86,50	76,50
	m.Db.		175-200	107,50	95,00
			200-250	130,50	118,00



Fagus sylvatica 'Purpurea Pendula'

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	200-250	210,00	
			250-300	290,00	
			300-350	410,00	
			350-400	585,00	



Fagus sylvatica 'Swat Magret'

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14			400,00
		14- 16			545,00
4xv.	m.Db.	16- 18			750,00
		18- 20			1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	1.280,00
		20- 25			1.690,00
5xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.890,00
		25- 30			2.340,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	500-700	4.070,00
		40- 45			5.050,00
		45- 50			6.600,00



Fagus sylvatica 'Swat Magret'



Forsythia intermedia 'Lynwood'



Forsythia intermedia 'Lynwood'



Forsythia intermedia  
'Goldzauber®'



Forsythia intermedia 'Minigold'

**Fargesia** - siehe unter Bambus - Fargesia

## FORSYTHIA - Oleaceae - GOLDGLÖCKCHEN

### intermedia-Sorten

Höhe: 1,5-3 m  
Wuchs: jung straff aufrecht, später weitbogig überhängend, dicht  
Laub: eilanzettlich; Austrieb nach Blüte  
Blüte: März bis April; in gelben Tönen  
Frucht: braune Kapseln; zahlreich  
Standort: alle Kulturböden; sonnig

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe	Wuchsform
'Beatrix Farrand'	dunkelgelb	300 cm	kräftig aufrecht, locker
'Lynwood'	dottergelb	300 cm	breit ausladend
'Spectabilis'	sattgelb	300 cm	breit ausladend
'Spring Glory'	hellgelb	250 cm	breit buschig
'Tetragold'	tiefgelb	200 cm	breit buschig

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,20	5,50
4 Tr.	o.B.	100-150	10,80	8,55	7,25
	Co.	60-100	12,30	10,90	8,90

### Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	53,50	47,20
		150-200	68,90	61,00
		200-250	96,50	

Sortenname	Blütenfarbe	Wuchshöhe	Wuchsform
'Goldzauber®'	goldgelb	200 cm	straff aufrecht
'Minigold'	hellgelb	150 cm	buschig aufrecht
'Week-End'	leuchtend gelb	250 cm	dicht, überhängend

### verpflanzte Sträucher

	Co.	40- 60	13,40	10,60	9,60
		60-100	16,60	14,65	13,30

## FOTHERGILLA - Hamamelidaceae - FEDERBUSCHSTRAUCH

**gardenii**, Erlenblättriger Federbuschstrauch

Synonym: *F. alniifolia*, *F. carolina*

Höhe: 0,6-1 m

Wuchs: breitbuschig, ausladend

Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis rot; einprägsam

Blüte: Mai; cremeweiße, aufrechte Ähre; starker Honigduft; auffallend

Frucht: Kapsel

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**major**, Hoher Federbuschstrauch

Synonym: *F. monticola*

Höhe: 80-150 cm

Wuchs: breitbuschig

Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung orangegelb bis karminrot

Blüte: Mai; rahmweiße, aufrechte Ähren; starker Honigduft; auffallend

Frucht: Kapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

### Sträucher

m.B./Co.	30- 40	40,10
	40- 60	51,90

## FRANGULA - Rhamnaceae - FAULBAUM

**alnus**, Gemeiner Faulbaum, Pulverholz

Synonym: *Rhamnus frangula*

Höhe: 3-5 m

Wuchs: breit aufrecht, leicht überhängend

Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis kupferrot

Blüte: Mai bis Juni; grünlich weiß

Frucht: ab September; kugelig; rotschwarz; glänzend; giftig


Standort: frisch bis nass, torfig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	5,90	4,25	3,85
4 Tr.	o.B.	100-150	8,20	6,20	5,55
	Co.	60-100	12,30	10,90	8,90
<b>Solitär</b>					
3xv.	m.Db.	125-150	53,50	47,20	
		150-200	68,90	61,00	
		200-250	96,50		
		250-300	116,50		




*Fothergilla gardenii*





*Fothergilla major*



*Frangula alnus*



*Frangula alnus*

Fraxinus americana  
'Autumn Applause®'Fraxinus americana  
'Autumn Applause®'Fraxinus americana  
'Autumn Purple'**FRAXINUS - Oleaceae - ESCHE****americana,**  
Weiß-Esche

Höhe: 20-25 m

Wuchs: halboffene, oval bis eiförmige Krone

Laub: unregelmäßig gefiedert; ca. 30 cm; tiefgrün; im Herbst gelb bis lila

Blüte: April; purpurgrün; zweihäusig

Frucht: geflügelte Nußfrucht; bis 5 cm

Standort: schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, sandig lehmig; kurzzeitige  
Überschwemmung vertragend

Sonstiges: verträgt Streusalz

**americana 'Autumn Applause®',**  
Weiß-Esche 'Autumn Applause®'

Höhe: 10-12 m

Wuchs: breit eiförmig

Laub: unregelmäßig gefiedert; bis 30 cm; tiefgrün; Herbstfärbung weinrot

Blüte: April; purpurgrün

Frucht: keine, da männliche Sorte

Standort: frisch bis feucht, schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, sandig  
lehmig oder lehmig; kurzzeitige Überschwemmung vertragend

Sonstiges: graubraune, im Alter tiefgefurchte Rinde

**americana 'Autumn Purple®',**  
Weiß-Esche 'Autumn Purple®'

Höhe: 16-18 m

Wuchs: kompakt, breit eiförmig, später rund

Laub: unregelmäßig gefiedert; bis 35 cm; tiefgrün; Herbstfärbung  
tiefpurpurn

Blüte: vor dem Laub, April/Mai; purpurgrün; unscheinbar

Frucht: keine, da männliche Sorte

Standort: schwach sauer bis neutral, nährstoffreich, lehmig; kurzzeitige  
Überschwemmung vertragend**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	970,00	855,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00


**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00

**angustifolia 'Raywood', Schmalblatt-Esche**

Synonym: F. a. 'Wollastonia'; F. oxycarpa 'Flame'

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Stamm bis Wipfel durchgehend, breit eiförmig, später rundlich und aufgelockert  
 Laub: schwach gefiedert; Herbstfärbung violett bis weinrot  
 Blüte: ohne Bedeutung  
 Frucht: kein Fruchtsatz  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig bis lehmig; sonnig

Neu-  
heit

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.890,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00



Fraxinus angustifolia 'Raywood'

**excelsior, Gemeine Esche**

- Höhe: 30-40 m  
 Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste dick, Krone licht, breit gewölbt kugelig oder stumpf kegelförmig  
 Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend  
 Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtig; grünlich bis rötlich; Windbestäubung  
 Frucht: September/Oktober; buschelig; schmal; geflügelt; Nussfrucht  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 200 Jahren

Baum  
des Jahres  
2001

Fraxinus angustifolia 'Raywood'


**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	19,50	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,90	26,40	



Fraxinus excelsior





Fraxinus excelsior

→ excelsior

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00



Fraxinus excelsior

**excelsior 'VKG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigene  
Gemeine Esche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6**

Höhe: 30-40 m

Wuchs: Stamm bis weit in die Krone, Äste dick, Krone licht,  
breit gewölbt kugelig oder stumpf kegelförmig

Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend

Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtlich; grünlich bis rötlich;  
Windbestäubung

Frucht: September/Oktober; buschelig; schmal; geflügelt; Nussfrucht

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: Lebenserwartung liegt bei 200 Jahren

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	26,90	23,30	21,20
	200-250	33,30	29,00	26,40
	250-300	41,10	36,50	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	272,00	244,00
		14- 16	369,00	325,00
		16- 18	506,00	450,00
		18- 20	660,00	580,00
		20- 25	875,00	765,00



Fraxinus excelsior 'Altena'

**excelsior 'Altena', Esche 'Altena'**

Synonym: F. e. 'Monarch'

Höhe: 20-25 m

Wuchs: Stamm bis Wipfel gerade, Krone breit kegelförmig, regelmäßig und dicht


Laub: mit gesägtem Rand; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend

Blüte: nur männlich

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: geringe Spätfrostgefahr durch späten Austrieb



Fraxinus excelsior 'Altena'

**excelsior 'Atlas', Esche 'Atlas'**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: Krone dicht, buschig kompakt, rund, breit eiförmig, später rundlich


Laub: unpaarig gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend

Blüte: nur männlich

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: wächst langsamer als 'Westhof's Glorie', kaum spätfrostgefährdet



Fraxinus excelsior 'Atlas'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00




Fraxinus excelsior 'Atlas'



Fraxinus excelsior 'Atlas'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'

**excelsior 'Diversifolia', Einblatt-Esche**

Synonym: F. e. 'Monophylla'; F. veltheimii

- Höhe: 10-18 m  
 Wuchs: Hauptäste aufrecht, Seitenäste locker ausladend, Krone erst kegelförmig, später dichter und fast rund  
 Laub: oval, einfach bis dreizählig; gelbe Herbstfärbung oder bereits grün abfallend  
 Blüte: wenig, nur männlich  
 Frucht: keine  
 Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: kaum spätfrostgefährdet

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	995,00	870,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.680,00
		35- 40			3.320,00
		40- 45			4.070,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00

**excelsior 'Geessink', Esche 'Geessink'**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: Stamm bis Wipfel, im Ganzen schmalkronig  
 Laub: lanzettliche Fiederblätter  
 Blüte: April/Mai; zwittrig oder eingeschlechtig; wenig  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: kaum spätfrostgefährdet

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.110,00 1.390,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40	200-300	500-700	2.160,00 2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	200-300	700-900	2.340,00 2.910,00 3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45 45- 50 50- 60	300-400	700-900	4.410,00 5.450,00 6.750,00

**excelsior 'Nana', Kleine Kugel-Esche**

Höhe: hochstämmig veredelt bis 3 m

Wuchs: Kugelkrone

Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder grün abfallend

Blüte: nicht beobachtet

Frucht: nicht beobachtet

Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, sandig bis lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

**excelsior 'Pendula', Hänge-Esche**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: überhängend breiten, lockeren Schirm bildend

Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb oder grün abfallend

Blüte: Mai; zwittrig oder eingeschlechtig; gelblich grün

Frucht: ab September/Oktob; schmal; geflügelte Nussfrüchte; zahlreich

Standort: feucht bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00
		25- 30	1.690,00
5xv.	m.Db.	30- 35	2.680,00
		35- 40	3.320,00

**excelsior 'Westhof's Glorie', Straßen-Esche**

Höhe: 20-30 m

Wuchs: erst breit eiförmig, später rundlich

Laub: gefiedert; gelbe Herbstfärbung oder grün abfallend

Blüte: Mai; zwittrig oder eingeschlechtig; grünlich gelb; selten


Frucht: sehr selten

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: kaum spätrostgefährdet




Fraxinus excelsior 'Geessink'



Fraxinus excelsior 'Geessink'



Fraxinus excelsior 'Nana'



Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'



Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'

→ excelsior 'Westhof's Glorie'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00



Fraxinus ornus

**ornus, Blumen-Esche, Manna-Esche**


Höhe: 6-10 m  
 Wuchs: kurzstämmig, Krone rundlich  
 Laub: gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb bis bronzefarben  
 Blüte: Mai; cremeweiße Rispen; duftend; auffallend  
 Frucht: ab September/Oktober; geflügelte Nussfrüchte  
 Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: blüht nach 10-15 Jahren



Fraxinus ornus

**ornus 'Arie Peters', Blumen-Esche 'Arie Peters'**

Höhe: 5-7 m (erwartet)  
 Wuchs: regelmäßig, breit eiförmig  
 Laub: gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend  
 Frucht: selten  
 Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig



Fraxinus ornus 'Arie Peters'

**ornus 'Louisa Lady', Blumen-Esche 'Louisa Lady'**

Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: kegelförmig, bogig aufrecht  
 Laub: gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend  
 Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig




**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	25- 30	2.160,00
		30- 35	2.680,00
		35- 40	3.320,00



Fraxinus ornus 'Louisa Lady'

**ornus 'Mecsek', Kugel-Blumen-Esche**

- Höhe: hochstämmig veredelt bis 5 m  
 Wuchs: Kugelkrone  
 Laub: gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; cremeweiße Rispe; duftend; auffallend  
 Frucht: ab September; geflügelte Nussfrüchte  
 Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00
		12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00
		25- 30	1.690,00
5xv.	m.DB.	30- 35	2.680,00
		35- 40	3.320,00
		40- 45	3.780,00
6xv.	m.Db.	45- 50	4.650,00
		50- 60	5.750,00



Fraxinus ornus 'Mecsek'


**ornus 'Nijmegen', Blumen-Esche 'Anita'**

Synonym: F. o. 'Anita'


- Höhe: 7-9 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig  
 Laub: gefiedert  
 Blüte: Mai/Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend  
 Frucht: selten  
 Standort: trocken bis frisch, sandig steinig lehmig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00



Fraxinus ornus 'Mecsek'



Fraxinus ornus 'Obelisk'

→ ornus 'Nijmegen'


**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	25- 30	2.160,00
		30- 35	2.680,00
		35- 40	3.320,00

**ornus 'Obelisk', Blumen-Esche 'Obelisk'**

Synonym: F. o. 'Papst Johannes Paul II'

Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: säulenförmig, im Alter breiter werdend  
 Laub: gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend  
 Frucht: ab September; geflügelte Nussfrüchte  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: bereits als junger Baum überreich blühend



Fraxinus ornus 'Rotterdam'

**ornus 'Rotterdam', Blumen-Esche 'Rotterdam'**

Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: Krone breit kegelförmig  
 Laub: gefiedert; Herbstfärbung bronzefarben  
 Blüte: Mai/Juni; gelblich weiße Rispen; duftend; auffallend  
 Frucht: noch nicht beobachtet  
 Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, steinig, sandig lehmig; sonnig



Fraxinus ornus 'Rotterdam'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	25- 30	2.160,00
		30- 35	2.680,00
		35- 40	3.320,00

**pennsylvanica 'Cimmzam', Rot-Esche 'Cimmzam'**

Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam'

Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: in jungen Jahren schmal, später breit eiförmig bis rundlich  
 Laub: gefiedert; Einzelblatt groß; Herbstfärbung orange- purpurrot  
 Blüte: April bis Mai; Rispen  
 Frucht: männliche Selektion bildet keine Früchte  
 Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: in den USA häufig gepflanzter Stadt- und Parkbaum

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
		20- 25	1.110,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

**pennsylvanica 'Patmore', Rot-Esche 'Patmore'**

Höhe: 15-18 m

Wuchs: breit eiförmig, gleichmäßig

Laub: gefiedert; lange haftend; Herbstfärbung gelb

Blüte: April bis Mai; unscheinbare Rispen


Frucht: keine; da männlich

Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: braungraue Rinde, im Alter rissig; in den USA bevorzugt gepflanzte Rot-Esche



Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'



Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'

**pennsylvanica 'Summit', Rot-Esche 'Summit'**

Höhe: 15-18 m

Wuchs: breit eiförmig, gleichmäßig


Laub: gefiedert; lange haftend; Herbstfärbung gelb

Blüte: April bis Mai; unscheinbare Rispen

Frucht: keine da männlich

Standort: trocken bis frisch, steinig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: braungraue Rinde, im Alter rissig



Fraxinus pennsylvanica 'Summit'


**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
		20- 25	1.050,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
		30- 35			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.980,00
		35- 40			3.680,00
		40- 45			4.520,00
5xv.	m.Db.	40- 45	200-300	700-900	4.650,00
		45- 50			5.750,00
		50- 60			7.180,00





Gaultheria procumbens

## GAULTHERIA - Ericaceae - TEPPICHBEERE, SCHEINBEERE, REBHUHNBEERE

### procumbens, Rote Teppichbeere

Höhe: 10-20 cm

Wuchs: Teppich bildend, Triebe horstartig, langsam ausbreitend

Laub: immergrün; elliptisch

Blüte: Juli bis August; weißrosa

Frucht: ab August bis Frühjahr; rot; auffallend

Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis wechelschattig

#### Büsche

m.Tb.	Tr.	8- 12	3,70	3,30	3,00
	Tr.	12- 18	5,90	4,50	4,10



Gaultheria shallon

### shallon, Hohe Teppichbeere

Höhe: 40-80 cm

Wuchs: horstartig

Laub: immergrün; eiförmig bis rund

Blüte: Juni bis Juli; weißrosa

Frucht: September bis Oktober; schwarzrot

Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig

Sonstiges: Früchte ungiftig

#### Büsche

m.Tb.	12- 20	12,35	10,90
	20- 30	15,30	13,50



Genista lydia

## GENISTA - Leguminosae - GINSTER

### lydia, Stein-Ginster, Balkan-Ginster, Goldland-Ginster, Lydischer Ginster

Höhe: 30-50 cm

Wuchs: bogig überhängend, später flach

Laub: lanzettlich


Blüte: Mai bis Juni; goldgelb

Frucht: Hülsen

Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, durchlässig; sonnig

#### Sträucher


Co.	20- 30	11,50	10,10	9,15
	30- 40	13,90	12,20	11,00



Genista lydia

**radiata**, Strahlen-Ginster

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht  
 Laub: lanzettlich  
 Blüte: Mai bis Juni; gelb  
 Frucht: Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtsattig




Genista radiata

**sagittalis**, Pfeil-Ginster, Flügel-Ginster

Synonym: Chamaespartum sagittale

- Höhe: 20-30 cm  
 Wuchs: locker, Boden aufliegend, kriechend  
 Laub: lanzettlich; nur schwach belaubt  
 Blüte: Juni bis Juli; dottergelb  
 Frucht: Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk meidend; sonnig



Genista sagittalis

**Sträucher**

Co.	15- 20	8,95	7,90	7,15
	20- 30	10,80	9,55	8,65

**tinctoria**, Färber-Ginster

- Höhe: 40-50 cm  
 Wuchs: locker aufrecht, buschig, dichttriebzig  
 Laub: lanzettlich; dunkelgrün; glänzend  
 Blüte: Juni bis August; goldgelb  
 Frucht: Hülsen



Genista tinctoria

**Sträucher**


Co.	40- 60	6,75	5,95	5,40
	60- 80	7,70	6,80	6,15

**tinctoria 'Plena'**, Gefüllter Färber-Ginster


- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: flach ausgebreitet  
 Laub: lanzettlich  
 Blüte: Juli bis August, mit Nachblüte; goldgelb; gefüllt; auffallend  
 Frucht: keine  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffarm, kalkempfindlich; sonnig bis lichtsattig

**Sträucher**

Co.	20- 30	10,80	9,55	8,65
	30- 40	13,00	11,50	10,95



Genista tinctoria 'Plena'



Gleditsia triacanthos

## **GLEDITSIA** - Caesalpinaceae - **GLEDITSCHIE**, **LEDERHÜLSENBAUM**

### **triacanthos**, Dreidorniger Lederhülsenbaum, Falscher Christudorn



- Höhe: 10-25 m  
 Wuchs: breit eiförmig, locker, später schirmförmig  
 Laub: einfach bis doppelt gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb  
 Blüte: Juni bis Juli; gelbgrün; duftend  
 Frucht: flache, große, braune Hülsen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: Blütenbaum nach 10 bis 15 Jahren; stark bedornt



Gleditsia triacanthos

#### **Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	995,00	870,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	

#### **Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	300-400	500-700	3.060,00
		35- 40			3.580,00
		40- 45			4.080,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	6.600,00
		50- 60			8.200,00
		60- 70			10.300,00



Gleditsia triacanthos

### **triacanthos inermis**, Dornenloser Lederhülsenbaum

- Höhe: 10-25 m  
 Wuchs: schmal, schirmförmig  
 Laub: einfach bis doppelt gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb  
 Blüte: Juni bis Juli; hellgrün; duftend  
 Frucht: flache, lange, braune Hülsen; selten und mäßig ausgebildet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig; kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: schwach bzw. unwesentlich bedornt



Gleditsia triacanthos inermis

**tricanthos 'Shademaster', Schirm-Gleditschie**


- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: erst kegelförmig, später breit schirmförmig  
 Laub: gefiedert; frühe, gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: gering  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: nicht bedornt



Gleditsia triacanthos inermis

**tricanthos 'Skyline', Schmalkronige Gleditschie**


- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig  
 Laub: gefiedert; frühe Herbstfärbung, gelb  
 Blüte: Juni; weiß; duftend  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: nicht bedornt

Gleditsia triacanthos  
'Shademaster'**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	970,00	855,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	300-400	500-700	3.060,00
		35- 40			3.580,00
		40- 45			4.080,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	6.600,00
		50- 60			8.200,00
		60- 70			10.300,00



Gleditsia triacanthos 'Skyline'

**tricanthos 'Street Keeper' (Draves), Schirm-Gleditschie**

- Höhe: 12-14 m  
 Wuchs: dichte, schmal pyramidenförmige Krone  
 Laub: gefiedert; dunkelgrün; im Herbst gelb  
 Blüte: gering, Juni/Juli  
 Frucht: gering; dunkelbraune Hülsen  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: nicht bedornt

Gleditsia triacanthos  
'Street Keeper'



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

→ triacanthos 'Street Keeper' (Draves)

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	
		14- 16	415,00	
		16- 18	575,00	
		18- 20	750,00	
		20- 25	970,00	
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	

**triacanthos 'Sunburst', Gold-Gleditschie**

Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, sehr locker  
 Laub: gefiedert; Austrieb hellgelb, später grüngelb; Herbstfärbung früh braun  
 Blüte: Juni; weiblich; duftend  
 Frucht: wird nicht ausgebildet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: dornelos




Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
		18- 20	900,00	793,00
		20- 25	1.050,00	925,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.690,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.290,00
		30- 35			2.830,00
		35- 40			3.490,00
		40- 45			4.300,00



Gleditsia triacanthos 'Sunburst'

**GYMNOCLADUS - Leguminosae - GEWEIHBAUM**

**dioicus**



Höhe: 10-15 (-20) m  
 Wuchs: unregelmäßig eiförmig, später geweihähnlich  
 Laub: doppelt gefiedert; groß; Austrieb spät; rosa; Sommer blaugrün; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: Juni; zweihäusig; weiß; klein  
 Frucht: ab September bis Winter; flache, braune Hülsen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig



Gymnocladus dioicus

**Solitär**


3xv.	m.Db.		125-150	170,00
			150-175	247,00
			175-200	365,00
			200-250	545,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	1.080,00
			300-350	1.590,00
			350-400	2.340,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.680,00
		30- 35			4.520,00
		35- 40			5.600,00



Gymnocladus dioica



Halesia carolina

**HALESIA - Styryaceae - MAIGLÖCKCHEN-  
STRAUCH, SCHNEEGLÖCKCHEN-BAUM**

**carolina**, Kleinblumiger Maiglöckchen-Strauch,  
Vierflügeliger Maiglöckchen-Strauch

Synonym: *H. tetraptera*


Höhe: 4-6 m  
Wuchs: breitbuschig bis rundlich, locker  
Laub: eiförmig; Herbstfärbung gelb  
Blüte: April bis Mai; weiß; auffallend  
Frucht: ab September bis Frühjahr; geflügelte Steinfrucht  
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig



Halesia carolina

**monticola**, Großblumiger Maiglöckchen-Strauch

Höhe: 6-10 m  
Wuchs: Großstrauch oder kleiner Baum, breit kegelförmig  
Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelb  
Blüte: Mai; glockig; groß; auffallend  
Frucht: ab September bis Frühjahr; geflügelte Steinfrüchte  
Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig



Halesia monticola



Hamamelis intermedia 'Diane'

→ monticola

**Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	37,00
	80-100	45,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	80,50	
		100-125	114,00	
		125-150	161,00	
4xv.	m.Db.	100-150	150-175	234,00
		175-200	325,00	
		200-250	460,00	

**HAMAMELIS - Hamamelidaceae - ZAUBERNUSS****intermedia-Sorten, Großblütige Zaubernuss-Sorten**

Höhe: 2-4 m

Wuchs: trichterförmig, aufrecht, später ausladend


Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis tiefrot

Blüte: je nach Sorte von Dezember bis März und von hellgelb bis kupferbronzerot

Frucht: holzige Kapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: Blüte erträgt -10 bis -12 °C Frost



Hamamelis intermedia 'Pallida'



Hamamelis intermedia 'Pallida'

Sortenname	Petalen	Blütenfarbe
'Arnold Promise'	bis 1,5-1,8 cm	primelgelb
'Diane'	bis 2 cm	rot, später bronze
'Feuerzauber'	bis 1,8 cm, gedreht	kupfrig bis tieforange, rotüberflossen
'Jelena'	bis 2 cm, leicht gewellt	kupfrig bis orange, gelber Saum
'Pallida'	bis 2 cm, leicht gewellt	hell- bis schwefelgelb
'Primavera'	bis 1,5 cm, sichelförmig, gebogen	hellgelb, am Grund leicht purpurfarben
'Ruby Glow'	bis 1,5 cm, gedreht	kupferrot, später rötlich braun
'Westerstede'	bis 1,5 cm, leicht gedreht	hellgelb

**Sträucher**

m.B./Co.	40- 60	45,50	40,20
	60- 80	63,80	60,50
	80-100	86,50	

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	141,00	
		100-125	198,00	
4xv.	m.Db.	60-100	125-150	370,00
		150-175	530,00	
		175-200	770,00	
5xv.	m.Db.	100-150	175-200	1.110,00
		200-250	1.540,00	



Hamamelis intermedia 'Westerstede'

**japonica**, Japanische Zaubernuss

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: trichterförmig, breit ausladend  
 Laub: breit eiförmig; Herbstfärbung gelb bis orangerotgelb  
 Blüte: je nach Sorte von Januar bis März; gelb  
 Standort: frisch bis feucht, schwach sauer, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt

**mollis**, Lichtmess-Zaubernuss

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: trichterförmig, aufrecht, später ausladend  
 Laub: eirundlich bis verkehrteiförmig; unterseits dicht graufilzig behaart; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: Februar bis März; intensiv gelb; schwach duftend  
 Standort: frisch bis feucht, kalkempfindlich, durchlässig, schwach sauer, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig; geschützt

**Sträucher**

m.B./Co.	40-60	45,50	40,20
	60-80	63,80	60,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	141,00	
		100-125	198,00	
4xv.	m.Db.	60-100	125-150	370,00
			150-175	530,00
			175-200	770,00
5xv.	m.Db.	100-150	175-200	1.110,00
			200-250	1.540,00

**virginiana**, Virginische Zaubernuss, Herbstblühende Zaubernuss

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: breit trichterförmig bis ausladend  
 Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung tiefgelb  
 Blüte: Oktober bis November; hellgelb  
 Frucht: folgender Spätsommer; Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig, humos; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**


m.B.	60-80	63,80	60,50
	80-100	86,50	76,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	198,00	
4xv.	m.Db.	60-100	125-150	370,00
			150-175	530,00
			175-200	770,00
5xv.	m.Db.	100-150	175-200	1.110,00
			200-250	1.540,00




Hamamelis japonica



Hamamelis mollis




Hamamelis mollis



Hamamelis virginiana





Hedera colchica 'Arborescens'

## HEDERA - Araliaceae - EFEU

### colchica 'Arborescens', Kaukasischer Strauch-Efeu

Höhe: 0,8-1,2 m  
 Wuchs: breit aufrecht, rundlich  
 Laub: immergrün; lang, oval; aromatisch  
 Blüte: Juli bis September; weiß  
 Frucht: kugelig; schwarz  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humushaltig; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

#### Büsche

m.B./Co.	30- 40	32,40	28,60
	40- 50	38,00	33,60
	50- 60	60,50	53,50



Hedera helix

### helix, Gemeiner Efeu, Kleinblättriger Efeu




Höhe: kriechend bis 20 cm, kletternd bis 20 m  
 Wuchs: ohne Halt kriechend, sonst kletternd  
 Laub: immergrün; drei- bis fünfflappig, unterschiedlich gestaltet  
 Blüte: September bis Oktober; grüngelb; kugelig  
 Frucht: Frühjahr; schwarzblau; kugelig; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; lichtschtig bis schattig  
 Sonstiges: Blühreife nach 8 bis 10 Jahren; Lebenserwartung über 400 Jahre

#### Büsche

3 Tr.	m.Tb.	30- 40	3,65	3,23	2,93
		40- 60	4,28	3,78	3,43
4-6 Tr.	m.Tb.	30- 40	4,39	3,88	3,52
		40- 60	5,10	4,51	4,10
		60- 80	6,05	5,35	4,83

#### gestäbte Pflanzen

4-6 Tr.	Co.	40- 60	6,40	5,65	5,10
		60- 80	8,20	7,25	6,55
		80-100	11,70	10,35	9,40



Hedera helix

#### Solitär, gestäbt

3xv.	Co.	80-100	23,60	20,80
		100-125	33,30	29,40
		125-150	46,80	41,40
		150-200	65,40	57,80
		200-250	91,00	80,50



Hedera helix 'Arborescens'

**helix 'Arborescens',** Strauch-Efeu

- Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: Strauch, dicht verzweigt, geschlossen, halbkugelförmig  
 Laub: immergrün; ungelappt; kaum gezeichnet  
 Blüte: September bis Oktober, grünlich gelb; duftend  
 Frucht: ab Frühjahr; Beeren schwarzblau; kugelig; schwach duftend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; lichtsattig bis schattig

**Büsche**

m.B./Co.	30-40	17,90	15,80
	40-50	20,50	18,10
	50-60	32,50	

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	40-60	40-60	60,50
			60-80	84,50
			80-100	120,50

**helix 'Goldheart',** Gelbbunter Efeu

Synonym: H. h. 'Oro del Bogliasco'

- Höhe: bis 5 m  
 Wuchs: Kletterstrauch, kein Bodendecker  
 Laub: immergrün; Blattmitte gelb; auffallend  
 Blüte: September bis Oktober; gelblich grün; selten  
 Frucht: ab Frühjahr; schwarzblau; kugelig; selten  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

**gestäbte Pflanzen**


m.Tb./Co.	40-60	12,70	11,20
	60-80	14,90	13,15

**Solitär**

3xv.	Co.	80-100	25,50
		100-125	39,00

**helix hibernica,** Irischer Efeu, Großblättriger Efeu

- Höhe: kriechend 20 cm, kletternd bis 20 m  
 Wuchs: kriechend oder kletternd, schnell wachsend  
 Laub: immergrün; fünfflappig variabel; groß  
 Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb; kugelig  
 Frucht: Frühjahr; kugelig; klein; schwarzblau; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; lichtsattig bis schattig →



Hedera helix 'Arborescens'




Hedera helix 'Goldheart'



Hedera helix 'Goldheart'



Hedera helix hibernica



Hedera helix hibernica

→ **helix hibernica**

**helix 'Plattensee', Efeu 'Plattensee'**

Höhe: 10-15 m; kriechend 20 cm  
 Wuchs: Kletterstrauch oder Kriechstrauch  
 Laub: immergrün; dreilappig; im Winter braunviolett  
 Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb; kugelig  
 Frucht: Frühjahr; schwarzblau; kugelig; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; lichtschantig bis schattig

**Büsche**

3 Tr.	m.Tb.	30- 40	3,65	3,23	2,93
		40- 60	4,28	3,78	3,43
4-6 Tr.	m.Tb.	30- 40	4,39	3,88	3,52
		40- 60	5,10	4,51	4,10

**gestäbte Pflanzen**

4-6 Tr.	Co.	40- 60	6,40	5,65	5,10
		60- 80	8,20	7,25	6,55
		80-100	11,70	10,35	9,40

**Solitär, gestäbt**

3xv.	Co.	80-100	23,60	20,80
		100-125	33,30	29,40
		125-150	46,80	41,40
		150-200	65,40	57,80
		200-250	91,00	80,50



Hedera helix 'Sagittifolia'

**helix 'Sagittifolia', Efeu 'Sagittifolia'**

Höhe: 4-8 m  
 Wuchs: mittelstark wachsend  
 Laub: immergrün; pfeilförmig, gelappt; auffallend  
 Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb  
 Frucht: ab Frühjahr; blauschwarze Beeren  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Büsche**


m.Tb.	30- 40	4,39	3,88	3,52
	40- 60	5,10	4,51	4,10

**helix 'Woerner', Efeu 'Woerner'**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: stark wachsend  
 Laub: immergrün; dreigelappt, sehr breit  
 Blüte: September bis Oktober; grünlich gelb  
 Frucht: ab Frühjahr; blauschwarze Beeren  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Büsche**

m.Tb.	30- 40	4,39	3,88	3,52
	40- 60	5,10	4,51	4,10



Hedera helix 'Sagittifolia'



Hedera helix 'Woerner'


**HIBISCUS - Malvaceae - EIBISCH****syriacus-Sorten, Garten-Eibisch, Rosen-Eibisch**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breit trichterförmig  
 Laub: eiförmig; dreilappig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Juli bis Ende September; malvenähnlich; Sorten in unterschiedlichen Farben  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk vertragend; sonnig



Hibiscus syriacus 'Hamabo'

Sortenname	Blütenfarbe	Höhe in cm
'Ardens'	purpurn bis violett, weinroter Mittelfleck	ca. 150
'Coelestis'	helles blauviolett, magentaroter Mittelfleck	ca. 180
'Hamabo'	rosa, dunkelroter Mittelfleck	ca. 200
'Lady Stanley'	rosaweiß, dunkelroter Mittelfleck; leicht gekräuselt	ca. 200
'Oiseau Bleu'	blauviolett, magentaroter Mittelfleck	ca. 200
'Red Heart'	weiß, dunkel- bis weinroter Mittelfleck	ca. 200
'Speciosus'	weiß, dunkel- bis weinroter Mittelfleck	ca. 150
'Totus Albus'	weiß, kein Mittelfleck	ca. 200
'Woodbridge'	rötlich lila, Mittelfleck klein und dunkelrot	ca. 200



Hibiscus syriacus 'Hamabo'

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	17,50	15,40
	40- 60	23,60	20,80
	60- 80	28,40	25,10

**Solitär**

3xv.	m.B.	60- 80	63,80
		80-100	82,50
		100-125	107,50
4xv.	m.Db.	125-150	165,00
		150-175	260,00



Hibiscus syriacus 'Oiseau Bleu'

**HIPPOPHAE - Elaeagnaceae - SANDDORN****rhamnoides, Gemeiner Sanddorn**

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, später breit ausladend bis sparrig, Ausläufer treibend  
 Laub: lanzettlich; silbrig grau; lange haftend  
 Blüte: März bis April; grünlich braun; zweihäusig  
 Frucht: September bis Oktober; orange; saftig; essbar, sauer  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig, schottrig, lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: bedornt



Hibiscus syriacus 'Red Heart'



Hippophae rhamnoides

## → rhamnoides

## verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	6,60	4,85	4,40
		100-150	9,20	7,00	6,40
	Co.	60-100	11,50	10,15	9,20

## Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	82,50	72,80	
		150-200	123,00	108,50	
		200-250	175,00		
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	268,00	
			300-350	385,00	



Hippophae rhamnoides

## rhamnoides 'Hikul', Zwerg-Sanddorn 'Hikul'

- Höhe: 0,8-1 m  
 Wuchs: zwergwüchsig, Ausläufer treibend  
 Laub: lanzettlich; graugrün  
 Blüte: klein; unscheinbar  
 Frucht: keine; männliche Sorte  
 Standort: mäßig trocken bis sehr feucht, sandig, schottrig, lehmig, sauer bis alkalisch; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: salztolerant; schnittverträglich; für Extremstandorte sehr gut geeignet

## Büsche

	Co.	30-40	17,50	15,40	
--	-----	-------	-------	-------	--

Fruchtsorten - siehe Obstteil



Hippophae rhamnoides

## HOLODISCUS - Rosaceae - SCHEINSPIERE

discolor arifolius, Graugrüne Scheinspiere,  
Kaskadenstrauch

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: locker aufrecht, weit bogig überhängend  
 Laub: eiförmig; gelappt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli bis August; gelblich weiße Rispen; auffallend  
 Frucht: September bis Frühjahr; braune Rispen  
 Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

## verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	13,00	10,55	9,55
	Co.	40-60	12,00	10,60	9,60

## Solitär

3xv.	m.Db.	100-125	49,30	43,60	
		125-150	63,80	56,40	
		150-200	82,50	72,80	



Holodiscus discolor arifolius

**HUMULUS - Moraceae - HOPFEN****lupulus**, Gewöhnlicher Hopfen

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: sehr starkwüchsig  
 Laub: dunkelgrün; rau behaart  
 Blüte: Juli bis August; zweihäusig; männlich: grüne Blütenrispen; weiblich: unauffällig gelbgrün  
 Frucht: zapfenähnlich; grün bis bräunlich  
 Standort: frisch bis feucht; liebt nährstoffreiche Böden; halbschattig bis sonnig  
 Sonstiges: rechtswindende, frostharte Staude; erwerbsmäßiger Anbau von Hopfen für Brauereien zur Bierherstellung

**Kletterpflanzen**

m.Tb.	60-100	8,20	7,25	6,55
-------	--------	------	------	------

**HYDRANGEA - Saxifragaceae - HORTENSIE****arborescens 'Annabelle'**, Strauch-Hortensie 'Annabelle'

- Höhe: 1,0-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, aufrecht  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; hell- bis mittelgrün; keine Herbstfärbung  
 Blüte: Ende Juni bis Anfang September; erst grünlich, später rahmweiße Rispen bzw. große, flachkugelige Blütenbälle  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig; geschützt  
 Sonstiges: frosthart; sehr gut schattenverträglich

**arborescens 'Grandiflora'**, Strauch-Hortensie, Schneeball-Hortensie


- Höhe: 80-150 cm  
 Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig, Dickichte bildend  
 Laub: eiförmig  
 Blüte: Juli; cremeweiße, flachrunde Bälle  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt Schatten; windgeschützt

**Sträucher**

Co.	40-60	19,00	16,80
	60-100	26,20	23,10




Humulus lupulus




Humulus lupulus

Hydrangea arborescens  
'Annabelle'Hydrangea arborescens  
'Grandiflora'



Hydrangea aspera 'Macrophylla'

Hydrangea macrophylla  
'Bouquet Rose'Hydrangea macrophylla  
'Bouquet Rose'

Hydrangea serrata 'Blue Bird'

**aspera 'Macrophylla',** Fell-Hortensie, Japan-Hortensie

Synonym: H. a. 'Strigosa'

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: straff aufrecht, geschlossen, geringe Ausläuferbildung

Laub: variabel, meist schmal eiförmig; rau behaart

Blüte: Juli bis August; weiß bis rosa, fertile Blüten rosa, violett oder bläulich;  
flache, kugelige Schirmrispen; wenige Randblüten

Frucht: braune Kapseln

Standort: frisch bis feucht, humos, kalkfeindlich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: spätfrostgefährdet

**Sträucher**

Co.	30-40	31,60	27,90
	40-60	42,00	37,20

**macrophylla-/ serrata-Sorten,** Garten-Hortensien,  
Bauern-Hortensien

Höhe: 60-200 cm

Wuchs: sehr dichtbuschig, breit wachsend, kugelförmig bis trichterförmig

Laub: eiförmig; keine Herbstfärbung

Blüte: Juni bis September; je nach Sorte in Farben; flach, rundlich bis  
ballförmig; auffallend

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, humos, kalkfeindlich; licht- bis  
halbschattig**Ballförmige:**

Sortenname	Blütenfarbe	Größe in cm
macro. 'Bela'	lila bis hellblau	130-150 cm
macro. 'Bodensee'	dunkelrosa bis hellblau	150-200 cm
macro. 'Bouquet Rose'	rosa bis helltürkisblau	bis 150 cm
macro. 'Endless Summer®'	blau bis rosa	bis 130 cm
m. 'Forever & Ever®Blue'	strahlend blau	bis 150 cm
m. 'Forever & Ever®Pink'	rosa	bis 150 cm
m. 'Forever & Ever® Red'	rot	bis 150 cm
macro. 'Freudenstein'	rosé bis violettrosa	bis 150 cm
macro. 'Masja'	tiefrosa bis violett; groß	bis 130 cm
macro. 'Soeur Thérèse'	weiß, im Verblühen blassrosa	170-200 cm
serrata 'Preziosa'	verschiedene Rosatöne	bis 150 cm

**Tellerförmige:**

macro. 'Blaumeise'	rosaviolett bis königsblau	bis 130 cm
macro. 'Blue Wave'	lilarosa und blau	bis 150 cm
macro. 'Kardinal'	bläulich-rot bis magentafarben	bis 150 cm
macro. 'Lanarth White'	weiß	bis 120 cm
macro. 'Libelle'	weiß; 10-15 cm	150-200 cm
serrata 'Bluebird'	violettweiß bis hellblau	150-200 cm

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

## HYDRANGEA

## Sträucher

Co.	20- 30	14,15	12,50
	30- 40	17,10	15,10

## Solitär

3xv.	m.B./Co.	40- 60	54,60
		60- 80	78,50
		80-100	114,00

## Rispenhortensien:

Sortenname	Blütenfarbe	Größe in cm
pan. 'Early Sensation'	erst weiß, dann burgundrot	200-250 cm
pan. 'Grandiflora'	große; weiße Rispen	150-200 cm
pan. 'Kyushu'	cremeweiß; stark duftend	200-250 cm
pan. 'Limelight'	hellgrünweiß, rosa abblühend	bis 250 cm
pan. 'Unique'	weiß-altrosa; breit	100-120 cm

## verpflanzte Sträucher

Co.	40- 60	16,20	14,25
	60- 80	26,90	23,80

## Solitär

3xv.	m.B./Co.	80-100	68,90
		100-125	89,00

## petiolaris, Kletter-Hortensie

- Höhe: kletternd 10-15 m, als Strauch bis 1,5 m  
 Wuchs: kletternd oder strauchig ausladend  
 Laub: eirundlich; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juni bis Juli; flache, weiße Schirmrispen; süß duftend  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkempfindlich; sonnig bis halbschattig




## Sträucher

Co.	30- 40	13,70	12,10
	40- 60	19,60	17,10
	60- 80	29,20	25,80

## Solitär


3xv.	Co.	60- 80	60,50	53,50
		80-100	82,50	72,80
4xv.	Co.	100-125	148,50	131,00
		125-150	210,00	

Hydrangea paniculata  
'Grandiflora'

Hydrangea paniculata 'Kyushu'



Hydrangea paniculata 'Unique'



Hydrangea petiolaris





Hydrangea quercifolia

**quercifolia**, Eichenblättrige Hortensie

- Höhe: bis 2 m  
 Wuchs: aufrecht; breitbuschig  
 Laub: erinnert an ein Eichenblatt; 3- bis 7-mal tief gelappt; prächtige orangefarbene bis dunkelrote Herbstfärbung  
 Blüte: weiße Rispen, die im Verblühen leicht rosa werden  
 Standort: frisch bis feucht, humos; sonnig bis halbschattig;  
 Sonstiges: frosthart bis mindestens -20 °C

**Sträucher**

Co.	30-40	26,20	23,10
	40-60	44,60	39,50



Hydrangea quercifolia

**sargentiana**, Samt-HortensieSynonym: *H. aspera sargentiana*

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: straff aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: länglich bis breit eiförmig; groß; rau behaart  
 Blüte: Juli bis September; flache Schirmrispen; weiß und helllila  
 Frucht: wenig auffallend; Fruchtstand bis Frühjahr haftend  
 Standort: frisch bis feucht, humos, sandig lehmig, sauer; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: spätfrostempfindlich

**Sträucher**

Co.	25-30	26,90	23,80
	30-40	31,60	27,90

**Solitär**


3xv.	m.B./Co.	40-60	62,10
		60-80	80,50
		80-100	101,50



Hydrangea sargentiana

**Hydrangea serrata** - siehe *H. macrophylla***HYPERICUM** - Guttiferae - JOHANNISKRAUT, HARTHEU**calycinum**, Niedriges Johanniskraut, Kelchiges Johanniskraut

- Höhe: 20-30 cm  
 Wuchs: Blütentriebe aufrecht, bogig überhängend oder Boden aufliegend, Teppich bildend  
 Laub: wintergrün; länglich  
 Blüte: Juni bis Oktober; gelb; auffallend  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, locker, kalktolerant, sandig, humos; sonnig bis halbschattig



Hypericum calycinum

**Büsche**

m.Tb.	10- 15	4,75	4,20	3,81
	15- 20	5,45	4,80	4,36
	20- 30	6,25	5,50	4,96

**'Hidcote', Großblumiger Johannisstrauch**

Synonym: H. 'Hidcote Gold'

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: Grundtriebe straff aufrecht, später überhängend, dicht geschlossen, halbkugelig  
 Laub: halbimmergrün; eiförmig  
 Blüte: Juli bis Frost; gelb; auffallend  
 Frucht: selten ausgebildet  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig; sonnig bis lichtsattig



Hypericum calycinum

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	4,75	4,20	3,81
	30- 40	5,45	4,80	4,36
	40- 60	6,25	5,50	4,96

**moserianum, Hohes Johanniskraut**

- Höhe: 30-50 cm  
 Wuchs: breitbuschig, aufrecht  
 Laub: halbimmergrün; eiförmig; ledrig  
 Blüte: Juli bis Oktober; gelb; auffallend  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbsattig  
 Sonstiges: spätfrostgefährdet



Hypericum 'Hidcote'

**Büsche**

m.Tb.	15- 20	5,45	4,80	4,36
	20- 30	6,25	5,50	4,96
	30- 40	7,30	6,45	5,85

**patulum henryi, Himalaja-Johanniskraut**

Synonym: H. pseudohenryi

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, halbrund  
 Laub: halbimmergrün; lanzettlich bis eiförmig; im Herbst rötlich braun  
 Blüte: Juli bis September; gelb; auffallend  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbsattig



Hypericum moserianum

**Büsche**

m.Tb.	30- 40	5,45	4,80	4,36
	40- 60	6,95	6,15	5,55



Hypericum patulum henryi



Ilex altaclarenensis 'Golden King'

## ILEX - Aquifoliaceae - STECHPALME, HÜLSE

### altaclarenensis 'Golden King', Gelbbunte Garten-Hülse

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit kegelförmig  
 Laub: breiter, goldgelber Rand; wenig Blattdornen  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; weiblich; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; rot; giftig  
 Standort: mäßig trocken frisch, sandig lehmig, leicht kalkverträglich, absolut windgeschützt; halbschattig  
 Sonstiges: nicht zuverlässig frosthart

#### Büsche

m.B./Co.	30-40	40,10
	40-60	45,60
	60-80	72,50
	80-100	93,50

### aquifolium, Wald-Hülse, Gewöhnliche Hülse

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: meist mehrstämmig, sparrig, breit bis spitz kegelförmig  
 Laub: immergrün; eiförmig bis elliptisch; dornig gezähnt, ledrig; Haftdauer 1 bis 3 Jahre  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; klein; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; knallrot; auffallend; giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung über 300 Jahre

### aquifolium 'Alaska', Alaska-Hülse


- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: aufrecht, breitbuschig, dicht verzweigt  
 Laub: immergrün; eiförmig; stark bedornet  
 Blüte: Mai bis Juli; zweihäusig; teils zwittrig; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; knallrot; sehr reich fruchtend und lange haftend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich, sehr frosthart; licht- bis halbschattig

#### Büsche

m.B./Co.	40-60	31,60	27,90
	60-80	42,20	37,30
	80-100	46,80	41,40

#### Solitär


3xv.	m.B.	100-125	116,00	
		125-150	165,00	
4xv.	m.Db.	150-175	260,00	
		175-200	355,00	
		200-225	495,00	
5xv.	m.Db.	100-150	225-250	990,00
		250-275	1.280,00	



Ilex aquifolium



Ilex aquifolium 'Alaska'



Ilex aquifolium 'Alaska'

**aquifolium 'Argentea-Marginata',****Weißbunte Garten-Hülse**

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: sparrig, aufrecht, breit bis spitz kegelförmig  
 Laub: weißrandig; wenig Dornen  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; knallrot; auffallend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	40,10
	40- 60	45,60
	60- 80	72,50
	80-100	93,50

**aquifolium 'J.C. van Tol',** Fruchtende Garten-Hülse

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: immer mehrstämmig, breit ausladend, sparrig, hochgewölbt  
 Laub: immergrün; schmal eiförmig; wenig bedornt  
 Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; hellrot; auffallend; giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich; lichtschattig bis schattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	29,20	25,80
	60- 80	39,00	34,50
	80-100	53,30	47,10
	100-125	84,50	74,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	126,00	
		125-150	179,00	
4xv.	m.Db.	150-175	298,00	
		175-200	365,00	
		200-225	510,00	
5xv.	m.Db.	100-150	200-225	600,00
		225-250	970,00	
6xv.	m.Db.	150-200	225-250	1.640,00
		250-275	2.040,00	

Ilex aquifolium  
'Argentea-Marginata'

Ilex aquifolium 'J.C. van Tol'



Ilex aquifolium 'J. C. van Tol'



Ilex aquifolium 'Nellie R. Stevens'

## aquifolium 'Nellie R. Stevens', Baum-Hülse

Synonym: I. (cornuta x aquifolium) 'Nellie R. Stevens'

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: mehrstämmig, breit kegelförmig bis rundkronig  
 Laub: immergrün; grobnervig  
 Blüte: Mai bis Juni; unscheinbar  
 Frucht: ab Sommer; orangerot  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich;  
 lichtschattig bis schattig  
 Sonstiges: bereits als junge Pflanze überreich fruchtend

### Hochstämme

4xv.	m.Db.	14- 16	660,00
		16- 18	920,00
		18- 20	1.210,00
5xv.	m.Db.	20- 25	1.590,00
		25- 30	2.100,00

### Solitär-Bäume

6xv.	m.Db.	25- 30	150-200	400-500	3.230,00
		30- 35			3.970,00
		35- 40			4.900,00
		40- 45			6.050,00



Ilex aquifolium 'Nellie R. Stevens'

## aquifolium 'Pyramidalis', Schmale Garten-Hülse

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: straff aufrecht, schmal kegelförmig  
 Laub: immergrün; elliptisch; buchtig gezahnt  
 Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; unscheinbar  
 Frucht: ab September bis Winter; tiefrot; auffallend; giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kalkverträglich;  
 lichtschattig bis schattig

### Büsche

m.B./Co.	40- 60	29,20	25,80
	60- 80	39,00	34,50
	80-100	53,30	47,10
	100-125	84,50	74,60



Ilex aquifolium 'Pyramidalis'

### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	126,00	
		125-150	179,00	
4xv.	m.Db.	150-175	298,00	
		175-200	365,00	
		200-225	510,00	
5xv.	m.Db.	100-150	200-225	600,00
			225-250	970,00
6xv.	m.Db.	150-200	225-250	1.640,00
			250-275	2.040,00
			275-300	2.540,00



Ilex aquifolium 'Pyramidalis'

**crenata**, Berg-Hülse, Japan-Hülse, Kerbblättrige Hülse

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig, halbkugelig  
 Laub: immergrün; eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß  
 Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	15,60	13,90	12,60
	40- 50	20,50	18,10	16,40
	50- 60	28,40	25,10	
	60- 80	39,00	34,50	

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	93,50
		100-125	133,50
		125-150	189,00

**crenata 'Convexa'**, Löffel-Hülse

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breitbuschig, annähernd halbkugelig  
 Laub: immergrün; elliptisch; Blattspreite hochgewölbt  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß  
 Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	25- 30	14,15	12,50	11,35
	30- 40	18,50	16,30	14,75
	40- 50	25,50	22,50	

**Solitär**

3xv.	m.B.	50- 60	59,00
		60- 80	74,30
		80-100	104,00
4xv.	m.B.	100-125	148,50

**crenata 'Golden Gem'**, Gelbe Berg-Hülse


Höhe: 60-80 cm  
 Wuchs: breit ausladend; langsam wachsend  
 Laub: immergrün; goldgelb; später vergrünend  
 Standort: feucht, durchlässig, humos, nahrhaft; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	20- 25	19,90	17,60
	25- 30	23,60	20,80
	30- 40	27,70	




Ilex crenata



Ilex crenata 'Convexa'



Ilex crenata 'Convexa'



Ilex crenata 'Golden Gem'



Ilex crenata 'Green Lustre'

**crenata 'Green Lustre', Berg-Hülse 'Green Lustre'**

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: flach ausgebreitet, im Alter mehr aufrecht  
 Laub: immergrün; elliptisch, groß  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß  
 Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	25- 30	19,00	16,80	15,20
	30- 40	24,80	21,90	19,90
	40- 50	34,20	30,20	27,40



Ilex crenata 'Hetzii'

**crenata 'Hetzii', Strauchige Berg-Hülse**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breit aufrecht, rundlich  
 Laub: immergrün; elliptisch; Blattspreite flach gewölbt  
 Blüte: Mai bis Juni; zweihäusig; cremeweiß  
 Frucht: ab September bis Winter; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

**crenata 'Rotundifolia', Rundblättrige Berg-Hülse**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: buschig, aufrecht, dicht verzweigt  
 Laub: immergrün, eirundlich, glänzend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	19,00	16,80	15,20
	40- 50	24,80	21,90	19,90
	50- 60	34,20	30,20	
	60- 80	46,80	41,40	

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	93,50
		100-125	133,50
		125-150	189,00



Ilex crenata 'Stokes'

**crenata 'Stokes', Niedrige Berg-Hülse**

Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: kompakt, breit kissenförmig  
 Laub: immergrün; matt glänzend; elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juni; vorwiegend männlich  
 Frucht: selten  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, sauer, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	20- 25	19,90	17,60
	25- 30	23,60	20,80
	30- 40	27,70	24,50
	40- 50	40,10	35,40



Ilex crenata 'Stokes'

**meserveae 'Blue Angel'®**


- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig ohne Mitteltrieb  
 Laub: immergrün; schwarzgrün, stark gewellt, kräftige Blattdornen  
 Blüte: Mai; weiß; weiblich  
 Frucht: weniger zahlreich, aber größer als bei 'Blue Princess'  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: sehr frosthart



Ilex meserveae 'Blue Angel'®

**meserveae 'Blue Prince'®**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: buschig aufrecht, breit kegelförmig  
 Laub: immergrün; elliptisch; schwach gewellt, lorbeerartig glänzend, grob gezahnt, nicht stehend  
 Blüte: Mai; weiß; männlich; gilt als guter Pollenspender auch für I. aquifolium und Sorten  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: als Heckenpflanze bewährt, Schnitthöhe 150 bis 250 cm; sehr frosthart



Ilex meserveae 'Blue Prince'®

**meserveae 'Blue Princess'®**

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht  
 Laub: elliptisch; immergrün; schwach gewellt, spitz gezahnt, etwas stehend  
 Blüte: Mai; weiß; weiblich  
 Frucht: ab Oktober; Haftdauer bestimmen die Vögel; leuchtend hellrot; oft erst im 2. Jahr färbend bzw. reifend  
 Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: sehr frosthart



Ilex meserveae 'Blue Princess'®

**Büsche**

m.B.	30- 40	24,20	21,40
	40- 50	27,70	24,50
	50- 60	42,20	37,30
	60- 80	51,90	45,90


**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	116,50	
		100-125	148,50	
4xv.	m.Db.	80-100	125-150	298,00
5xv.	m.Db.	100-125	150-175	495,00
			175-200	715,00



Ilex meserveae 'Blue Princess'®





Ilex meserveae 'Blue Princess'®

**meserveae 'Heckenstar'®**

Höhe: 3 m +

Wuchs: breit säulenförmig aufrecht, dicht beastet

Laub: elliptisch; immergrün; schwach gewellt, spitz gezahnt, etwas stechend

Blüte: männliche Sorte

Standort: feucht bis frisch, sandig bis lehmig, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: sehr frosthart

**Büsche**

m.B.	30- 40	24,20	21,40
	40- 50	27,70	24,50
	50- 60	42,20	37,30
	60- 80	59,90	45,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	60- 80	91,00
		80-100	116,50
		100-125	148,50
4xv.	m.Db.	80-100	210,00
		100-125	298,00
		125-150	298,00

**verticillata, Korallen-Hülse, Gemeine Winterbeere**

Höhe: 2,5-3 m

Wuchs: breit aufrecht, sparrig, Ausläufer treibend

Laub: elliptisch bis lanzettlich, variabel; sommergrün; Herbstfärbung gelborange

Blüte: Juli bis August; zweihäusig; weiß; streng duftend

Frucht: Oktober bis Winter; rot; kugelig; auffallend

Standort: feucht bis nass, sauer, humos; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: gute Bienenweide

**Büsche**

m.B./Co.	60- 80	26,90
	80-100	36,00

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	91,00
		125-150	141,00
		150-175	216,00



Ilex verticillata

**ITEA - Escalloniaceae - ROSMARINWEIDE****virginica**, Amerikanische Rosmarinweide

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: länglich, spitz; Herbstfärbung leuchtend weinrot  
 Blüte: Juni; weiß, in Trauben; duftend  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: frisch bis mäßig feucht, mäßig nährstoffreich, sauer bis neutral, kalkfeindlich; sonnig  
 Sonstiges: nur mäßig düngen, damit Triebe gut ausreifen können

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	72,50
		100-125	101,50



Itea virginica

**JASMINUM - Oleaceae - ECHTER JASMIN****nudiflorum**, Winter-Jasmin

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht bis stark überhängend, ohne Halt Boden aufliegend  
 Laub: dreizählig gefingert  
 Blüte: Dezember bis April; gelb  
 Frucht: schwarze Beeren; selten  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig




Jasminum nudiflorum

**Kletterpflanzen**

Co.	40-60	11,10	8,55
	60-80	12,05	9,80

**Solitär**


3xv.	Co.	80-100	32,40	28,60
		100-150	51,90	45,90



Jasminum nudiflorum

**JUGLANS - Juglandaceae - NUSSBAUM****nigra**, Schwarznuss

- Höhe: 20-40 m  
 Wuchs: breit ausladend, rundlich bis eiförmig  
 Laub: gefiederte Blättchen, eiförmig bis lanzettlich; Endblättchen meist fehlend  
 Blüte: Juni; einhäusig; männliche in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten; kugelig  
 Frucht: ab September; kugelig; nicht essbar  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, Kalk liebend, lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: wird bis 250 Jahre alt



Juglans nigra



Juglans nigra

→ nigra

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.890,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00



Juglans regia

**regia, Walnuss**

Höhe: 15-18 (-20) m  
 Wuchs: locker, breit ausladend, fast rund  
 Laub: gefiedert; Blättchen eilänglich  
 Blüte: Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten grün; kugelig  
 Frucht: ab September; kugelig; dickschalig; Nüsse essbar  
 Standort: tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: frosthart bis -28 Grad C; Lebenserwartung bis zu 600 Jahre



**verpflanzte Heister**


o.B.	150-200	40,10	35,40
	200-250	49,30	43,60

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.890,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00



Juglans regia



Juglans regia

**Hinweise zu veredelten Walnussorten - siehe Obstteil**

**KALMIA - Ericaceae - LORBEERROSE****angustifolia 'Rubra', Rotes Lorbeerröschen,  
Kleiner Berglorbeer**

Höhe: 50-70 cm

Wuchs: straff aufrecht, Ausläufer treibend

Laub: immergrün; lanzettlich; graugrün

Blüte: Juni bis Juli; intensiv rosa; auffallend

Frucht: braune Kapseln

Standort: frisch bis nass, humos, sauer, nährstoffarm; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	20-30	26,20	23,10
	30-40	30,70	27,10

**latifolia, Großer Berglorbeer**

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: unregelmäßig breit aufrecht, sparrig

Laub: immergrün; elliptisch

Blüte: Mai bis Juni; zartrosa; auffallend

Frucht: braune Kapseln

Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, sauer; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: gut frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	25-30	30,70	27,10
	30-40	37,00	32,70

**latifolia 'Ostbo Red', Berglorbeer 'Ostbo Red'**

Höhe: bis 1,50 m

Wuchs: locker aufrecht, geschlossen

Laub: immergrün; lanzettlich; hellgrün

Blüte: Mai bis Juni; Knospe leuchtend rot, geöffnet zweifarbig rosa und rot

Frucht: braune Kapseln

**Büsche**


m.B./Co.	25-30	38,00	33,60
	30-40	46,80	41,40



Kalmia angustifolia 'Rubra'




Kalmia latifolia



Kalmia latifolia 'Ostbo Red'



Kalmia latifolia 'Ostbo Red'



Kerria japonica

## KERRIA - Rosaceae - RANUNKELSTRAUCH

### japonica, Gemeiner Ranunkelstrauch



- Höhe: 150-200 cm  
 Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: eirund; Austrieb früh; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: April bis Mai; dottergelb  
 Frucht: trockene Steinfrucht  
 Standort: frisch feucht, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: verträgt Vollschatten

#### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	40- 60	11,70	9,25	8,40
		60-100	14,90	12,20	11,05
	Co.	40- 60	13,40	11,85	
		60-100	16,60	14,65	

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	68,90		
		100-125	89,00		
		125-150	133,50		



Kerria japonica

### japonica 'Pleniflora', Gefüllter Ranunkelstrauch


- Höhe: 150-200 cm  
 Wuchs: breit aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: eilänglich; früher Austrieb; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; gefüllt; dottergelb; Nachblüte  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

#### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	40- 60	10,15	7,90	7,15
		60-100	13,45	10,90	9,90
	Co.	40- 60	13,80	12,20	
		60-100	16,60	14,65	

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	60,50		
		100-125	78,50		
		125-150	116,50		



Kerria japonica 'Pleniflora'



Kerria japonica 'Pleniflora'

**KOELREUTERIA - Sapindaceae - BLASENBAUM****paniculata, Gold-Blasenbaum**

- Höhe: 6-12 m  
 Wuchs: Strauch oder kleiner Baum; breit ausladend, pilzförmig  
 Laub: gefiedert; Austrieb hellrot; Herbstfärbung orange-gelb  
 Blüte: Juli bis August; gelbe, aufrechte Rispen  
 Frucht: ab September bis November; papierdünne, aufgeblasene Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, locker, durchlässig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: verträgt Trockenheit und Hitze

**Sträucher**

m.B.	80-100	36,00
	100-125	42,20

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	110,50
			150-175	157,00
			175-200	216,00
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	385,00
			250-300	545,00
			300-350	770,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.460,00
			350-400	1.940,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00
		16- 18		750,00
4xv.	m.Db.	18- 20		1.050,00
		20- 25		1.390,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	400-500	3.230,00
		35- 40			3.970,00
		40- 45			4.900,00
		45- 50			6.050,00

**paniculata 'Fastigiata', Säulen-Blasenbaum**

- Höhe: 8-10 m; Breite bis 2 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig  
 Laub: gefiedert; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli bis August; gelb; aufrechte Rispen  
 Frucht: ab September; papierdünne, aufgeblasene Kapseln  
 Standort: trocken bis frisch, locker, durchlässig, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: verträgt Wärme und Trockenheit



Koelreuteria paniculata



Koelreuteria paniculata



Koelreuteria paniculata

Koelreuteria paniculata  
'Fastigiata'



Kolkwitzia amabilis

→ **paniculata 'Fastigiata'**

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00
		25- 30	2.410,00

**KOLKWITZIA - Caprifoliaceae - KOLKWITZIE, SCHEINWEIGELIE**

**amabilis, Perlmutterstrauch**



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, später breit trichterförmig und bogig überhängend  
 Laub: breit eiförmig; bräunliche Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; rosaweiß; glockig; duftend; auffallend  
 Frucht: borstige Kapseln  
 Standort: mäßig trocken feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschatig



Kolkwitzia amabilis

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	13,40	10,90	9,90
		60-100	15,80	13,15	11,95
	Co.	40- 60	15,80	13,90	12,60
		60-100	19,50	17,20	15,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	57,60	50,90
		100-125	74,30	65,70
		125-150	110,50	97,50
4xv.	m.Db.	150-175	152,00	
		175-200	210,00	
		200-225	310,00	



Kolkwitzia amabilis

**LABURNUM - Leguminosae - GOLDREGEN**

**anagyroides, Gemeiner Goldregen, Bohnenbaum, Kleebaum**



Synonym: L. vulgare

Höhe: 4-7 m  
 Wuchs: breit trichterförmig  
 Laub: dreizählig; unterseits graugrün; behaart  
 Blüte: Mai bis Juni; gelbe, überhängende Trauben; duftlos  
 Frucht: ab September; Hülsenfrüchte; giftig  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschatig  
 Sonstiges: fast alle Pflanzenteile sind giftig (Cytisin)



Laburnum anagyroides

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück


LAGERSTROEMIA

**verpflanzte Sträucher**

Co.	60-100	12,05	10,65
	100-150	23,00	20,30

**watereri 'Vossii', Edel-Goldregen**

- Höhe: 5-6 m  
 Wuchs: trichterförmig, bogig übergeneigt  
 Laub: dreizählig; glänzend dunkelgrün  
 Blüte: Mai bis Juni; in tiefgelben, hängenden Trauben; duftend  
 Frucht: ab September, Hülsenfrüchte; giftig  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: fast alle Pflanzenteile sind giftig (Cytisin)



Laburnum watereri 'Vossii'

**verpflanzte Sträucher**

Co.	60-100	38,00	33,60
	100-150	57,60	50,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	157,00
		200-250	222,00
4xv.	m.Db.	250-300	355,00
		300-350	510,00
		350-400	750,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	291,00
		12- 14	400,00
		14- 16	545,00
4xv.	m.Db.	16- 18	795,00
		18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00



Laburnum watereri 'Vossii'

**LAGERSTROEMIA - Lythraceae - LAGERSTROEMIE****indica, Krepp-Myrthe**

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breit rundlich  
 Laub: elliptisch länglich  
 Blüte: Juli bis August; hellrosa; endständige Rispe  
 Frucht: ohne Bedeutung  
 Standort: trocken bis frisch, schwach sauer bis alkalisch, Kalk liebend; sonnig, Wärme liebend; außerordentlich trockenheitsresistent  
 Sonstiges: malerische Rindenzeichnung

**Solitär**

Co.	125-150	152,00
	150-175	210,00
	175-200	291,00



Laburnum watereri 'Vossii'



Lagerstroemia indica





Lagerstroemia indica

→ indica

**Hochstämme**

Co.	12- 14	530,00
	14- 16	750,00
	16- 18	1.020,00
	18- 20	1.390,00

**LAURUS - Lauraceae - LOORBEER****nobilis, Lorbeer**

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: aufrecht, buschig  
 Laub: schmal elliptisch; immergrün  
 Blüte: März; grünlich gelb  
 Frucht: ab Juni; schwarz; kugelig  
 Standort: trocken bis feucht, schwach sauer bis alkalisch, sandig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: getrocknete Blätter werden seit alters her als Küchengewürz verwendet

**Solitär**

Co.	125-150	120,00
	150-175	165,00
	175-200	229,00
	200-250	315,00



Lagerstroemia indica



Laurus nobilis

**LEDUM - Ericaceae - PORST****palustre, Sumpf-Porst (Syn. Rhododendron tomentosum bzw. palustre)**

Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: aufrecht, rundlich  
 Laub: immergrün; schmal länglich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; duftend; reichblühende Büschel  
 Frucht: braune Kapsel, unscheinbar  
 Standort: feucht bis nass, sauer, humos, torfig, Kalk fliehend; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

m.Tb.	20- 30	14,90	13,15
	30- 40	18,50	16,30




Ledum pallustre

**LESPEDEZA - Leguminosae - BUSCHKLEE****thunbergii**, Großblumiger BuschkleeSynonym: *Desmodium pendulifolium*

- Höhe: bis 1,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, bogig überhängend  
 Laub: dreiteilig; dunkelgrün  
 Blüte: August bis Oktober; purpurrosa Rispen; auffallend  
 Frucht: kurze Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, sandig lehmig, kalkfeindlich; sonnig

**Sträucher**

Co.	40-60	21,70	19,20
	60-100	26,90	23,80



Lespedeza thunbergii

**LEUCOTHOE - Ericaceae - LORBEERKRÜGLEIN, TRAUBENHEIDE****walteri**, Immergrünes Lorbeerkrüglein, Immergrüne TraubenheideSynonym: *L. catesbaei*; *L. fontanesiana*


- Höhe: 80-120 cm  
 Wuchs: breitbuschig, Ausläufer treibend  
 Laub: immergrün; eilanzettlich; Austrieb rötlich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Trauben; duftend  
 Frucht: braungraue Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffarm, humos, sauer; licht- bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	30-40	19,00	16,80
	40-60	26,20	23,10



Lespedeza thunbergii



Leucothoe walteri

**LIGUSTRUM - Oleaceae - RAINWEIDE, LIGUSTER****japonicum**, Japanischer Liguster

- Höhe: 5-8 m  
 Wuchs: breit eiförmig  
 Laub: immergrün; breit eiförmig  
 Blüte: Juli bis September; cremeweiße Rispen  
 Frucht: ab September; schwarz  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, schwach sauer bis alkalisch, humos, kalktolerant; sonnig bis halbschattig; im Weinbauklima ausreichend frosthart

Sonstiges: auch für Bonsai-Formen zu verwenden



Ligustrum japonicum

Ligustrum obtusifolium  
'Regelianum'

→ japonicum

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00

**obtusifolium 'Regelianum', Buschiger Liguster**

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschig, breit ausladend, sparrig  
 Laub: länglich; späte Herbstfärbung, bläulich violett  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, dichte Rispen; auffallend  
 Frucht: ab September; kleine schwarze Beeren; leicht giftig  
 Standort: trocken bis frisch, lehmig humos; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	10,50	8,30	7,50
		60-100	14,15	12,00	11,00

**Solitär**

3xv.	m.B.	60-100	60- 80	53,30	47,10
			80-100	68,90	60,90
			100-125	89,00	78,50



Ligustrum ovalifolium

**ovalifolium, Ovalblättriger Liguster**

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: straff aufrecht, angedeutet spitz kegelförmig  
 Laub: wintergrün; eiförmig bis länglich  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, aufrechte Rispen; stark duftend  
 Frucht: ab September; kugelige, schwarze Beeren; schwach giftig  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Bienennährgehölz; etwas frostempfindlich

**verpflanzte Sträucher**

6 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
8 Tr.	o.B.	60-100	8,65	6,50	5,90
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90



Ligustrum ovalifolium

**ovalifolium 'Aureum', Gold-Liguster**

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: straff aufrecht, angedeutet spitzkegelig  
 Laub: breit goldgelb gerandet oder fast ganz goldgelb  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße, aufrechte Rispen; stark duftend  
 Frucht: ab September; kugelige, schwarze Beeren; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig; sonnig  
 Sonstiges: Bienennährgehölz

**Sträucher**

	m.B./Co.	30- 40	13,00	11,50
		40- 60	17,10	15,10



Ligustrum ovalifolium 'Aureum'

**vulgare**, Gemeiner Liguster, Zaunriegel

Höhe: 2-5 m  
 Wuchs: breit ausladend, sparrig  
 Laub: eilänglich bis lanzettlich; fest; dunkelgrün  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend  
 Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: schattenverträglich

**verpflanzte Sträucher**

6 Tr.	o.B.	60-100	6,60	4,85	4,40
8 Tr.	o.B.	60-100	7,70	5,70	5,15
	Co.	40- 60	11,10	9,80	8,90
		60-100	12,35	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,70	
		125-150	65,40	57,80	
		150-175	84,50		
4xv.	m.Db.	175-200	120,00		
		200-250	170,00		



Ligustrum vulgare



Ligustrum vulgare

**vulgare 'VKG 3 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigener Gemeiner Liguster, Zaunriegel aus Vorkommensgebiet 3 bis 6

Höhe: 2-5 m  
 Wuchs: breit ausladend, sparrig  
 Laub: eilänglich bis lanzettlich; fest; dunkelgrün  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend  
 Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

6 Tr.	o.B.	60-100	9,20	7,05	6,40
8 Tr.	o.B.	60-100	10,50	8,30	7,50



Ligustrum vulgare

**vulgare 'Atrovirens'**, Schwarzgrüner Liguster

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: straff aufrecht, später breit ausladend  
 Laub: wintergrün; eilänglich; im Winter violett braun  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend  
 Frucht: ab September; glänzend schwarz; kugelige Beeren; schwach giftig  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: schattenverträglich



Ligustrum vulgare 'Atrovirens'

→ **vulgare 'Atrövirens'**

**verpflanzte Sträucher**

6 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
8 Tr.	o.B.	60-100	8,65	6,50	5,90
	Co.	40- 60	11,10	9,80	8,90
		60-100	12,35	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,70	
		125-150	65,40	57,80	
		150-175	84,50		
4xv.	m.Db.	175-200	120,00		
		200-250	570,00		

**vulgare 'Lodense', Zwerg-Liguster**

Synonym: L. v. 'Nanum'

- Höhe: 50-70 cm  
 Wuchs: kompakt, halbkugelig  
 Laub: wintergrün; schmal elliptisch; im Winter bronzebraun  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen; duftend  
 Frucht: ab September; glänzend schwarze, kugelige Beeren; schwachgiftig  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: schattenverträglich

**verpflanzte Sträucher**


5 Tr.	o.B.	30- 40	7,30	5,40	4,90
		40- 60	9,90	7,75	7,05
	Co.	20- 30	12,05	10,65	9,65
		30- 40	13,40	11,85	10,75
		40- 60	16,60	14,65	13,30

**LIQUIDAMBAR - Hamamelidaceae - AMBERBAUM**


**styraciflua, Amerikanischer Amberbaum, Storaxbaum, Seesternbaum**



- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: schmal, spitz kegelförmig, später hoch gewölbt eiförmig  
 Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung vielfarbig von gelb, orange, rot bis karminviolett, rot herrscht vor  
 Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten aufrecht, weibliche Blüten hängend; kugelig  
 Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln  
 Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer; sonnig bis lichtschattig




Ligustrum vulgare 'Atrövirens'



Ligustrum vulgare 'Lodense'



Ligustrum vulgare 'Lodense'



Liquidambar styraciflua

**verpflanzte Heister**

m.B.		100-125	40,10
		125-150	56,00

**Solitär**

3xv.	m.B.		150-175	104,00
			175-200	148,50
			200-250	204,00
4xv.	m.Db.		250-300	276,00
			300-350	400,00
5xv.	m.Db.	150-200	300-350	585,00
			350-400	820,00
			400-500	1.150,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		340,00
		14- 16		475,00
		16- 18		680,00
		18- 20		900,00
		20- 25		1.050,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.270,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	300-400	500-700	3.320,00
		35- 40			3.970,00
		40- 45			4.900,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	7.500,00
		50- 60			9.450,00

**styraciflua 'Gumball', Kugel-Amberbaum**

Höhe: 3-4 m

Wuchs: kugelförmig

Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung in vielen Rottönen

Blüte: noch nicht beobachtet

Frucht: noch nicht beobachtet

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend;  
sonnig bis lichtschtattig


Sonstiges: Rinde mit Korkleisten; Frühjahrspflanzung ratsam

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		475,00
		14- 16		670,00
		16- 18		910,00
		18- 20		1.280,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.740,00
		25- 30		2.220,00



Liquidambar styraciflua



Liquidambar styraciflua



Liquidambar styraciflua



Liquidambar styraciflua 'Gumball'



Liquidambar styraciflua 'Moraine'

## styraciflua 'Moraine', Amberbaum 'Moraine'

- Höhe: 10-20 m  
 Wuchs: pyramidal, später kegelförmig  
 Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung rot  
 Blüte: April bis Mai; grünlich gelb  
 Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln  
 Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend;  
 sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
		20- 25	1.050,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.270,00

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00



Liquidambar styraciflua 'Red Star'

## styraciflua 'Red Star', Amberbaum 'Red Star'

- Höhe: 12-15 m hoch, ca. 5 m breit  
 Wuchs: schmal kegelförmig, langsam wachsend  
 Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangerot; auffallend  
 Blüte: unscheinbar  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend;  
 sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam



Liquidambar styraciflua 'Red Star'

## styraciflua 'Slender Silhouette', Säulen-Amberbaum

- Höhe: bis 15 m, ca. 1,5 m breit  
 Wuchs: schmale Säulenform  
 Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung variiert von orange, scharlach-  
 bis weinrot  
 Blüte: unscheinbar  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend;  
 sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

Liquidambar styraciflua 'Slender  
Silhouette'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00
		16- 18		750,00
		18- 20		1.020,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.840,00
		25- 30			2.290,00
		30- 35			2.830,00

**styraciflua 'Worplesdon',  
Amberbaum 'Worplesdon'**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: schmal kegelförmig, später breiter

Laub: fünf- bis siebenlappig; Herbstfärbung orangerot; auffallend

Blüte: April bis Mai; grünlich gelb

Frucht: Herbst bis Winter; kugelige, verholzte Kapseln

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, sauer, Kalk meidend;  
sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		340,00
		14- 16		479,00
		16- 18		680,00
		18- 20		900,00
		20- 25		1.050,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.270,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.730,00
		25- 30			2.160,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.410,00
		30- 35			2.980,00
		35- 40			3.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	300-400	500-700	3.320,00
		35- 40			3.970,00
		40- 45			4.900,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	7.500,00
		50- 60			9.450,00

Liquidambar styraciflua  
'Worplesdon'Liquidambar styraciflua  
'Worplesdon'



**LIRIODENDRON - Magnoliaceae - TULPENBAUM**

**tulipifera, Gemeiner Tulpenbaum**



Liriodendron tulipifera

- Höhe: 20-25 m
- Wuchs: kegelförmig, im Alter breit ausladend, hochgewölbt
- Laub: Umriss fast viereckig, ungewöhnliche Form; Herbstfärbung goldgelb
- Blüte: Mai bis Juni; tulpenförmig; aufrecht; gelborange
- Frucht: Herbst; länglich verholzte Zapfen, im Winter abfallend
- Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig
- Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Solitär**

3xv.	m.Db.		200-250	145,00
			250-300	204,00
4xv.	m.Db.	150-200	300-350	420,00
			350-400	600,00
			400-450	845,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	225,00
		12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
20- 25	970,00		
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.830,00
		35- 40			3.490,00
		40- 45			4.300,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	5.300,00
		45- 50			6.600,00



Liriodendron tulipifera




Liriodendron tulipifera

**tulipifera 'Fastigiatum', Säulen-Tulpenbaum**

- Höhe: 15-18 m
- Wuchs: breit säulenförmig
- Laub: Umriss fast viereckig; Herbstfärbung gelb
- Blüte: Mai bis Juni; tulpenförmig
- Frucht: Herbst; verholzte Zapfen
- Standort: Kulturböden; frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, tiefgründig; sonnig
- Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

**Solitär**

3xv.	m.B.	175-200	179,00
		200-250	260,00




Liriodendron tulipifera

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
4xv.	m.Db.	250-300	450,00		
		300-350	640,00		
		350-400	895,00		
5xv.	m.Db.	60-100	350-400	1.540,00	
			400-500	2.160,00	
			500-600	2.910,00	

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00	
		14- 16		545,00	
		16- 18		750,00	
		18- 20		1.020,00	
4xv.	m.Db.	20- 25		1.390,00	
		25- 30		1.840,00	
		30- 35		2.410,00	



Liriodendron tulipifera  
'Fastigiatum'



Liriodendron tulipifera  
'Fastigiatum'

## LONICERA - Caprifoliaceae - HECKENKIRSCHEN, GEISSSCHLINGE, GEISSBLATT

### brownii 'Dropmore Scarlet', Rote Geißschlinge

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: Schlingstrauch, buschig verzweigt, feintriebig  
 Laub: elliptisch; blaugrün  
 Blüte: Juni bis September; orangerot; nicht duftend  
 Frucht: ab September bis Winter; klein; kugelig; orangerot  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: extrem frosthart

### brownii 'Fuchsoides', Fuchsienblütige Geißschlinge

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: buschig verzweigt, feintriebig, schwach windend  
 Laub: elliptisch; blaugrün  
 Blüte: Mai bis August; dunkelorange; nicht duftend  
 Frucht: ab September bis Winter; selten  
 Standort: frisch bis feucht, sandig bis lehmig; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: gute Winterhärte



Lonicera brownii  
'Dropmore Scarlet'

### Kletterpflanzen

2 Tr.	m.Tb.	60-100	10,50	9,25	8,40
-------	-------	--------	-------	------	------

### Solitär

3xv.	Co.	100-150	36,00	31,80	
		150-200	50,60	44,70	
		200-250	70,60	62,40	



Lonicera brownii 'Fuchsoides'



Lonicera caerulea


**caerulea, Blaue Heckenkirsche**



Höhe: 1,0-2,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig, aufrecht, rundlich  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; dunkelgrün; keine Herbstfärbung  
 Blüte: April bis Mai; gelblich weiß; röhrig trichterförmig  
 Frucht: kugelig; schwarz und hellblau bereift; verwachsene Doppelbeere  
 Standort: sauer bis neutral, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	7,95	5,90	5,35
5 Tr.	o.B.	60-100	10,80	8,55	7,75



Lonicera caprifolium

**caprifolium, Jelängerjelieber, Echtes Geißblatt**



Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: buschig verzweigt, mittelstark windend  
 Laub: elliptisch bis eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; besonders abends duftend  
 Frucht: September bis November; orangerote Beeren  
 Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig



Lonicera heckrottii

**heckrottii, Feuer-Geißschlinge**



Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: buschig verzweigt, locker windend  
 Laub: breit elliptisch; bläulich grün  
 Blüte: Juni bis September, Nachblüte mitunter bis zum Frost; zweifarbig rot und gelb; duftend  
 Frucht: ab September bis Winter; rote, kugelige Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; licht- bis halbschattig

**heckrottii 'Goldflame', Feuer-Geißschlinge 'Goldflame'**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: starkwüchsiger als L. heckrottii; stark windend  
 Laub: breit elliptisch; dunkel bläulich grün  
 Blüte: Juni bis September; orangerot; duftend  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: siehe L. heckrottii  
 Sonstiges: frohart



Lonicera heckrottii 'Goldflame'

**henryi, Immergrüne Geißschlinge**



Höhe: 3-4 (-6) m  
 Wuchs: buschig, schleppenartig überhängend, stark windend  
 Laub: immergrün; lanzettlich  
 Blüte: Juni bis Juli; gelb bis rot  
 Frucht: ab August bis September; kugelige, schwarze Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich; halbschattig

Stamm-  
umfang


Größe in cm

Stückpreis in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

LONICERA

**Kletterpflanzen**

2 Tr. m.Tb. 60-100 12,70 11,20 10,15

**Solitär**3xv. Co. 100-150 40,10 35,40  
150-200 56,00 49,50  
200-250 78,50 69,10**japonica 'Repens', Kriechende Heckenkirsche**Synonym: *L. acuminata*, *L. flexuosa*, *L. j. 'Dart's Acumen'*Höhe: 60-100 cm, kletternd 3-4 m  
Wuchs: Schlingstrauch, ohne Halt über den Boden kriechend  
Laub: halbbimmergrün; elliptisch  
Blüte: Juni bis Juli; cremegelb; duftend  
Frucht: ab September; rote Beeren  
Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig, Kalk liebend; licht- bis halbschattig**Büsche**m.Tb. 30- 40 6,60 5,80 5,25  
40- 60 7,70 6,80 6,15**ledebourii, Großblättrige Heckenkirsche**Synonym: *L. involucrata ledebourii*Höhe: 2-3,5 m  
Wuchs: breitbuschig, trichterförmig  
Laub: eiförmig bis lanzettlich  
Blüte: Mai bis Juni; rötlich gelb  
Frucht: ab August; glänzend schwarz; kugelige Beeren  
Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis schattig**verpflanzte Sträucher**4 Tr. o.B. 100-150 7,30 5,40 4,90  
Co. 60-100 11,45 10,10 9,15**Solitär**3xv. m.B. 150-200 70,60  
200-250 96,50  
250-300 133,50**maackii, Schirm-Heckenkirsche, Baum-Heckenkirsche**Höhe: 3-5 m  
Wuchs: schirmförmig überhängend, dichtbuschig  
Laub: eiförmig bis elliptisch; glänzend dunkelgrün  
Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; angenehm duftend  
Frucht: ab August; leuchtend rote Beeren  
Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis halbschattig


Lonicera henryi



Lonicera ledebourii




Lonicera ledebourii



Lonicera ledebourii





Lonicera maackii

→ maackii

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	10,20	8,00	7,20
4 Tr.	o.B.	100-150	13,80	11,30	10,20
	Co.	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	48,10		
		150-200	62,10		
		200-250	86,50		
		250-300	123,00		

**morrowii, Filzige Heckenkirsche**



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: eiförmig; früher Austrieb  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß  
 Frucht: ab August; leuchtend blutrote Beeren  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Natur- und Kulturböden, auch auf Schütt- und Rohböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,95	5,85	5,30
4 Tr.	o.B.	100-150	10,80	8,55	7,75



Lonicera maackii

**nitida 'Elegant', Heckenmyrte**

Synonym: L. pileata 'Yunnanensis'

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: aufrecht, unregelmäßig, dichtbuschig  
 Laub: immergrün; eiförmig; dunkelgrün; leicht glänzend  
 Blüte: Mai; cremeweiß; leicht duftend  
 Frucht: ab August; kugelig; purpurn  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: in rauen Lagen und Polarwintern nicht ausreichend frosthart



Lonicera maackii

**nitida 'Maigrün', Flache Heckenmyrte**

Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, kompakt  
 Laub: immergrün; eiförmig; hell- bis gelbgrün; glänzend  
 Blüte: nicht beobachtet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: in rauen Lagen und Polarwintern nicht ausreichend frosthart



Lonicera nitida 'Maigrün'

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	2,95	2,61	2,37
	30- 40	3,85	3,40	3,09
	40- 60	5,00	4,42	4,00

**periclymenum**, Wald-Geißblatt

- Höhe: 3-6 m  
 Wuchs: rechts windend, schlingend  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; unterseits bläulich  
 Blüte: Mai; gelblich weiß; abends süßer Duft  
 Frucht: ab August; kugelig; rot; leicht giftig  
 Standort: frisch bis feucht, sauer, sandig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig



Lonicera nitida 'Maigrün'

**Kletterpflanzen**

2 Tr.	m.Tb.	60-100	10,50	9,25	8,40
-------	-------	--------	-------	------	------

**pileata**, Böschungsmyrte

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: flach ausgebreitet, nestförmig  
 Laub: immergrün; länglich lanzettlich; dunkelgrün; glänzend  
 Blüte: Mai; cremeweiß; duftend  
 Frucht: ab August; kugelige, purpurviolette Beeren  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: schattenverträglich; frosthärter als L. nitida 'Elegant'



Lonicera periclymenum

**Büsche**

m.Tb.	20- 30	2,95	2,61	2,57
	30- 40	3,85	3,40	3,09
	40- 60	5,00	4,42	4,00

**purpusii**, Winterduft-Heckenkirsche

- Höhe: 2-3,5 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: wintergrün; lanzettlich  
 Blüte: Dezember bis Februar; rahmweiß; duftend  
 Frucht: ab März; rot  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, schwach sauer bis alkalisch, kalktolerant; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: anspruchsloser Winterblüher



Lonicera pileata

**verpflanzte Sträucher**


Co.	40- 60	23,60
	60-100	30,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	59,00
		100-125	80,50
		125-150	110,50



Lonicera purpusii



Lonicera tatarica

**tatarica, Tatarische Heckenkirsche**



Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: aufrecht, breit ausladend, trichterförmig  
 Laub: eiförmig bis lanzettlich; bläulich grün; früher Austrieb  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß bis rot; duftlos  
 Frucht: ab August bis September; kugelig; hellrot  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	6,05	4,40	4,00
4 Tr.	o.B.	100-150	8,20	6,15	5,50
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	70,60		
		200-250	98,50		
		250-300	141,00		



Lonicera tatarica

**tellmanniana, Gold-Geißschlinge**




Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: dicht verzweigt, bogig überhängend, stark windend  
 Laub: breit elliptisch bis eiförmig; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juli; gelborange; ohne Duft  
 Frucht: ab August; orangerote Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: ausreichend winterhart

**Kletterpflanzen**

2 Tr.	m.Tb.	60-100	10,50	9,25	8,40
-------	-------	--------	-------	------	------

**Solitär**

3xv.	Co.	100-150	36,00	31,80	
		150-200	50,60	44,70	
		200-250	70,60	62,40	



Lonicera tellmanniana


**xylosteum, Gemeine Heckenkirsche, Beinholz**



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: dichtbuschig, breit ausladend  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; mattgrün bis grau; früher Austrieb; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß; duftend  
 Frucht: ab August/September; kugelig; rot; leicht giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, Kalk liebend; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,05	4,40	4,00
5 Tr.	o.B.	100-150	8,20	6,15	5,50
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90



Lonicera xylosteum

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	70,60
		200-250	98,50
		250-300	141,00

**xylosteoides 'Clavey's Dwarf', Niedrige Heckenkirsche**

Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: dichtbuschig aufrecht, kompakt  
 Laub: eiförmig; blaugrün; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; gelblich weiß  
 Frucht: ab August bis September; kugelig; rot; leicht giftig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: extrem salzresistent

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	40- 60	7,30	5,40	4,90
5 Tr.	o.B.	60-100	9,90	7,75	7,05
	Co.	30- 40	12,05	10,65	9,65
		40- 60	13,40	11,85	10,75

**LYCIUM - Solanaceae - BOCKSDORN,  
TEUFELSZWIRN****barbarum, Gemeiner Bocksdorn**Synonym: *L. halmifolium*

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: weit bogig überhängend, dichtbuschig, Ausläufer treibend  
 Laub: lanzettlich; graugrün  
 Blüte: Juni bis September; purpurne Glöckchen  
 Frucht: ab August; eiförmige, scharlachrote Beeren; nicht essbar  
 Standort: trocken bis frisch, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	6,05	4,40	4,00
4 Tr.	o.B.	100-150	8,45	6,30	5,70
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

Loniceraxylosteoides  
'Clavey's Dwarf'Loniceraxylosteoides  
'Clavey's Dwarf'

Lycium barbarum





Maackia amurensis

## MAACKIA - Leguminosae - GELBHOLZ

### amurensis, Asiatisches Gelbholz



Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: breit trichterförmig, ausladend  
 Laub: gefiedert; bis 30 cm lang  
 Blüte: Juli bis August; gelbweiß; aufrechte Traube; auffallend  
 Frucht: ab Herbst; Hülse  
 Standort: bodentolerant, frisch bis feucht, humos, sandig, lehmig, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: korkige Rinde im Alter abblätternd

#### Solitär

3xv.	m.B.		100-125	93,50
			125-150	129,50
			150-175	179,00
			175-200	247,00
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	385,00
			250-300	545,00

## MAGNOLIA - Magnoliaceae - MAGNOLIE

### 'Galaxy', Magnolie 'Galaxy'



Magnolia 'Galaxy'

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: kegelförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: April bis Mai; dunkel rosarot; leichter Duft  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: Kreuzung aus M. lilliflora 'Nigra' x M. sprengeri 'Diva'


#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00
4xv.	m.Db.	16- 18		795,00
		18- 20		1.050,00
		20- 25		1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30		1.840,00
		30- 35		2.410,00

Magnolia grandiflora  
'Gallisonière'

**grandiflora 'Gallisonière', Großblütige Magnolie 'Gallisonière'**

- Höhe: 8-10 m hoch, 3-5 m breit  
 Wuchs: kegelförmig, dicht geschlossen  
 Laub: immergrün; verkehrt eiförmig; glänzend  
 Blüte: Mai bis August; rahmweiß; sehr groß, bis 25 cm; Zitronenduft  
 Frucht: ab September, Sammelbalgfrucht; wenig fruchtend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humusreich, sauer bis neutral, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

Magnolia grandiflora  
'Gallisonière'**grandiflora 'Victoria', Großblütige Magnolie 'Victoria'**

- Höhe: 8- 12 m  
 Wuchs: kegelförmig, dicht geschlossen  
 Laub: dunkelgrün; ledrig; glänzend  
 Blüte: ab Mai, vereinzelt auch später noch; weiß; bis 25 cm; tulpenartig  
 Standort: sonnig

Magnolia grandiflora  
'Victoria'**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-250	640,00
		250-300	895,00
		300-350	1.240,00
		350-400	1.730,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.890,00
		25- 30	2.470,00

**kewensis 'Wada's Memory'**

- Höhe: bis 9 m hoch, bis 4 m breit  
 Wuchs: kompakter, aufrechter Wuchs  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: duftend; weiße Blüten; bis 15 cm Durchmesser; April/Mai  
 Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis absonnig



Magnolia grandiflora 'Victoria'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
4xv.	m.Db.	16- 18	795,00
		18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00

Magnolia kewensis  
'Wada's Memory'



Magnolia kobus

## kobus, Baum-Magnolie

Höhe: 8-10 m

Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend

Laub: verkehrt eiförmig; Herbstfärbung gelblich

Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß

Frucht: ab Spätsommer; rot

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, humos; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

### Solitär

3xv.	m.Db.		125-150	110,00
			150-175	157,00
			175-200	222,00
			200-250	315,00
4xv.	m.Db.	100-150	250-300	750,00
			300-350	1.020,00
			350-400	1.390,00
5xv.	m.Db.	150-200	300-350	1.390,00
			350-400	1.890,00
			400-450	2.540,00
6xv.	m.Db.	200-300	350-400	2.830,00
			400-450	3.780,00

### Hochstämme


3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
4xv.	m.Db.	16- 18	795,00
		18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

### Solitär-Bäume

5xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00
6xv.	m.Db.	30- 35	150-200	400-500	2.910,00
		35- 40			3.580,00
		40- 45			4.410,00
		45- 50			5.450,00



Magnolia kobus



Magnolia kobus

**liliiflora 'Nigra',** Purpur-MagnolieSynonym: *M. soulangiana* 'Nigra'

Höhe: 3-4 m

Wuchs: dichtbuschig, breit aufrecht

Laub: verkehrt eiförmig

Blüte: April bis Mai; zeitgleich mit Austrieb; rubinrot, innen weißlich; häufig  
NachblüteStandort: frisch bis feucht, humos, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis  
absonnig

Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

m.B./Co.	40-60	41,10
	60-80	56,00
	80-100	82,50

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	149,00
		100-125	205,00
4xv.	m.Db.	125-150	370,00
		150-175	530,00
5xv.	m.Db.	100-150	175-200
		200-225	1.390,00

**liliiflora 'Susan',** Magnolie 'Susan'Synonym: *M. 'Susan'*

Höhe: 2-4 m

Wuchs: dichtbuschig, breit kegelförmig

Laub: verkehrt eiförmig

Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; lilienförmig; violettrot; duftend

Frucht: unbedeutend

Standort: frisch bis feucht, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig


Sonstiges: blüht schon als junge Pflanze

**Sträucher**

m.B./Co.	40-60	41,10
	60-80	56,00

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	149,00
		100-125	205,00
4xv.	m.Db.	125-150	370,00
		150-175	530,00



Magnolia liliiflora 'Nigra'



Magnolia liliiflora 'Nigra'



Magnolia liliiflora 'Susan'



Magnolia liliiflora 'Susan'



Magnolia loebneri 'Leonard Messel'

## loebneri 'Leonard Messel', Großblumige Stern-Magnolie 'Leonard Messel'

Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breitbuschig, malerisch aufgelockert  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; sternförmig; außen rosa, innen weiß  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Frühjahrspflanzung ratsam

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	56,00
	80-100	82,50

### Solitär

3xv.	m.Db.		100-125	102,00
			125-150	145,00
			150-175	204,00
			175-200	290,00
4xv.	m.Db.	100-150	200-225	560,00
			225-250	750,00
			250-300	990,00



Magnolia loebneri 'Leonard Messel'

## loebneri 'Merrill', Großblumige Stern-Magnolie

Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; sternförmig; zwei Lagen Blütenblätter; weiß; duftend  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Frühjahrspflanzung

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	56,00
	80-100	82,50
	100-125	114,00

### Solitär

3xv.	m.Db.		125-150	145,00
			150-175	204,00
			175-200	290,00
4xv.	m.Db.	100-150	200-225	560,00
			225-250	750,00
			250-300	990,00
			300-350	1.150,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	865,00
			250-300	1.150,00
			300-350	1.500,00



Magnolia loebneri 'Merrill'



Magnolia loebneri 'Merrill'

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
6xv.	m.Db.	200-300	350-400 400-450	3.060,00 4.410,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16		400,00 545,00	
4xv.	m.Db.	16- 18 18- 20 20- 25		795,00 1.050,00 1.390,00	

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25 25- 30 30- 35	100-150	400-500	1.690,00 2.100,00 2.600,00
------	-------	----------------------------	---------	---------	----------------------------------

**Solitär-Bäume**

6xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45 45- 50	150-200	400-500	2.910,00 3.580,00 4.410,00 5.450,00
------	-------	--------------------------------------	---------	---------	--

**sieboldii, Sommer-Magnolie**Synonym: *M. parviflora*

Höhe: 2-4 m

Wuchs: breit ausladend, rundlich, locker bis dicht

Laub: breit elliptisch; Herbstfärbung gelblich

Blüte: Juni bis Juli; schalenförmig; cremeweiß; duftend

Frucht: gurkenförmig; lilarosa

Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend, nahrhaft; licht- bis halbschattig


Sonstiges: Frühjahrspflanzung

**Sträucher**


m.B./Co.	60- 80	56,00
	80-100	82,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100 100-125	116,00 161,00	
4xv.	m.Db.	125-150 150-175	370,00 530,00	
4xv.	m.Db.	100-150	175-200 200-225 225-250	675,00 945,00 1.320,00



Magnolia sieboldii



Magnolia sieboldii



Magnolia soulangiana

## soulangiana, Tulpen-Magnolie


- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: kurzer Stamm, Krone offen, sparrig, breit ausladend  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; tulpenförmig; weiß mit rosa  
 Frucht: walzenförmig; rot  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig  
 Sonstiges: Frühjahrs-pflanzung

### Sträucher

m.B./Co.	60- 80	45,60
	80-100	60,50

### Solitär

3xv.	m.B.		100-125	123,00
			125-150	184,00
4xv.	m.Db.	100-150	150-175	254,00
			175-200	365,00
			200-225	510,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-225	715,00
			225-250	990,00
			250-275	1.390,00




Magnolia soulangiana

## soulangiana 'Heaven Scent', Tulpen-Magnolie 'Heaven Scent'

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig  
 Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; tulpenförmig; weiß mit rosa  
 Frucht: walzenförmig; rot  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, humos, Kalk meidend; sonnig  
 Sonstiges: Frühjahrs-pflanzung ratsam

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
4xv.	m.Db.	16- 18	795,00
		18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00



Magnolia stellata

## stellata, Stern-Magnolie

- Höhe: selten über 2 m  
 Wuchs: trichterförmig, später breitbuschig, rundlich  
 Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung bräunlich gelb  
 Blüte: März bis April; vor Austrieb; sternförmig; weiß; duftend  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: wird so gut wie nie von Schädlingen und Krankheiten befallen



Magnolia stellata

**stellata 'Royal Star', Stern-Magnolie 'Royal Star'**

- Höhe: selten über 3 m  
 Wuchs: breitbuschig, stärker als die Art  
 Laub: grün; wechselständig; um 8 cm  
 Blüte: April; vor Austrieb; reinweiß; größer als von *M. stellata*  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschtig  
 Sonstiges: noch frosthärter als der Sämling

**Sträucher**


m.B./Co.	40- 60	41,10
	60- 80	56,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	80-100	152,00	
		100-125	216,00	
5xv.	m.Db.	125-150	310,00	
		150-175	460,00	
6xv.	m.Db.	100-150	150-175	695,00
		175-200	970,00	
		200-225	1.350,00	



Magnolia stellata 'Royal Star'



Mahonia aquifolium

**MAHONIA - Berberidaceae - MAHONIE, FIEDERBERBERITZE****aquifolium, Gewöhnliche Mahonie**


- Höhe: 50-100 cm  
 Wuchs: kompakt, halbrund  
 Laub: immergrün; gefiedert; im Austrieb kupfrig, im Winter violettbraun  
 Blüte: April bis Mai; aufrechte, tiefgelbe Trauben  
 Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, sandig lehmig bis lehmig, humos; sonnig bis lichtschtig  
 Sonstiges: schattenverträglich



Mahonia aquifolium


**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	30- 40	6,75	5,00	4,50
		40- 60	9,45	7,30	6,60
	m.B./Co.	30- 40	12,35	10,90	9,90
		40- 60	14,90	13,15	12,00



Mahonia aquifolium 'Apollo'





Mahonia aquifolium 'Apollo'

**aquifolium 'Apollo', Niedrige Mahonie, Zwerg-Mahonie**

- Höhe: 50-70 cm  
 Wuchs: breitbuschig, Ausläufer treibend  
 Laub: immergrün; gefiedert; Herbst-, Winter- und Austriebsfärbung braunrot  
 Blüte: April bis Mai; aufrechte, tiefgelbe Trauben  
 Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, lehmig, humos; sonnig bis lichtschtattig  
 Sonstiges: schattenverträglich, sehr frosthart

**Büsche**

m.B./Co.	20- 25	20,50	18,10	16,40
	25- 30	24,50	21,40	19,40
	30- 40	29,20	25,80	23,40



 Mahonia aquifolium  
'Atropurpurea'

**aquifolium 'Atropurpurea', Winterrote Mahonie**

- Höhe: 50-70 cm  
 Wuchs: aufrecht, breitbuschig, vieltriebig, schwachwüchsig  
 Laub: immergrün; gefiedert; Herbst- und Winterfärbung dunkelrot bis bronzebraun  
 Blüte: April bis Mai; aufrechte, goldgelbe Trauben  
 Frucht: ab August/September; schwarze, hellblau bereifte Beeren

**Büsche**

m.B./Co.	25- 30	24,50	21,40
	30- 40	29,20	25,80



Mahonia bealei

**bealei, Schmuck-Mahonie, Lederblatt-Mahonie**

- Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: sparrig aufrecht, breit rund  
 Laub: immergrün; gefiedert; ledrig; dornig; steif; blaugrau  
 Blüte: Februar bis April; in aufrechten, hellgelben Trauben  
 Frucht: ab Juli bis Herbst; schwarze, hellblau bereifte Beeren  
 Standort: frisch bis feucht, humos, lehmig, nahrhaft; licht- bis halbschtattig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	28,40
	40- 60	44,50

**Solitär**

3xv.	m.B.	60- 80	70,60
		80-100	98,50
4xv.	m.Db.	100-125	157,00



Mahonia bealei

**MALUS** - Rosaceae - APFEL, KIRSCH-APFEL**Kurzübersicht**

Sortenname	Wuchs	Blütenfarbe	Fruchtfarbe
Adams	vasenförmig	reinrosa	weinrot
Adirondack	trichterförmig	reinweiß	rot
Butterball	ausladend, locker	weiß mit rosa	gelb
Calocarpa	breit kegelförmig	weiß	orangerot
Charlottae	breit aufrecht, locker	zartrosa; halbgefüllt	grünlich
Eleyi	breit aufrecht	dunkelrot	dunkelrot
Evereste	breit pyramidal, locker	weiß mit rosa	orangerot
floribunda	breit gewölbt, schirmförmig	rosaweiß	gelb
Hillieri	hoch, überhängend	rosa	gelborange
Indian Magic	rundlich	dunkelrosa	orange
John Downie	geschlossen, kegelförmig	weiß	orangerot
Liset	breit kegelförmig, bis rundlich, kompakt	purpurrot	dunkelrot
Makamik	gleichmäßig rund	lilarot mit weiß	hellrot
Prof. Sprenger	breit aufrecht, locker	weiß	orange-gelb
Profusion	breit ausladend, eiförmig	rosarot	tiefrot
Red Jade	breite Trauerform	reinweiß	rot
Red Sentinel	aufrecht, eiförmig	weiß	dunkelrot
Royal Raindrops®	breit aufrecht	magentapink	rot
Royalty	aufrecht, kompakt	karminpurpurn	dunkelrot
Rudolph	breit aufrecht	rosarot	orange-gelb
Snow Magic	kompakter Wuchs	weiß	rot; klein
Spring Snow	erst oval, dann rund	weiß	keine
Street Parade	schmal eiförmig	weiß	violettrot
sylvestris	breit ausladend	weißlich rosa	grünlich rot
Tina	flach ausgebreitet	weiß	rot
toringo sargentii	breit aufrecht,	weiß	rot
Veredlung	annähernd rundlich		
toringo 'sieboldii'	oval bis rund	hellrosa, dann weiß	gelborange
trilobata	säulenförmig	weiß	rot
tschonokii	schmal kegelförmig	weiß	gelbgrün
Van Eseltine	säulenförmig	rosa; halbgefüllt	gelbgrün mit rot
Whitney	kegelförmig	weiß	gelbrot
Wintergold	breit rundlich	hellrosa	gelb



Malus 'Rudolph'



Malus 'Street Parade'



Malus 'Street Parade'



Malus 'Wintergold'

'Adams'<sup>®</sup>, Zierapfel 'Adams'<sup>®</sup>

Höhe: 5-6 m

Wuchs: vasenförmig, halboffen

Laub: grün; Herbstfärbung gelb

Blüte: im Mai rosarot

Frucht: kirschgroß, dunkelweinrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: sehr gesundes Laub

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00

## 'Adirondack', Zierapfel 'Adirondack'

Höhe: 3-4 m

Wuchs: aufrecht, dicht, trichterförmig

Laub: eiförmig; dunkelgrün

Blüte: reinweiß; Knospe rosaweiß; mittelfrüh

Frucht: bis Oktober; kugelig; rot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtschatig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	129,50	114,50
		150-200	194,00	171,00
		200-250	291,00	

## 'Bittenfelder Sämling', Zierapfel 'Bittenfelder Sämling'

Höhe: 5-8 m

Wuchs: breit, im Alter überhängend

Laub: grün; Herbstfärbung gelb

Blüte: einfach; weiß, teilweise mit rosa Blütenrändern

Frucht: gelb, rot angehaucht; groß, breiter als hoch

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: sehr gesund und widerstandsfähig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	129,50	114,50
		150-200	194,00	171,00
		200-250	291,00	
		250-300	365,00	



Malus 'Adirondack'



Malus 'Bittenfelder Sämling'

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12		285,00	255,00
		12- 14		340,00	300,00
		14- 16		475,00	420,00
		16- 18		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20		870,00	
		20- 25		1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00	
		25- 30		1.840,00	

**'Butterball', Zierapfel 'Butterball'**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: ausladend, locker  
 Laub: breit eiförmig  
 Blüte: Knospe rosa, später weiß, rosa überhaucht; mittel bis spät  
 Frucht: gelb; apfelförmig; erst im Dezember abfallend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: Früchte eignen sich gut für Marmelade

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	
			400-500	2.600,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12		285,00	255,00
		12- 14		340,00	300,00
		14- 16		475,00	420,00
		16- 18		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20		970,00	
		20- 25		1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00	
		25- 30		1.840,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00	
		30- 35		2.680,00	
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00	
		40- 45		4.300,00	



Malus 'Butterball'



Malus 'Butterball'




Malus 'Butterball'



Malus 'Butterball'



Malus 'Calocarpa'



Malus 'Calocarpa'

## 'Calocarpa', Zierapfel 'Calocarpa'

Synonym: M. zumi 'Calocarpa'

Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: breit kegelförmig  
 Laub: eiförmig; oft gelappt; Herbstfärbung gelbbrot  
 Blüte: Knospe rosa, später weiß; früh  
 Frucht: bis Winter; flach kugelig; orangerot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtsattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	

## 'Charlottae', Zierapfel 'Charlottae'

Synonym: M. coronaria 'Charlottae'

Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breit aufrecht  
 Laub: breit eiförmig, schwach gebogen  
 Blüte: zartrosa; halbgefüllt; spät  
 Frucht: bis Oktober; kugelig; grünlich  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	
			400-500	2.600,00	



Malus 'Charlottae'



Malus 'Charlottae'

**'Eleyi', Zierapfel 'Eleyi'**Synonym: *M. purpurea* 'Eleyi'

Höhe: 4-6 m

Wuchs: breit aufrecht, rundlich

Laub: eiförmig; Austrieb braunrot

Blüte: dunkelrot; mittelfrüh

Frucht: bis Oktober; rundlich; dunkelrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	
			400-500	2.600,00	



Malus 'Eleyi'



Malus 'Eleyi'

**'Evereste®', Zierapfel 'Evereste'®**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: breit pyramidal; locker; Seitenäste im Alter überhängend

Laub: dunkelgrün; Herbstfärbung orangegelb; Blattstiel rot

Blüte: einfach; weiß, teilweise mit rosa Blütenrändern; früh

Frucht: klein; orangerot, sonnenseits leuchtend orangerot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: sehr gesundes, lang haftendes Laub

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	



Malus 'Evereste'®

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	





Malus floribunda

→ 'Evereste'®

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00

**floribunda, Zierapfel floribunda**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: breit gewölbt, schirmförmig

Laub: elliptisch bis eiförmig; Herbstfärbung orangerot

Blüte: rosaweiß; früh

Frucht: bis Winter; klein; kugelig; gelb

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtsattig



Malus floribunda

**Solitär**


3xv.	m.Db.		125-150	129,50	144,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.		150-200	150-200	254,00
				200-250	355,00
				250-300	510,00
				300-350	730,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00



Malus floribunda



Malus floribunda

**'Hillieri', Zierapfel 'Hillieri'**

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: überhängend, aufrecht  
 Laub: elliptisch; Blattstiel dunkelrot  
 Blüte: rosa; spät  
 Frucht: bis November; kugelig; gelborange, später braun  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschantig

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00

**'Indian Magic', Zierapfel 'Indian Magic'**


- Höhe: 4-6 m hoch, 2-3 m breit  
 Wuchs: gleichmäßig rund  
 Laub: sommergrün; gelb im Herbst  
 Blüte: auffällig dunkelrosa  
 Frucht: orangefarben; klein  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschantig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00




Malus 'Hillieri'



Malus 'Hillieri'







Malus 'John Downie'

## → 'Indian Magic'

4xv.	m.Db.	18-20	970,00
		20-25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	100-150	1.610,00
		25-30		2.025,00
5xv.	m.Db.	25-30	150-200	2.160,00
		30-35		2.680,00

**'John Downie', Zierapfel 'John Downie'**

Höhe: 5-8 m

Wuchs: geschlossen, kegelförmig

Laub: breit eiförmig; variabel

Blüte: Knospe rosa, später weiß; mittelfrüh

Frucht: bis Oktober; orangerot; groß; essbar

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus 'John Downie'



Malus 'John Downie'



Malus 'John Downie'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	129,50	114,50
		150-200	194,00	171,00
		200-250	291,00	
		250-300	365,00	

4xv.	m.Db.	150-200	200-250	355,00
			250-300	510,00
			300-350	730,00

5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00
			350-400	1.890,00
			400-500	2.600,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10-12	285,00	255,00
		12-14	340,00	300,00
		14-16	475,00	420,00
		16-18	680,00	600,00

4xv.	m.Db.	18-20	970,00
		20-25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	100-150	1.460,00
		25-30		1.840,00

5xv.	m.Db.	25-30	150-200	2.160,00
		30-35		2.680,00

6xv.	m.Db.	35-40	200-300	3.490,00
		40-45		4.300,00
		45-50		5.600,00

**'Liset', Zierapfel 'Liset'**Synonym: *M. moerlandsii* 'Liset'

Höhe: 5-7 m

Wuchs: kompakt, breit kegelförmig bis rundlich

Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb rot, dann bräunlich grün;  
Herbstfärbung orangerot

Blüte: purpurrot; mittelfrüh

Frucht: bis November; kugelig; dunkelrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis  
lichtschattig**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	

**'Makamik', Zierapfel 'Makamik'**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: gleichmäßig rund

Laub: eiförmig; Austrieb purpurrot, später dunkelgrün

Blüte: lilarot mit weiß, im Verblühen hellrosa; früh

Frucht: bis Oktober; kugelig; hellrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis  
lichtschattig**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	1.460,00	
		25- 30	1.840,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	2.160,00	
		30- 35	2.680,00	
		35- 40	3.320,00	



Malus 'Liset'




Malus 'Makamik'



Malus 'Makamik'



Malus 'Makamik'



Malus 'Professor Sprenger'

## 'Professor Sprenger', Zierapfel 'Professor Sprenger'

Synonym: M. zumi 'Prof. Sprenger'

Höhe: 5-6 m  
 Wuchs: breit aufrecht, kegelförmig  
 Laub: eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelb und rot  
 Blüte: Knospe rosa, später weiß; mittel bis spät  
 Frucht: bis Winter; kugelig; orangegelb  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00	
			200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	



Malus 'Professor Sprenger'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12		285,00	255,00
		12- 14		340,00	
		14- 16		475,00	
		16- 18		680,00	
4xv.	m.Db.	18- 20		970,00	
		20- 25		1.270,00	



Malus 'Professor Sprenger'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	1.210,00	
		20- 25		1.460,00	
		25- 30		1.840,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00	
		30- 35		2.680,00	
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00	
		40- 45		4.300,00	



Malus 'Profusion'

## 'Profusion', Zierapfel 'Profusion'

Synonym: M. moerlandsii 'Profusion'

Höhe: 5-6 m  
 Wuchs: breit ausladend, eiförmig  
 Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb rotbraun, später grünbraun; Herbstfärbung rötlich  
 Blüte: rosarot; mittelfrüh bis spät  
 Frucht: bis November; kugelig; tiefrot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50
			150-200	194,00	171,00
			200-250	291,00	
			250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	200-250	355,00	
			250-300	510,00	
			300-350	730,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00	
			350-400	1.890,00	
			400-500	2.600,00	

**'Red Jade', Zierapfel 'Red Jade'**

Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: breite Trauerform  
 Laub: grün, im Herbst gelb  
 Blüte: weiß im Mai  
 Frucht: klein; rot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**'Red Sentinel', Zierapfel 'Red Sentinel'**

Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: aufrecht, eiförmig  
 Laub: eiförmig  
 Blüte: Knospe hellrosa, später weiß; mittelfrüh bis spät  
 Frucht: bis weit in den Winter; rundlich abgeflacht; dunkelrot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	1.460,00	
		25- 30	1.840,00	



Malus 'Red Sentinel'



Malus 'Red Sentinel'



Malus 'Red Sentinel'





Malus 'Royal Raindrops®' -PBR-

## → 'Red Sentinel'

5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35	150-200	2.160,00 2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40 40- 45	200-300	3.490,00 4.300,00

## 'Royal Raindrops'®, Zierapfel 'Royal Raindrops'®

Höhe: 6-8 m

Wuchs: breit aufrecht

Laub: glänzend schwarzrot, bronzeorangelila im Herbst

Blüte: strahlend magentapink

Frucht: rot; klein; lange haftend

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: sehr resistent; hitze- und trockenheitsverträglich; bisher in Europa exklusiv von "Ley" vermehrt



Malus 'Royal Raindrops®' -PBR-

## Sträucher

Co.	80-100	56,00
	100-125	67,50
	125-150	79,00

## Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	145,00
		150-200	215,00
		200-250	325,00
4xv.	m.Db.	150-200	288,00
		200-250	400,00
		250-300	585,00
		300-350	820,00

## Hochstämme

2xv.	o.B.	7- 8	65,00
		8- 10	78,00
		10- 12	105,00
3xv.	m.Db.	10- 12	315,00
		12- 14	375,00
		14- 16	510,00
		16- 18	715,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.080,00
		20- 25	1.420,00

## 'Royalty', Zierapfel 'Royalty'

Höhe: 4-6 m

Wuchs: kompakt, breit kegelförmig

Laub: eiförmig; Austrieb leuchtend rot, später dunkel rotbraun; Herbstfärbung braunrot

Blüte: Knospe schwarzrot, später karminrot; mittelfrüh bis spät

Frucht: länglich; dunkelrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig



Malus 'Royal Raindrops®' -PBR-



Malus 'Royalty'

Neu-  
heit

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00

**'Rudolph', Zierapfel 'Rudolph'**Synonym: *M. sargentii* 'Rudolph'

Höhe: 4-6 m

Wuchs: breit aufrecht

Laub: eiförmig; Austrieb bronzerot, später dunkelbronzegrün

Blüte: Knospe karminrot, Blüte später rosarot; bis 4,5 cm groß; mittelfrüh

Frucht: bis Winter; länglich; orangegelb

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig



Malus 'Royalty'



Malus 'Rudolph'

**'Snow Magic', Zierapfel 'Snow Magic'**

Höhe: 6-10 m

Wuchs: kompakter Wuchs, gut aufgebaute Krone

Laub: eiförmig grün, im Herbst gelb

Blüte: weiß; reich blühend; Mai; Knospe in rosa

Frucht: klein; rot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig



Malus 'Rudolph'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00



Malus 'Rudolph'

## 'Spring Snow', Zierapfel 'Spring Snow'

Höhe: 5- 7 m, ca.4 m breit

Wuchs: anfangs schmal oval, im Alter platt rund

Laub: eiförmig; grün; im Herbst gelb

Blüte: weiß; reich blühend; Mai

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00

## 'Street Parade', Zierapfel 'Street Parade'

Synonym: M. baccata 'Street Parade'

Höhe: 4-6 m

Wuchs: schmal eiförmig

Laub: eiförmig

Blüte: Knospe zartrosa, später weiß; mittelfrüh

Frucht: bis September; kugelig; violettrot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschatig

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00
		45- 50		5.600,00
		50- 60		6.950,00



Malus 'Street Parade'



Malus 'Street Parade'

**sylvestris**, HolzapfelBaum  
des Jahres  
2013Synonym: *M. communis*, *M. pumila*

Höhe: 6-10 m

Wuchs: Strauch oder Baum, breit ausladend

Laub: breit elliptisch bis rund; später Austrieb

Blüte: Mai bis Juni; weißlich rosa

Frucht: bis Oktober; kugelig; grünlich rot; sauer schmeckend

Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig,  
Kalk liebend; sonnig bis halbschattig**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	7,30	5,40	4,90
4 Tr.	o.B.		100-150	9,90	7,70	7,00
3xv.	m.Db.		125-150	129,50	114,50	
			150-200	194,00	171,00	
			200-250	291,00		
			250-300	365,00		
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00		
			200-250	355,00		
			250-300	510,00		
			300-350	730,00		
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	1.350,00		
			350-400	1.890,00		

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	1.220,00
				1.460,00
				1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
				2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
				4.300,00





Malus 'Tina'

**'Tina'®, Zierapfel 'Tina'®**Synonym: *M. toringo sargentii* 'Tina'®

Höhe: 0,8-1,5 m  
 Wuchs: flach ausgebreitet  
 Laub: eiförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Knospe tiefrot, später weiß; mittelfrüh  
 Frucht: bis Dezember; kugelig; rot; klein  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	32,40	28,60
	60-100	40,10	35,40

**Solitär**


3xv.	m.Db.	60- 80	60,50
		80-100	84,50
		100-125	110,50

**toringo sargentii-Veredlung, Zierapfel sargentii**Synonym: *sargentii*-Veredlung

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit aufrecht, annähernd rundlich  
 Laub: eiförmig, teilweise dreilappig; Herbstfärbung gelbrot  
 Blüte: Knospe hellrosa, später weiß; mittelfrüh  
 Frucht: bis Oktober kugelig; rot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	129,50	114,50
		150-200	194,00	171,00
		200-250	291,00	
		250-300	365,00	
4xv.	m.Db.	150-200	150-200	254,00
		200-250	355,00	
		250-300	510,00	
		300-350	730,00	

Malus toringo sargentii-  
VeredlungMalus toringo sargentii-  
Veredlung**toringo 'sieboldii', Japan-Apfel**

Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: oval bis rund, Seitenäste überhängend  
 Laub: eiförmig, an den Langtrieben 3-5-lappig; dunkelgrün  
 Blüte: hellrosa, dann weiß; Knospe dunkelrosa; mittelfrüh  
 Frucht: bis Oktober; kugelig; gelborange  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich lehmig; sonnig bis lichtsattig



**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	1.460,00	
		25- 30	1.840,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	2.160,00	
		30- 35	2.680,00	



Malus trilobata

**trilobata, Dreilappiger Apfel**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: säulenförmig, später schmal kegelförmig  
 Laub: dreilappig, an Ahornlaub erinnernd; Herbstfärbung prachtvoll rot  
 Blüte: weiß; mittelfrüh  
 Frucht: bis November; dick; rot  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig



Malus tschonoskii

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**tschonoskii, Scharlachapfel**


- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, später breiter  
 Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb graufilzig; Herbstfärbung orangerot; auffallend  
 Blüte: weiß; mittelfrüh; wenig auffallend  
 Frucht: bis November; flachkugelig; gelbgrün; selten  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschattig




Malus tschonoskii

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	



Malus tschonoskii



Malus 'Van Eseltine'

## → tschonokii

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00
		45- 50		5.600,00

**'Van Eseltine', Zierapfel 'Van Eseltine'**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: schmal säulenförmig, später breiter und lockerer

Laub: länglich

Blüte: Knospe rosarot, später rosa; halbgefüllt; groß; mittelfrüh

Frucht: bis Oktober; flach rund; gelbgrün mit rot

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig



Malus 'Whitney'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**'Whitney', Zierapfel 'Whitney'**

Höhe: 5-7 m

Wuchs: kegelförmig

Laub: breit elliptisch

Blüte: weiß; mittelfrüh

Frucht: bis Oktober; gelbrot; groß

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig



Malus 'Whitney'

**'Wintergold', Zierapfel 'Wintergold'**

Höhe: 4-6 m


Wuchs: breit rundlich

Laub: breit elliptisch

Blüte: Knospe rosarot, später hellrosa; mittelfrüh bis spät

Frucht: bis Winter; kugelig; gelb

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig; sonnig bis lichtsattig



Malus 'Wintergold'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreis in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück**MESPILUS****Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	285,00	255,00
		12- 14	340,00	300,00
		14- 16	475,00	420,00
		16- 18	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.270,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	1.220,00
		20- 25		1.460,00
		25- 30		1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
6xv.	m.Db.	35- 40	200-300	3.490,00
		40- 45		4.300,00

MALUS Fruchtsorten -siehe Obstteil



Malus 'Wintergold'

**MESPILUS - Rosaceae - MISPEL****germanica, Echte Mispel**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: breit aufrechter Strauch bis kleiner Baum; unregelmäßige Krone; langsam wachsend

Laub: länglich oval; fein gezähnt, teilweise ganzrandig; trübgrün

Blüte: groß; weiß; nach Laubaustrieb

Frucht: rundlich; braun; nach Frosteinwirkung essbar

Standort: trocken bis frisch; nährstoffreiche kalkhaltige Böden; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: stadtklimafest; frosthart

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	114,00
		150-200	157,00
		200-250	216,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	485,00
		14- 16	695,00
		16- 18	970,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.350,00
		20- 25	1.790,00

**Veredelte Mispel-Sorten - siehe Obstteil CYDONIA, MESPILUS**

Mespilus germanica



Mespilus germanica



Mespilus germanica



Morus alba

## MORUS - Moraceae - MAULBEERE

### alba, Weißer Maulbeerbaum



- Höhe: 8-10 (-15) m  
 Wuchs: breitkugelig  
 Laub: oval; unterschiedlich gelappt; hellgrün; glänzend; rau; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; hängende Ähren  
 Frucht: Spätsommer bis Frost; weiß, rosa oder schwarzrot; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: etwas frostempfindlich

#### Solitär

3xv.	m.Db.	150-200	114,00
		200-250	161,00
		250-300	229,00

#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00
		25- 30	1.390,00

#### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00

### alba 'Fruitless', Fruchtloser Maulbeerbaum

Synonym: *M. platanifolia* 'Fruitless'


- Höhe: 3-4 m, variabel  
 Wuchs: breit rundlich, schirmartig  
 Laub: groß, bis 20 cm lang  
 Blüte: Mai; nur männliche Blüten; zahlreich  
 Frucht: keine, da männliche Form  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: etwas frostempfindlich

#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00
		25- 30	1.390,00



Morus alba 'Pendula'



Morus alba 'Fruitless'



Morus nigra

**nigra**, Schwarzer Maulbeerbaum

- Höhe: 6-15 m  
 Wuchs: kompakt, kugelrund  
 Laub: herzförmig; glänzend dunkelgrün; rau; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; hängende Ähren  
 Frucht: ab August; brombeerähnlich; purpurschwarz; essbar  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nahrhaft, lehmig; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	12,10	9,70	8,80
		100-150	16,60	13,90	12,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	114,00		
		200-250	161,00		
		250-300	229,00		

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	14- 16		415,00	
		16- 18		575,00	
4xv.	m.Db.	18- 20		795,00	
		20- 25		1.050,00	
		25- 30		1.390,00	

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00



Morus nigra



Nothofagus antarctica




Nothofagus antarctica

**NOTHOFAGUS - Fagaceae - SÜDBUCHE, SCHEINBUCHE****antarctica**, Pfennigbuche

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: locker, unregelmäßig, krummwüchsig, bizarr  
 Laub: eiförmig; gekerbt, krauser Rand; winzig; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: Mai; einhäusig; grünlich gelb  
 Frucht: ab August; Fruchtbecher mit drei Nüssen  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

m.B./CO.	80-100	37,00	32,70
	100-125	46,80	41,40
	125-150	59,00	53,00



Nothofagus antarctica




Nothofagus antarctica

→ antarctica

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-175	110,00
			175-200	152,00
4xv.	m.Db.	100-150	175-200	184,00
			200-250	260,00
			250-300	365,00
5xv.	m.Db.	150-200	250-300	585,00
			300-350	820,00
			350-400	1.150,00
6xv.	m.Db.	200-300	350-400	1.540,00
			400-450	2.100,00
			450-500	2.830,00



Nyssa sylvatica

**NYSSA - Nyssaceae - TUPELOBAUM**

**sylvatica, Nymphenbaum**



Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: kegelförmig, locker, Stamm kerzengerade  
 Laub: verkehrt eiförmig; spät austreibend; Herbstfärbung orange- bis scharlachrot; auffallend  
 Blüte: Mai bis Juni; grünlich; unscheinbar  
 Frucht: ab Oktober; eiförmig; blauschwarz; ungenießbar  
 Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, durchlässig, tiefgründig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Tupelo ist die Bezeichnung der nordamerikanischen Creek-Indianer für Sumpfbäume; Frühjahrspflanzung ratsam

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-175	184,00
			175-200	260,00
			200-250	355,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	175-200	370,00
			200-250	530,00
			250-300	750,00
5xv.	m.Db.	150-200	250-300	1.050,00
			300-350	1.460,00
			350-400	2.040,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		530,00
		14- 16		750,00
4xv.	m.Db.	16- 18		1.080,00
		18- 20		1.390,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.980,00
		25- 30		2.470,00



Nyssa sylvatica

**OSMANTHUS - Oleaceae - DUFTBLÜTE****heterophyllus**, Stachelblättrige DuftblüteSynonym: *O. ilicifolius*

Höhe: 2,5-4 m

Wuchs: buschig aufrecht, rundlich

Laub: immergrün; länglich, variabel; dorniger Rand


Blüte: September bis Oktober; weiß; unscheinbar

Frucht: blauschwarz; selten


Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig; licht- bis halbschattig; geschützt

Sonstiges: im Gegensatz zu *Ilex* gegenständige Blattanordnung**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	310,00
		150-175	410,00
4xv.	m.Db.	175-200	510,00
		200-225	710,00



Osmanthus heterophyllus



Ostrya carpinifolia

**OSTRYA - Betulaceae - HOPFENBUCHE****carpinifolia**, Gemeine Hopfenbuche

Höhe: 8-12 (-15) m

Wuchs: geschlossen, breit rund

Laub: eiförmig bis elliptisch; gelbe Herbstfärbung

Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen Kätzchen, weibliche Blüten in unscheinbaren Ähren

Frucht: ab Spätsommer bis Winter; hopfenähnlich; cremeweiß; auffallend

Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, Kalk liebend, sandig bis lehmig; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 100 Jahre

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.640,00
		25- 30			2.040,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	400-500	2.680,00
		35- 40			3.320,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.980,00
		35- 40			3.680,00
		40- 45			4.520,00




Ostrya carpinifolia



Ostrya carpinifolia





Pachysandra axillaris

→ **carpinifolia**

6xv.	m.Db.	40-45	300-400	500-700	4.900,00
		45-50			6.050,00
		50-60			7.500,00

**PACHYSANDRA** - Buxaceae - **SCHATTENGRÜN, YSANDER, DICKANTHERE****terminalis, Dickmännchen**

Höhe:	20-30 cm
Wuchs:	teppichartig, durch Rhizome ausbreitend, Triebe aufrecht
Laub:	immergrün; verkehrt eiförmig; grob gezähnt
Blüte:	April bis Mai; weiße Ähren
Frucht:	unscheinbar
Standort:	frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; licht- bis halbschattig

**Büsche**

3-4 Tr.	m.Tb.	2,26	2,00	1,81
5-7 Tr.	m.Tb.	2,58	2,28	2,07



Pachysandra axillaris

**terminalis 'Green Carpet'®, Niedriges Schattengrün**

Höhe:	15-20 cm
Wuchs:	Teppich bildend, gedrungen, Ausläufer treibend
Laub:	immergrün, hellgrün glänzend; verkehrt eiförmig; grob gezähnt
Blüte:	April bis Mai; weiße Ähren
Frucht:	unscheinbar
Standort:	frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; licht- bis halbschattig
Sonstiges:	nicht spätfrostgefährdet

**Büsche**

3-4 Tr.	m.Tb.	3,11	2,75	2,50
5-7 Tr.	m.Tb.	3,76	3,32	3,01

Pachysandra terminalis  
'Green Carpet'®


**PAEONIA - Paeoniaceae - PFINGSTROSE****Paeonia suffruticosa-Sorten, Strauchpfingstrose**

- Höhe: 1 (-2) m  
 Wuchs: wenig verzweigte Triebe, sparrig aufrecht, Zweige dick und kahl  
 Laub: farnartig gefiedert  
 Blüte: Mai; Sorten mit unterschiedlichen Farben  
 Standort: nahrhaft, durchlässig, humos; sonnig  
 Sonstiges: windgeschützt



Paeonia suffruticosa

Sorte	Höhe in m	Blütenform und -farbe	Wuchs/ Bemerkung
'Baronne d'Alès'	1,00	leuchtend rosa, Mitte dunkelrosa	gedrungen
'Beauté de Twicken'	1,50	großblumig, karminrot, Mitte dunkler	kräftig
'Blanche de His'	1,20	großblumig, gefüllt, weiß, später zartrosa	mittelstark
'Jeanne d'Arc'	1,50	gut gefüllt, silbrig lachsfarben, Mitte dunkel	kräftig
'Mme Laffay'	1,20	rosa, Blüte dicht gefüllt, innen karmesinrot	mittelstark
'Mme Stuart Low'	1,20	lachsrosa, Blüte halb gefüllt, silbrig gesäumt	mittelstark
'Reine Elisabeth'	1,00	sehr großblumig, gefüllt, feurig rosarot	gedrungen
'Souvenir de Ducher'	1,75	tiefviolett, Blüten gefüllt	kräftig, schattige Lagen bevorzugt




Paeonia suffruticosa

**Sträucher**

- 1j. Vg. m.Tb. 51,90  
 2j. Vg. m.Tb. 62,10

**PARROTIA - Hamamelidaceae - PARROTIE****persica, Eisenholzbaum**

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: mehrstämmig, breit trichterförmig, aufrecht  
 Laub: verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb, orangerot bis scharlachrot  
 Blüte: März; vor Austrieb rot  
 Frucht: kleine, braune Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: abblätternde Rinde, ähnlich Platane; in der Jugend etwas frostanfällig



Parrotia persica

**Sträucher**

- m.B./Co. 60-80 49,30  
 80-100 67,10

**Solitär**

- 3xv. m.Db. 100-125 165,00  
 125-150 216,00  
 150-175 283,00



Parrotia persica



Parrotia persica

→ persica

4xv.	m.Db.	150-200	175-200	470,00
			200-225	675,00
			225-250	945,00
			250-275	1.050,00
			275-300	1.350,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.890,00



Parrotia persica

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.980,00
		25- 30	2.470,00
		30- 35	3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	3.410,00
		35- 40	4.300,00
		40- 45	5.300,00
6xv.	m.Db.	40- 45	5.900,00
		45- 50	7.300,00
		50- 60	9.200,00

**persica 'Vanessa', Eisenholzbaum 'Vanessa'**



Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: schmal oval, baumartig  
 Laub: verkehrt eiförmig; lange haftend; Herbstfärbung gelb bis orangerot; auffallend  
 Blüte: März; vor Austrieb; rot  
 Frucht: kleine, braune Kapsel  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig


Sonstiges: abblätternde Rinde, vor allem bei älteren Exemplaren sehr dekorativ

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.890,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.980,00
		25- 30	2.470,00
		30- 35	3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	3.410,00
		35- 40	4.300,00
		40- 45	5.300,00
6xv.	m.Db.	40- 45	5.900,00
		45- 50	7.300,00




Parrotia persica



Parrotia persica 'Vanessa'

**PARTHENOCISSUS - Vitaceae - JUNGFERNREBE****quinquefolia, Wilder Wein**Synonym: *Ampelopsis quinquefolia*

- Höhe: 8-10 (-15) m  
 Wuchs: durch Blattranken und Haftscheiben kletternd  
 Laub: fünfteilig, elliptisch; Herbstfärbung scharlachrot  
 Blüte: Juli bis August; in weißen Rispen  
 Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; blauschwarz  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschtig



Parthenocissus quinquefolia

**quinquefolia 'Engelmannii', Mauerwein**


- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: selbst kletternd  
 Laub: fünfteilig, elliptisch, schmal; Herbstfärbung intensiv karmin- bis scharlachrot  
 Blüte: Juli bis August; in weißen Rispen  
 Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; blauschwarz  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtschtig

Parthenocissus tricuspidata  
'Veitchii'**Kletterpflanzen**

ab 2 Tr. m.Tb. 60-100 9,90 8,75 7,95

**Solitär**3xv. Co. 100-150 33,30  
150-200 46,80**tricuspidata 'Veitchii', Selbstklimmer**

- Höhe: 8-10 (-12) m  
 Wuchs: mit Haftscheiben an glattem Untergrund kletternd  
 Laub: eiförmig; an sterilen Neutrieben eiförmig ungelappt, sonst dreizählig; Herbstfärbung orange bis rot  
 Blüte: Juni bis Juli; gelblich grüne Trugdolden  
 Frucht: ab September bis Winter; kugelig; schwarze Beeren  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschtig

Parthenocissus tricuspidata  
'Veitchii'**Kletterpflanzen**ab 2 Tr. m.Tb. 40-60 9,90 8,75 7,95  
60-100 12,10 10,70 9,70**Solitär**3xv. Co. 80-100 36,00 31,80  
100-150 56,00 49,50  
150-200 78,50 69,10  
200-250 110,50Parthenocissus tricuspidata  
'Veitchii'



Paulownia tomentosa

## PAULOWNIA - Scrophulariaceae - PAULOWNIE

**tomentosa**, Blauglockenbaum



Synonym: *P. imperialis*

Höhe: 10-15 m

Wuchs: Krone locker, breit gewölbt

Laub: breit herzförmig, oft gelappt; unterseits graufilzig; keine Herbstfärbung

Blüte: April bis Mai; vor Austrieb aufrechte, violettblaue Rispen

Frucht: graubraune, walnussähnliche Kapseln; haftend bis ins nächste Jahr

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, Kalk liebend, lehmig; sonnig




Paulownia tomentosa

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
		20- 25	895,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00



Paulownia tomentosa

## PERNETTYA - Ericaceae - TORFMYRTE

**mucronata 'Alba', 'Purpurea', 'Rosea'**, Fruchtmyrte

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: buschig aufrecht

Laub: immergrün; ledrig; mit dorniger Blattspitze


Blüte: Mai bis Juli; zweihäusig; weiß bis rosa

Frucht: ab August/September bis Winter; rosa, rot oder weiß

Standort: frisch bis feucht, humos, nährstoffarm, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig

### Büsche, mit Beeren

m.B./Co.	20- 30	13,00	11,50
	30- 40	17,50	15,40



Pernettya mucronata


**PEROVSKIA - Labiatae - BLAURAUTE****abrotanoides, Silberbusch**

Höhe: 0,8-1,2 m

Wuchs: aufrecht, locker, breitbuschig

Laub: fiederförmig; silbergrau; aromatisch

Blüte: Juli bis Oktober; violettblau

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig, lehmig, Kalk liebend;  
sonnig bis lichtschtattig

Perovskia abrotanoides

**Sträucher**

m.Tb.	30- 40	16,60	14,65
	40- 60	19,90	17,60

**atriplicifolia 'Blue Spire',**

Höhe: 1,0-1,5 m

Wuchs: aufrecht, locker, breitbuschig, oft niederliegend

Laub: fiederförmig; silbergrau; aromatisch

Blüte: Juli bis Oktober; lavendelblau an langen Rispen

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig, lehmig, Kalk liebend;  
sonnig bis lichtschtattig; treibt nach Frostschäden wieder durch**Sträucher**

Co.	30- 40	16,60	14,65
	40- 60	19,90	17,60

**PHELLODENDRON - Rutaceae - KORKBAUM****amurense, Amur-Korkbaum**

Höhe: 10-12 m

Wuchs: lockerkronig, malerisch

Laub: gefiedert; zerrieben aromatisch duftend; früher Blattfall; gelbe  
Herbstfärbung

Blüte: Juni; gelbgrün

Frucht: ab Sommer; schwarz; kugelig; traubenartige Rispe

Standort: alle Kulturböden; frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig

Sonstiges: im Alter dicke, graue Korkrinde




Phellodendron amurense

**Solitär**

4xv.	m.Db.	150-200	250-300	420,00
			300-350	600,00
			350-400	845,00
			400-500	1.180,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		400,00
		14- 16		545,00
		16- 18		750,00
4xv.	m.Db.	18- 20		1.050,00
		20- 25		1.390,00



Phellodendron amurense



Philadelphus 'Belle Etoile'

## PHILADELPHUS - Saxifragaceae - GARTENJASMIN, PFEIFENSTRAUCH, FALSCHER JASMIN

### 'Belle Etoile', Gartenjasmin 'Belle Etoile'

Höhe: 1-1,5 m  
Wuchs: insgesamt gedungen  
Laub: eiförmig zugespitzt  
Blüte: Juni bis Juli; weiß mit rosa; angenehm duftend  
Frucht: Kapseln  
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig

#### verpflanzte Sträucher

5 Tr.	o.B.	40- 60	9,70	7,60	6,90
		60-100	12,30	9,90	9,00
	Co.	40- 60	14,50	12,80	11,60

#### Solitär

3xv.	m.B.	80-100	51,90	45,90	
		100-125	67,10	59,30	



Philadelphus 'Belle Etoile'

### coronarius, Bauernjasmin



Höhe: 3-4 m  
Wuchs: straff aufrecht, bogig überhängend  
Laub: spitz oval  
Blüte: Mai bis Juni; cremeweiß; stark süßlich duftend  
Frucht: braune Kapseln  
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig

#### verpflanzte Sträucher


4 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
5 Tr.	o.B.	100-150	10,10	7,80	7,10
	Co.	60-100	12,40	10,90	9,90

#### Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	54,60	48,30	
		150-200	70,60	62,40	
		200-250	98,50		
		250-300	137,00		

### 'Dame Blanche', Gartenjasmin 'Dame Blanche'

Höhe: 1-1,5 m  
Wuchs: dichtbuschig, gedungen, zierlich  
Laub: eiförmig; zugespitzt  
Blüte: Juni bis Juli; weiß; einfach bis halbgefüllt; stark duftend  
Frucht: keine  
Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig



Philadelphus coronarius



Philadelphus coronarius

**verpflanzte Sträucher**

5 Tr.	o.B.	40-60	9,70	7,60	6,90
		60-100	12,30	9,90	9,00
	Co.	40-60	14,50	12,80	11,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	51,90	45,90	
		100-125	67,10	59,30	

**'Erectus', Heckenjasmin, Duft-Jasmin**Synonym: *P. lemoinei* 'Erectus', *P.* 'Mont Blanc'

Höhe:	1,5-2 m
Wuchs:	straff aufrecht, locker verzweigt
Laub:	eilänglich; klein
Blüte:	Mai bis Juni; weiß; stark duftend
Frucht:	braune Kapseln
Standort:	alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

5 Tr.	o.B.	40-60	7,50	5,50	5,00
		60-100	10,20	8,00	7,20
	Co.	40-60	13,80	12,20	11,05

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	46,80	41,40	
		100-125	60,50	53,50	
	m.Db.	125-150	78,50	69,10	
		150-175	101,00		

**'Girandole', Gartenjasmin 'Girandole'**Synonym: *P. virginalis* 'Girandole'

Höhe:	1,5-2 m
Wuchs:	straff aufrecht, sehr dicht, geschlossen
Laub:	eiförmig; zugespitzt
Blüte:	Juni bis Juli; cremeweiß; gefüllt; leicht duftend
Frucht:	keine
Standort:	alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	9,90	7,70	7,00
5 Tr.	o.B.	100-150	12,70	10,30	9,30
	Co.	60-100	13,00	11,50	10,45

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	65,40		
		150-175	84,50		
		175-200	120,00		



Philadelphus 'Erectus'



Philadelphus 'Girandole'



Philadelphus 'Girandole'



Philadelphus inodorus  
grandiflorus**inodorus grandiflorus**, Großblütiger Parkjasmin

Synonym: P. 'Grandiflorus'

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: locker aufrecht, breit überhängend  
 Laub: spitz oval  
 Blüte: Juni; weiß mit gelben Staubgefäßen; nicht duftend  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	7,30	5,40	4,90
5 Tr.	o.B.	100-150	10,10	7,80	7,10
	Co.	60-100	12,40	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	54,60	48,30	
		150-200	70,60	62,40	
		200-250	98,50		



Philadelphus 'Manteau d'Hermine'

**'Manteau d'Hermine'**, Gartenjasmin

Synonym: 'Manteau d'Hermine'


Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht, kleiner Strauch  
 Laub: eielliptisch, etwas wellig verdreht; klein; sommergrün  
 Blüte: Juni bis Juli; schneeweiß; kaum duftend  
 Frucht: keine  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**

5 Tr.	o.B.	40- 60	9,70	7,60	6,90
		60-100	12,30	9,90	9,00
	Co.	40- 60	14,50	12,80	11,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	51,90	45,90	
		100-125	67,10	59,30	




Philadelphus 'Schneesturm'

**'Schneesturm'**, Gartenjasmin 'Schneesturm'

Synonym: P. virginalis 'Schneesturm'

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: straff aufrecht, später leicht und elegant überhängend  
 Laub: spitz oval  
 Blüte: Juni bis Juli; reinweiß; gefüllt; stark duftend  
 Frucht: keine  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig



Philadelphus 'Virginal'

**'Virginal', Gartenjasmin 'Virginal'**

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: steif aufrecht, Seitentriebe sparrig abstehend  
 Laub: spitz oval  
 Blüte: Juni bis Juli; weiß; gefüllt; duftend  
 Frucht: braune Kapseln  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	9,90	7,70	7,00
5 Tr.	o.B.	100-150	12,70	10,30	9,30
	Co.	60-100	13,00	11,50	10,45

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	50,60	44,70	
		125-150	65,40	57,80	
		150-175	84,50		
		175-200	120,00		



Philadelphus 'Virginal'



Photinia fraseri 'Red Robin'

**PHOTINIA - Rosaceae - GLANZBLATTSTRAUCH, GLANZMISPEL****fraseri 'Red Robin', Purpur-Glanzmispel**

- Höhe: bis 3 m  
 Wuchs: breitbuschig, locker; aufrecht  
 Laub: immergrün; im Austrieb leuchtend rot, später glänzend grün  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: rot; klein und kugelig  
 Standort: gut durchlässige, mäßig feuchte bis trockene Böden; sonnig bis absonnig  
 Sonstiges: etwas frostempfindlich

**Sträucher**

3xv.	m.B./Co.	80-100	57,60		
		100-125	80,50		

**Solitär**


3xv.	m.Db.	125-150	110,50		
		150-175	157,00		
		175-200	222,00		

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00		
		12- 14	530,00		
		14- 16	750,00		
4xv.	m.Db.	16- 18	1.080,00		
		18- 20	1.390,00		
		20- 25	1.850,00		



Photinia fraseri 'Red Robin'



Photinia villosa



Photinia villosa

**villosa**, Scharlach-Glanzmispel

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, breit ausladend  
 Laub: verkehrt eiförmig bis lanzettlich; Herbstfärbung gelb bis orangerot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Doldentrauben; streng duftend  
 Frucht: ab Oktober bis Winter; kugelig; glänzend rot  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, sauer, nährstoffreich; sonnig bis halbschattig

**Sträucher**

3xv.	m.B.	80-100	37,00
		100-125	50,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	78,50
		150-175	110,50
		175-200	152,00
4xv.	m.Db.	100-150	276,00
		250-300	385,00



Physocarpus opulifolius

**Phyllostachys** - siehe unter Bambus - Phyllostachys**PHYSOCARPUS** - Rosaceae - BLASENSPIERE


Physocarpus opulifolius

**opulifolius**, Fasanenspiere

Höhe: 2,5-3,5 m  
 Wuchs: Hauptäste straff aufrecht, insgesamt breitbogig überhängend  
 Laub: eirundlich, drei- bis fünfplappig  
 Blüte: Juni; hellrosafarbene Doldentrauben  
 Frucht: braun; blasig gewölbt; lange haftend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, humos, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Rinde hellbraun, abblätternd

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,25	4,50	4,05
	Co.	60-100	11,70	10,35	9,40



Physocarpus opulifolius

**PIERIS - Ericaceae - SCHATTENGLÖCKCHEN,  
LAVENDELHEIDE****floribunda**, Aufrechtes SchattenglöckchenSynonym: *Andromeda floribunda*

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig aufrecht, annähernd halbrund  
 Laub: immergrün; elliptisch; mattgrün  
 Blüte: April bis Mai; weiße, aufrechte Rispen  
 Frucht: ab Herbst bis Frühjahr; kugelige, braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; halbschattig bis schattig

**japonica**, Hängendes Schattenglöckchen

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker, breit aufrecht, leicht überhängend  
 Laub: immergrün; lanzettlich bis schmal eiförmig; glänzend  
 Blüte: ab März bis Mai; weiße, überhängende Rispen  
 Frucht: braune, kugelige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; lichtschantig bis schattig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	30,70	27,10
	40- 60	38,00	33,60
	60- 80	62,10	54,90

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	170,00
		100-125	241,00
4xv.	m.Db.	60-100	100-125
		125-150	430,00

**japonica 'Debutante'**, Schattenglöckchen 'Debutante'

- Höhe: 0,8-1,2 m  
 Wuchs: sehr breitbuschig, kompakt  
 Laub: immergrün; schmal eiförmig bis lanzettlich  
 Blüte: März bis April; weiß; stark verzweigte, aufrechte Rispen  
 Frucht: braune, holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig, schattenverträglich




Pieris floribunda



Pieris japonica



Pieris japonica



Pieris japonica 'Forest Flame'



Pieris japonica 'Forest Flame'

## japonica 'Forest Flame', Rotlaubiges Schattenglöckchen

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breit und locker, aufrecht  
 Laub: immergrün; länglich oval; Austrieb tiefrot; auffallend  
 Blüte: April bis Mai; weiße, überhängende Rispen  
 Frucht: braune, kugelförmige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig



Pieris japonica 'Red Mill'

## japonica 'Red Mill', Schattenglöckchen 'Red Mill'

- Höhe: 1,2-1,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, kompakt  
 Laub: immergrün; lanzettlich; dunkelroter Austrieb  
 Blüte: März bis April; weiße, waagrecht ausgebreitete bis überhängende Rispen  
 Frucht: braune, holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

### Büsche

m.B./Co.	20- 25	16,60	14,65
	25- 30	24,80	21,90
	30- 40	32,40	28,60



Pieris japonica 'Variegata'

## japonica 'Variegata', Weißbuntes Schattenglöckchen

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: kompakt, flach rund  
 Laub: immergrün; variable Form; grün mit gelblich weißem Rand  
 Blüte: April bis Mai; weiße, abstehende Rispen; klein  
 Frucht: braune, holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

### Büsche

m.B./Co.	20- 25	19,00	16,80
	25- 30	29,20	26,40
	30- 40	38,00	33,60



Pieris japonica 'White Pearl'

## japonica 'White Pearl', Schattenglöckchen 'White Pearl'

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: sehr breitbuschig, niedrig  
 Laub: immergrün; lanzettlich, leicht hängend  
 Blüte: März bis April; weiß; aufrecht; große Rispe  
 Frucht: braune, holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig

### Büsche

m.B./Co.	20- 25	16,60	14,65
	25- 30	24,80	21,90
	30- 40	32,40	28,60

**PLATANUS - Platanaceae - PLATANE****hispanica, Ahornblättrige Platane**Synonym: *P. acerifolia*, *P. hybrida*

Höhe: 20-30 m

Wuchs: Krone rundlich bis breit gewölbt

Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung gelbbraun

Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfechen

Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschantig


Sonstiges: zierend abblätternde Rinde



Platanus hispanica

**Hochstämme, Alleebäume**


3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00



Platanus hispanica

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00	980,00
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00	
		30- 35			2.160,00	
		35- 40			2.680,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00	
		35- 40			2.910,00	
		40- 45			3.580,00	
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00	
		45- 50			5.450,00	
		50- 60			6.750,00	
		60- 70			8.450,00	
6xv.	m.Db.	50- 60	400-600	700-900	8.450,00	
		60- 70			10.500,00	
		70- 80			12.990,00	
7xv.	m.Db.	80- 90	400-600	900-1200	15.750,00	
		90-100			19.400,00	




Platanus hispanica

**Form-Bäume, ein- oder mehretagige Dächer****Solitär-Bäume, dachförmig gezogen**

4xv.	m.Db.	18- 20		1.350,00	
		20- 25		1.790,00	
5xv.	m.Db.	25- 30		2.600,00	
		30- 35		3.230,00	
		35- 40		4.070,00	



Platanus hispanica



Platanus hispanica - Dachform

→ **hispanica**

6xv.	m.Db.	40- 45	5.450,00
		45- 50	7.150,00
		50- 60	8.950,00

Auch als Spalierform verfügbar

## hispanica 'Alphen's Globe', Kugel-Platane

Höhe: 3-5 m

Wuchs: kugelförmig

Laub: drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung gelbbraun

Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen

Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend;  
sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: zierend abblätternde Rinde

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
		20- 25	970,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00
		25- 30	1.390,00



Platanus hispanica

## hispanica 'Pyramidalis', Schmalkronige Platane

Höhe: 20-25 m

Wuchs: schmaler als die Art

Laub: meist dreilappig, auffallend breit; Herbstfärbung gelbbraun

Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen

Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend;  
sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: zierend abblätternde Rinde

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00	350,00
		14- 16	545,00	480,00
		16- 18	750,00	660,00
		18- 20	1.020,00	900,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00	925,00
		20- 25	1.390,00	



Platanus hispanica

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	2.340,00
		30- 35			2.600,00
		35- 40			3.230,00
5xv.	m.Db.	35- 40	200-300	700-900	3.580,00
		40- 45			4.410,00
		45- 50			5.450,00



Platanus hispanica 'Pyramidalis'

**hispanica 'Tremonia',**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: kegelförmig bis breit aufrecht  
 Laub: meist dreilappig, auffallend breit; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: Mai; gelblich grüne Köpfchen  
 Frucht: ab August/September bis Frühjahr; kugelig; hängend; braun  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	2.340,00
		30- 35			2.600,00
		35- 40			3.290,00

**Pleioblastus** - siehe unter Bambus - Pleioblastus

**POLYGONUM - Polygonaceae - KNÖTERICH****aubertii, Schling-Knöterich**

Synonym: Fallopia aubertii, Bilderdykia aubertii


- Höhe: 8-15 m  
 Wuchs: starkwüchsiger Schlingstrauch, braucht Halt  
 Laub: schmal eiförmig; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: Juli bis September; weiße, aufrechte Rispen  
 Frucht: selten  
 Standort: alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**Kletterpflanzen**

m.Tb.	60-100	8,65	7,65	6,95
	100-150	10,80	9,55	8,65

**Solitär**


3xv.	Co.	100-150	36,00	31,80
		150-200	50,60	44,70
		200-250	70,60	62,40



Platanus hispanica 'Tremonia'



Platanus hispanica 'Tremonia'



Polygonum aubertii



Polygonum aubertii



## POPULUS - Salicaceae - PAPPEL

### alba 'Nivea', Silber-Pappel

- Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: Krone breit ausladend, rundlich  
 Laub: drei- bis fünfflappig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen  
 Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: silbergraue Borke

#### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00
		25- 30	1.020,00	900,00

#### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00	980,00
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00	
		35- 40			2.980,00	
		40- 45			3.680,00	

### berolinensis, Berliner Lorbeer-Pappel

- Höhe: 20-25 m  
 Wuchs: Stamm bis zur Spitze, aufrecht stehend, Krone schmal kegelförmig bis breit säulenförmig  
 Laub: eiförmig, lang zugespitzt; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: vor Austrieb; nur männliche Kätzchen  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig


### canadensis 'Robusta', Kanadische Holz-Pappel

Synonym: P. euramericana 'Zeeland', P. canadensis 'Zeeland'

- Höhe: 30 (-40) m  
 Wuchs: geschlossen, schmal eiförmig  
 Laub: dreieckig; Austrieb rotbraun; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: vor Austrieb; nur männliche Kätzchen  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: weite Standortamplitude, fast alle Kulturböden; sonnig




Populus alba 'Nivea'



Populus berolinensis



Populus berolinensis



Populus canadensis 'Robusta'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00
		25- 30		1.020,00	900,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00

**canescens, Grau-Pappel**

- Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: unregelmäßig kegelförmig, später breit ausladend, hochgewölbt  
 Laub: dreieckig, oval; unterseits graufilzig  
 Blüte: vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in grünlich gelben Kätzchen  
 Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen  
 Standort: sehr weite Standortamplitude, fast alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: graue Rinde



Populus canadensis 'Robusta'



Populus canescens

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		240,00	213,00
		14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00
		25- 30		1.020,00	990,00

**nigra, Schwarz-Pappel**

- Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: breit ausladend; schnellwüchsig  
 Laub: rautenförmig, im Austrieb rötlich; oberseits dunkelgrün, unterseits hell blaugrün  
 Blüte: zweihäusig, vor Laubaustrieb; männliche Kätzchen: gelbbrot; weibliche Kätzchen: gelbgrün  
 Frucht: Samen in weißwolligen Kapseln  
 Standort: sonnig bis absonnig; anpassungsfähig; Staunässe meidend  
 Sonstiges: stadtklimaresistent und industriefest; frosthart

Baum  
des Jahres  
2006

Populus nigra



Populus nigra

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00
		25- 30		1.020,00	900,00





Populus nigra

→ nigra

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.390,00
		30- 35			1.730,00
		35- 40			2.160,00

**nigra 'Italica', Säulen-Pappel,  
Italienische Pyramiden-Pappel**

Synonym: P. nigra pyramidalis

Höhe: 25-30 m

Wuchs: schmal säulenförmig

Laub: breit herzförmig; Herbstfärbung gelb

Blüte: März bis April; männlich; hängend

Frucht: keine, da männlich

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, kalkhaltig; sonnig

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	16,60	13,90	12,60
	200-250	20,50	17,65	16,00
	250-300	25,50	22,20	

**Solitär**

3xv.	m.Db.	300-350	234,00	207,00
		350-400	325,00	285,00
		400-500	460,00	
4xv.	m.Db.	500-600	845,00	
		600-700	1.180,00	
		700-800	1.640,00	
		800-900	2.290,00	

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00
		25- 30	1.020,00	900,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	100-150	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00



Populus nigra 'Italica'




Populus nigra 'Italica'



Populus nigra 'Italica'

**simonii**, Birken-PappelSynonym: *P. brevifolia*


- Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: schmal, hochgewölbt, eiförmig, überhängend, locker  
 Laub: verkehrt eiförmig bis löffelförmig; Balsamduft; früher Austrieb; keine Herbstfärbung  
 Blüte: vor Austrieb; vorwiegend männliche Kätzchen  
 Frucht: Kapseln mit weißwolligen Samen  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, sandig bis lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: weißgraue Rinde



Populus simonii

**simonii 'Fastigiata'**, Säulenförmige Birken-Pappel

- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: anfangs säulenförmig, später breit kegelförmig, aufgelockert  
 Laub: verkehrt eiförmig bis löffelförmig; früher Austrieb; keine Herbstfärbung  
 Blüte: vor Austrieb; überwiegend männliche Kätzchen  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: Rinde weißgrau



Populus simonii 'Fastigiata'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	240,00	213,00
		14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00




Populus simonii 'Fastigiata'

**tremula**, Zitter-Pappel, Aspe, Espe

- Höhe: 10-20 (-30) m  
 Wuchs: krummstämmig, unregelmäßig, locker, annähernd eiförmig  
 Laub: fast rund; gebuchtet; Herbstfärbung gelb bis orange  
 Blüte: März bis April; vor Austrieb; zweihäusig; weibliche und männliche Kätzchen  
 Frucht: hängende, grüne Fruchtkätzchen, später weißwollig  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtschtattig  
 Sonstiges: geringe Lebenserwartung



Populus simonii 'Fastigiata'




Populus tremula



Populus tremula



Populus tremula



Populus tremula 'Erecta'

→ tremula

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	20,50	17,70	16,05
	200-250	25,50	22,20	20,15
	250-300	31,60	27,50	25,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	240,00	213,00
		14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00

**tremula 'VkG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigene**

Zitter-Pappel, Aspe, Espe aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Höhe: 10-20 (-30) m  
Wuchs: krummstämmig, unregelmäßig, locker, annähernd eiförmig



Laub: fast rund; gebuchtet; Herbstfärbung gelb bis orange  
Blüte: März bis April; vor Austrieb; zweihäusig; weibliche und männliche Kätzchen

Frucht: hängende, grüne Fruchtkätzchen, später weißwollig  
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtsattig  
Sonstiges: geringe Lebenserwartung

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	33,30	29,40	26,70
	200-250	41,10	36,30	33,00
	250-300	50,60	44,70	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	283,00
		14- 16	385,00
		16- 18	510,00
		18- 20	645,00
		20- 25	850,00

**tremula 'Erecta', Säulenförmige Zitter-Pappel**

Höhe: 8-15 m  
Wuchs: schmal säulenförmig  
Laub: breit rund; Herbstfärbung gelb bis orange  
Blüte: nur männliche Kätzchen  
Frucht: keine, da männlich  
Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtsattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	250-300	161,00
		300-350	222,00
		350-400	310,00
		400-450	450,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
		20- 25	970,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	25- 30	1.640,00
		30- 35	2.040,00

**tremula 'Tapiau', Aspe 'Tapiau'**

- Höhe: 15-18 m  
 Wuchs: eiförmig  
 Laub: herzförmig und kurz zugespitzt  
 Blüte: März bis April; zweihäusig; weibliche, rote Kätzchen  
 Frucht: Mai/Juni; weißer Haarschopf (Samenwolle)  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Böden; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	240,00	213,00
		14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00

**Solitär-Bäume, Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00

**POTENTILLA - Rosaceae - FINGERSTRAUCH****fruticosa, Gewöhnlicher Fingerstrauch**


- Höhe: 1,2-1,5 m  
 Wuchs: dichtbuschig  
 Laub: fünfzählig gefingert; hellgrün  
 Blüte: Mai bis Oktober; gelb; elliptisch bis lineallänglich  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: frisch bis feucht, alle Kulturböden; hitzeempfindlich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	5,30	4,68	4,25
5 Tr.	o.B.	60-100	7,20	6,30	5,70
	Co.	40- 60	9,20	8,10	7,35



Populus tremula 'Erecta'



Populus tremula 'Erecta'



Populus tremula 'Tapiau'



Potentilla fruticosa 'Abbotswood'

→ fruticosa

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	41,10	36,30
		100-125	56,00	49,50

**fruticosa-Sorten, Gemeiner Fingerstrauch**

Höhe: 30-80 (-150) cm  
 Wuchs: dichtbuschig  
 Laub: fünfzählig gefingert; hellgrün  
 Blüte: Mai bis Oktober; je nach Sorte gelb, weiß, rosa, orangefarben  
 Frucht: unscheinbar  
 Standort: frisch bis feucht, alle Kulturböden, empfindlich für Hitze und Trockenheit; sonnig

Sortenname	Höhe in cm	Blütenfarbe	Bewertung*	Preis- gruppe
Abbotswood	80-100	reinweiß	x	1
Dart's Golddigger®	40- 50	goldgelb	-	1
Elizabeth (Arbuscula)	50- 80	hellgelb	x	1
Farreri	60-100	dunkelgelb	o	1
Goldfinger	100-130	dunkelgelb	xxx	1
Goldstar	60- 80	leuchtend gelb	xx	1
Goldteppich	40- 60	leuchtend gelb	xx	1
Hachmann's Gigant	60- 75	leuchtend gelb	x	1
Jackman	120-150	dunkelgelb	-	1
Klondike	80-120	hellgelb	x	1
Kobold	60- 80	goldgelb	xx	1
Longacre	60-100	hellgelb	o	1
mandshurica (Manchu)	30- 40	silberweiß	-	2
Princess®	60- 80	rosa, bei Wärme silberrosa	-	2
Red Ace	40- 60	rotorange, bei Wärme hellorange, unterseits gelb	s	2
Sommerflor	60- 80	leuchtend gelb	xxx	1
Tangerine	60-100	gelborange, bei Wärme gelb	xx	2


\* Bewertung: Gehölzsichtung 1980 – 1985: xxx = ausgezeichnet, xx = sehr gut, x = gut, s = für Spezialzwecke, o = entbehrlich, - = nicht im Test

**Büsche, Preisgruppe 1**

m.Tb.	20- 30	3,95	3,50	3,17
	30- 40	4,75	4,20	3,80
Co.	40- 60	12,30	10,90	9,90

**Büsche, Preisgruppe 2**

m.Tb.	20- 30	5,10	4,50	4,10
	30- 40	6,25	5,50	4,96



Potentilla fruticosa 'Goldteppich'



Potentilla fruticosa 'Hachmann's Gigant'



Potentilla fruticosa 'Red Ace'



Potentilla fruticosa 'Tangerine'

**PRUNUS - Rosaceae - APRIKOSE, LORBEERKIRSCH, MANDEL, PFIRSICH, PFLAUME, SCHLEHE, ZIERKIRSCH****'Accolade', Zierkirsche 'Accolade'**Synonym: *P. sargentii* 'Accolade'

Höhe: 5-7 m

Wuchs: halb offen, breit trichterförmig

Laub: elliptisch; Herbstfärbung gelborange

Blüte: April vor Austrieb, lange dauernd; in Büscheln; kräftig rosa; leicht gefüllt; 4 cm

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: Rinde hellbraun

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	23,60	20,80
4 Tr.	o.B.	100-150	33,30	29,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	129,50	
		200-250	184,00	
		250-300	260,00	
4xv.	m.Db.	150-200	325,00	
		300-350	450,00	
		350-400	640,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00
			350-400	970,00
			400-450	1.350,00
			450-500	1.890,00

**Hochstämm (auch als Fußveredlung)**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00



Prunus 'Accolade'



Prunus 'Accolade'




Prunus 'Accolade'





Prunus avium



Prunus avium

## avium, Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche



Baum  
des Jahres  
2010

Höhe: 15-20 m

Wuchs: hochgewölbt, eiförmig, später bis rundlich

Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot

Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß

Frucht: ab Juli; rote Kirschen; süß, essbar

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: rosagraue Rinde, längsrissig abreibend

### verpflanzte Heister

o.B.	150-200	20,50	18,10	16,40
	200-250	25,50	22,50	20,40
	250-300	31,60	27,90	

### Solitär

3xv.	m.Db.	200-250	104,00	92,00
		250-300	157,00	138,50
		300-350	236,00	207,00

### Solitär, mehrstämmig

3xv.	m.Db.	200-250	229,00	202,00
		250-300	315,00	278,00
		300-350	450,00	
		350-400	640,00	

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14	240,00	213,00
		14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00
4xv.	m.Db.	20- 25	820,00	725,00

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Prunus avium



Prunus avium

## avium 'VkG 1 bis 3 und 4/5/6 - ZgG®', Gebietseigene Vogel-Kirsche, Süß-Kirsche aus Vorkommensgebiet 1 bis 3 und 4/5/6

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: hochgewölbt, eiförmig, später bis rundlich  
 Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot  
 Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß  
 Frucht: ab Juli; rote Kirschen; süß, essbar  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmhaltig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtig  
 Sonstiges: rosagraue Rinde, längsrissig abreibend



Prunus avium

### verpflanzte Heister

o.B.	150-200	33,30	29,40	26,70
	200-250	44,10	36,30	33,00
	250-300	50,60	44,70	

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	283,00
		14- 16	385,00
		16- 18	510,00
		18- 20	645,00
		20- 25	850,00

## avium 'Pendula', Hänge-Vogelkirsche


- Höhe: 2-2,5 m, je nach Veredlungshöhe  
 Wuchs: dicht, schleppenartig  
 Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot  
 Blüte: April bis Mai; reinweiß;  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschtig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00

### Solitär-Bäume


4xv.	m.Db.	20- 25	1.210,00
		25- 30	1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	1.840,00
		30- 35	2.290,00



Prunus avium 'Pendula'



Prunus avium 'Pendula'



Prunus avium 'Plena'

**avium 'Plena', Gefüllte Vogel-Kirsche**

Höhe: 7-12 m

Wuchs: gleichmäßig, breit kegelförmig

Laub: eilänglich; Herbstfärbung gelborange bis scharlach

Blüte: April bis Mai; reinweiß; dicht gefüllt

Frucht: keine


Standort: tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	21,10	18,60
4 Tr.	o.B.	100-150	29,20	25,80

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	150-200	129,50
			200-250	184,00
			250-300	260,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00
			300-350	450,00
			350-400	640,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00
			350-400	970,00
			400-450	1.350,00
			450-500	1.890,00



Prunus avium 'Plena'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
					1.500,00
					1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
					2.290,00
					2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
					3.150,00
					3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
					5.900,00
					7.300,00
					9.200,00



Prunus avium 'Plena'



Prunus avium 'Plena'

**cerasifera**, Kirsch-PflaumeSynonym: *P. myrobalana*

Höhe: 5-8 m

Wuchs: zunächst aufstrebend, dann sparrig ausladend, oft mehrstämmig

Laub: länglich eiförmig

Blüte: April bis Mai; weiß; einzeln

Frucht: ab Sommer; gelb oder rot; bis 3 cm dick

Standort: anspruchslos, sonnig bis absonnig; stadtklimafest

Sonstiges: als bedeutsame Veredlungsunterlage für Pflaumen und als Stammbildner in der Gehölzanzucht verwendet



Prunus cerasifera

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,90	4,47
4 Tr.	o.B.	100-150	7,50	6,60	6,00
	Co.	60-100	11,40	10,10	9,10

**cerasifera 'Nigra'**, Blut-Pflaume

Höhe: 5-7 m

Wuchs: breit kegelförmig

Laub: eiförmig bis elliptisch; schwarzrot

Blüte: April, vor oder mit Austrieb; rosa

Frucht: selten; dunkelrote Pflaumen; süß, essbar

Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Rinde jung dunkelrot, im Alter grau bis schwarz




Prunus cerasifera

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	21,10	18,60
4 Tr.	o.B.	100-150	29,20	25,80
	Co.	60-100	29,90	26,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	200-250	107,50
			250-300	152,00
			250-300	216,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00
			300-350	450,00
			350-400	640,00
5xv.	m.Db.	200-300	350-400	1.280,00
			400-450	1.790,00
			450-500	2.470,00



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus cerasifera 'Nigra'



Prunus cerasifera 'Nigra'

## → cerasifera 'Nigra'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00



Prunus cistena

**cistena, Zwerg-Blut-Pflaume**

Höhe:	1,5–2 (-2,5) m
Wuchs:	buschig aufrecht
Laub:	verkehrt eiförmig; dunkelpurpurrot; leicht glänzend
Blüte:	April/Mai, mit Austrieb; zartrosa, später weiß
Frucht:	August/September; purpurschwarze, kleine Pflaumen, essbar
Standort:	mäßig trocken, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk bevorzugend; sonnig bis lichtschattig

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	19,00	16,80
	40- 60	24,20	21,40

**Solitär**

3xv.	m.B.	60- 80	63,80
		80-100	82,50
		100-125	107,50
		125-150	141,00



Prunus cistena

**dulcis 'Dürkheimer Krachmandel', Ertrags-Mandel**

Synonym: P. amygdalus 'Dürkheimer Krachmandel'

Prunus dulcis  
'Dürkheimer Krachmandel'

Höhe:	7-9 m
Wuchs:	sehr unregelmäßig, breit
Laub:	länglich lanzettlich
Blüte:	April/Mai; weiß
Frucht:	Mandeln, essbar
Standort:	mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig
Sonstiges:	Frosthärte beachten

**dulcis 'Rosea', Blüten-Mandel**Synonym: *P. amygdalus* 'Rosea'

Höhe: 6-8 m

Wuchs: unregelmäßig, breit rundlich

Laub: länglich lanzettlich

Blüte: April vor Austrieb; rosa

Frucht: Mandeln, essbar

Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: Frosthärte beachten

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	129,50
		200-250	184,00
		250-300	260,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	345,00
		14- 16	495,00
		16- 18	715,00
		18- 20	1.020,00
		20- 25	1.350,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.430,00
		25- 30			1.790,00
		30- 35			2.220,00
5xv.	m.D	30- 35	200-300	500-700	2.600,00
		35- 40			3.230,00

**fruticosa 'Globosa', Kugel-Kirsche,**

Kugelige Steppen-Kirsche

Synonym: *P. f.* 'Nana'

Höhe: 2-4 m, je nach Veredlungshöhe

Wuchs: dicht verzweigt, geschlossen, kugelförmig

Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; Herbstfärbung orangerot


Blüte: April bis Mai; weiß

Frucht: kleine, tiefrote Kirschen; sauer, essbar; selten


Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme (auch mit Sth.100,125 cm verfügbar)**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
		20- 25	895,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00



Prunus dulcis 'Rosea'



Prunus dulcis 'Rosea'



Prunus fruticosa 'Globosa'



Prunus fruticosa 'Globosa'



Prunus hillieri 'Spire'

→ fruticosa 'Globosa'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.210,00
		25- 30		1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	1.840,00
		30- 35		2.290,00
		35- 40		2.830,00
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	3.970,00
		45- 50		4.900,00
		50- 60		6.050,00

**hillieri 'Spire', Zierkirsche 'Spire'**

Synonym: P. serrulata 'Spire'

Höhe: 5-8 m


Wuchs: schmal trichterförmig, später vasenförmig

Laub: eiförmig zugespitzt; Herbstfärbung gelb bis rot

Blüte: April; vor Austrieb mandelrosa, im Verblühen weiß

Frucht: klein, unbedeutend

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, sandig lehmig; sonnig bis lichtschantig



Prunus hillieri 'Spire'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.540,00
		35- 40			3.150,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00



Prunus hillieri 'Spire'



Prunus hillieri 'Spire'

**laurocerasus 'Caucasica', Kaukasische Lorbeerkirsche**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: kräftig; breit aufrecht

Laub: schmal elliptisch; hellgrün, glänzend; teilweise eingerollt

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

Sonstiges: sehr gesundes lang haftendes Laub; frosthärteste Sorte der großblättrigen Lorbeerkirschen

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	13,80	12,20	11,05
	40- 60	18,50	16,30	14,75
	60- 80	37,00	32,70	29,70
	80-100	43,30	38,30	

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	84,50	74,60
		100-125	120,00	106,00
		125-150	165,00	146,00
4xv.	m.Db.	150-175	234,00	
		175-200	335,00	
		200-250	485,00	

**laurocerasus 'Cherry-Brandy', Lorbeerkirsche 'Cherry Brandy'**

Höhe: bis 80 cm

Wuchs: flach, 2-3 m breit

Laub: immergrün; elliptisch

Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, lange Traube; Nachblüte im Herbst

Frucht: ab Juli bis August; schwarz; kugelig; giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

**Sträucher**

m.B./Co.	20- 30	16,60	14,65
	30- 40	19,90	17,60
	40- 50	24,80	21,90
	50- 60	29,90	26,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60- 80	82,50
		80-100	116,50
4xv.	m.Db.	100-125	165,00
		125-150	234,00



Prunus laurocerasus 'Caucasica'



Prunus laurocerasus 'Caucasica'

Prunus laurocerasus  
'Cherry Brandy'Prunus laurocerasus  
'Cherry Brandy'





Prunus laurocerasus 'Etna'®

**laurocerasus 'Etna'®**, Lorbeerkirsche 'Etna'®

Synonym: P. l. 'Anbri'

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit aufrecht, dicht geschlossen  
 Laub: immergrün; dunkelgrün; glänzend  
 Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben  
 Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: sehr schnittverträglich, lässt sich deutlich kleiner halten

**Sträucher**

m.B./Co.	30-40	16,20	14,25	12,95
	40-60	23,00	20,30	18,40
	60-80	40,10	35,40	32,10
	80-100	54,60	48,30	
	100-125	74,30	65,70	

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	116,50
		100-125	165,00
		125-150	229,00
4xv.	m.Db.	150-175	325,00
		175-200	470,00

**laurocerasus 'Greenpeace'** Lorbeerkirsche 'Greenpeace'

- Höhe: 3-4 m hoch, bis 2,5 m breit  
 Wuchs: breit aufrecht, dicht verzweigt  
 Laub: elliptisch bis umgedreht eiförmig; dunkelgrün, glänzend;  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: gut frosthart

**Sträucher**

m.B./Co.	30-40	17,50	15,40	14,00
	40-60	23,60	20,80	18,90
	60-80	41,10	36,30	33,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	98,50
		100-125	141,00
		125-150	198,00
4xv.	m.Db.	150-175	276,00
		175-200	400,00
		200-250	585,00

**laurocerasus 'Herbergii', Aufrechte Lorbeerkirsche**

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breit aufrecht, kegelförmig


Laub: immergrün; schmal elliptisch

Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben

Frucht: ab Juli/August; schwarz; kugelig; giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

Sonstiges: verträgt Hitze und Trockenheit



Prunus laurocerasus 'Herbergii'

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	17,50	15,40	14,00
	40- 60	23,60	20,80	18,90
	60- 80	41,10	36,30	33,00
	80-100	48,10	42,50	38,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	98,50
		100-125	141,00
		125-150	198,00
4xv.	m.Db.	150-175	276,00
		175-200	400,00
		200-250	585,00



Prunus laurocerasus 'Herbergii'

**laurocerasus 'Mount Vernon', Zwerg-Lorbeerkirsche**

Höhe: bis 30 cm, bei einer Breite von 80-100 cm

Wuchs: breit und flach ausgebreitet

Laub: glänzend dunkelgrün; länglich elliptisch

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig


Sonstiges: neuere Züchtung aus den USA

**Sträucher**

m.B./Co.	20- 30	17,50	15,40
	30- 40	23,00	20,30
	40- 50	34,20	30,20
	50- 60	41,10	36,30

**Solitär**

3xv.	m.Db./Co.	60- 80	96,50
		80-100	137,00

Prunus laurocerasus  
'Mount Vernon'**laurocerasus 'Novita' Lorbeerkirsche Novita**

Höhe: 3-4 m hoch, bis 3,5 m breit

Wuchs: anfangs aufrecht, später breit werdend

Laub: großes, hellgrünes Laub; glänzend;

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

Sonstiges: gut frosthart

Prunus laurocerasus  
'Mount Vernon'


→ laurocerasus 'Novita'

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	13,80	12,20	11,05
	40- 60	18,50	16,30	14,75
	60- 80	37,00	32,70	29,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	84,50
		100-125	120,00
		125-150	165,00
4xv.	m.Db.	150-175	234,00
		175-200	335,00
		200-250	485,00



Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

**laurocerasus 'Otto Luyken',** Breitwüchsige Lorbeerkirsche

Höhe: 120-170 cm  
 Wuchs: breitbuschig, annähernd halbrund  
 Laub: immergrün; lorbeerblattähnlich; schmal  
 Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben; duftend  
 Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

m.B./Co.	20- 30	14,90	13,15	11,95
	30- 40	15,80	13,90	12,60
	40- 50	21,70	19,20	17,40
	50- 60	26,90	23,50	21,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60- 80	96,50
		80-100	137,00
		100-125	194,00



Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'

**laurocerasus 'Rotundifolia',** Rundblättrige

Lorbeerkirsche

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: kräftig; breit und straff aufrecht  
 Laub: immergrün; hellgrün, glänzend  
 Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

Sonstiges: große und dekorative Belaubung; eignet sich hervorragend zur Heckenpflanzung

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	13,80	12,20	11,05
	40- 60	18,50	16,30	14,75
	60- 80	37,00	32,70	29,70
	80-100	43,30	38,30	



Prunus laurocerasus 'Rotundifolia'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	84,50	74,60
		100-125	120,00	106,00
		125-150	165,00	146,00
4xv.	m.Db.	150-175	234,00	
		175-200	335,00	
		200-250	485,00	

**laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla',**

## Großblättrige Lorbeerkirsche

- Höhe: 2-3 m hoch, 3-5 m breit  
 Wuchs: locker, breit aufrecht  
 Laub: immergrün; schmal elliptisch  
 Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, lange Trauben; Nachblüte  
 Frucht: ab Juli/August; kugelig; schwarz; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**laurocerasus 'Van Nes',** Lorbeerkirsche 'Van Nes'

- Höhe: 2-3 m hoch, 4-5 m breit  
 Wuchs: breitbuschig, locker  
 Laub: immergrün; länglich elliptisch  
 Blüte: ab Mai; weiß; aufrechte, sehr lange Traube; reich blühend  
 Frucht: ab Juli bis August; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig

**laurocerasus 'Zabeliana',** Schmalblättrige Lorbeerkirsche

- Höhe: 1,2-1,8 m hoch, 3-5 m breit  
 Wuchs: flach waagrecht ausgebreitet, Kontur halbrund  
 Laub: immergrün; lanzettlich bis schmal eiförmig  
 Blüte: Mai; weiß; aufrechte Trauben; reiche Nachblüte  
 Frucht: ab Juli/August; schwarz; kugelig; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis schattig  
 Sonstiges: sehr frosthart

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	16,60	14,65	13,20
	40- 60	22,30	19,70	17,90
	60- 80	43,30	38,30	34,80
	80-100	50,60	44,70	40,60

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	98,50
		100-125	137,00
		125-150	194,00
		150-175	276,00

Prunus laurocerasus  
'Schipkaensis Macrophylla'Prunus laurocerasus  
'Schipkaensis Macrophylla'

Prunus laurocerasus 'Van Nes'



Prunus laurocerasus 'Zabeliana'



Prunus lusitanica

## lusitanica, Portugiesische Lorbeerkirsche



- Höhe: 4-6 m, 3-4 m breit  
 Wuchs: breit kegelförmig oder formiert  
 Laub: immergrün; länglich eiförmig  
 Blüte: Juni; weiß; Traube  
 Frucht: ab Sommer; dunkelpurpurrot  
 Standort: trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig, steinig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig; geschützter Standort  
 Sonstiges: frostgeschädigte Pflanzen haben ein hohes Regenerationsvermögen und treiben rasch wieder aus

### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	38,00
	60- 80	46,80

### Solitär

3xv.	m.B./Co.	80-100	107,50
		100-125	152,00
		125-150	216,00



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

## lusitanica 'Angustifolia', Schmalblättrige Lorbeerkirsche

- Höhe: 4-6 m, 3-4 m breit  
 Wuchs: breit kegelförmig oder formiert  
 Laub: immergrün; länglich lanzettlich  
 Blüte: Juni; weiß; Traube  
 Frucht: ab Sommer; dunkelpurpurrot  
 Standort: trocken bis feucht, durchlässig, sandig lehmig, steinig, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig; geschützter Standort  
 Sonstiges: frostempfindlich, aber nach Winterschäden rasch regenerierend

### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	38,00
	60- 80	46,80
	80-100	57,60

### Solitär


3xv.	m.B./Co.	100-125	152,00
		125-150	216,00
		150-175	355,00



Prunus lusitanica 'Angustifolia'

## maackii 'Amber Beauty', Amur-Kirsche

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: kegelförmige Krone  
 Laub: hellgrün, Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: weiße Doldentrauben im April  
 Frucht: selten; klein; schwarz  
 Standort: sonnig bis halbschattig; anspruchslos; frische, sandig lehmige, nährstoffreiche Böden  
 Sonstiges: auffallend gelbbraune, glänzend glatte Rinde



Prunus maackii 'Amber Beauty'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00

**mahaleb, Steinweichsel, Weichsel-Kirsche**

Höhe: 4-6 (-8) m

Wuchs: locker, breit kegelförmig bis rundlich

Laub: rundlich bis oval; glänzend grün


Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; weiß; duftend

Frucht: ab August/September; schwarzrot; kugelig; saftarm; bitter, essbar

Standort: trocken bis frisch, sandig bis kiesig lehmig, locker, Kalk liebend; sonnig



Prunus maackii 'Amber Beauty'



Prunus mahaleb

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	5,20	3,69	3,35
4 Tr.	o.B.		100-150	7,20	5,30	4,80
	Co.		60-100	9,90	8,75	7,95

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	63,80	59,40
		150-200	82,50	72,80
		200-250	116,50	

**padus, Trauben-Kirsche, Faulbaum**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: oft mehrstämmig, Hauptäste durchgehend aufrecht

Laub: länglich elliptisch, runzelig; Herbstfärbung gelborange

Blüte: April bis Mai; weiß; lockere Trauben; stark duftend


Frucht: ab August; kugelig; rotschwarz; bitter, essbar

Standort: weite Standortamplitude, fast alle Böden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Lebenserwartung ca. 60 Jahre; Früchte können zu Saft, Marmelade und Essig verarbeitet werden



Prunus padus



Prunus padus

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	6,75	5,00	4,50
4 Tr.	o.B.		100-150	9,45	7,30	6,80
	Co.		60-100	11,70	10,35	9,40



Prunus padus

→ padus

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-200	107,50	95,00
			200-250	152,00	
			250-300	216,00	
			300-350	325,00	
4xv.	m.Db.	200-300	300-350	485,00	
			350-400	695,00	
			400-500	990,00	
5xv.	m.Db.	300-400	400-500	1.940,00	
			500-600	2.680,00	

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00



Prunus padus



Prunus padus 'Albertii'

**padus 'Albertii', Trauben-Kirsche 'Albertii'**

Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig  
 Laub: länglich elliptisch, runzelig; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weiß; dichte Trauben; stark duftend  
 Frucht: ab August; kugelig; rotschwarz; selten; bitter  
 Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00



Prunus padus 'Albertii'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.210,00 1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	1.840,00 2.290,00 2.830,00

**padus 'Colorata', Trauben-Kirsche 'Colorata'**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: breit rundlich, offen  
 Laub: länglich elliptisch, rot austreibend; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weiß; große hängende Trauben; stark duftend  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral;  
 sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: gute Trachtpflanze

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			305,00 415,00 575,00 750,00 970,00	265,00 365,00 510,00 655,00 855,00
4xv.	m.Db.	20- 25			1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.320,00 1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35	200-300	500-700	1.980,00 2.470,00

**padus 'Schloss Tiefurt', Trauben-Kirsche 'Schloss Tiefurt'**

- Höhe: 9-12 m  
 Wuchs: kegelförmig; geschlossen  
 Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weiß; dichte hängende Trauben; duftend  
 Frucht: selten; ab August; rotschwarz; bitter  
 Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral;  
 sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			270,00 370,00 510,00 680,00 895,00	240,00 330,00 450,00 600,00 790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00



Prunus padus 'Colorata'



Prunus padus 'Colorata'




Prunus padus 'Schloss Tiefurt'



Prunus padus 'Schloss Tiefurt'





Prunus padus 'Watereri'

→ padus 'Schloss Tiefurt'

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db. 20- 25	150-200	400-500	1.210,00
	25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db. 25- 30	200-300	500-700	1.840,00
	30- 35			2.290,00
	35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db. 30- 35	200-300	700-900	2.540,00
	35- 40			3.150,00
	40- 45			3.880,00

**padus 'Watereri', Großblütige Trauben-Kirsche**

Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: locker, breit kegelförmig bis annähernd eiförmig  
 Laub: länglich elliptisch; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weiß; große hängende Trauben; stark duftend  
 Frucht: selten  
 Standort: feucht bis mäßig nass, gute Kulturböden, schwach sauer bis neutral; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**


3xv.	m.Db. 12- 14			247,00	218,00
	14- 16			335,00	293,00
	16- 18			460,00	403,00
	18- 20			600,00	530,00
	20- 25			795,00	700,00
4xv.	m.Db. 20- 25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db. 20- 25	150-200	400-500	1.110,00
	25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db. 25- 30	200-300	500-700	1.730,00
	30- 35			2.160,00
	35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db. 30- 35	200-300	700-900	2.340,00
	35- 40			2.910,00
	40- 45			3.580,00



Prunus padus 'Watereri'



Prunus 'Rancho'

**'Rancho', Zierkirsche 'Rancho'**

Synonym: P. sargentii 'Rancho'

Höhe: 6-8 m, bis 3 m breit  
 Wuchs: schmal säulenförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig; Austrieb bronze; keine Herbstfärbung  
 Blüte: April bis Mai; rosa; groß, 4 cm  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechelschattig



Prunus 'Rancho'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

PRUNUS

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00

**sargentii**, Scharlach-Kirsche, Berg-Kirsche

Höhe: 8-10 m

Wuchs: aufrecht bis breit ausladend

Laub: verkehrt eiförmig; Austrieb bronzerot; Herbstfärbung scharlachrot orange

Blüte: April bis Mai; vor Austrieb; reinrosa; 3-4 cm; einfach in Dolden; auffallend

Frucht: ab August; kugelig; dunkelrot; bitter, essbar

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sandig lehmig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: Rinde kastanienbraun, glänzend, deutlich sichtbare Lentizellen



Prunus 'Rancho'




Prunus sargentii

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	23,60	20,80
4 Tr.	o.B.		100-150	33,30	29,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	86,50	
			150-200	129,50	
			200-250	184,00	
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00	
			300-350	450,00	
			350-400	640,00	



Prunus sargentii

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00



Prunus sargentii




Prunus schmittii



Prunus schmittii



Prunus schmittii



Prunus serotina

→ sargentii

5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	200-300	500-700	2.540,00 3.150,00 3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45 45- 50 50- 60	300-400	500-700	4.770,00 5.900,00 7.300,00

**schmittii, Zierkirsche**



Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: geschlossen, schmal kegelförmig  
 Laub: elliptisch; Austrieb bronze; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weißrosa; leicht gefüllt  
 Frucht: nicht beobachtet  
 Standort: tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: Rinde mahagonifarben glänzend; außergewöhnlich frosthart

**Hochstämme (auch als Fußveredlung)**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			270,00 370,00 510,00 680,00 895,00	240,00 330,00 450,00 600,00 790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.210,00 1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40 40- 45	150-200	500-700	2.040,00 2.540,00 3.150,00 3.880,00

**serotina, Späte Trauben-Kirsche**



Höhe: 5-10 (-15)  
 Wuchs: Strauch oder Baum, länglich eiförmig  
 Laub: länglich bis elliptisch; später Austrieb; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: April bis Mai; weiße Trauben  
 Frucht: ab August; rund; dunkelpurpurn bis schwarz; bitter, essbar  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, sauer bis schwach alkalisch, sandig bis lehmig, Kalk meidend; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	5,45	3,91	3,55
4 Tr.	o.B.		100-150	7,50	5,50	5,00
	Co.		60-100	10,20	9,00	8,15

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-200	74,30	65,70
			200-250	104,00	
			250-300	148,00	
			300-350	222,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-300	300-350	345,00
			350-400	485,00
			400-500	715,00

**serrula, Mahagoni-Kirsche, Tibetanische Kirsche**

Höhe: 6-8 m

Wuchs: rundlich, mehrstämmig

Laub: schmal elliptisch; Herbstfärbung gelb

Blüte: April bis Mai; weiß

Frucht: ab Sommer; rot; selten ausgebildet

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, sandig lehmig oder lehmig, Kalk liebend; vollsonnig bis wechselschattig

Sonstiges: mahagonifarbene Dekorrinde



Prunus serotina

**Solitär**

3xv.	m.Db.		125-150	114,00
			150-200	161,00
			200-250	228,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	430,00
			300-350	470,00
			350-400	675,00
			400-500	945,00



Prunus serrula

**serrulata 'Amanogawa', Säulen-Kirsche**

Synonym: P. s. 'Erecta'

Höhe: 6- 8 m

Wuchs: schmal säulenförmig, später breit eiförmig


Laub: spitz elliptisch; Austrieb bräunlich; Herbstfärbung oft orangegelb

Blüte: April bis Mai; hellrosa; leicht gefüllt; in Büscheln, 4 cm; auffallend; schwach duftend

Frucht: keine

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

Sonstiges: Rinde hell- bis rotbraun



Prunus serrulata 'Amanogawa'

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.		60-100	23,00	20,00
			100-150	32,70	28,45



Prunus serrulata 'Amanogawa'



Prunus serrulata 'Amanogawa'

→ serrulata 'Amanogawa'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	86,50
		150-200	129,50
		200-250	184,00
4xv.	m.Db.	250-300	260,00
		300-350	400,00
		350-400	600,00
		400-500	920,00
5xv.	m.Db.	500-600	1.390,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	18- 20	60-100	400-500	895,00
		20- 25			1.180,00
4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	30- 35	100-150	500-700	2.290,00
		35- 40			2.830,00



Prunus serrulata 'Kanzan'

**serrulata 'Kanzan', Hohe Nelken-Kirsche**

- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: breit trichterförmig, später schirmartig  
 Laub: spitz elliptisch; Austrieb bronze; Herbstfärbung orangegelb  
 Blüte: Anfang Mai; dunkelpurpurrosa, später silberrosa; dicht gefüllt; in Büscheln; 6 cm; reich blühend  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtig  
 Sonstiges: Rinde rotbraun, später braungrau



Prunus serrulata 'Kanzan'

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	23,60	20,80
4 Tr.	o.B.	100-150	33,30	29,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	129,50
		200-250	184,00
		250-300	260,00
4xv.	m.Db.	150-200	325,00
		250-300	450,00
		300-350	640,00
		350-400	970,00
5xv.	m.Db.	200-300	695,00
		300-350	970,00
		350-400	1.350,00
		400-500	1.890,00



Prunus serrulata 'Kanzan'

**Hochstämme (auch als Fußveredlung)**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	500-700	5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00

**serrulata 'Kiku-shidare-zakura', Hänge-Nelken-Kirsche**

Synonym: P. s. 'Shidare-zakura'

Höhe: 3-5 m

Wuchs: Hängeform, schleppenartig

Laub: spitz elliptisch; Austrieb bronzegelb; Herbstfärbung gelborange

Blüte: April bis Mai; Knospen purpurrosa, später rosa; dicht gefüllt; 3 cm

Frucht: keine

Standort: tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: Rinde erst rötlich, später bräunlich grau

**Solitär**


3xv.	m.Db.		150-200	129,50
			200-250	184,00
4xv.	m.Db.	100-150	250-300	370,00
			300-350	530,00
			350-400	750,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		340,00	300,00
		14- 16		475,00	420,00
		16- 18		680,00	600,00
		18- 20		900,00	795,00
		20- 25		1.050,00	925,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.270,00	1.110,00



Prunus serrulata 'Kanzan'

Prunus serrulata  
'Kiku-shidare-zakura'Prunus serrulata  
'Kiku-shidare-zakura'Prunus serrulata  
'Kiku-shidare-zakura'



Prunus serrulata 'Royal Burgundy'

→ serrulata 'Kiku-shidare-zakura'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.610,00 2.025,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	150-200	400-500	2.160,00 2.680,00 3.320,00

**serrulata 'Royal Burgundy', Rotlaubige Zierkirsche**

Höhe:	5-7 m
Wuchs:	breit trichterförmig
Laub:	spitz elliptisch; violett-purpurrot, Herbstfärbung rötlich bis bronzefarben
Blüte:	Mai; dunkelpurpurrosa
Frucht:	keine
Standort:	frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig
Sonstiges:	'Royal Burgundy' ist ein rotblättriger Spot von P. serrulata 'Kanzan'; etwas schwächer wachsend als die Muttersorte




Prunus serrulata 'Shirofugen'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			270,00 370,00 510,00 680,00 895,00	240,00 330,00 450,00 600,00 790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.210,00 1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	150-200	400-500	1.840,00 2.290,00 2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	200-300	500-700	2.540,00 3.150,00 3.880,00



Prunus serrulata 'Shirofugen'

**serrulata 'Shirofugen', Zierkirsche 'Shirofugen'**

Synonym: P. albo-rosea

Höhe:	7-9 m, Breite 6-8 m
Wuchs:	breit ausladend, trichterförmig, später schirmartig
Laub:	Austrieb dunkelbronzen, im Herbst orangegelb
Blüte:	Mai bis Juni; Knospe rosa, später reinweiß, im Verblühen purpurrosa; gefüllt; 5 cm
Frucht:	keine
Standort:	tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig
Sonstiges:	Rinde hellbraun, später dunkelbraun



Prunus serrulata 'Shirofugen'

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	200-250	129,50	
			250-300	184,00	
				260,00	
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00	
			300-350	450,00	
			350-400	640,00	
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00	
			350-400	970,00	
			400-500	1.350,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00

**serrulata 'Taihaku', Zierkirsche 'Taihaku'**

Höhe: 7-9 m, Breite 6-8 m

Wuchs: breit rundlich, später tafelförmig

Laub: eilänglich; Austrieb bronze; Herbstfärbung gelborange

Blüte: April; Knospe rosa, später schneeweiß; groß; 6 cm


Frucht: vereinzelt; rot; 1 cm

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: Rinde bildet kräftige Borke, quer laufende Lentizellen deutlich sichtbar

**Solitär**


3xv.	m.Db.	150-200	129,50
		200-250	184,00
		250-300	260,00



Prunus serrulata 'Shirofugen'



Prunus serrulata 'Taihaku'




Prunus serrulata 'Taihaku'



Prunus serrulata 'Taihaku'





Prunus serrulata 'Taihaku'

→ **serrulata 'Taihaku'**

4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00
			300-350	450,00
			350-400	640,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00
			350-400	970,00
			400-500	1.350,00

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
		40- 45			3.490,00




Prunus spinosa

**spinosa, Schlehe, Schwarzdorn**



Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: dickichtartig, Ausläufer treibend  
 Laub: verkehrt eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: März/April; weiß; nach Bittermandeln duftend  
 Frucht: ab September; kugelig; schwärzlich; bereift; süß säuerlich; erst nach Frost roh genießbar  
 Standort: weite Standortamplitude, nährstoffreich, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: stark bedornt



Prunus spinosa

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	6,25	4,55	4,10
		100-150	8,65	6,50	5,90
		60-100	12,35	10,90	9,90
	Co.				

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	125-150	86,50	76,50
			150-200	129,50	114,50
			200-250	184,00	
			250-300	260,00	
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00	
			300-350	450,00	



Prunus spinosa

## spinosa 'VKG 1 bis 6 - ZgG®', Gebütsseigene Schlehe, Schwarzdorn aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

- Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: dickichtartig, Ausläufer treibend  
 Laub: verkehrt eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: März/April; weiß; nach Bittermandeln duftend  
 Frucht: ab September; kugelig; schwärzlich; bereift; süß säuerlich; erst nach Frost roh genießbar  
 Standort: weite Standortamplitude, nährstoffreich, sandig lehmig, kalkhaltig; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: stark bedornt




Prunus spinosa

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	7,70	5,70	5,15
		100-150	10,50	8,30	7,50

## subhirtella 'Autumnalis Rosea', Rosa Winter-Kirsche

- Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: ausladend, vasenförmig  
 Laub: spitz oval; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: ab Dezember; Hauptblüte März bis April; rosa; halbgefüllt; 2 cm  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechseltattig  
 Sonstiges: Rinde dunkelbraun, später grauschwarz

Prunus subhirtella  
'Autumnalis Rosea'

## subhirtella 'Fukubana', Rosa Frühlings-Kirsche

- Höhe: 4-6 m, Breite 3-4 m  
 Wuchs: aufrecht, rundlich bis schirmförmig  
 Laub: elliptisch; Austrieb bronzegrün; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April; Knospe rosarot, später dunkelrosa; halbgefüllt; Rand franselig  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend, sandig lehmig; sonnig bis wechseltattig  
 Sonstiges: Rinde hellbraun, später graubraun


Prunus subhirtella  
'Autumnalis Rosea'

### Solitär

3xv.	m.Db.		150-200	129,50
			200-250	184,00
			250-300	260,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00
			300-350	450,00
			350-400	640,00
			400-500	1.350,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00
			350-400	970,00
			500-600	1.890,00



Prunus subhirtella 'Fukubana'



Prunus subhirtella 'Fukubana'

→ subhirtella 'Fukubana'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.210,00
		25- 30		1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	1.840,00
		30- 35	400-500	2.290,00
		35- 40		2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	2.540,00
		35- 40	500-700	3.150,00
		40- 45		3.880,00



Prunus subhirtella 'Fukubana'

**subhirtella 'Pendula', Hänge-Schnee-Kirsche**

Höhe: je nach Veredlungshöhe 2-5 m hoch, 3-4 m breit  
 Wuchs: Hängeform, schirmartig  
 Laub: spitz oval; Austrieb bronzefarben; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April; hellrosa; 1,5 cm  
 Frucht: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis wechselschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	1.210,00
		25- 30		1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	1.540,00
		30- 35		2.290,00
		35- 40		2.830,00



Prunus subhirtella 'Pendula'



Prunus subhirtella 'Pendula'

**tenella 'Fire Hill', Rote Zwerg-Mandel**

- Höhe: 1-1,5 m, bis 2,5 m breit  
 Wuchs: breitbuschig, locker aufrecht bis überhängend  
 Laub: elliptisch bis lanzettlich; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: April/Mai; kurz vor Austrieb; rosarot  
 Frucht: ab August; kugelig  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtattig  
 Sonstiges: windgeschützt, gut hitzeverträglich

**verpflanzte Sträucher**

Co.	30- 40	21,10	18,60
	40- 60	23,00	20,30

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	107,50
		125-150	157,00
		150-200	234,00

**triloba, Mandelbäumchen**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: kompakt, breitbuschig  
 Laub: breit elliptisch, häufig dreilappig  
 Blüte: April; rosa; dicht gefüllt  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, sandig bis lehmig; sonnig bis lichtschtattig

**Halbstämme**

Co.	Sth.	80-100	46,80
	Sth.	100-125	51,90

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	80-100	82,50
		100-125	107,50
		125-150	170,00

**'Umineko', Schmalkronige Fuji-Kirsche**

Synonym: *P. incisa* 'Umineko'


- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: breit säulenförmig; später breit eiförmig  
 Laub: eiförmig, zugespitzt; Herbstfärbung orange und scharlachrot  
 Blüte: April; reinweiß; einfach  
 Frucht: ohne Bedeutung  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtattig  
 Sonstiges: Rinde graubraun



Prunus tenella 'Fire Hill'



Prunus tenella 'Fire Hill'



Prunus triloba



Prunus triloba

→ 'Umineko'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150		1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00

**virginiana 'Shubert',** Virginische Trauben-Kirsche

Synonym: P. 'Shubert'

Höhe: 5-8 m

Wuchs: geschlossen, eiförmig, später rund

Laub: breit elliptisch; Austrieb hellgrün, später dunkelpurpurrot

Blüte: Mai; weiß; überhängende Trauben

Frucht: ab August; schwarzrot; kugelig; essbar

Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: extrem frosthart!

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00



Prunus 'Umineko'



Prunus 'Umineko'



Prunus virginiana 'Shubert'



Prunus virginiana 'Shubert'

**yedoensis**, Japanische Maien-Kirsche, Yoshino-Kirsche 

- Höhe: 8-10 m, 5-7 m breit  
 Wuchs: breit ausladend, flach trichterförmig  
 Laub: elliptisch; Austrieb gelblich grün; Herbstfärbung gelb bis orangefarben  
 Blüte: April; Knospe rosa, später weiß; 3,5 cm  
 Frucht: ab August; glänzend; schwarz; kugelig; selten  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis wechelschattig  
 Sonstiges: Rinde braunrot über rötlich bis grau

**Solitär**

3xv.	m.Db.		150-200	129,50
			200-250	184,00
			250-300	260,00
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	325,00
			300-350	450,00
5xv.	m.Db.	200-300	300-350	695,00
			350-400	970,00
			400-500	1.350,00
			500-600	1.890,00

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00	
					25- 30	1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.040,00	
					30- 35	2.540,00
					35- 40	3.150,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00	
					45- 50	5.900,00
					50- 60	7.300,00

**PRUNUS Fruchtsorten** - siehe Obstteil**Pseudosasa** - siehe unter Bambus

Prunus yedoensis



Prunus yedoensis



Prunus yedoensis



Prunus yedoensis



Ptelea trifoliata

## PTELEA - Rutaceae - HOPFENSTRAUCH, KLEEULME, LEDERSTRAUCH

### trifoliata, Dreiblättriger Lederstrauch



Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: rundlich, breit wie hoch  
 Laub: dreizählig; Herbstfärbung gelb; auffallend  
 Blüte: Juni; gelblich grün; unscheinbar  
 Frucht: ab Herbst bis Winter; Nüsse, geflügelt, diskusförmig  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, mäßig nährstoffreich, sandig, lehmig; sonnig



Ptelea trifoliata

### verpflanzte Sträucher

Co.	80-100	24,20	21,40
	100-125	29,20	


### Solitär

3xv.	m.Db.	150-175	133,50
		175-200	189,00
		200-250	315,00
		250-300	450,00

## PTEROCARYA - Juglandaceae - FLÜGELNUSS

### fraxinifolia, Kaukasische Flügelnuß

Höhe: 15-20 (-30) m  
 Wuchs: meist mehrstämmig, breit gewölbt, rundlich, Ausläufer treibend  
 Laub: gefiedert; früher Austrieb; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen hängenden Kätzchen  
 Frucht: ab August; geflügelte Nüsschen; lang, perlschnurartig, hängend  
 Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig  
 Sonstiges: Rinde tief gefurcht; schwarzgrau



Pterocarya fraxinifolia

### Solitär

3xv.	m.Db.		150-200	129,50
			200-250	184,00
			250-300	260,00
			300-350	470,00
4xv.	m.Db.	200-300	250-300	560,00
			300-350	820,00
			350-400	1.180,00
5xv.	m.Db.	300-400	350-400	2.040,00
			400-500	2.910,00
			500-600	4.070,00
			600-700	5.750,00



Pterocarya fraxinifolia

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14			270,00
		14- 16			370,00
		16- 18			510,00
		18- 20			680,00
		20- 25			895,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	400-500	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00

**rhoifolia 'Kyoto Convention'®, Flügelnuss**

Höhe: bis 15 m, schnellwachsend

Wuchs: pyramidenförmig, dichte Krone

Laub: gefiedert; früher Austrieb

Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten in langen hängenden Kätzchen; grün

Frucht: geflügelte Nüsschen in hängenden Trauben; ca. 25 cm


Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14			305,00
		14- 16			415,00
		16- 18			575,00
		18- 20			750,00
		20- 25			970,00
4xv.	m.Db.	20- 25			1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00



Pterocarya fraxinifolia



Pterocarya fraxinifolia





Pterostyrax corymbosa

## PTEROSTYRAX - Styraceae - FLÜGEL-STORAX

### corymbosa, Doldiger Flügel-Storax

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breiter Strauch  
 Laub: elliptisch bis eiförmig, 6-11 cm lang  
 Blüte: weiß; in 8-15 cm langen, lockeren Doldenrispen  
 Frucht: ca. 12 mm lange Steinfrucht, 5-flügelig  
 Standort: bevorzugt einen neutralen, gut drainierten Boden, kalkverträglich  
 Sonstiges: in voller Blüte eine sehr auffällige Erscheinung

#### Solitär

3xv.	m.Db.	175-200	129,50
		200-250	184,00
		250-300	260,00



Pyracantha 'Orange Glow'

## PYRACANTHA - Rosaceae - FEUERDORN

### in Sorten, Feuerdorn-Sorten



- Höhe: 0,6-3,5 m  
 Wuchs: je nach Sorte mehr oder minder buschig aufrecht, sparrig  
 Laub: immergrün; länglich bis eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß  
 Frucht: ab September bis Winter; orange, gelb oder rot; auffallend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: bedornt



Pyracantha 'Soleil d'Or'

Sorte	Wuchshöhe in cm	Fruchtfarbe	Bewertung*	Preisgruppe
'Golden Charmer'	200 – 300	orangegelb	sehr gut	1
'Koralle'	70 – 100	rot	entbehrlich	2
'Mohave'	250 – 300	orangerot	entbehrlich	1
'Orange Charmer'	200 – 250	orange	sehr gut	1
'Orange Glow'	250 – 350	orange	gut	1
'Red Column'	200 – 250	rot	gut	1
'Red Cushion'	60 – 100	rot	nicht im Test	2
'Soleil d'Or'	160 – 220	goldgelb	sehr gut	1
'Teton'	100 – 150	rot	nicht im Test	2

\* Bewertung: Gehölzsichtung 1980 – 1985

#### Preisgruppe 1

#### gestäbte Pflanzen

m.Tb./Co.	40- 60	8,95	7,90	7,15
	60- 80	10,80	9,55	8,65
	80-100	13,00	11,85	10,75

#### Solitär

3xv.	Co.	80-100	45,60	40,30
		100-125	59,00	52,20
		125-150	76,50	
		150-175	98,50	

**Preisgruppe 2  
Büsche**

Co.	20- 30	8,95	7,90	7,15
	30- 40	10,80	9,55	8,65

**PYRUS - Rosaceae - BIRNE****calleryana 'Chanticleer', Chinesische Wildbirne**

- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: gleichmäßig, kegelförmig, schmal, später breiter und lockerer  
 Laub: eiförmig bis rundlich; früher Austrieb, später Blattfall; Herbstfärbung rot bis scharlachrot  
 Blüte: April bis Mai; zeitgleich mit dem Austrieb; weiß  
 Frucht: ab August; rundlich bis länglich; klein; bräunlich; selten; nicht auffallend  
 Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: feuerbrandresistent; Frühjahrspflanzung ratsam



Pyrus calleryana 'Chanticleer'

**canescens, Grau-Birne**


- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: kegelförmig, aufgelockert  
 Laub: lanzettlich bis schmal elliptisch; Austrieb grauweiß; filzig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April bis Mai; weiß  
 Frucht: wenig fruchtend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig



Pyrus canescens

**caucasica, Kaukasische Wildbirne****Synonym: P. communis caucasica**


- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: gleichmäßig, länglich eiförmig  
 Laub: eirund, zugespitzt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April/Mai; weiß  
 Frucht: rund; gelblich; bis 4 cm Durchmesser; selten  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschantig



Pyrus canescens

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00




Pyrus caucasica



Pyrus caucasica



Pyrus communis



Pyrus communis 'Beech Hill'



Pyrus communis 'Beech Hill'

→ caucasica

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25 25-30	100-150	400-500	1.210,00 1.500,00
5xv.	m.Db.	25-30 30-35 35-40	150-200	500-700	1.840,00 2.290,00 2.830,00
5xv.	m.Db.	30-35 35-40 40-45	200-300	500-700	2.540,00 3.150,00 3.880,00
6xv.	m.Db.	40-45 45-50 50-60	200-300	700-900	4.770,00 5.900,00 7.300,00

**communis, Gemeine Birne, Holzbirne**



Baum  
des Jahres  
1998

Synonym: P. pyraaster, P. domestica

- Höhe: 8-12 (-20) m  
 Wuchs: unregelmäßig, sparrig, hochgewölbt  
 Laub: eirund bis elliptisch; früher Austrieb; Herbstfärbung orange bis gelb  
 Blüte: April bis Mai; zugleich mit Austrieb; weiß  
 Frucht: ab September; klein; kugelig; bis 3,5 cm dick; hart; graugrün; herb schmeckend  
 Standort: durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: dornige Fruchtspieße

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,65	6,50	5,90
4 Tr.	o.B.	100-150	11,70	9,30	8,45

**communis 'Beech Hill', Wildbirne 'Beech Hill'**

- Höhe: 8-10 (-15) m  
 Wuchs: regelmäßig, schmal kegelförmig  
 Laub: eirund bis länglich; Herbstfärbung leuchtend gelb bis orangerot  
 Blüte: April bis Mai; weiß; auffallend  
 Frucht: ab September; birnenförmig, klein, bis 4 cm Durchmesser; gelbgrün; sauer  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25	270,00 370,00 510,00 680,00 895,00	240,00 330,00 450,00 600,00 790,00
4xv.	m.Db.	20-25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00	1.500,00
		25- 30				
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00	2.290,00
		30- 35				
		35- 40			2.830,00	

**regelii, Fiederlaub-Birne, Turkmenische Birne**

Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: eiförmig, später rundlich  
 Laub: oval, ungeteilt oder fiederteilig; Herbstfärbung gelborange  
 Blüte: April bis Mai; weiß  
 Frucht: ab September, birnenförmig; gelbgrün; essbar  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: dornige Fruchtspieße

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			270,00	240,00
		14- 16			370,00	330,00
		16- 18			510,00	450,00
		18- 20			680,00	600,00
		20- 25			895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00	1.500,00
		25- 30				
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00	2.290,00
		30- 35				
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00	3.150,00
		35- 40			3.150,00	
		40- 45			3.880,00	

**salicifolia 'Pendula', Hängende Silber-Birne**

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: malerische, unregelmäßige Hängeform  
 Laub: schmal elliptisch; silbrig grau; lange haftend  
 Blüte: April; mit Austrieb; weiß  
 Frucht: ab August; grüne Birnen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14			475,00	
		14- 16			670,00	
		16- 18			910,00	
4xv.	m.Db.	18- 20			1.280,00	
		20- 25			1.640,00	
		25- 30			2.220,00	
5xv.	m.Db.	30- 35			3.150,00	
		35- 40			3.880,00	



Pyrus communis 'Beech Hill'



Pyrus regelii



Pyrus regelii



Pyrus salicifolia 'Pendula'

**PYRUS Fruchtsorten - siehe Obstteil**

**QUERCUS - Fagaceae - EICHE**

**bicolor, Zweifarbige Eiche**

- Höhe: 15-20 m
- Wuchs: breit rundlich, offen
- Laub: verkehrt eiförmig, nicht tief gelappt; Herbstfärbung gelbbraun bis orange und rot
- Blüte: April bis Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig
- Frucht: Eicheln
- Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, Kalk meidend, sonnig bis halbschattig
- Sonstiges: Borke platanenartig abblättern

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
		18- 20	1.280,00
		20- 25	1.690,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.850,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.990,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.410,00
		30- 35			4.190,00
		35- 40			5.050,00

**bimundorum 'Crimson Spire'**


- Höhe: 10-15 m
- Wuchs: säulenförmig, später schmal oval, dichte Krone
- Laub: verkehrt eiförmig, flach gelappt; dunkelgrün; 10-15 cm; im Herbst rot bis lila
- Blüte: Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig
- Frucht: Eicheln, Nüpfchen mit warzigen Schuppen, 1,5-2,5 cm
- Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, sonnig bis halbschattig
- Sonstiges: verträgt Teilbepflasterung

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00
4xv.	m.Db.	14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
		18- 20	1.390,00
5xv.	m.Db.	20- 25	2.040,00
		25- 30	2.830,00
		30- 35	3.880,00



Quercus bicolor



Quercus bicolor

**castaneifolia**, Kastanienblättrige Eiche

- Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, hochgewölbt  
 Laub: schmal eiförmig, Blattrand mit scharf zugespitzten Zähnen  
 Blüte: April bis Mai; gelbgrüne Kätzchen; einhäusig  
 Frucht: Eicheln; Reife im 2. Jahr; dekorativ durch Becherschuppen  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig; sonnig, warme Lage; neutral bis alkalisch  
 Sonstiges: junge Triebe braunviolett

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			530,00
		14- 16			750,00
		16- 18			1.020,00
		18- 20			1.280,00
		20- 25			1.690,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.410,00
		30- 35			4.190,00
		35- 40			5.050,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.250,00
		45- 50			7.700,00

**cerris**, Zerr-Eiche

- Höhe: 25-30 m  
 Wuchs: stumpf kegelförmig, später breit und hochgewölbt  
 Laub: schmal länglich gelappt; ledrig; glänzend grün; Herbstfärbung gelbbraun bis rötlich  
 Blüte: April/Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelblich grünen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln mit wolligen Bechern; Reife im 2. Jahr  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig.  
 Sonstiges: dicke, längs- und querrissige Rinde; graubraun, Risse rostrot

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14			305,00
		14- 16			415,00
		16- 18			575,00
		18- 20			750,00
		20- 25			970,00
4xv.	m.Db.	20- 25			1.050,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00




Quercus castaneifolia



Quercus castaneifolia



Quercus cerris



Quercus cerris

→ **cerris**

5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
5xv.	m.Db.	35- 40	300-400	500-700	3.780,00
		40- 45			4.650,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	5.750,00
		45- 50			7.150,00
		50- 60			8.950,00

**coccinea, Scharlach-Eiche**

Höhe: 18 (-20) m  
 Wuchs: locker, breit kegelförmig  
 Laub: elliptisch, tief gelappt; glänzend grün;  
 Herbstfärbung scharlachrot; oft astweise  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; Reife und Fall im Oktober  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme, Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	10- 12	510,00
		12- 14	560,00
		14- 16	795,00
5xv.	m.Db.	16- 18	1.180,00
		18- 20	1.460,00
		20- 25	2.040,00


**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.410,00
		30- 35			4.190,00
		35- 40			5.200,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.400,00
		45- 50			7.950,00

**frainetto, Ungarische Eiche**

Synonym: *Q. conferta*

Höhe: 15-20 (-25) m  
 Wuchs: sehr ausladend und mächtig, hoch gewölbt bis rundlich  
 Laub: verkehrt eiförmig; sehr groß; tief gelappt und gebuchtet;  
 Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; Reife und Fall im Oktober des 1. Jahres  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Rinde dick; dunkelgrau



Quercus coccinea



Quercus coccinea



Quercus frainetto

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			530,00
		14- 16			750,00
		16- 18			1.020,00
		18- 20			1.350,00
		20- 25			1.790,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.060,00
		30- 35			3.780,00
		35- 40			4.650,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	6.950,00
		45- 50			8.650,00
		50- 60			10.800,00
		60- 70			13.400,00

**frainetto 'Trump', Ungarische Eiche 'Trump'**

- Höhe: 20-25 m  
 Wuchs: breit-eirund, halboffen  
 Laub: verkehrt eiförmig; sehr groß; tief gelappt und gebuchtet; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: Mai; goldfarbige Kätzchen bis 10 cm lang  
 Frucht: eiförmige Eicheln, 2-5 zusammen  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: Rinde dick; dunkelgrau

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14			475,00
		14- 16			670,00
		16- 18			910,00
		18- 20			1.180,00
		20- 25			1.540,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.775,00
		25- 30			2.220,00

**hispanica 'Waasland Select', Immergrüne Eiche 'Waasland Select'**

- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: rundliche Krone; schnell wachsend  
 Laub: dunkelgrün; ungewöhnlich schlank, gelappt; wintergrün  
 Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; fast rundlich  
 Standort: tolerant für die meisten Bodentypen; pH-neutral; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: attraktive Rinde, korkähnlich; lockt Bienen an



Quercus frainetto



Quercus frainetto



Quercus frainetto 'Trump'

Quercus hispanica  
'Waasland Select'





Quercus hispanica  
'Waesland Select'

→ hispanica 'Waesland Select'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			530,00
		14- 16			750,00
		16- 18			1.020,00
		18- 20			1.350,00
		20- 25			1.790,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00

**ilex, Stein-Eiche**



Quercus ilex

Höhe: am Naturstandort 15-20 m  
 Wuchs: breit aufrecht, sparrig ausgebreitet, im Alter breit rundlich  
 Laub: immergrün; eiförmig lanzettlich; gezähnt  
 Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; fast rundlich  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: Rinde auffallend schuppig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			530,00
		14- 16			750,00
		16- 18			1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20			1.390,00
		20- 25			1.850,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	3.230,00
		30- 35			3.970,00
		35- 40			4.900,00

**macranthera, Persische Eiche, Kaukasus-Eiche**

Höhe: bis 20 m  
 Wuchs: breit eiförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig; regelmäßig flach gelappt; groß  
 Blüte: Mai bis Juni; grünlich gelb; männliche Kätzchen; auffallend  
 Frucht: Eicheln; eiförmig  
 Standort: bodentolerant, trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, durchlässig, sandig lehmig; sonnig  
 Sonstiges: Rinde dunkelgrau

**Solitär**

3xv.	m.Db.	175-200	270,00
		200-250	365,00



Quercus macranthera

4xv.	m.Db.	250-300	530,00
		300-350	730,00

## nigra, Wasser-Eiche

Höhe: 20-25 m

Wuchs: regelmäßig rundlich, dicht verzweigt

Laub: verkehrt eiförmig und an der Spitze gelappt; tropfenförmig

Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen

Frucht: Eicheln; rundlich

Standort: feucht bis nass, tiefgründig, sauer bis leicht alkalisch, sandig humos bis lehmig, Kalk meidend; sonnig

Sonstiges: Borke schwarzbraun; tief gefurcht

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.850,00
		25- 30	2.340,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	3.230,00
		30- 35			3.970,00
		35- 40			4.900,00

## palustris, Sumpf-Eiche

Höhe: 15-20 (-25) m

Wuchs: regelmäßig, breit kegelförmig

Laub: breit länglich; gelappt; Herbstfärbung rötlich oder gelbbraun

Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen

Frucht: kugelige Eicheln; Reife im 1. Herbst

Standort: frisch bis nass, durchlässig, nährstoffreich, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig.

### Hochstämme, Stammbüsche


3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
		20- 25	970,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00

### Solitär-Bäume, -Stammbüsche

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00




Quercus palustris



Quercus palustris



Quercus palustris



Quercus palustris

→ **palustris**

5xv.	m.Db.	25-30	200-300	500-700	1.980,00
		30-35			2.470,00
		35-40			3.060,00

**Solitär-Bäume, - Stammbüsche**

5xv.	m.Db.	30-35	200-300	700-900	3.060,00
		35-40			3.780,00
		40-45			4.650,00
6xv.	m.Db.	40-45	300-400	700-900	5.750,00
		45-50			7.150,00
		50-60			8.950,00
7xv.	m.Db.	45-50	400-600	700-900	7.950,00
		50-60			9.900,00
		60-70			12.350,00



Quercus palustris 'Green Dwarf'

**palustris 'Green Dwarf', Kugelsumpfeiche 'Green Dwarf'**

Höhe: am Naturstandort 15-20 m  
 Wuchs: breit aufrecht, sparrig ausgebreitet, im Alter breit rundlich  
 Laub: immergrün; eiförmig lanzettlich; gezähnt  
 Blüte: April bis Mai; gelblich grün; Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; fast rundlich  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig; sonnig; geschützt  
 Sonstiges: Rinde auffallend schuppig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12-14	475,00
		14-16	670,00
		16-18	910,00
4xv.	m.Db.	18-20	1.250,00
		20-25	1.640,00
		25-30	2.150,00




Quercus palustris 'Green Pillar®'

**palustris 'Green Pillar®', Säulenförmige Sumpf-Eiche 'Green Pillar®'**

Höhe: 16-19 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig  
 Laub: im Sommer glänzend tiefgrün; intensive dunkelrote Herbstfärbung  
 Standort: frisch bis nass, durchlässig, nährstoffreich, lehmig, kalkverträglich; sonnig  
 Sonstiges: in den USA als schmaler Straßenbaum häufig gepflanzt; erhielt 2006 die Goldmedaille von „Pennsylvania Horticultural Society“; nach US-Patent geschützte Sorte!

**Solitär**

4xv.	m.Db.	250-300	460,00
		300-350	660,00
		350-400	920,00



Quercus palustris 'Green Pillar®'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

QUERCUS

5xv.	m.Db.	350-400	1.500,00
		400-500	2.100,00
		500-600	2.910,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	360,00
		12- 14	475,00
4xv.	m.Db.	14- 16	710,00
		16- 18	980,00
		18- 20	1.380,00
5xv.	m.Db.	20- 25	1.850,00
		25- 30	2.400,00
		30- 35	3.140,00



Quercus palustris 'Green Pillar®'

**petraea, Trauben-Eiche, Winter-Eiche**

Synonym: Q. sessiflora, Q. robur petraea

Höhe: 20-30 (-40) m

Wuchs: gleichmäßig, breit, stumpf kegelförmig

Laub: verkehrt eiförmig, regelmäßig gelappt, gestielt; Laubfall sehr spät, oft über Winter haftend; Herbstfärbung gelbbraun

Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen

Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst

Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: feinhorkig; dunkelgrau; Lebenserwartung bis 500 Jahre

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	36,00	31,80	28,90
	200-250	44,50	39,30	35,70

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
		20- 25	895,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.040,00
		30- 35			2.540,00
		35- 40			3.150,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	5.750,00
		45- 50			7.150,00
		50- 60			8.950,00

Baum  
des Jahres  
2014


Quercus petraea



Quercus petraea



Quercus petraea



Quercus petraea

**petraea 'VKG 1 bis 6 - ZgG®',** Gebietseigene Trauben-  
Eiche, Winter-Eiche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: Q. sessiflora, Q. robur petraea



- Höhe: 20-30 (-40) m
- Wuchs: gleichmäßig, breit, stumpf kegelförmig
- Laub: verkehrt eiförmig, regelmäßig gelappt, gestielt; Laubfall sehr spät, oft über Winter haftend; Herbstfärbung gelbbraun
- Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
- Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst
- Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig
- Sonstiges: feinhorkig; dunkelgrau; Lebenserwartung bis 500 Jahre

**verpflanzte Heister**

m.B.	150-200	46,80	41,40	37,60
	200-250	57,60	50,90	46,20

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	355,00
		14- 16	470,00
		16- 18	620,00
		18- 20	750,00
		20- 25	980,00



Quercus petraea

**phellos, Weiden-Eiche**

- Höhe: 15-20 m
- Wuchs: kegelförmig, später rundlich
- Laub: schmal lanzettlich; weidenförmig; Herbstfärbung gelb
- Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen
- Frucht: Eicheln; Reife im 2. Jahr; halbkugelartig
- Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, sauer bis leicht alkalisch, sandig humos bis lehmig, Kalk meidend; sonnig
- Sonstiges: Borke grau und rau

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
		18- 20	1.390,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.460,00
		20- 25	1.850,00
		25- 30	2.410,00



Quercus phellos

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.980,00
		25- 30			2.470,00
		30- 35			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	3.780,00
		35- 40			4.650,00
		40- 45			5.750,00



Quercus phellos

**pubescens, Flaum-Eiche**

- Höhe: 15-20 m; übliche Veredlungen auf Q. robur bleiben niedriger  
 Wuchs: oval, später rundlich  
 Laub: verkehrt eiförmig; variabel  
 Blüte: Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; klein  
 Standort: trocken bis frisch, neutral bis alkalisch, gut durchlässig, sandig lehmig, steinig, kiesig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: Borke grau; korkartig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00
		25- 30	1.840,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.910,00
		35- 40			3.580,00
		40- 45			4.410,00



Quercus pubescens



Quercus pubescens

**robur, Stiel-Eiche, Sommer-Eiche, Deutsche Eiche**

Synonym: Q. pedunculata

Baum  
des Jahres  
1989


- Höhe: 25-35 (-40) m  
 Wuchs: kegelförmig, später wuchtig, gewölbt  
 Laub: verkehrt eiförmig, gelappt, Basis mit Öhrchen; fest sitzend; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten in lang gestielten Ähren  
 Frucht: Eicheln, lange Stiele; Reife im 1. Herbst  
 Standort: weite Standortamplitude; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Borke mit tiefen Längsrissen, in der Tiefe mit hellerem Grund; Lebenserwartung 500 bis 800 Jahre

**verpflanzte Heister**

m.B.	125-150	29,90	26,40	24,00
	150-200	36,00	31,80	28,90
	200-250	44,50	39,30	35,70
	250-300	51,90	45,90	41,70

**Solitär**

3xv.	m.Db.	60-100	200-250	89,00	78,50
			250-300	126,00	111,50
			300-350	175,00	154,00



Quercus robur



Quercus robur

→ robur

3xv.	m.Db.	100-150	250-300	175,00
			300-350	254,00
			350-400	365,00

**Solitär, mehrstämmig**

3xv.	m.Db.	200-250	335,00
		250-300	470,00
		300-350	675,00
		350-400	945,00

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00



Quercus robur

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00
7xv.	m.Db.	50- 60	400-600	700-900	9.200,00
		60- 70			11.450,00
		70- 80			14.150,00
8xv.	m.Db.	80- 90	400-600	900-1200	17.450,00
		90-100			21.500,00



Quercus robur



Quercus robur

## robur 'VkG 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigene Stiel-Eiche, Sommer-Eiche, Deutsche Eiche aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

Synonym: *Q. pedunculata*



- Höhe: 25-35 (-40) m  
 Wuchs: kegelförmig, später wuchtig, gewölbt  
 Laub: verkehrt eiförmig, gelappt, Basis mit Öhrchen; fest sitzend; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen, weibliche Blüten in lang gestielten Ähren  
 Frucht: Eicheln, lange Stiele; Reife im 1. Herbst  
 Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen, sauren Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: Borke mit tiefen Längsrissen, in der Tiefe mit hellerem Grund; Lebenserwartung 500 bis 800 Jahre

### verpflanzte Heister

m.B.	125-150	42,20	37,30	33,90
	150-200	51,90	45,90	41,70
	200-250	67,10	59,30	
	250-300	86,50	75,50	

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	300,00
		14- 16	410,00
		16- 18	560,00
		18- 20	750,00
		20- 25	980,00

## robur 'Fastigiata', Säulen-Eiche, Pyramiden-Eiche

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig, später länglich eiförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig, gelappt; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbbraunen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; gestielt; Reife im 1. Herbst  
 Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen, sauren Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschantig

## robur 'Fastigiata Koster', Säulen-Eiche 'Koster'


- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: sehr schmal säulenförmig  
 Laub: verkehrt eiförmig, gelappt; Herbstfärbung gelbbraun  
 Blüte: April; einhäusig; männliche Blüten in gelbbraunen Kätzchen  
 Frucht: Eicheln; gestielt  
 Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf armen Sand- und schweren Tonböden; sonnig bis lichtschantig →



Quercus robur



Quercus robur



Quercus robur 'Fastigiata'



Quercus robur 'Fastigiata Koster'





Quercus robur 'Fastigiata Koster'

→ robur 'Fastigiata Koster'

### Heister

3xv.	m.Db.	150-175	72,50
		175-200	98,50
		200-250	137,00

### Solitär

4xv.	m.Db.	250-300	410,00
		300-350	640,00
		350-400	845,00

5xv.	m.Db.	60-100	350-400	1.390,00
			400-500	1.980,00
			500-600	2.830,00

6xv.	m.Db.	100-150	500-600	4.300,00
			600-700	5.450,00
			700-800	6.950,00
			800-900	8.950,00



Quercus rubra

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00

4xv.	m.Db.	14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
		18- 20	1.390,00

5xv.	m.Db.	20- 25	2.040,00
		25- 30	2.410,00
		30- 35	2.980,00

6xv.	m.Db.	35- 40	4.900,00
		40- 45	6.750,00
		45- 50	9.450,00
		50- 60	11.700,00



Quercus rubra

## rubra, Amerikanische Rot-Eiche



Synonym: Q. borealis maxima

Höhe: 20-30 m

Wuchs: breit ausladend, kegelförmig bis rundlich

Laub: verkehrt eiförmig, spitz, tief gelappt; im Herbst orangerot bis scharlach

Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen

Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst


Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Rinde glatt; hellbraun; Lebenserwartung bis 400 Jahre

### Hochstämme, Stammbüsche

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	970,00	855,00

4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	925,00
------	-------	--------	----------	--------



Quercus rubra

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.980,00
		35- 40			3.680,00
		40- 45			4.520,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	5.200,00
		45- 50			6.400,00
		50- 60			7.950,00
		60- 70			9.900,00
7xv.	m.Db.	45- 50	400-600	700-900	7.950,00
		50- 60			9.900,00
		60- 70			12.350,00
		70- 80			15.300,00

**turneri 'Pseudoturneri', Wintergrüne Eiche**

Höhe: 8-10 m

Wuchs: breit eiförmig bis kugelrund

Laub: halbbimmergrün; verkehrt eiförmig; gebuchtet; ledrig

Blüte: Mai bis Juni; einhäusig; männliche Blüten in gelbgrünen Kätzchen

Frucht: Eicheln; Reife im 1. Herbst

Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Solitär**

4xv.	m.Db.		150-175	450,00
			175-200	640,00
			200-250	895,00
5xv.	m.Db.	100-150	250-300	1.730,00
			300-350	2.222,00
			350-400	2.830,00

**Hochstämme**


4xv.	m.Db.	14- 16		795,00
		16- 18		1.080,00
		18- 20		1.390,00
		20- 25		1.850,00



Quercus rubra



Quercus turneri 'Pseudoturneri'



Quercus turneri 'Pseudoturneri'



Quercus turneri 'Pseudoturneri'

**warei 'Long', Säulenförmige Eiche**

Synonym: Q. warei 'Regal Prince'

- Höhe: 12-18 m
- Wuchs: säulenförmig bis schmal, dichte Krone
- Laub: verkehrt eiförmig; glänzend dunkelgrün, im Herbst gelb
- Blüte: Mai; gelblich grün; Kätzchen
- Frucht: breit eiförmige Eicheln, 1,5 -2,5 cm
- Standort: lieber feucht als trocken, keine Überpflasterung, nährstoffreich
- Sonstiges: verträgt Streusalz

**Solitär**

4xv.	m.Db.	250-300	355,00
		300-350	495,00
		350-400	715,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	10- 12	410,00
		12- 14	530,00
4xv.	m.Db.	14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
		18- 20	1.390,00
5xv.	m.Db.	20- 25	2.040,00
		25- 30	2.830,00
		30- 35	3.880,00

**RHAMNUS - Rhamnaceae - FAULBAUM, KREUZDORN**

**catharticus, Gemeiner Kreuzdorn**



- Höhe: 4-6 m
- Wuchs: locker, sparrig, breitbuschig, Ausläufer treibend
- Laub: spitz oval; Herbstfärbung gelb
- Blüte: Mai bis Juni; polygam oder zweihäusig; gelblich grün; duftend
- Frucht: ab September, kugelig; rotschwarz; giftig
- Standort: trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig
- Sonstiges: verdorrte Triebspitzen

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	6,75	5,95	5,40
4 Tr.	o.B.	100-150	9,95	8,35	7,55
	Co.	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	54,60	48,30
		150-200	70,60	62,40
		200-250	89,50	
		250-300	141,00	

**frangula** - siehe Frangula alnus

**RHEUM Fruchtarten** - siehe Obstteil



Rhamnus catharticus



Rhamnus catharticus

# RHODODENDRON - Ericaceae - ALPENROSE

## Erläuterungen zu den Rhododendrontabellen

### \* Blühzeitgruppen

Blühbeginn und -dauer schwanken beträchtlich je nach der Region und dem aktuellen Klimaverlauf.

Deshalb wurde auf die Angabe konkreter Blühtermine verzichtet, um stattdessen Blühzeitgruppen zu bilden.

Sie sind für alle Rhododendron-Hybriden (Großblumige, repens, williamsianum, yakushmanum) einschließlich Azaleen (Hybriden und japanische Azaleen) gleich gewählt worden, um Vergleiche anstellen zu können.

### Als Orientierungswerte für die kalendarischen Daten gelten:

sehr früh	1. bis 20. Mai (oder noch früher)
früh	10. bis 31. Mai
mittelfrüh	20. Mai bis 10. Juni
mittelspät	25. Mai bis 15. Juni
spät	31. Mai bis 20. Juni

## Großblumige Hybriden

Höhe:	2-3 (-5) m
Wuchs:	je nach Sorte breitbuschig bis kugelig
Laub:	immergrün; schmal elliptisch
Blüte:	Mai; viele Farbtonen
Frucht:	holzige Kapseln
Standort:	frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit	Höhe/ Breite	Pr.Gr.
Alfred	hellviolett	3. Mai - 1. Juniwoche	1,5/2,5 m	2
Azurro	tiefviolett	4. Mai - 3. Juniwoche	2,0/2,0 m	3
Blue Peter	hellblau, innen weinroter Fleck	4. Mai - 2. Juniwoche	1,5/2,0 m	2
Catharina van Tol	reinrosa	3. Mai - 2. Juniwoche	3,0/3,0 m	2
Catawbiense Boursault	kräftig lila	1. - 4. Juniwoche	5,0/5,0 m	1
Catawbiense Grandiflorum	lila	1. - 4. Juniwoche	6,0/4,0 m	1
Cunningham's White	weiß, im Auf- blühen rosa	3. Mai - 1. Juniwoche	2,5/4,5 m	1
Dr. H. C. Dresselhuys	purpurrot	4. Mai - 3. Juniwoche	3,0/2,5 m	2
Erato	dunkelblutrot	4. Mai - 2. Juniwoche	2,5/2,5 m	3
Furnivall's Daughter	hellrosa Fleck	3. Mai - 1. Juniwoche	2,0/2,5 m	3




Rhododendron  
'Catawbiense Boursault'



Rhododendron  
'Catawbiense Grandiflorum'



Rhododendron  
'Cunningham's White'



Rhododendron  
'Furnivall's Daughter'



Rhododendron 'Progres'



Rhododendron 'Viscy'

## → Großblumige Hybriden

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit	Höhe/ Breite	Pr.Gr.
Germania	rosarot	3. Mai - 2. Juniwoche	2,5/2,5 m	3
Gomer Waterer	weiß	1. - 4. Juniwoche	2,5/3,0 m	2
Goldflimmer	helllilarosa	1. - 4. Maiwoche	2,0/2,5 m	3
Hachmann's Feuerschein ©	kirschrot	4. Mai - 3. Juniwoche	2,5/3,0 m	3
Humboldt	zart lilaviolett	3. Mai - 1. Juniwoche	2,5/3,0 m	2
Jacksonii	weißrosa	1. - 4. Maiwoche	1,5/2,5 m	3
Kokardia ©	hellrubinrosa	3. Mai - 2. Juniwoche	2,5/3,0 m	3
Lee's Dark Purple	dunkelpurpur- violett	4. Mai - 3. Juniwoche	2,5/3,0 m	2
Nova Zembla	rubinrot	4. Mai - 3. Juniwoche	2,5/2,5 m	2
Old Port	rotviolett	4. Mai - 3. Juniwoche	2,0/2,5 m	2
Progres (= Le Progres)	hellrosa	3. Mai - 1. Juniwoche	2,5/2,0 m	2
Rasputin	hellviolettblau	4. Mai - 2. Juniwoche	2,0/2,5 m	3
Roseum Elegans	helllilarosa	1. - 4. Juniwoche	3,0/4,0 m	1
Scintillation	reinrosa	3. Mai - 2. Juniwoche	2,0/2,5 m	3
Stadt Westerstede	gelb, roter Fleck	3. Mai - 2. Juniwoche	1,5/2,0 m	3
Viscy	kupfrig gelb, außen lachs- rosa gestreift	1. - 4. Maiwoche	2,0/2,5 m	3

## Preisgruppe 1:

m.B./Co.	30-40	28,50	25,00	23,00
	40-50	38,00	33,50	30,50
	50-60	55,00	48,50	44,00
	60-70	85,00	74,50	
m.B./Co.	70-80	107,50		
	80-90	132,50		
	90-100	179,50		

## Solitär

m.B.	100-120	80-90	375,00
		90-100	510,00
		100-120	620,00
m.B.	120-140	90-100	620,00
		100-120	840,00
		120-140	1.145,00
		140-160	1.395,00
m.B.	140-160	90-100	1.045,00
		100-120	1.145,00
		120-140	1.395,00

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreis in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

RHODODENDRON

		140-160	1.770,00		
m.B.	160-180	100-120	1.395,00		
		120-140	1.770,00		
		140-160	2.225,00		
		160-180	2.685,00		

**Preisgruppe 2:**

m.B./Co.		30- 40	32,50	28,50	25,50
		40- 50	43,50	38,50	35,00
		50- 60	71,00	62,50	55,50
		60- 70	105,00	93,50	
m.B./Co.		70- 80	140,00		
		80- 90	205,00		
		90-100	275,00		

**Solitär: Größen und Preise wie Preisgruppe 1 zzgl. 10,0 %****Preisgruppe 3:**

m.B./Co.		25- 30	37,00	32,50	
		30- 40	40,50	36,50	
		40- 50	50,00	45,00	
m.B./Co.		50- 60	73,00	65,50	
		60- 70	126,00	113,00	
		70- 80	160,00		
		80- 90	255,00		
		90-100	335,00		

**Solitär: Größen und Preise wie Preisgruppe 1 zzgl. 20,0 %****repens-Hybriden, Flache Rhododendron**

Höhe: 60-100 cm

Wuchs: kompakt, flach, kissenförmig

Laub: immergrün; elliptisch bis länglich


Blüte: April bis Mai; meist rötliche Farbtöne

Frucht: holzige Kapseln

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, humos, kalkfeindlich; licht- bis halbschattig

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit-Gruppe*	Wuchshöhe
Baden-Baden	dunkelscharlachrot	sehr früh	bis 0,60 m
Scarlet Wonder	scharlachrot	sehr früh	bis 0,70 m

m.B./Co.		15- 20	14,50	13,00	11,50
		20- 25	16,50	14,50	13,00
		25- 30	19,00	17,00	15,50
		30- 40	28,50	25,00	22,50
m.B./Co.		40- 50	43,50		
		50- 60	64,50		
		60- 70	95,00		
		70- 80	142,00		

Rhododendron repens  
'Baden-Baden'Rhododendron repens  
'Scarlet Wonder'

Rhododendron williamsianum  
'August Lamken'**williamsianum-Hybriden, Glocken-Rhododendron**

Höhe: 1-1,5 (-2,5) m  
 Wuchs: flach rund bis kugelig  
 Laub: immergrün; breit oval bis rund  
 Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos; licht- bis halbschattig

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit	Höhe/Breite		
August Lamken	purpurrosa	3. Mai - 2. Juniwoche	1,5/1,5 m		
Gartendirektor Glocker	rötlich rosa, innen rosa	1. - 3. Maiwoche	1,25/1,25 m		
Gartendirektor Rieger	cremegelb	1. - 3. Maiwoche	2,5/2,0 m		
Görlitz	rubinrosa	1. - 3. Maiwoche	1,50/1,25 m		
Jackwill	rosaweiß	2. - 4. Maiwoche	0,8/1,0 m		
m.B./Co.		25- 30	31,00	27,00	24,50
		30- 40	38,50	34,00	31,50
		40- 50	50,00	45,00	
		50- 60	75,50	67,00	
m.B./Co.		60- 70	122,50	110,50	
		70- 80	180,00	160,00	
		80- 90	262,00		

Rhododendron williamsianum  
'Jackwill'**yakushmanum-Hybriden, Ball-Rhododendron**

Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: dicht und kompakt, breit rund bis aufrecht  
 Laub: immergrün; eiförmig bis elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis wechelschattig  
 Sonstiges: extrem winterhart

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit	Höhe/Breite		
Anuschka	außen dunkelrosa, innen heller bis weiß	3. Mai - 2. Juniwoche	1,2/1,8 m		
Colibri	dunkel-, hellrosa	3. Mai - 2. Juniwoche	1,2/2,0 m		
Fantastica	hellrot, innen weiß	3. Mai - 2. Juniwoche	1,5/2,0 m		
Flava	cremegelb	3. Mai - 2. Juniwoche	1,6/2,0 m		
Kalinka	rosa, magenta	3. Mai - 1. Juniwoche	1,4/1,8 m		
Morgenrot	erst rot, dann rosa	2. - 4. Maiwoche	1,6/2,2 m		
Percy Wisemann	gelblich/rosa	2. Mai - 1. Juniwoche	1,4/1,8 m		
Polaris	rubinrot	3. Mai - 2. Juniwoche	1,4/1,8 m		
Schneekrone	von rosa, ins weiß	3. Mai - 2. Juniwoche	1,3/1,7 m		
Silberwolke	magenta/weiß	3. Mai - 2. Juniwoche	2,7/2,4 m		
m.B.		20- 25	31,00	27,00	24,50

Rhododendron yakushmanum  
'Anuschka'Rhododendron yakushmanum  
'Schneekrone'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

RHODODENDRON

	25- 30	38,50	34,00	31,50
	30- 40	43,50	38,50	
	40- 50	61,00	54,50	
m.B.	50- 60	97,00	87,50	
	60- 70	138,00	123,00	
	70- 80	185,00		

## Wildformen und Kleinblumige Hybriden

### carolinianum 'P.J. Mezitt', Zwergrhododendron

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: geschlossen rund  
 Laub: immergrün; im Winter bronzegrün  
 Blüte: Ende April bis Mitte Mai; rubinrosa  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig



Rhododendron yakushimanum  
'Polaris'

### ferrugineum, Echte Alpenrose

- Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: kompakt, breit kissenförmig  
 Laub: immergrün; schmal elliptisch  
 Blüte: Juni bis Juli; dunkelpurpurrot  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig



Rhododendron carolinianum  
'P. J. Mezitt'

### hirsutum, Almenrausch

- Höhe: um 50 cm  
 Wuchs: gedrungen, buschig aufrecht  
 Laub: immergrün; spitz elliptisch  
 Blüte: Juni bis August; hell- bis tiefrosa  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig



Rhododendron ferrugineum

m.B.	15- 20	23,50	21,00
	20- 25	32,00	28,50
	25- 30	38,50	34,00
	30- 40	49,00	42,50

### impeditum und Sorten, Kissen-Rhododendron

- Höhe: 30-100 cm  
 Wuchs: kompakt, kissenförmig  
 Laub: immergrün; breit oval bis lanzettlich  
 Blüte: April bis Mai; blau bis violett  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschattig



→ Rhododendron hirsutum





Rhododendron impeditum

→ **impeditum und Sorten**

Sortenname	Höhe/cm	Breite/cm	Blütenfarbe
Azurika	50- 60	70- 90	violettblau
Blue Tit	80-100	100-120	helllavendelblau
Gristede	40- 50	80-100	lila
Ramapo	60- 70	110-130	helllila

**stark wachsend**

m.B.	20- 25	15,00	13,00
	25- 30	20,70	18,50
	30- 40	29,00	25,50
	40- 50	34,50	

Rhododendron impeditum  
'Blue Tit'

Sortenname	Höhe/cm	Breite/cm	Blütenfarbe
impeditum	30- 40	50- 60	lilaviolett
Moerheim	40- 50	60- 80	violett

**schwach wachsend**

m.B.	15- 20	14,00	12,00	11,00
	20- 25	17,60	15,50	14,50
	25- 30	23,50	21,00	
	30- 40	34,50	31,50	
	40- 50	48,50		

**'Lavendula', Rhododendron 'Lavendula'**

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: breitbuschig, kompakt, geschlossen  
 Laub: immergrün; breit oval; blaugrün, im Winter bronzefarben; aromatisch duftend  
 Blüte: Mai bis Juni; lavendelfarben  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig



Rhododendron 'Lavendula'

**minus, Synonym: Rh. punctatum**

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: gedungen, breitbuschig aufrecht  
 Laub: immergrün; spitz elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juni; lilarosa  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig



Rhododendron minus

m.B./Co.	20- 25	18,50	16,50	14,50
	25- 30	26,00	23,50	21,00
	30- 40	35,50	32,00	

**'Praecox',** Vorfrühlings-Rhododendron

- Höhe: bis 1,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht  
 Laub: halbbimmergrün; oval  
 Blüte: März bis April; lilarosa  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	25- 30	22,50	20,00
	30- 40	32,50	29,50
	40- 50	46,00	
	50- 60	70,00	
	60- 70	92,50	



Rhododendron 'Praecox'

**russatum,** Rost-Rhododendron

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: breitbuschig  
 Laub: immergrün; breit elliptisch; oberseits graugrün, unterseits braun bis rötlich braun  
 Blüte: April bis Mai; dunkelviolet bis indigoblau  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig



Rhododendron russatum

**russatum 'Azurwolke',** Rost-Rhododendron 'Azurwolke'

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: kompakt, rundlich  
 Laub: immergrün; breit elliptisch  
 Blüte: April bis Mai; dunkellilablau  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	20- 25	14,75	13,00
	25- 30	22,50	20,00
	30- 40	32,50	28,50
	40- 50	46,00	41,00

Rhododendron russatum  
'Azurwolke'**yakushmanum,** Ball-Rhododendron (Wildform)

- Höhe: 60-80 cm, 150-200 cm breit  
 Wuchs: gedrungen, flach rundlich  
 Laub: immergrün; breit oval; braunfilzig  
 Blüte: Mai bis Juni; hellrosa, später weiß  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; lichtsattig  
 Sonstiges: extrem winterhart

m.B./Co.	20- 25	31,70	28,00
	25- 30	37,50	33,00
	30- 40	48,00	44,10



Rhododendron yakushmanum

**AZALEA - Ericaceae - AZALEE****Rhododendron luteum, Pontische Azalee**

Synonym: Azalea pontica Sämling

Höhe: 1,5-2,5 (-3) m  
 Wuchs: straff aufrecht, später breitbuschig ausladend  
 Laub: schmal elliptisch; Herbstfärbung orange bis scharlachrot  
 Blüte: Mai; goldgelb; stark duftend  
 Frucht: holzige Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschantig



Rhododendron luteum



Rhododendron luteum 'Berryrose'



Rhododendron luteum 'Feuerwerk'

Rhododendron luteum  
'Golden Eagle'

m.B./Co.	30- 40	28,50	25,00	22,50
	40- 50	33,50	30,00	27,00
	50- 60	42,50	37,50	34,00
	60- 70	63,00	55,50	
	70- 80	77,00	68,00	

**Solitär**

m.B.	80-100	166,00		
	100-125	228,00		

**Azalea-Hybriden**

Höhe: 1-2,5 m  
 Wuchs: je nach Sorte breitbuschig, straff aufrecht oder sparrig ausladend  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung orange bis scharlachrot  
 Blüte: Mai bis Juni; Farbe je nach Sorte  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtschantig

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit-Gruppe*	Wuchs-höhe	Preis-gruppe
Berryrose	rosa	mittelspät	bis 1,50 m	1
Cecile	lachsrosa	spät	bis 2,00 m	2
Corneille	hellrosa	mittelspät	bis 2,00 m	2
Daviesii	rahmweiß	mittelspät	bis 2,00 m	1
Feuerwerk	feuerrot, innen orange	spät	bis 2,00 m	1
Fireball	orange bis rot	spät	bis 2,00 m	1
Gibraltar	orange	mittelspät	bis 2,00 m	1
Golden Eagle	hellorange	spät	bis 2,00 m	1
Golden Sunset	dunkelgelb	spät	bis 2,00 m	2
Goldtopas	hellgelb, oranger Fleck	mittelspät	bis 1,50 m	2
Homebush	karminrosa; halbgefüllt, ballförmig	mittelspät	bis 2,00 m	2
Klondyke	goldgelb, rötlich orange geflammt; Herbstfärbung rot	mittelspät	bis 1,80 m	2
Persil	reinweiß	mittelspät	bis 2,00 m	2

Sortenname	Blütenfarbe	Blühzeit-Gruppe*	Wuchshöhe	Preisgruppe
Pink Delight	reinrosa, innen zartrosa	mittelspät	bis 2,00 m	1
Satan	dunkelscharlachrot	spät	bis 2,00 m	1
Schneegold	weiß mit gelbem Fleck	mittelspät	bis 1,50 m	2
Whitethroat	silberweiß gefüllt	früh	bis 1,50 m	2

**Preisgruppe 1:**

m.B./Co.	30- 40	28,50	25,00	22,50
	40- 50	33,50	30,00	27,00
	50- 60	42,50	37,50	34,00
	60- 70	63,00	55,50	
	70- 80	77,00	68,00	
	80-100	166,00		

**Preisgruppe 2:**

m.B./Co.	30- 40	33,50	30,00	27,00
	40- 50	41,50	36,50	33,00
	50- 60	55,00	48,50	
	60- 70	75,00	67,00	
	70- 80	99,90	88,50	
	80-100	175,00		

**Rhododendron obtusum, Japanische Azalee**

Synonym: Azalea japonica

Höhe: je nach Sorte 40-180 cm

Wuchs: je nach Sorte locker aufrecht bis kompakt breitbuschig

Laub: halbbimmergrün; elliptisch bis eiförmig

Blüte: Mai; Farbe je nach Sorte

Frucht: holzige Kapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; wechelschattig, licht- bis halbschattig

Sonstiges: die Frosthärte mancher Sorten ist im kontinental beeinflussten Klima nicht immer ganz ausreichend

Name	Farbe	Blühzeit-Gruppe*	Wuchshöhe in cm	Preisgruppe
Blaue Donau (Syn.: Blue Danube)	purpurviolett	mittelspät	70- 90	2
Canzonetta	rötlich rosa	mittelspät	30- 40	3
Favorite	tiefrosa	früh	120-150	1
Hatsugiri	purpurviolett	mittelfrüh	60- 90	2
John Cairns	dunkelrot	früh	80-100	1
Kathleen	dunkelrosa	früh	120-150	1
Kermesina	karminrosa	mittelfrüh	50- 60	2
Maruschka	hellkarminrot	mittelspät	40- 50	3
Muttertag	karminrot	früh	60- 90	2
Palestrina	weiß	früh	150-180	1
Stewartstonian	orangerot	früh	80-120	1



Rhododendron luteum 'Klondyke'



Rhododendron luteum 'Persil'

Rhododendron luteum  
'Pink Delight'Rhododendron obtusum  
'Blaue Donau'



Rhododendron obtusum  
'Kermesina'

→ **Rhododendron obtusum**

**Preisgruppe 1**

m.B./Co.	25- 30	17,60	15,50
	30- 40	25,30	22,00
	40- 50	48,50	43,50
	50- 60	110,00	97,20
	60- 70	170,00	
	70- 80	255,00	

**Preisgruppe 2**

m.B./Co.	20- 25	15,75	14,00
	25- 30	19,60	17,50
	30- 40	30,85	27,25
	40- 50	60,00	52,50
	50- 60	135,00	120,00

**Preisgruppe 3**

m.B./Co.	20- 25	17,15	15,00
	25- 30	22,50	20,00
	30- 40	36,20	32,00
	40- 50	66,00	61,50



Rhododendron obtusum  
'Palestrina'

**Rhododendron obtusum 'Diamant®', Diamant Azaleen**

Höhe: 60-70 cm  
 Wuchs: kompakt, polsterartig; 80-150 cm breit  
 Laub: immergrün; eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; in den Farben lachs, rosa, purpurn, rot oder weiß  
 Frucht: kaum  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, kalkfeindlich; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	20- 25	15,75	13,50	12,50
	25- 30	20,70	18,25	16,50
	30- 40	33,50	29,50	
	40- 50	61,25	54,00	



Rhododendron obtusum  
'Diamant'

**RHODOTYPOS - Rosaceae - ROSENKERRIE, SCHEINKERRIE**

**scandens, Weiße Rosenkerrie**

Synonym: R. kerrioides

Höhe: bis 2 m  
 Wuchs: breitbuschig, leicht überhängend  
 Laub: eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; reinweiß mit gelber Mitte  
 Frucht: ab August; glänzend schwarz; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich; licht- bis halbsattig



Rhodotypos scandens

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

RHUS

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	Größe in cm	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
		40-60	8,20	6,15	5,50
		60-100	11,00	8,70	7,90
	Co.	40-60	16,20	14,25	12,95

**RHUS - Anacardiaceae - SUMACH, ESSIGBAUM****typhina, Hirschkolben Sumach**

- Höhe: 4-5 m  
 Wuchs: schirmförmig, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelborange bis feurig rot  
 Blüte: Juni bis Juli; polygam oder meist zweihäusig; grünliche Rispen  
 Frucht: bis Winter; aufrechte, rote Kolben  
 Standort: sehr weite Standortamplitude; fast alle durchlässigen Kulturböden, auch lockere Rohböden; sonnig

**Solitär, mehrstämmig**

3xv.	m.Db.	125-150	175,00
		150-200	247,00
		200-250	355,00

**typhina 'Dissecta', Farnwedel Sumach, Geschlitzter Essigbaum**

Synonym: R. t. 'Laciniata'


- Höhe: 2-2,5 (-3) m  
 Wuchs: breit ausladend  
 Laub: unpaarig gefiedert, Blättchen farnartig geschlitzt; Herbstfärbung gelborange bis scharlachrot  
 Blüte: Juni bis Juli; weibliche Sorte  
 Frucht: bis Winter; rote, aufrechte Kolben  
 Standort: weite Standortamplitude; fast alle durchlässigen Kulturböden; sonnig

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	100-125	175,00
		125-150	247,00
		150-200	355,00



Rhus typhina



Rhus typhina



Rhus typhina 'Dissecta'

**RIBES - Saxifragaceae - JOHANNISBEERE, STACHELBEERE****alpinum 'Schmidt', Alpenbeere**

- Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: breitbuschig, später rundlich  
 Laub: drei- bis fünfflappig; früher Austrieb; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April bis Mai; männlich; gelblich grün  
 Frucht: keine, da männlicher Klon  
 Standort: weite Standortamplitude; Kalk liebend



Ribes alpinum 'Schmidt'


## → alpinum 'Schmidt'

## verpflanzte Sträucher

6 Tr.	o.B.	40- 60	6,25	4,55	4,10
		60-100	7,30	5,40	4,90
8 Tr.	o.B.	60-100	8,65	6,50	5,90
	Co.	60-100	14,55	12,85	11,65

## Solitär

3xv.	m.B.	80-100	46,80	41,40	
		100-125	60,50	53,50	
		125-150	78,50		



Ribes alpinum 'Schmidt'

## aureum, Gold-Johannisbeere



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: lockerbuschig, breit ausladend  
 Laub: dreilappig, rundlich; hellgrün; frühe Herbstfärbung; rötlich  
 Blüte: April bis Mai; goldgelbe, hängende Trauben; duftend  
 Frucht: ab August; schwärzliche, kugelige Beeren; herb-sauer  
 Standort: humos, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Ribes aureum

divaricatum, Sparrige Stachelbeere,  
Küsten-Stachelbeere

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig, sparrig  
 Laub: rundlich, fünfflappig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April bis Mai; gelblich grün  
 Frucht: ab August; schwarzrote Stachelbeeren; essbar; mäßig schmeckend  
 Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, durchlässigen Kulturböden;  
 sonnig bis wechselschattig  
 Sonstiges: spitze Stacheln



Ribes aureum

## verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	5,45	3,91	3,55
4 Tr.	o.B.	100-150	7,50	5,50	5,00
	Co	60-100	12,35	10,90	9,90

## nigrum, Schwarze Johannisbeere



Höhe: bis 2 m  
 Wuchs: breitbuschiger Strauch  
 Laub: rundlich; 3 bis 5-lappig; mittel- bis dunkelgrün; hellgrüne  
 Blattunterseite  
 Blüte: in gelbgrünen, hängenden Trauben  
 Frucht: schwarz; essbar; herb  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos,  
 kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Ribes nigrum

**rubrum**, Rote JohannisbeereSynonym: *R. silvestre*


- Höhe: bis 2 m  
 Wuchs: breitbuschiger Strauch  
 Laub: rundlich; 3 bis 5-lappig; mittel- bis dunkelgrün; hellgrüne, weichhaarige Blattunterseite  
 Blüte: in gelbgrünen, hängenden Trauben  
 Frucht: rot; essbar; süßsauer  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: möglicherweise aus Wilder Roter Johannisbeere (*R. spicatum*) und Felsenjohannisbeere (*R. petraeum*) entstanden



Ribes rubrum

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	40-60	6,75	5,00	4,55
		60-100	9,45	7,30	6,60



Ribes sanguineum 'Atrorubens'

**sanguineum 'Atrorubens'**, Blut-JohannisbeereSynonym: *R. s. 'Atrosanguinea'*

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: aufrecht, locker, vasenförmig  
 Laub: rundlich, drei- bis fünfflappig; aromatisch  
 Blüte: April; dunkelrote Trauben  
 Frucht: schwarze, kugelige Beeren  
 Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig



Ribes sanguineum 'Atrorubens'

**sanguineum 'King Edward VII'**, Zier-Johannisbeere

- Höhe: bis 1,5-2 m  
 Wuchs: aufrecht, dichtbuschig  
 Laub: drei- bis fünfflappig, rundlich  
 Blüte: April; knallrote Trauben  
 Frucht: kugelige, schwarze Beeren  
 Standort: weite Standortamplitude; alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig

Ribes sanguineum  
'King Edward VII'**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	8,95	6,85	6,20
5 Tr.	o.B.	100-150	11,70	9,35	8,50
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	65,40	57,80	
		150-200	84,50	74,60	
		200-250	110,50		



**uva-crispa**, Wilde StachelbeereSynonym: *R. grossularia*

Höhe: bis 1,5 m

Wuchs: dicht verzweigt und dornig

Laub: breit eiförmig; 3- bis 7-, selten 9-lappig; glänzend dunkelgrün

Blüte: gelbgrün; spätfrostgefährdet

Frucht: grün; essbar

Standort: mäßig trocken bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos,  
kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: verschiedene, auch mehlttauresistente Kultur-Sorten

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	30- 40	6,75	5,00	4,55
		40- 60	8,20	6,15	5,50

**RIBES Fruchtarten** - siehe Obstteil**ROBINIA** - Leguminosae - **ROBINIE, SCHEINAKAZIE, SCHOTENDORN**

## 'Casque Rouge', Rosa Akazie

Synonym: *R. margaretta* 'Pink Cascade'

Höhe: 12-15 m

Wuchs: locker, breit ausladend

Laub: unpaarig gefiedert; Austrieb bronzefarben

Blüte: Mai bis Juni; violettrosa bis rosarot

Frucht: borstige Hülsen

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nicht zu  
nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: schwach bedornt bis dornelos

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	1.020,00


4xv. m.Db. 20- 25 1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.580,00



Robinia 'Casque Rouge'




Robinia 'Casque Rouge'

**hispidia 'Macrophylla', Großlaubige Borsten-Akazie**

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: straff aufrecht, sparrig  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Juni bis Juli; lilarosa  
 Frucht: borstige Hülsen  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: windbrüchig; Rinde borstig bestachelt

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-175	157,00
		175-200	222,00
		200-250	335,00



Robinia hispidia 'Macrophylla'

**pseudoacacia, Scheinakazie**

- Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: locker breit gewölbt, später schirmförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; späte, gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; hängende Trauben; wohlriechend  
 Frucht: bis Winter; braune Hülsen, dann aufspringend  
 Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: bedornt; dickborstig

Baum  
des Jahres  
2020**Solitär, mehrstämmig**

3xv.	m.Db.	300-350	470,00
		350-400	675,00
4xv.	m.Db.	400-500	1.050,00
		500-600	1.460,00
		600-700	2.040,00



Robinia hispidia 'Macrophylla'

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00




Robinia pseudoacacia

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00



Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia  
'Bessoniana'Robinia pseudoacacia  
'Bessoniana'

Robinia pseudoacacia 'Frisia'



Robinia pseudoacacia 'Frisia'

## pseudoacacia 'Bessoniana', Kegel-Akazie

Höhe: 12-16 (-20) m

Wuchs: dicht, eiförmig, später breiter und lockerer

Laub: unpaarig gefiedert; später Austrieb; Herbstfärbung gelb

Blüte: sehr selten

Frucht: nicht beobachtet

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, ausgewogen, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: kaum bedornt

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	7.300,00
		50- 60			9.200,00

## pseudoacacia 'Frisia', Gold-Akazie

Höhe: 12-15 m

Wuchs: unregelmäßig, locker, eiförmig, später breit gewölbt

Laub: unpaarig gefiedert; goldgelb

Blüte: Mai bis Juni; gering; weiße, hängende Trauben; stark duftend

Frucht: bis Winter; braune Hülsen; selten

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: Dornen rotbraun

### Solitär

3xv.	m.B.	200-250	126,00
		250-300	184,00
		300-350	268,00

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	1.020,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	150-200	400-500	1.690,00 2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	2.340,00 2.910,00 3.580,00

**pseudoacacia 'Nyirsegi', Masten-Akazie**

- Höhe: 25-30 m  
 Wuchs: kräftig, eiförmig  
 Laub: gefiedert; hellgrün  
 Blüte: Juni; weiß; kurze Rispen  
 Frucht: selten; Samen unfruchtbar  
 Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: viele große Dornen



Robinia pseudoacacia 'Frisia'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14 14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			270,00 370,00 510,00 680,00 895,00	240,00 330,00 450,00 600,00 790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00



Robinia pseudoacacia 'Nyirsegi'


**Solitär-Bäume**



4xv.	m.Db.	20- 25 25- 30 30- 35	150-200	400-500	1.210,00 1.500,00 1.840,00
4xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	200-300	500-700	1.840,00 2.290,00 2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	200-300	700-900	2.540,00 3.150,00 3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45 45- 50 50- 60	300-400	700-900	4.770,00 5.800,00 7.300,00

Robinia pseudoacacia  
'Pyramidalis'**pseudoacacia 'Pyramidalis', Säulen-Akazie**

Synonym: R. p. 'Fastigiata'

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: wenig  
 Standort: weite Standortamplitude, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: kaum bedornt

Robinia pseudoacacia  
'Pyramidalis'

Robinia pseudoacacia  
'Pyramidalis'Robinia pseudoacacia  
'Sandraudiga'Robinia pseudoacacia  
'Semperflorens'Robinia pseudoacacia  
'Semperflorens'

## → pseudoacacia 'Pyramidalis'

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.580,00

**pseudoacacia 'Sandraudiga', Scheinakazie  
'Sandraudiga'**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: breit oval bis kegelförmig, locker, offen

Laub: unpaarig gefiedert; graugrün; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juni bis Juli; zartrosa Trauben

Frucht: selten

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, lehmig, Kalk liebend; sonnig

**pseudoacacia 'Semperflorens', Scheinakazie  
'Semperflorens'**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: locker, breit eiförmig

Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juni; weiße Trauben; duftend; Nachblüte August bis September

Frucht: selten

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend, sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
		20- 25	1.080,00	925,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.980,00
		30- 35			2.470,00
		35- 40			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.760,00
		35- 40			3.320,00
		40- 45			4.070,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	5.050,00
		45- 50			6.250,00
		50- 60			7.690,00



Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

**pseudoacacia 'Tortuosa', Korkenzieher-Akazie**

Höhe: 8-12 m

Wuchs: breit aufrecht, Äste verschlungen

Laub: unpaarig gefiedert; hängend; gedreht; später Austrieb; Herbstfärbung gelb

Blüte: selten

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig bis lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: bedornt; Zweige korkenzieherartig gedreht

**Solitär**

3xv.	m.Db.		175-200	222,00
			200-250	335,00
4xv.	m.Db.	100-150	250-300	485,00
			300-350	695,00

**pseudoacacia 'Umbraculifera', Kugel-Akazie**

Synonym: R. p. 'Inermis'

Höhe: je nach Veredlungshöhe 4-6 m

Wuchs: kugelrund, später flach rund

Laub: unpaarig gefiedert; zierlich; Herbstfärbung gelb

Blüte: keine

Frucht: keine

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, sandig bis lehmig, nährstoffausgewogen, Kalk liebend; sonnig


Sonstiges: nicht bedornt

**Hochstämmе, Halbstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00



Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'



Robinia pseudoacacia 'Tortuosa'

Robinia pseudoacacia  
'Umbraculifera'

Robinia pseudoacacia  
'Umbraculifera'

## → pseudoacacia 'Umbraculifera'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	1.210,00
		25- 30		1.500,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	1.840,00
		30- 35		2.290,00
		35- 40		2.830,00
5xv.	m.Db.	35- 40	300-400	3.150,00
		40- 45		3.880,00
		45- 50		4.770,00
		50- 60		5.900,00



Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'

**pseudoacacia 'Unifoliola', Einblättrige Akazie, Straßen-Akazie**

## Synonym: R. p. 'Monophylla'

Höhe: 10-15 (-20) m

Wuchs: annähernd kegelförmig

Laub: schwach gefiedert; großes Endblatt, kleine Fiederblättchen; im Herbst gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiße Trauben; stark duftend

Standort: weite Standortamplitude; trocken bis frisch, mäßig nährstoffreich, sandig lehmig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: nicht bedornt




Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
		20- 25		895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
4xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.770,00
		45- 50			5.800,00
		50- 60			7.300,00



Robinia pseudoacacia 'Unifoliola'

**ROSA - Rosaceae - ROSE****agrestis**, Acker-Rose, Feld-RoseSynonym: *R. sepium*

Höhe: 1-2,5m  
 Wuchs: lockerer Strauch  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: weiß bis blassrosa  
 Frucht: eiförmig; leuchtend orangerot  
 Standort: trocken bis frisch; sonnig bis halbschattig



Rosa agrestis

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
-------	------	--------	------	------	------

**arvensis**, Kriech-Rose

Höhe: 0,5-2 m  
 Wuchs: nieder liegend, kriechend oder locker kugelig, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Juli; weiß  
 Frucht: eiförmig; hellrot  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, nährstoffreich, lehmig; sonnig, licht- bis halbschattig



Rosa arvensis

Sonstiges: sichelförmige Stacheln

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	40- 60	10,80	9,55	8,65

**blanda**, Eschen-RoseSynonym: *R. fraxinifolia*

Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: aufrecht, strauchförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: einfach; kräftig rosa in kleinen Büscheln  
 Frucht: rot; ca. 1 cm dick  
 Standort: frische nährstoffreiche Böden, neutral bis alkalisch



Rosa blanda

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	40- 60	6,60	4,85	4,40
		60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	40- 60	10,80	9,55	8,65



Rosa blanda





Rosa canina

## canina, Hunds-Rose



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; hellrosa  
 Frucht: ab Juli bis Winter; eiförmige Hagebutten; rot; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: Stacheln hakig gekrümmt

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	5,75	4,15	3,90
4 Tr.	o.B.	100-150	7,70	5,70	5,15
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90



Rosa canina

## canina 'Vkg 1 bis 6 - ZgG®', Gebietseigene Hunds-Rose aus Vorkommensgebiet 1 bis 6



Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; hellrosa  
 Frucht: ab Juli bis Winter; eiförmige Hagebutten; rot; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: Stacheln hakig gekrümmt

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	5,00
4 Tr.	o.B.	100-150	10,15	7,90	7,15



Rosa carolina

## carolina, Sand-Rose




Synonym: R. virginiana

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: aufrecht, stark Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Juli bis August; rosa; schwach duftend  
 Frucht: ab September; rote Hagebutten; lange haftend  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschantig

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	40- 60	5,75	4,15	3,80
		60-100	7,70	5,70	5,15
	Co.	40- 60	12,70	11,20	10,15



Rosa carolina

**corymbifera**, Ebenstrauß-RoseSynonym: *R. dumetorum*

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: breit wachsend  
 Laub: unpaarig gefiedert, behaart  
 Blüte: Juni; weiß bis blassrosa  
 Frucht: 1,2-1,8 cm eiförmig; orangerot  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
-------	------	--------	------	------	------



Rosa corymbifera


**gallica**, Essig-Rose

- Höhe: 0,5-1 m  
 Wuchs: nieder liegend bis mäßig aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert; ledrig  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa bis karminrot; stark duftend  
 Frucht: kugelige, braune Hagebutten  
 Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: mit Stachelborsten besetzt

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	40-60	6,60	4,85	4,40
		60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	40-60	10,80	9,55	8,65



Rosa gallica


**glauca**, Hecht-RoseSynonym: *R. rubrifolia*

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, bogig überhängend  
 Laub: unpaarig gefiedert; bläulich grün; Herbstfärbung orange  
 Blüte: Juni bis Juli; purpurrot  
 Frucht: ab August bis September; kugelig; rote Hagebutten  
 Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Rinde junger Triebe rotblau; wenige Stacheln

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
4 Tr.	o.B.	100-150	10,80	8,55	7,75
	Co.	60-100	14,20	12,55	11,70



Rosa glauca



Rosa glauca



Rosa jundzillii

**jundzillii**, Raublättrige RoseSynonym: *R. marginata*

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: aufrecht, bogig überhängend  
 Laub: drüsig; doppelt gesägt; Blattoberseite matt dunkelgrün  
 Blüte: groß; rosa später weiß werdend  
 Frucht: kugelig; glatt; dunkelrot  
 Standort: Wärme liebend, Sonne bis lichter Schatten; Kalk liebend




Rosa majalis

**majalis**, Zimt-Rose, Mai-RoseSynonym: *R. cinnamomea*

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: kleiner, breitbuschiger, aufrechter Strauch, Ausläufer bildend  
 Laub: unpaarig gefiedert; länglich; behaart; Blattoberseite stumpfgrün  
 Blüte: meist einzeln; karminrot mit heller Mitte  
 Frucht: 1 cm dick; dunkelrot; glatt  
 Standort: sonnig bis halbschattig; feuchter bis leicht trockener Lehmboden  
 Sonstiges: Vogelschutzgehölz

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	40- 60	6,60	4,85	4,40
		60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	40- 60	10,80	9,55	8,65



Rosa moyesii

**moyesii**, Mandarin-Rose

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, sparrig  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Juni bis Juli; dunkelweinrot, Mitte gelb  
 Frucht: ab September; flaschenförmige, orangefarbene Hagebutten  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: bestachelt

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	30- 40	10,80	9,55	8,65



Rosa moyesii

**multiflora, Büschel-Rose**

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig überhängend  
 Laub: unpaarig gefiedert; lange haftend  
 Blüte: Juni bis Juli; weiß; süßlich duftend  
 Frucht: ab August bis Winter; kugelige, kleine Hagebutten  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig lehmig, Kalk meidend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: wenig bestachelt



Rosa multiflora

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	5,75	4,15	3,80
4 Tr.	o.B.	100-150	7,70	5,70	5,15
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

**nitida, Glanz-Rose**

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: straff aufrecht, kaum verzweigt, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa  
 Frucht: September bis Dezember; kugelige, rote Hagebutten  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis nass, Kalk feindlich; sonnig  
 Sonstiges: dicht mit Stachelborsten besetzt



Rosa nitida


**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	20-30	5,60	4,02	3,65
5 Tr.	o.B.	30-40	6,60	4,85	4,40
		40-60	9,20	7,10	6,40
	Co.	20-30	11,10	9,80	8,90
		30-40	12,40	11,00	9,95

**obtusifolia, Flaum-Rose**

Synonym: *R. tomentella*

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: aufrecht mit überhängenden Trieben  
 Laub: unpaarig gefiedert; Blattoberseite tiefgrün oft glänzend  
 Blüte: klein; weiß bis blass rötlich  
 Frucht: kugelig; glatt; scharlach bis orange  
 Standort: Pioniergehölz; auch für schlechtere Standorte geeignet  
 Sonstiges: Vogelschutzgehölz



Rosa nitida



Rosa nitida



Rosa pendulina

## pendulina, Alpen-Heckenrose



Synonym: *R. alpina*

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: kleiner bis mittelhoher Strauch, Ausläufer bildend  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: Mai bis Juni; rosa bis purpurrot; reich blühend  
 Frucht: hellrot; ei- bis flaschenförmig  
 Standort: Kalk meidend, mäßig trocken bis feucht; schattenverträglich

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	40- 60	6,60	4,85	4,40
		60-100	8,20	6,15	5,50



Rosa pimpinellifolia

## pimpinellifolia, Bibernelle-Rose



Synonym: *R. spinosissima*

- Höhe: 0,75-1 (-1,5) m  
 Wuchs: sparrig aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß mit gelber Mitte  
 Frucht: ab September; runde, schwarze Hagebutten  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: mit Nadelstacheln und Stachelborsten besetzt

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	40- 60	5,75	4,15	3,80
		60-100	7,70	5,70	5,15
	Co.	60-100	12,70	11,20	10,15



Rosa pimpinellifolia

## rubiginosa, Wein-Rose, Zaun-Rose




- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breitbuschig, überhängend  
 Laub: unpaarig gefiedert; fruchtig duftend  
 Blüte: Juni bis Juli; hellkarminrosa  
 Frucht: ab September bis Winter; eiförmige, orangerote Hagebutten  
 Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, lehmig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschatig

Sonstiges: kräftige Hakenstacheln und Stachelborsten

### verpflanzte Sträucher

3 Tr.	o.B.	60-100	5,75	4,15	3,80
4 Tr.	o.B.	100-150	7,70	5,70	5,15
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90



Rosa rubiginosa

**rubrifolia** - siehe *R. glauca***rugosa**, Apfel-Rose

Höhe: 1-2 m

Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend


Laub: unpaarig gefiedert, runzelig; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juni bis Oktober; rosa und weiß; duftend

Frucht: bis Winter; scharlachrote Hagebutten

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk feindlich; sonnig

Sonstiges: voll besetzt mit Stachelborsten



Rosa rugosa

**verpflanzte Sträucher**

2 Tr.	o.B.	30- 40	4,20	2,90	2,65
3 Tr.	o.B.	40- 60	5,10	3,60	3,30
		60-100	6,95	5,10	4,60
	Co.	40- 60	11,70	10,35	9,40

**rugosa 'Alba'**, Weiße Apfel-Rose

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend

Laub: unpaarig gefiedert; runzelig; Herbstfärbung gelb

Blüte: ab Mai bis September; weiß; duftend

Frucht: bis Winter; rote Hagebutten

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk feindlich; sonnig


Sonstiges: voll besetzt mit Stachelborsten



Rosa rugosa

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	30- 40	4,75	3,30	3,00
		40- 60	5,75	4,15	3,80
		60-100	7,70	5,70	5,15
	Co.	40- 60	12,35	10,90	9,90



Rosa rugosa 'Alba'

**rugotida**, Niedrige Strand-Rose

Höhe: bis 1 m

Wuchs: straff aufrecht, buschig, Ausläufer treibend


Laub: unpaarig gefiedert; runzelig; Herbstfärbung gelblich rot

Blüte: Juni bis Juli; rosa

Frucht: keine

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, Kalk feindlich; sonnig

Sonstiges: Stachelborsten



Rosa rugotida



Rosa rugotida

**rugotida 'Defender', Böschung-Rose**

Synonym: R. rugotida 'Dart's Defender'

Höhe: 0,5-1 m  
 Wuchs: breitbuschig, hängende Zweige, Ausläufer bildend  
 Laub: großes Blatt; unterseits tiefbraun; unpaarig gefiedert  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa bis violettrosa; bis 10 cm breit  
 Frucht: keine Früchte  
 Standort: schwach sauer bis neutral, mäßig trocken bis frisch; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	30- 40	6,60	4,85	4,40
		40- 60	9,20	7,10	6,45



Rosa tomentosa

**spinosissima - siehe R. pimpinellifolia****tomentosa, Filz-Rose, Wald-Rose**

Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: breitbuschiger gedrungener Strauch  
 Laub: unpaarig gefiedert; stumpfgrün  
 Blüte: Juni; hellrosa bis weiß; einzeln oder in kleinen Büscheln  
 Frucht: fast kugelig; 1-2 cm dick; tiefrot  
 Standort: Sonne bis Halbschatten; trocken bis mäßig feucht, Kalk liebend



Rosa villosa

**villosa, Apfel-Rose**

Synonym: R. pomifera

Höhe: 1-2 m  
 Wuchs: dichtverzweigter, kurztriebiger Strauch; Ausläufer bildend  
 Laub: unpaarig gefiedert; graugrün; Blättchen elliptisch länglich  
 Blüte: Juni bis Juli; dunkelrosa; bis 5 cm breit  
 Frucht: kugelig bis länglich; dunkelrot; bis 2,5 cm dick  
 Standort: Wärme liebend, Sonne bis Halbschatten; Kalk liebend, trocken

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,20	6,15	5,50
	Co.	40- 60	10,80	9,55	8,65

## ROSA - Rosen-Sortiment

Der Erfolg einer Rosenpflanzung steht und fällt mit dem Wissen über die Standortansprüche der Königin der Blumen. Rosen lieben Sonne und Luft. Ein sonniger Standort ist die beste Gewähr für eine volle Blütenpracht. Hat die Rose zusätzlich an ihrem Standort ausreichend Luftzirkulation, nimmt der Befallsdruck durch Pilzkrankheiten deutlich ab. Die tiefwurzelnde Rose verlangt einen tiefgründigen, humosen Boden. Staunässe ist zu vermeiden. Soll auf einem Boden, auf dem seit Jahren Rosen gestanden haben, gepflanzt werden, ist ein Bodenaustausch ratsam. Nach dem Pflanzen reagieren Rosen positiv auf langsam fließende, organische Dünger. Optimal versorgte Pflanzen auf einem rosengerechten Standort garantieren viele Jahre fantastische Farbeffekte, die in Blühwilligkeit und -dauer von keinem anderen Gehölz übertroffen werden.



### ADR-Rosen

ADR steht für die Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung, eine der strengsten Rosenprüfungen weltweit. Rosen, die diese Prüfung bestanden haben, bekommen das ADR-Siegel verliehen und stehen für Blattgesundheit, Blühwilligkeit, Robustheit und Frosthärte.

### Duftkategorien:

- = kein Duft; \* = leichter Duft; \*\* = mittlerer Duft; \*\*\* = starker Duft

### Güteklasse A und P 1 /1,5 ab 3 Tr.

Preisgruppe

2	6,95	6,15	5,55
3	8,60	7,60	6,90
4	10,20	9,00	8,15
5	11,45	10,10	9,15
6	12,70	11,20	10,15
7	13,40	11,85	10,75

### Rosen im Container

3 ltr.	16,60	14,65
5 ltr.	24,80	21,90
7,5 ltr.	30,70	27,10

### Stammrosen im Container

5 ltr.	Sth.	40-60 cm	41,10	36,30
7,5 ltr.	Sth.	90 cm	48,10	42,50
7,5 ltr.	Sth.	120-140 cm	57,60	50,90



Rosa 'Aachener Dom'®



Rosa 'Gloria Dei'



Rosa 'Mainzer Fastnacht'®



Rosa 'Nostalgie'®





Rosa 'Bengali'®



Rosa 'La Perla'®



Rosa 'Garden of Roses'®



Rosa 'Schneeküsschen'®

## Edelrosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Aachener Dom®	3	lachsrosa	60-80	***
Augusta Luise®	6	rosa-apricot	80-100	***
Aquarell®	6	rosa-pfirsichgelb	70-100	***
Barkarole®	5	dunkelrot	100-150	***
Berolina®	3	zitronengelb gefüllt	160	*
Beverly®	4	zartrosa	70-80	*
Duftfestival®	4	samtrot	50-60	***
Duftgold®	4	goldgelb	70-100	***
Duftzauber 84®	3	dunkelrot	60-80	***
Elbflorenz®	4	fuchsiarot	60-80	***
Eliza®	4	silbrig rosa	100	*
Frederic Mistral®	4	hellrosa	60-80	***
Grande Amore®	4	leuchtend rot	80	*
Gloria Dei	3	gelb, Rand braunrot	80-100	-
Hamburger Deern®	3	orange	60-80	**
Ingrid Bergman®	2	schwarzrot	70-100	***
Johann W. v. Goethe®	5	purpurviolett	100-130	***
Kupferkönigin®	6	Kupfergelb	70-90	*
Landora®	2	reingelb	ca. 100	-
La Perla®	4	creme	80-100	*
Mainzer Fastnacht®	3	fliederfarben	50-80	***
Memoire®	3	reinweiß	70-80	**
Nostalgie®	6	cremeweiß u. kirschfarben	80	**
Piano®	6	leuchtend rot	100-130	**
Polarstern®	3	leuchtend weiß	60-100	*
Schwarze Madonna®	3	samtiges schwarzrot	70-90	*
Sebastian Kneipp®	5	weißlich rosa	120	***
Sunny Sky®	4	honiggelb	120	*
Whisky®	2	bronzegelb	50-70	**

## Beetrosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Aprikola®	3	aprikosengelb	50-80	*
Bad Birmbach®	3	leuchtend rosa	40-60	-
Bayerngold®	2	reingelb	100-110	-
Bella Rosa®	2	kräftig rosa	40-50	-
Bengali®	4	kupfergelb gefüllt	100	**
Bentheimer Gold®	4	apricot-orange	60-80	*
Bernstein Rose®	4	bernsteingelb	50-60	-
Bienenweide® Apricot	3	apricot	40-60	*
Bienenweide® Gelb	3	gelb	40-60	*
Bienenweide® Hellrot	3	helles rot	40-60	-
Bienenweide® Rosa	3	rosa	40-60	-

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Bienenweide® Rot	3	rot	40-60	-
Bienenweide® Weiß	3	weiß	40-60	-
Black Forest Rose®	3	rot	50-70	-
Bonica 82®	3	hellrosa	50-60	-
Cherry Girl®	3	kirschrot	70	**
Chorus®	2	zinnoberrrot	50-70	-
Colossal Meidiland®	3	dunkelrot	60-80	-
Duftwolke®	2	korallenrot	60-70	***
Edelweiss®	2	cremeweiß	40-50	*
Fortuna®	3	lachsrosa mit weißer Mitte	40-60	-
Friesia®	3	goldgelb	50-60	**
Gebrüder Grimm®	4	leuchtend orange	60-70	*
Garden of Roses®	3	creme pastellrosa	60	*
Gruß an Bayern®	2	blutrot	50-70	-
Home & Garden®	4	rosa	70-90	-
Innocencia®	3	reinweiß	40-60	*
Kosmos®	4	cremeweiß	60-80	**
Larissa®	3	rosa, aufhellend	70-80	*
La Paloma®	2	rahmweiß	50-70	*
La Sevillana®	3	blutrot	70-90	*
Leonardo da Vinci®	4	dunkelrosa	50-60	***
Lions-Rose®	5	cremeweiß	70	*
Marie Curie®	3	apricot bis hellrosa	50-60	**
Neon®	3	karminrosa	60	-
Novalis®	5	flieder	80	**
Planten un Blumen®	3	rotweiß, halbgefüllt	70	-
Play Rose®	3	karminrosa	60-80	*
Pomponella®	4	dunkelrosa	80	*
Portorož®	4	apricot	90	*
Red Leonardo da Vinci®	6	dunkelrot	40-60	*
Rosenfee®	4	rosa	60-70	*
Rosengräfin®	6	rosa	60-80	***
Marie Henriette®				
Rotilia®	3	dunkelrot	40-60	*
Rotkäppchen®	4	dunkelrot	70	*
Sangerhäuser Jubiläum®	4	zartapricot	70	*
Tequila®	3	orange	50-70	*
The Queen Elisabeth R.®	2	zartrosa	80-100	**
Träumerei®	2	lachsorange	60-80	**



Rosa 'Gebrüder Grimm'® ADR



Rosa 'La Sevillana'®



Rosa 'Marie Curie'®



Rosa 'Tequila'®

## Zwergrosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Charmant®	3	rosa	40-50	***
Honeymilk®	3	weiß - cremegelb	40-50	***
Little Sunset®	3	gelb mit rotem Rand	40	-

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Lupo®	3	dunkellila	50	-
Mandy®	3	blutrot	50	-
Pepita®	3	pink	40- 50	-
Roxy®	3	magenta	40	-
Schneeküsschen®	3	reinweiß	40	-
Sonnenröschen®	3	weiß mit gelbem Auge	30	-
Zwergenfee®	3	orangerot	20- 40	***

## Bodendeckende Rosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Alba Meidiland®	3	reinweiß	60-100	*
Alpenglühén®	3	signalrot	50- 60	-
Amber Sun®	3	kupfergelb	40- 60	*
Apache®	4	dunkelrot	79- 90	-
Aspirin-Rose®	3	weiß	60- 70	-
Austriana®	3	blutrot	50- 70	-
Ballerina®	3	rosa, weiße Mitte	40- 60	-
Bassino®	3	leuchtendblutrot	20- 40	-
Bingo Meidiland®	3	zartrosa	50- 60	-
Candela®	3	honiggelb	70-100	*
Cubana®	3	orange/apricot	50- 60	-
Dagmar Hastrup (rug.)	3	hellrosa	80-100	*
Diamant®	3	reinweiß	50- 60	-
Escimo®	3	reinweiß	60	-
Fairy Dance®	3	blutrot	30- 50	-
Fiona®	3	blutrot	70- 90	-
Foxi® (rugosa)	3	altrosa	40- 60	**
Gärtnerfreude®	3	himbeerrot	30- 60	-
Gelbe Dagmar Hastrup® (rug.)	3	kräftig gelb	60- 80	**
Heideröslein Nozomi®	3	perlmutterrosa-weiß	30- 40	-
Ice Meidiland®	3	reinweiß	40- 50	-
Jazz®	3	kupferorange	60- 70	*
Juanita®	4	karmirosa	40- 50	*
Kent®	3	weiß mit gelben Auge	30- 40	*
Knirps®	3	leuchtend pink	30- 40	-
Limesglut®	4	dunkelrot	40- 60	**
Lemon Fizz®	3	gelb	80	*
Lovely Fairy®	3	pink	50- 60	-
Lovely Meidiland®	3	hellrosa	40- 50	-
Magic Meidiland®	3	dunkelrosa	40- 50	**
Mainaufeuer®	3	blutrot	40- 50	-
Matador®	3	leuchtend rot	50- 70	***
Medeo®	3	cremeweiß-rosa	60- 80	-
Mirato®	3	pinkrosa	40- 50	-



Rosa 'Dagmar Hastrup'



Rosa 'Fiona'



Rosa 'Gelbe Dagmar Hastrup'

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Moje Hammarberg(rug.)	3	violettrosa	70- 90	***
Palmengarten Frankfurt®	3	kräftig rosa	60- 80	-
Pearl Meidiland®	3	zartweiß	50- 60	-
Phlox Meidiland®	3	reinrosa	60- 80	-
Pink Meidiland®	3	rot, später rosa	90-100	-
Pink Roadrunner® (rug.)	3	rosa	60- 80	***
Polareis® (rugosa)	3	porzellanrosa	60- 70	**
Purple Roadrunner®	3	purpurlila	60- 70	***
Red Meidiland®	3	rot mit weißer Mitte	40- 50	-
Rody®	3	himbeerrot	30- 40	*
Romatic Roadrunner®	3	kräftig rosa	60- 70	***
Rosa Zwerg® (rugosa) (Syn.: Dwarf Pavement)	3	reinrosa	30- 40	***
Rote Max Graf	3	leuchtend rot	40- 60	-
Rotes Meer® (rugosa) (Syn.: Purple Pavement)	3	karminrot	50-100	***
Satina®	3	zartrosa	30- 50	*
Scarlet Meidiland®	3	orangerot	50- 60	-
Schnee-Eule® (rugosa)	3	weiß	50- 70	**
Schneekoppe® (rugosa) (Syn.: Snow Pavement)	3	weiß	60- 80	*
Schneekönigin®	3	weiß mit gelber Mitte	50- 70	**
Sea Foam®	3	leuchtend weiß	50- 60	*
Smart Roadrunner®(rug.)	3	dunkelrosa	60- 80	**
Snow Ballet®	3	weiß	40- 50	-
Sommerabend®	3	leuchtend dunkelrot	40- 80	-
Sommerwind®	3	leuchtend rosa	50- 60	-
Sonnenschirm®	3	zitronengelb	50- 60	*
Stadt Rom®	3	lachsrosa	50- 60	*
Summer of Love®	3	gelb mit rotem Rand	80	*
Sunny Rose®	3	hellgelb	30- 40	-
Swany®	3	schneeweiß	30- 50	-
Sweet Haze®	3	rosa	50- 80	*
The Fairy	2	zartrosa	60- 70	-
Topolina®	3	rosa, gelbe Mitte	40	*
Weg der Sinne®	3	purpurviolett, gelbe Mitte	80	*
White Meidiland®	3	weiß	40- 60	-
White Roadrunner®(rug)	3	weiß	40- 50	***



Rosa 'Moje Hammarberg'



Rosa 'Schnee-Eule®'



Rosa 'Sommerwind®'

## Strauchrosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Abraham Darby®	6	apricotgelb rosa	150-200	***
Alba Suaveolens®	2	reinweiß	bis 200	***
Amadeus®	6	blutrot	180-250	*
Angela®	3	kräftig altrosa	80-100	-
Artemis®	6	cremeweiß, leicht grünlich	100-130	*



Rosa 'Centenaire de Lourdes'



Rosa 'Graham Thomas'



Rosa 'IGA 83 München'



Rosa 'Rose de Resht'

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Astrid Gräfin von Hardenberg®	6	rot	100-150	***
Bonanza®	3	leuchtend gelb, mit rotem Rand	150-200	*
Bremer Stadtmusikanten®	5	cremerosa	bis 120	**
Brillant Korsar®	4	rotorange	150	*
Caramella®	5	bernsteingelb	120	*
Centenaire de Lourdes	3	hellrosa	180	**
Charles Austin	6	aprikosengelb mit rosa	bis 180	**
Cinderella®	5	zartrosa	150	*
Dirigent®	3	blutrot	150-180	-
Eden Rose 85®	5	zartrosa, innen kräftig rosa	100-150	**
Feuerwerk®	3	orange	150	*
Freisinger Morgenröte®	3	orangefarben	120-150	**
Fritz Nobis®	3	rosa, gelbe Mitte	200	**
Frühlingsgold®	5	goldgelb	200-250	**
Gallica officinalis	6	karminrot	150	-
Gertrude Jekyll®	6	leuchtend rosa	100-150	**
Ghislaine de Feligonde®	3	rosa gelblich	80- 90	**
Goldspatz®	4	hellgelb	150	*
Graham Thomas®	6	gelb mit Kupferschein	120-150	***
Grandhotel®	3	samtigblutrot	bis 200	-
Hansa® (rugosa)	3	dunkelvioletrot	100-200	**
Herkules®	5	lavendel bis weiß	120	**
Hugonis	4	goldgelb	150-200	-
IGA 83 München®	3	karminrosa	60- 80	-
Jacque Cartier®	4	karminrosa	100-150	***
Kiese® (canina)	2	blutrot, weiße Mitte	200-250	-
Königin von Dänemark®	6	karminrosa	bis 150	***
Lichtkönigin Lucia®	3	zitronengelb	120-150	**
Louise Odier®	4	rosa	150-200	**
Maigold® (spinosissima)	3	leuchtend goldgelb	220-250	***
Marguerite Hilling®	3	karminrosa	150-250	-
Matthias Claudius®	5	apricotcreme	100-130	**
Moyesii	3	karminrot	200-250	-
Mozart®	3	rosa mit weißem Auge	100-150	*
Muscosa (centifolia)	3	intensivrosa	100	**
Nevada® (moyesii)	3	cremeweiß	180-200	*
Omeiensis pteracantha	5	reinweiß (Stacheldrahtrose)	200-250	-
Postillon®	4	leuchtend gelb	120-150	**
Red Eden Rose®	6	dunkelrot	100-150	***
Robusta® (rugosa)	3	leuchtend blutrot	150-200	*
Romanze®	3	kräftig dunkelrosa	100-130	**
Rose de Resht®	4	fuchsienrot	90-120	***
Roter Korsar®	4	leuchtend dunkelrot	120-150	-
Schneewittchen®	3	weiß	100-150	**
Soul®	6	purpurviolett	100-130	***

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Summer Memories®	4	cremeweiß	120	*
Ulmer Münster®	3	blutrot	100-150	*
Westerland®	3	kupferorange	150-200	**
William Shakespeare 2000®	6	rot	100-150	***
Winchester Cathedral®	6	weiß	100-150	*

## Kletterrosen

Sortenname	Pr.-Gr.	Farbe	Höhe in cm	Duft
Alaska® (Syn: Future®)	6	weiß	200	*
Alberic Barbier®	6	cremeweiß	300-500	***
Aloha®	6	apricot mit Rosa- und Rottönen	230-250	**
Amadeus®	6	blutrot	250	*
American Pillar®	4	karminrosa	bis 500	*
Barock®	5	gelb-cremeweiß	250-300	**
Bobbie James®	6	weiß	bis 500	***
Camelot®	5	rosapink	250-300	**
Compassion®	4	salmrosa	220-250	***
Coral Dawn®	4	korallenrosa	200-250	***
Elfe®	6	grünlich elfenbeinfarben	250-300	**
Filipes Kiftgate®	6	rahmweiss	700-900	**
Flammentanz®	6	blutrot	400-500	-
Florentina®	6	rot	200	*
Giardina®	6	rosa	250-350	**
Golden Gate®	6	goldgelb	250	**
Golden Showers®	3	goldgelb	200-300	*
Gruß an Heidelberg®	4	feurig karminrot	200-250	*
Guirlande d'Amour®	6	weiß	200-300	**
Ilse Krohn Superior®	5	leuchtend weiß	200-300	***
Jasmina®	6	violettrosa	250	**
Laguna®	6	pink	250	***
Lawinia®	5	reinrosa	250-300	**
Libertas®	5	pink, gelbe Mitte	200-300	*
Lykkefund®	5	weiß	bis 600	***
Moonlight®	6	zitronengelb	200-250	***
New Dawn®	5	zartrosa	300	*
Paul's Musk Rambler®	5	hellrosa	bis 900	**
Perennial Blue®	5	rosaviolett	350-450	*
Rosanna®	6	rosa	250	*
Rosarium Uetersen®	4	pinkrosa	200-300	*
Santana®	5	dunkelrot	200-250	*
Super Dorothy®	5	rosa	200-300	*
Super Excelsa®	6	karminrosa	200-300	-
Sympathie®	6	samtdunkelrot	300-400	**
Uetersener Klosterrose®	5	creme	250-350	**
Veilchenblau®	6	violett mit weißer Mitte	350-400	-




Rosa 'Bobbie James'®



Rosa 'Ilse Krohn Superior'®



Rosa 'Sympathie'®



Rubus fruticosus

**RUBUS - Rosaceae - HIMBEERE, BROMBEERE****caesius, Kratzbeere, Ackerbeere**

- Höhe: 0,5-1,5 m  
 Wuchs: mattenförmig oder strauchartig  
 Laub: dreizählig gefiedert; Einzelblättchen; zwei- bis dreilappig;  
 Herbstfärbung gelb bis orange  
 Blüte: Mai bis September; weiß  
 Frucht: ab Sommer; schwarz; Brombeere  
 Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, lehmig, tonig, Kalk liebend; sonnig bis schattig

**Sträucher**

2j. Ausl. o.B.	60-100	3,95	3,49	3,17
Co.	30- 40	7,30	5,40	4,90
	40- 60	9,20	7,10	6,40

**fruticosus, Gemeine Brombeere**

- Höhe: 1,5-3 m  
 Wuchs: lockerbuschig, kräftig aufrecht oder Boden aufliegend  
 Laub: fünfzählig; Herbstfärbung rötlich braun; oft bis Frühjahr haftend  
 Blüte: Juni bis Juli; weiß bis rosa; Doldentrauben  
 Frucht: schwarze Brombeeren; essbar  
 Standort: weite Standortamplitude; mäßig trocken bis frisch, humos, nährstoffreich; licht- bis halbschattig

Sonstiges: bestachelt

**Sträucher**

2j. Ausl. o.B.	60-100	3,15	2,15	1,95
m.Tb.		3,20	2,83	2,57

**idaeus, Gemeine Himbeere**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: aufrecht, wenig verzweigt, leicht überhängend  
 Laub: unpaarig gefiedert; runzelig  
 Blüte: Mai bis Juli; weiße Trauben  
 Frucht: bis September; rote Himbeeren  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, lehmig; licht- bis halbschattig


Sonstiges: bestachelt

**Sträucher**

2j. Ausl.	60-100	3,20	2,83	2,57
-----------	--------	------	------	------




Rubus idaeus



Rubus idaeus

**odoratus**, Zimt-Himbeere, Wohlriechende Himbeere

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschig, Ausläufer treibend  
 Laub: handförmig gelappt; behaart  
 Blüte: Juni bis August; purpurne Rispen; auffallend  
 Frucht: bis September; rote Himbeeren; fade schmeckend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, lehmig; licht- bis halbschattig



Rubus odoratus

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	9,70	7,60	6,90
	Co.	40-60	12,10	10,70	9,70

**tricolor**, Chinesische Brombeere

- Höhe: 30 cm  
 Wuchs: flach niederliegend, kriechend  
 Laub: eirundlich; oft leicht gelappt; unterseits weißfilzig  
 Blüte: Juli bis August; weiße Trauben  
 Frucht: ab September; hellrote Brombeeren; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, nahrhaft, humos, Kalk meidend; licht- bis halbschattig  
 Sonstiges: nicht zuverlässig winterhart




Rubus tricolor

**Sträucher**

m.Tb.	20-30	4,05	3,58
	30-40	5,10	4,51
	40-60	5,75	5,05

**RUBUS Fruchtsorten** - siehe Obstteil**SALIX** - Salicaceae - WEIDE**alba**, Weiß-WeideBaum  
des Jahres  
1999

- Höhe: 20-25 m  
 Wuchs: kegelförmig, später locker rundlich  
 Laub: lanzettlich; graugrün, silbrig behaart  
 Blüte: April bis Mai mit Austrieb; zweihäusig; gelbe Kätzchen  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: weite Standortamplitude, frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: höchste und langlebigste Weidenart, Lebenserwartung 80 bis 200 Jahre




Rubus tricolor



Salix alba





Salix alba 'Belders'

→ alba

**alba 'Belders', Weiß-Weide 'Belders'**

Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: geschlossen, breit eiförmig  
 Laub: länglich lanzettlich; graugrün  
 Blüte: April bis Mai; männliche Selektion  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig



Salix alba 'Liempde'

**alba 'Liempde', Kegelförmige Weiß-Weide**

Höhe: 25-30 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig  
 Laub: lanzettlich; grün, unterseits bläulich  
 Blüte: April bis Mai; männliche Selektion  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Rinde jung braunrot, später gelblich

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	16,60	13,95	12,65
	200-250	20,50	17,60	16,00
	250-300	25,50	22,15	20,10

**Hochstämme, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00
		25- 30		1.020,00	900,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
		35- 40			2.160,00
4xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00
5xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.520,00
		45- 50			5.600,00
		50- 60			6.950,00

**Form-Bäume, als Kopfweide geschnitten, Stammhöhe ab 180 cm**

3xv.	m.Db.	14- 16		370,00
		16- 18		510,00
		18- 20		680,00
		20- 25		895,00




Salix alba 'Liempde'



Salix alba - Kopfweide

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00		
		25- 30	1.240,00		
		30- 35	1.730,00		
		35- 40	2.410,00		
		40- 45	3.580,00		
5xv.	m.Db.	45- 50	4.070,00		
		50- 60	5.600,00		

**alba 'Tristis'** - Dotter-Weide, Hänge-Weide, Trauer-Weide 

Synonym: *S. sepulcralis* 'Chrysocoma'

- Höhe: 15-20 m
- Wuchs: weit ausladend, schleppenartig
- Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung gelbgrün
- Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen
- Frucht: Kapseln
- Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.210,00	150-200
		25- 30	1.500,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	2.290,00	200-300
		35- 40	2.830,00	
5xv.	m.Db.	35- 40	3.150,00	300-400
		40- 45	3.880,00	
		45- 50	4.770,00	

**aurita, Öhrchen-Weide**


- Höhe: 0,5-2 m
- Wuchs: sparrig, breitbuschig
- Laub: verkehrt eiförmig, runzlig; nierenförmige Nebenblätter nicht abfallend
- Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen, weibliche Blüten grün
- Frucht: Kapseln
- Standort: frisch bis nass, kalkfeindlich, torfig; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	40- 60	4,75	3,30	3,00
		60-100	5,75	4,15	3,80
	Co.	40- 60	10,50	9,25	8,40



Salix alba 'Tristis'



Salix alba 'Tristis'



Salix aurita



Salix aurita

**babylonica**, Babylonische Trauer-Weide (*Salix pendula*) 

Höhe: 10-12 m  
 Wuchs: bogig abstehende, hängende Zweige bis zum Boden  
 Laub: länglich lanzettlich; unterseits graugrün  
 Blüte: April bis Mai, silbriggrüne Kätzchen  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**balsamifera 'Mas'**, Gelbe Stein-Weide, Balsam-Weide

Synonym: *S. pyrifolia* 'Mas'

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: breit aufrecht, sparrig, Ausläufer bildend  
 Laub: elliptisch; dunkelgrün, unterseits blaugrün; stark duftend  
 Blüte: März bis April; männliche Kätzchen gelbgrün  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: trocken bis feucht nass, sauer alkalisch; sonnig bis lichtschtig

**Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,92	4,47
		100-150	7,70	6,80	6,15
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

**caprea**, Sal-Weide 

Höhe: 5-8 (-10) m  
 Wuchs: breit aufrecht, sparrig  
 Laub: länglich elliptisch bis breit oval; runzlig  
 Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in grausilbrigen Kätzchen  
 Frucht: grauwoelige Fruchtkätzchen  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschtig

**verpflanzte Sträucher**


4 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,02	3,65
		100-150	7,50	5,50	5,00
	Co.	60-100	11,45	10,10	9,15

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	62,10	54,90
		200-250	86,50	76,50



Salix caprea



Salix caprea

250-300 123,00

**caprea 'Mas', Echte Sal-Weide**

- Höhe: 5-8 m  
 Wuchs: dichtbuschig, rundlich  
 Laub: länglich elliptisch bis breit oval; runzlig  
 Blüte: März bis April; männliche Sorte; goldgelbe Kätzchen; schwach duftend; auffallend  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig




Salix caprea 'Mas'

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	100-150	21,70	18,90
		150-200	29,20	25,35
	Co.	60-100	19,50	17,20

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	67,10	59,30
		200-250	93,50	82,50
		250-300	133,50	



Salix caprea 'Mas'

**caprea 'Pendula', Hängende Kätzchen-Weide,  
Hänge-Kätzchen-Weide**

- Höhe: je nach Unterlage bis 2,5 m  
 Wuchs: dichte, kompakte Hängeform  
 Laub: länglich elliptisch  
 Blüte: März bis April; männliche Sorte; goldgelbe Kätzchen; schwach duftend  
 Frucht: keine, da männlich  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig




Salix caprea 'Pendula'

**Stamm**

Co.	Sth. 100-125	23,00	20,30
	Sth. 125-150	29,90	26,40

**cinerea, Asch-Weide, Grau-Weide**

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit ausladend, sparrig  
 Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig; aschgrau  
 Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten gelb  
 Frucht: silbergraue, filzige Fruchtkätzchen  
 Standort: frisch bis nass, tiefgründig, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig



Salix cinerea

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,02	3,65
		100-150	7,50	5,50	5,00
	Co.	60-100	11,45	10,10	9,15

**daphnoides**, Reif-Weide, Schimmel-Weide

Höhe: 5-10 (-15) m

Wuchs: locker, hochgewölbt, eiförmig

Laub: lanzettlich bis länglich; glänzend grün, unterseits matt bläulich;  
Herbstfärbung gelbBlüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in silbrig weißen  
Kätzchen

Frucht: selten

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, halbschattig, lehmig tonig; sonnig bis  
lichtschattig

Sonstiges: Zweige bläulich bereift

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	4,65	3,27	2,97
		100-150	5,60	4,02	3,65
	Co.	60-100	11,45	10,10	9,15

**elaeagnos**, Lavendel-Weide, Grau-Weide

Höhe: 2-2,5 m

Wuchs: kompakt, dicht

Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: April; kurz vor oder mit dem Austrieb; männliche Blüten gelb

Frucht: keine, da männlich

Standort: anspruchslos, trocken bis feucht, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1987 bis 1992 mit ausgezeichnet bewertet

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,02	3,65
		100-150	7,50	5,50	5,00

**fragilis**, Knack-Weide, Bruch-Weide

Höhe: 10-15 m

Wuchs: rundlich, Zweige leicht abknackend

Laub: lanzettlich

Blüte: April bis Mai mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in  
grüngelben Kätzchen; leicht duftend

Frucht: graue Fruchtkätzchen

Standort: nass bis frisch, Sand-, Kies-, Lehm- oder Tonböden; sonnig bis  
lichtschattig

Sonstiges: Zweige brechen leicht

**verpflanzte Stäucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	4,65	3,27	2,97
		100-150	5,60	4,02	3,65




Salix elaeagnos



Salix hastata 'Wehrhahnii'

**hastata 'Wehrhahnii', Engadin-Weide**

- Höhe: 80-120 cm  
 Wuchs: kompakt, breitrund  
 Laub: eirund; grauweiß  
 Blüte: April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrig weißen Kätzchen  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, nährstoffausgewogen, kalkverträglich; sonnig




Salix hastata 'Wehrhahnii'

**Sträucher**

m.B./Co.	30- 40	11,10	9,80
	40- 60	14,15	12,50

**matsudana 'Tortuosa', Korkenzieher-Weide**

- Höhe: 4-8 m  
 Wuchs: breit aufrecht, Zweige korkenzieherartig  
 Laub: schmal lanzettlich; kräuselig  
 Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in grauweißen Kätzchen  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: alle Kulturböden, mäßig trocken bis feucht, Kalk liebend; sonnig



Salix matsudana 'Tortuosa'

**vepflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,95	6,75	6,10
		100-150	11,45	9,15	8,30
	Co.	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	67,10		
		200-250	93,50		
		250-300	133,50		
4xv.	m.Db.	150-200	250-300	152,00	
			300-350	210,00	
			350-400	291,00	
			400-500	410,00	

**purpurea, Purpur-Weide, Korb-Weide**


- Höhe: 3-5 (-10) m  
 Wuchs: locker, besenförmig  
 Laub: lanzettlich; aromatisch duftend  
 Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen  
 Frucht: graue Fruchtkätzchen  
 Standort: weite Standortamplitude, versagt nur auf moorigem Boden; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: leicht schattenverträglich; Rinde gelblich, braun oder purpurn




Salix matsudana 'Tortuosa'

**vepflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	5,60	4,02	3,65
		100-150	7,50	5,50	5,00
	Co.	60-100	11,45	10,10	9,15



Salix purpurea



Salix purpurea 'Nana'

## purpurea 'Nana', Niedrige Purpur-Weide, Zwerg-Kugel-Weide

- Höhe: 0,5-1 (-1,5) m  
 Wuchs: feintriebig, dicht verzweigt, kugelig  
 Laub: lanzettlich; bläulich silbrig  
 Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen  
 Frucht: graue Fruchtkätzchen  
 Standort: frisch bis feucht, sandig lehmig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig

### verpflanzte Sträucher

5 Tr.	o.B.	40- 60	5,10	3,60	3,30
		60-100	6,95	5,10	4,60
	Co.	40- 60	12,35	10,90	9,90

## purpurea 'Pendula', Hänge-Purpur-Weide



- Höhe: bis 60 cm  
 Wuchs: dünne, bogig überhängende Zweige  
 Laub: schmal lanzettlich; hellgrün, unterseits silbrig grau  
 Blüte: März bis April; zweihäusig; männliche Blüten in roten, später gelben Kätzchen  
 Frucht: graue Fruchtkätzchen  
 Standort: frisch feucht, sandig lehmig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig

### Büsche

Co.	30- 40	13,40	11,85	10,75
	40- 60	16,60	14,65	13,30

## repens nitida, Silberlaubige Kriech-Weide



Synonym: S. arenaria, S. repens argentea

- Höhe: 30-100 cm  
 Wuchs: niederliegend, Triebspitzen aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: oval bis lanzettlich; silbrig grau  
 Blüte: April; zweihäusig; männliche Blüten silbrig, später gelb; duftend  
 Frucht: graue Fruchtkapseln  
 Standort: feucht bis nass, nährstoffarm, kalkfeindlich; sonnig  
 Sonstiges: Triebe samtig behaart

**rosmarinifolia**, Rosmarin-WeideSynonym: *S. repens angustifolia*

Höhe: 1,5-2 (-3) m

Wuchs: aufrecht bis niederliegend, breitbuschig

Laub: schmal lanzettlich; gelbe Herbstfärbung

Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in gelben Kätzchen

Frucht: graue Fruchtkätzchen

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig


Sonstiges: Triebspitzen weißfilzig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40-60	5,10	3,60	3,30
5 Tr.	o.B.	60-100	6,95	5,10	4,60
	Co.	40-60	11,10	9,80	8,90



Salix rosmarinifolia



Salix rosmarinifolia

**sachalinensis 'Sekka'**, Japanische Drachen-Weide

Höhe: 3-4 m

Wuchs: locker aufrecht, Zweigenden gebändert

Laub: lanzettlich

Blüte: April mit Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrigen, später gelben Kätzchen

Frucht: graue Fruchtkätzchen

Standort: alle Kulturböden, mäßig trocken bis feucht, humos, nährstoffreich, mäßig kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	8,95	6,75	6,10
		100-150	11,45	9,15	8,30
	Co.	60-100	13,40	11,85	10,75

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	67,10		
		200-250	93,50		
		250-300	133,50		



Salix sachalinensis 'Sekka'

**smithiana**, Kübler-Weide

Höhe: 5-6 m

Wuchs: straff aufrecht, eiförmig

Laub: schmal lanzettlich


Blüte: März bis April vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in silbrigen, später gelben Kätzchen

Frucht: Kapseln

Standort: mäßig trocken bis feucht, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	4,65	3,27	2,97
		100-150	5,60	4,02	3,65
	Co.	100-150	11,45	10,10	9,15



Salix smithiana





Salix viminalis

→ smithiana

**triandra**, Mandel-WeideSynonym: *S. amygdalina*

Höhe: 1-4 m

Wuchs: breitwüchsig

Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelb

Blüte: April bis Mai; männliche Kätzchen gelb

Frucht: ohne Bedeutung

Standort: anspruchslos, feucht bis nass, nährstoffreich, sandig, lehmig, tonig, kiesig, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtattig

Sonstiges: Borke älterer Zweige lösen sich schildförmig ab



Sambucus canadensis 'Maxima'

**viminalis**, Hanf-Weide, Flecht-Weide, Korb-Weide

Höhe: 5-8 m

Wuchs: breit aufrecht

Laub: schmal lanzettlich, zum Rand eingerollt; bis 15 cm lang

Blüte: April bis Mai vor Austrieb; zweihäusig; männliche Blüten in tiefgelben Kätzchen

Frucht: grauwoelige Fruchtkapseln

Standort: frisch bis feucht, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	100-150	5,60	4,02	3,65
		150-200	7,50	5,50	5,00
	Co.	60-100	11,45	10,10	9,15



Sambucus nigra

**SAMBUCUS** - Caprifoliaceae - **HOLUNDER****canadensis 'Maxima'**, Großfruchtiger Kanadischer

Holunder

Höhe: 4-5 m

Wuchs: breitbuschig, aufrecht

Laub: gefiedert; groß; dekorativ

Blüte: Juli bis August; rahmweiß; Schirmrispe

Frucht: September bis November; schwarz; beerenartige Steinfrucht

Standort: anspruchslos, mäßig trocken bis feucht, pH-tolerant, nährstoffreich, sandig lehmig, humos, locker; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: scharfer frühjährlicher Schnitt fördert Jungtriebbildung

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	11,10	9,00	8,15
		100-150	14,50	11,85	10,75



Sambucus nigra

**nigra**, Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: ausgebreitet rundlich, später schirmförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb, später Laubfall; streng riechend  
 Blüte: Juni; cremeweiße Schirmrispen  
 Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	5,00
		100-150	10,20	8,00	7,20
	Co.	60-100	13,80	12,20	11,05

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	84,50	74,60
		200-250	120,00	
		250-300	170,00	

**nigra 'VKG 1 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigene Schwarzer Holunder, Holler, Flieder-Beere aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

- Höhe: 5-7 m  
 Wuchs: ausgebreitet rundlich, später schirmförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb, später Laubfall; streng riechend  
 Blüte: Juni; cremeweiße Schirmrispen  
 Frucht: ab August; glänzend schwarze Holunderbeeren; roh nicht essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	9,65	7,45	6,75
		100-150	13,00	10,55	9,55

**racemosa**, Trauben-Holunder, Hirsch-Holunder, Roter Holunder


- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: locker, ungleichmäßig, annähernd halbrund  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: April bis Mai; gelbgrüne, aufrechte Rispen  
 Frucht: ab Juli bis Winter; kräftig rote Steinfrüchte; verwertbar  
 Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, Kalk meidend; lichtschtig

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.	60-100	7,95	5,90	5,35
		100-150	10,80	8,55	7,75
	Co.	60-100	15,80	13,90	12,60



Sambucus nigra



Sambucus nigra



Sambucus racemosa



Sambucus racemosa



Sambucus racemosa

→ **racemosa**

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	84,50	74,60
		200-250	120,00	
		250-300	170,00	

**racemosa 'Vkg 3 bis 6 - ZgG®'**, Gebietseigener Trauben-Holunder, Hirsch-Holunder, Roter Holunder aus Vorkommensgebiet 3 bis 6



Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: locker, ungleichmäßig, annähernd halbrund  
 Laub: unpaarig gefiedert  
 Blüte: April bis Mai; gelbgrüne, aufrechte Rispen  
 Frucht: ab Juli bis Winter; kräftig rote Steinfrüchte; verwertbar  
 Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, Kalk meidend; lichtschtattig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	10,30	8,10	7,35
		100-150	14,05	11,50	10,45



Sambucus racemosa

**SAMBUCUS Fruchtarten - siehe Obstteil**

**Sasa** - siehe unter Bambus - Sasa


**SINARUNDINARIA** - siehe unter Bambus - Fargesia

**SKIMMIA - Ruraceae - SKIMMIE**

**japonica**, Frucht-Skimmie

Synonym: *S. fragans*, *S. oblata*

Höhe: 60-100 cm  
 Wuchs: breitbuschig und kompakt  
 Laub: immergrün; elliptisch bis verkehrt eiförmig  
 Blüte: Mai; zweihäusig; weiße aufrechte Rispen; duftend  
 Frucht: ab September bis Winter; rot; kugelig  
 Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, lehmig, bedingt kalkverträglich; licht- bis halbschattig



Skimmia japonica



Skimmia japonica

**japonica 'Rubella', Blüten-Skimmie**Synonym: *S. foremanii*,

Höhe: 60-100 cm

Wuchs: kompakt, breitbuschig, halbkugelig

Laub: immergrün; lanzettlich

Blüte: April bis Mai; weißrosa, aufrechte Rispen; meist männlich

Frucht: selten; nur bei zwittrigen Blüten

Standort: frisch bis feucht, nahrhaft, humos, lehmig, bedingt kalkverträglich;  
licht- bis halbschattig**Büsche**

m.B./Co.	20- 25	19,00	16,80
	25- 30	23,00	20,30
	30- 40	29,20	25,80

**SOPHORA - Leguminosae - SCHNURBAUM****japonica, Japanischer Schnurbaum**

Höhe: 15-20 (-25) m

Wuchs: unregelmäßig breit gewölbt, rund


Laub: unpaarig gefiedert; später Austrieb, lange haftend; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juli bis August; cremeweiße, lockere Trauben

Frucht: ab Oktober; Hülsen

Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: Blütenbaum nach 10 bis 15 Jahren; grünliche Borke



Sophora japonica

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		305,00
		14- 16		415,00
		16- 18		575,00
		18- 20		750,00
		20- 25		970,00
4xv.	m.Db.	20- 25		1.050,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.760,00
		35- 40			3.320,00
		40- 45			4.070,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	5.050,00
		45- 50			6.250,00
		50- 60			7.690,00



Sophora japonica



Sophora japonica 'Pendula'

## japonica 'Pendula', Hänge-Schnurbaum

- Höhe: 5-8 m  
 Wuchs: Trauerform mit steif überhängenden Zweigen  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: ohne Bedeutung  
 Frucht: ohne Bedeutung  
 Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

Sophora japonica  
'Princeton Upright'

## japonica 'Princeton Upright', Japanischer Schnurbaum


- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: schmal oval bis eiförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli bis August; cremeweiße Trauben  
 Frucht: ab Oktober; braune Hülsen  
 Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
		18- 20	750,00
		20- 25	970,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.050,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.470,00
		35- 40			3.060,00
		40- 45			3.780,00



Sophora japonica 'Regent'

## japonica 'Regent', Japanischer Schnurbaum

- Höhe: 15-20 (-25) m  
 Wuchs: regelmäßig, geschlossen, breit eiförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; größer als von S. japonica  
 Blüte: Juli bis August; große, cremeweiße Trauben  
 Frucht: ab Oktober; Hülsen  
 Standort: frisch bis trocken, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig  
 Sonstiges: Blütenbaum nach 6 bis 8 Jahren



Sophora japonica 'Regent'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			305,00
		14- 16			415,00
		16- 18			575,00
		18- 20			750,00
		20- 25			970,00
4xv.	m.Db.	20- 25			1.050,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
		30- 35			2.040,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.760,00
		35- 40			3.320,00
		40- 45			4.070,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	5.050,00
		45- 50			6.250,00
		50- 60			7.690,00



Sorbaria japonica 'Regent'




Sorbaria sorbifolia

**SORBARIA - Rosaceae - FIEDERSPIERE****sorbifolia, Ebereschen-Fiederspiere**

- Höhe: 1-3 m  
 Wuchs: steif aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend  
 Laub: unpaarig gefiedert; früher Austrieb  
 Blüte: Juni bis Juli; cremeweiße Rispen  
 Frucht: Balgfrüchte  
 Standort: weite Standortamplitude; frisch bis feucht, nährstoff- und humusreich; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: schattenverträglich

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	5,00
4 Tr.	o.B.	100-150	10,20	8,00	7,20
	Co.	60-100	12,70	11,20	10,15




Sorbaria sorbifolia

**SORBUS - Rosaceae - EBERESCHE, MEHLBEERE, VOGELBEERE****aria, Mehlbeere**

- Höhe: 6-15 m  
 Wuchs: breit kegelförmig bis breit rund  
 Laub: breit eiförmig; Austrieb weißfilzig, vergrauend, nur Blattunterseite weißfilzig; lange haftend  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: ab September; orangerot; kugelig; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung oft über 100 Jahre





Sorbus aria 'Lutescens'

→ aria

**aria 'Lutescens', Gelbfilzige Mehlsbeere**

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breiter  
 Laub: elliptisch bis eiförmig; Austrieb weißfilzig bis cremeweiß, später vergrünend, unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: ab September bis Oktober; rot; kugelig; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig



Sorbus aria 'Lutescens'

**aria 'Magnifica', Großlaubige Mehlsbeere**

- Höhe: 8-10 (-15) m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, später breit eiförmig  
 Laub: oval bis elliptisch; ledrig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: September bis Oktober; rot; kugelig; essbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig



Sorbus aria 'Magnifica'

**aria 'Majestica', Schirm-Mehlsbeere**


- Höhe: 8-10 (-12) m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, später schirmartig  
 Laub: breit oval; ledrig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: September bis Oktober; orangerot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche,**

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00	265,00
		14- 16	415,00	365,00
		16- 18	575,00	510,00
		18- 20	750,00	655,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00	695,00
		20- 25	1.050,00	925,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.320,00
		25- 30			1.640,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	2.040,00
		30- 35			2.540,00
		35- 40			3.150,00
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	500-700	4.300,00
		45- 50			5.300,00
		50- 60			6.600,00



Sorbus aria 'Magnifica'

**arnoldiana 'Golden Wonder',  
Eberesche 'Golden Wonder'**

- Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orangerot  
 Blüte: Mai bis Juni; flache, weiße Rispen  
 Frucht: ab August; orange; eiförmig  
 Standort: frisch bis feucht, sauer, nährstoff- und humusreich; sonnig bis lichtschattig



Sorbus aria 'Majestica'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	18- 20		715,00	630,00
		20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00

Sorbus arnoldiana  
'Golden Wonder'**aucuparia, Gewöhnliche Eberesche,  
Vogelbeerbaum**


- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: baum- oder strauchartig, eiförmig, später locker, rundlich  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orange  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen  
 Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; verwertbar  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

Baum  
des Jahres  
1997Sorbus arnoldiana  
'Golden Wonder'**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	19,30	17,20	15,60
	200-250	24,20	21,40	19,40
	250-300	29,90	26,40	

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	200-250	210,00	185,00
		250-300	291,00	257,00
		300-350	420,00	
4xv.	m.Db.	350-400	795,00	
		400-500	1.110,00	
		500-600	1.940,00	

Sorbus arnoldiana  
'Golden Wonder'





Sorbus aucuparia



Sorbus aucuparia



Sorbus aucuparia



Sorbus aucuparia

## → aucuparia

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	403,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00

4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00
------	-------	--------	--------	--------

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.110,00	980,00
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	

5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00

### aucuparia 'Vkg 1 und 4/5/6 - ZgG®', Gebietseigene Gewöhnliche Eberesche, aus Vorkommensgebiet 1 und 4/5/6



Höhe: 10-15 m

Wuchs: baum- oder strauchartig, eiförmig, später locker, rundlich

Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung gelb bis orange

Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen

Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; verwertbar

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	272,00
		14- 16	370,00
		16- 18	505,00
		18- 20	660,00
		20- 25	875,00

### aucuparia 'Edulis', Essbare Eberesche, Mährische Eberesche

Synonym: *S. aucuparia moravica*

Höhe: 10-15 m

Wuchs: geschlossen, schmal eiförmig, später breiter und lockerer

Laub: unpaarig gefiedert; größer als die Art; Herbstfärbung gelb bis orangerot

Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen

Frucht: August bis Oktober; rot; kugelig; groß; gesund; essbar

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	31,60	27,90	25,30
	200-250	39,00	34,50	31,30
	250-300	48,10	42,50	38,60

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.110,00	980,00
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	2.160,00	
		35- 40			2.680,00	
		40- 45			3.320,00	

**aucuparia 'Fastigiata', Säulen-Eberesche**

Höhe: 6-9 m

Wuchs: schmal säulenförmig, später unregelmäßig eiförmig

Laub: unpaarig gefiedert; tiefgrün; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen

Frucht: August bis November; tiefrot; kugelig

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig


Sonstiges: blüht und fruchtet schon als junger Baum

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12		285,00
		12- 14		340,00
		14- 16		475,00
		16- 18		680,00
4xv.	m.Db.	18- 20		970,00
		20- 25		1.270,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	1.500,00
		25- 30			1.890,00
		30- 35			2.340,00
5xv.	m.Db.	30- 35	100-150	400-500	2.680,00
		35- 40			3.320,00



Sorbus aucuparia 'Edulis'



Sorbus aucuparia 'Edulis'



Sorbus aucuparia 'Fastigiata'



Sorbus aucuparia 'Fastigiata'



Sorbus aucuparia 'Pendula'

## aucuparia 'Pendula', Hänge-Eberesche

- Höhe: 5-6 m  
 Wuchs: unregelmäßig herabhängende Zweige  
 Laub: unpaarig gefiedert; tiefgrün; Herbstfärbung gelb bis rot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen  
 Frucht: August bis November; orangerot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	305,00
		14- 16	415,00
		16- 18	575,00
4xv.	m.Db.	18- 20	795,00
		20- 25	1.050,00
		25- 30	1.390,00

## aucuparia 'Sheerwater Seedling', Eberesche 'Sheerwater Seedling'

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: geschlossen, regelmäßig, kegelförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; blaugrün; Herbstfärbung gelb bis rot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen  
 Frucht: ab August; orangerot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nährhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig  
 Sonstiges: Früchte werden von Vögeln sehr früh gefressen


Sorbus aucuparia  
'Sheerwater Seedling'

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	403,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.730,00
		30- 35			2.160,00
		35- 40			2.680,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.340,00
		35- 40			2.910,00
		40- 45			3.580,00

Sorbus aucuparia  
'Sheerwater Seedling'

**commixta 'Dodong'**

- Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: schlank wachsender, kleiner Baum  
 Laub: dunkelgrünes Laub, Austrieb bräunlich, im Herbst von gelb über orange bis rot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, Rispen  
 Frucht: ab August, lange haftend; scharlachrot; kugelig, erbsengroß  
 Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00
		14- 16		370,00
		16- 18		510,00
		18- 20		680,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00

**commixta 'Embley', Kokarden-Eberesche**Synonym: *S. discolor*

- Höhe: 7-10 m  
 Wuchs: unregelmäßig, breit eiförmig, locker  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung tiefrot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen  
 Frucht: ab August; erst gelb, später rot; kugelig  
 Standort: sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig

**Hochstämme, Alleebäume**


3xv.	m.Db.	12- 14		270,00
		14- 16		370,00
		16- 18		510,00
		18- 20		680,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	970,00
		20- 25			1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	500-700	3.880,00
		45- 50			4.770,00
		50- 60			5.900,00




Sorbus commixta 'Dodong'



Sorbus commixta 'Embley'



Sorbus decora



Sorbus domestica

**decora**, Schmuck-Eberesche

- Höhe: 4-6 (-8) m  
 Wuchs: kompakt, eiförmig, später breit rundlich  
 Laub: unpaarig gefiedert; blaugrün; Herbstfärbung orange  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Rispen; groß  
 Frucht: ab August; kräftig rot; kugelig; verwertbar  
 Standort: feucht bis frisch, sandig lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	970,00
		20- 25			1.210,00
		25- 30			1.500,00

**domestica**, Speierling

Baum  
des Jahres  
1993

- Höhe: 10-20 m  
 Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend, rundlich  
 Laub: unpaarig gefiedert; stumpf grau; Herbstfärbung gelb bis orange  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, längliche Rispen  
 Frucht: ab September; je nach Typ birnen- oder apfelförmig; grüngelb; essbar  
 Standort: trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: sehr wärmebedürftig, Lebenserwartung 150 bis 200 Jahre

**verpflanzte Heister**

m.B./Co.	150-200	57,60
	200-250	70,60

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**hybrida 'Gibbsii'**, Finnland-Mehlbeere

- Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: geschlossen, breit eiförmig bis rundlich  
 Laub: gelappt; an der Basis 1 bis 2 freie Fiederblätter, ähnlich S. intermedia  
 Blüte: Mai; weiße, flache Rispen  
 Frucht: August bis Oktober; tiefrot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: gilt als resistent gegen Feuerbrand



Sorbus domestica



Sorbus domestica




Sorbus hybrida 'Gibbsii'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14			270,00	240,00
		14- 16			370,00	330,00
		16- 18			510,00	450,00
		18- 20			680,00	600,00
		20- 25			895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00	
		25- 30			1.500,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00	
		30- 35			2.290,00	
		35- 40			2.830,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00	
		35- 40			3.150,00	
		40- 45			3.880,00	



Sorbus hybrida 'Gibbsii'

**intermedia, Schwedische Mehlbeere, Oxelbeere**Synonym: *S. scandica*

Höhe: 10-12 m

Wuchs: geschlossen kegelförmig, später eiförmig

Laub: gelappt; ledrig; Herbstfärbung oft gelb bis orange

Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Schirmrispen

Frucht: ab September; kugelig; orangerot; lange haftend

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschtattig.

Sonstiges: Lebenserwartung 50 bis 100 Jahre

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	31,60	27,90	25,30
	200-250	39,00	34,50	31,30
	250-300	48,10	42,50	

**Solitär, mehrstämmig**


3xv.	m.Db.	200-250	335,00	293,00
		250-300	470,00	415,00
		300-350	675,00	
4xv.	m.Db.	350-400	1.210,00	
		400-500	1.690,00	
		500-600	2.340,00	
5xv.	m.Db.	600-700	3.580,00	

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14			270,00	240,00
		14- 16			370,00	330,00
		16- 18			510,00	450,00
		18- 20			680,00	600,00
4xv.	m.Db.	20- 25			945,00	835,00



Sorbus hybrida 'Gibbsii'



Sorbus intermedia



Sorbus intermedia



Sorbus intermedia

## → intermedia

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00



Sorbus intermedia

**intermedia 'Brouwers', Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'**

Höhe: 10-12 m

Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breiter, lockerer

Laub: gelappt; ledrig; Herbstfärbung gelblich

Blüte: Mai bis Juni; weiße, breite Schirmrispen

Frucht: ab September; kugelig; orangerot; lange haftend

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: resistent gegen Feuerbrand




Sorbus intermedia 'Brouwers'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	700-900	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00



Sorbus intermedia 'Brouwers'

**koehneana**, Weißfrüchtige Eberesche,  
Strauch-Eberesche

- Höhe: 2-4 m  
 Wuchs: breit rundlich  
 Laub: unpaarig gefiedert; Herbstfärbung bronzefarben  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; Dolden  
 Frucht: September bis Winter; weiß; rotstielig  
 Standort: frisch bis feucht, aber auch kalkverträglich, nährstoffreich, humos, locker; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Triebe rötlich



Sorbus koehneana

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	86,50
		150-200	129,50
		200-250	194,00

**latifolia**, Breitblättrige Mehlebeere

- Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: breit pyramidal  
 Laub: unpaarig gefiedert; dunkelgrün  
 Blüte: Mai; weiße Trugdolden  
 Frucht: August bis November; orangerot; kugelig  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig lehmig, nahrhaft, humos, Kalk vertragend; sonnig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
4xv.	m.Db.	18- 20	715,00
		20- 25	945,00

**serotina**, Mahagoni-Eberesche, Späte Vogelbeere


- Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: regelmäßig, schmal kegelförmig, später schirmförmig  
 Laub: unpaarig gefiedert; lange Herbstfärbung, orange bis tiefrot; auffallend  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, flache Doldenrispen  
 Frucht: ab September; kräftig rot; kugelig  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig



Sorbus serotina


**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00



Sorbus serotina






Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'



Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'



Sorbus torminalis



Sorbus torminalis

→ **serotina**

**Solitär-Bäume,**

4xv.	m.Db.	18- 20	100-150	400-500	970,00
		20- 25			1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00

**thuringiaca 'Fastigiata',** Thüringische Säulen-Eberesche,  
Thüringische Säulen-Mehlbeere

Höhe: 6-8 (-10) m

Wuchs: geschlossen kegelförmig, später eiförmig

Laub: vielgestaltig; eilänglich bis lanzettlich; gelappt; Herbstfärbung gelb bis orangerot

Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen

Frucht: August bis Oktober; orangerot; kugelig

Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00	240,00
		14- 16		370,00	330,00
		16- 18		510,00	450,00
		18- 20		680,00	600,00
4xv.	m.Db.	20- 25		945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	500-700	1.840,00
		30- 35			2.290,00
		35- 40			2.830,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00

**torminalis,** Elsbeere

Höhe: 10-20 (-25) m

Wuchs: geschlossen, eirundlich

Laub: eiförmig; ahornartig gelappt; Herbstfärbung gelborange bis rotbraun

Blüte: Mai bis Juni; weiße Schirmrispen; strenger Geruch

Frucht: ab Oktober; braun; eiförmig; mehlig schmeckend

Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Lebenserwartung 200 bis 300 Jahre; dicke Borke



Baum  
des Jahres  
2011

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	48,10
	200-250	59,00

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

SPIRAEA

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14			400,00
		14- 16			545,00
		16- 18			750,00
4xv.	m.Db.	18- 20			1.050,00
		20- 25			1.390,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.690,00
		25- 30			2.100,00
		30- 35			2.600,00



Sorbus torminalis

**SPIRAEA - Rosaceae - SPIERSTRAUCH****arguta, Braut-Spiere, Schnee-Spiere**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschig, schirmförmig  
 Laub: schmal lanzettlich; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: April bis Mai; weiße Doldentrauben; streng duftend; auffallend  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtsattig



Spiraea arguta

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	8,20	6,15	5,50
		60-100	10,80	8,55	7,75
	Co.	40- 60	12,70	11,20	10,15

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	51,90	45,90
		100-125	67,10	59,30
	m.Db.	125-150	86,50	
		150-175	129,00	

**betulifolia, Birkenblättrige Spiere**

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: breitbuschiger, dichttriebiger Kleinstrauch  
 Laub: rundlich; dunkelgrün; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: Juni; weiß; dichte Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: trockene bis frische, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: frosthart; in Skandinavien beliebt




Spiraea arguta



Spiraea betulifolia

**Sträucher**

m.Tb.	20- 30	12,05	10,65	9,65
	30- 40	14,90	13,15	11,95



Spiraea billardii 'Triumphans'

**billardii 'Triumphans', Kolben-Spiree**

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: straff aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend

Laub: elliptisch bis lanzettlich


Blüte: Juni bis Juli; kräftigrosa Rispen

Frucht: Balgkapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk meidend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,75	5,00	4,55
5 Tr.	o.B.	100-150	9,45	7,20	6,50
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

Spiraea bumalda  
'Anthony Waterer'**bumalda 'Anthony Waterer', Rote Sommer-Spiree**Synonym: *S. japonica* 'Anthony Waterer'

Höhe: 60-80 cm

Wuchs: dichtbuschig, halbkugelig

Laub: lanzettlich; Austrieb rötlich, einige Partien gelblich bis hellrosa; Herbstfärbung gelborange

Blüte: Juli bis September; rubinrot; flache Schirmrispen

Frucht: Balgkapseln

Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig



Spiraea bumalda 'Dart's Red'

**bumalda 'Dart's Red', Tiefrote Sommer-Spiree**Synonym: *S. japonica* 'Dart's Red'

Höhe: 60-80 cm

Wuchs: dichtbuschig, rundlich

Laub: lanzettlich; Austrieb rötlich; Herbstfärbung gelborange

Blüte: Juni bis September; tiefrot

Frucht: Balgkapseln

Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**Sträucher**

m.Tb.	15- 20	5,00	4,42	4,00
	20- 30	5,75	5,05	4,80
	30- 40	6,60	5,80	5,25

**bumalda 'Froebelii', Rote Strauch-Spiere**Synonym: *S. japonica* 'Froebelii'

- Höhe: 0,6-1 m  
 Wuchs: dichtbuschig, halbkugelig  
 Laub: breit lanzettlich  
 Blüte: Juli bis September; malvenfarben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	30- 40	5,75	4,15	3,80
		40- 60	6,75	5,00	4,55
5 Tr.	o.B.	60-100	9,45	7,30	6,60
		Co.	40- 60	12,35	10,90

**cinerea 'Grefsheim', Aschgraue Spiere**

- Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschig, schirmförmig  
 Laub: lanzettlich; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: April bis Mai; schneeweiße Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	8,20	6,15	5,50
		60-100	10,80	8,55	7,75
	Co.	40- 60	12,70	11,20	10,15

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	51,90	45,90
		100-125	67,10	59,30
		125-150	86,50	76,50
		150-175	129,00	

**decumbens, Weiße Polster-Spiere**

- Höhe: 20-30 cm  
 Wuchs: dichtes, niedriges Strauchpolster, Ausläufer treibend  
 Laub: schmal elliptisch; hellgrün  
 Blüte: Juni; weiße Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: frisch bis feucht, locker, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**Sträucher**

m.Tb.	15- 20	6,25	5,50	5,00
	20- 30	7,30	6,45	5,85



Spiraea bumalda 'Froebelii'



Spiraea cinerea 'Grefsheim'



Spiraea decumbens



Spiraea japonica 'Albiflora'

## japonica 'Albiflora', Weiße Zwerg-Spiere

Synonym: *S. albiflora*


Höhe: 30-60 cm  
 Wuchs: kompakt, halbrund  
 Laub: lanzettlich; hellgrün; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Juli bis August; weiße Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: alle Kulturböden, frisch bis feucht, nährstoffreich, kalkverträglich;  
 sonnig bis lichtsattig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	20-30	6,75	5,00	4,55
5 Tr.	o.B.	30-40	8,20	6,15	5,50

### Sträucher

m.Tb.	15-20	5,40	4,80	4,35
	20-30	6,25	5,50	4,95
	30-40	7,15	6,30	5,70



Spiraea japonica 'Albiflora'

## japonica 'Little Princess', Rosa Zwerg-Spiere

Höhe: 30-40 cm  
 Wuchs: dichtbuschig, kompakt, halbrund  
 Laub: elliptisch bis spitz eiförmig  
 Blüte: Juni bis Juli; reinrosa  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis  
 lichtsattig

## japonica 'Nana', Rosa Kissen-Spiere

Synonym: *S. japonica 'Alpina'*


Höhe: bis 40 cm  
 Wuchs: kissenförmig  
 Laub: elliptisch bis spitz eiförmig  
 Blüte: Juni bis Juli; reinrosa; Nachblüte  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis  
 lichtsattig  
 Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1994 bis 1999 mit ausgezeichnet bewertet

### Sträucher

m.Tb.	15-20	6,75	5,95	5,40
	20-30	7,95	7,00	6,35
	30-40	9,20	8,10	7,35



Spiraea japonica 'Little Princess'



Spiraea japonica 'Little Princess'

**japonica 'Shirobana'**, Japanische Strauch-Spiere  
'Shirobana'Synonym: *S. japonica* 'Genpei'

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: aufrechter Zwergstrauch; dichtbuschig  
 Laub: hellgrün; lanzettlich  
 Blüte: Juli bis August; weiß mit rosa(-rot) in flachen Dolden  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig



Spiraea japonica 'Nana'

**Sträucher**

m.Tb.	20-30	10,80	9,55	8,65
	30-40	13,80	12,20	11,05

**nipponica**, Japanische Strauch-Spiere

- Höhe: 1,5-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, schirmförmig  
 Laub: elliptisch bis verkehrt eiförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig



Spiraea japonica 'Shirobana'

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	8,95	6,75	6,10
	Co.	40-60	13,00	11,50	10,45

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,70
		125-150	65,40	57,80
	m.Db.	150-175	84,50	
		175-200	120,00	



Spiraea nipponica

**nipponica 'Halward's Silver'**, Japanische Strauch-Spiere  
'Halward's Silver'

- Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: breitbuschig, dicht  
 Laub: dunkelgrün; verkehrt oval  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentraube; reich blühend  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig  
 Sonstiges: in der Gehölzsichtung 1994 bis 1999 mit sehr gut bewertet

Spiraea nipponica  
'Halward's Silver'**Sträucher**

Co.	20-30	14,55	12,85	11,65
	30-40	17,90	15,80	14,35



Spiraea nipponica 'Snowmound'

## nipponica 'Snowmound', Japanische Strauch-Spiere 'Snowmound'

Höhe: bis 1 m  
 Wuchs: kompakt, dichtbuschig; breit aufrecht  
 Laub: dunkelgrün; verkehrt oval  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbkugelige Doldentrauben; reich blühend  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschatig  
 Sonstiges: verträgt starken Rückschnitt (steigert Blütenansatz)

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	30- 40	7,50	5,5	5,00
		40- 60	9,20	7,10	6,45
	Co.	40- 60	13,40	11,85	10,75



Spiraea nipponica 'Snowmound'

## prunifolia, Pflaumenblättriger Spierstrauch



Synonym: S. prunifolia 'Plena'

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: trichter- bis schirmförmig  
 Laub: elliptisch; Herbstfärbung orangerot  
 Blüte: April bis Mai; weiß; dicht gefüllt  
 Frucht: Balgkapsel, abgespreizt  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, durchlässigen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschatig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	40- 60	12,35	9,90	9,00
5 Tr.	o.B.	60-100	16,60	13,95	12,65
	Co.	40- 60	17,90	15,80	14,35



Spiraea prunifolia

## thunbergii, Frühlings-Spiere



Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: locker aufrecht, überhängend  
 Laub: lineal, lanzettlich; Herbstfärbung orange bis gelb  
 Blüte: April bis Mai vor Austrieb; weiße Dolden  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschatig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	30- 40	12,35	9,90	9,00
		40- 60	16,60	13,95	12,65
	Co.	40- 60	17,90	15,80	14,35




Spiraea thunbergii

### Solitär

3xv.	m.B.	60- 80	33,30	29,40	
		80-100	45,60	40,30	

**vanhouttei**, Pracht-Spiere

- Höhe: 2-2,5 m  
 Wuchs: aufrecht, breitbuschig, später annähernd schirmartig  
 Laub: oval; drei- bis fünfflappig; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai bis Juni; weiße, halbrunde Doldentrauben  
 Frucht: Balgkapseln  
 Standort: weite Standortamplitude; alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig



Spiraea vanhouttei

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	8,95	6,75	6,10
5 Tr.	o.B.	100-150	11,70	9,35	8,50
	Co.	60-100	14,55	12,85	11,65

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	65,40
		150-200	84,50
		200-250	110,50

**STAPHYLEA - Staphyleaceae - PIMPERNUSS****colchica**, Kolchische Pimpernuss

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit ausladend, annähernd rund  
 Laub: drei- bis fünfzählig; hellgrün  
 Blüte: Mai; cremeweiße Rispen; zart duftend  
 Frucht: bis Winter; blasig aufgetriebene, braune Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbsattig

**Sträucher**

m.B./Co.	80-100	42,20
	100-125	68,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	123,00
		150-175	170,00
		175-200	247,00



Spiraea vanhouttei



Staphylea colchica

**STEPHANANDRA - Rosaceae - KRANZSPIERE****incisa**, Halbhohe Kranzspiere

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, schirmförmig  
 Laub: oval; dreilappig; frühe Herbstfärbung orangebraun  
 Blüte: Juli; gräulich weiße Rispen; leicht duftend  
 Frucht: Balgfrucht  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtsattig



Staphylea colchica



→ *incisa***verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40- 60	9,90	7,75	7,05
		60-100	12,70	10,20	9,20
	Co.	40- 60	13,40	11,85	10,75

***incisa* 'Crispa', Niedrige Kranzspiere**

Höhe: 50-80 cm

Wuchs: kompakt, nestförmig, später weit ausladend

Laub: dreilappig; hellgrün; Herbstfärbung gelb bis bräunlich

Blüte: Juni bis Juli; weiße, lockere Rispen

Frucht: Balgkapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos; sonnig bis lichtschtig

**Sträucher**

m.Tr.	20- 30	4,15	3,68	3,33
	30- 40	4,95	4,37	3,96

**STEWARTIA - Theaceae - SCHEINKAMELIE*****pseudocamellia*, Japanische Scheinkamelie**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: breit rundlich

Laub: elliptisch lanzettlich; Herbstfärbung rot-gelb-orange; auffallend

Blüte: Juni bis August; weiß; schalenförmig mit gelben Staubgefäßen

Frucht: ab September; verholzte Kapsel

Standort: frisch bis feucht, schwach sauer bis sauer, sandig humos, durchlässig, tiefgründig, Kalk meidend; absonnig bis halbschtig


Sonstiges: junge Pflanzen vor Wintersonne schützen

**Sträucher**


m.B./Co.	80-100	84,50
	100-125	116,50

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	222,00
		150-175	345,00
		175-200	485,00
		200-250	695,00



Stephanandra incisa 'Crispa'



Stephanandra incisa 'Crispa'



Stewartia pseudocamellia



Stewartia pseudocamellia

**STRANVAESIA - Rosaceae - FUNKENBLATT****dauidiana**, Lorbeermispel

Synonym: Photinia dauidiana

Höhe: 2-3 m

Wuchs: unregelmäßig, breit ausladend, vasenförmig

Laub: immergrün; länglich lanzettlich; ledrig; orangerote Herbstfärbung;  
ältere Blätter haften bis ins Frühjahr

Blüte: Juni; weiße Doldentrauben

Frucht: bis nächstes Frühjahr; stumpf rot; kugelig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, Kalk vertragend; sonnig bis  
halbschattig

Sonstiges: Früchte vertragen bis -20 °C Frost

**Sträucher**


m.B./Co.	60- 80	43,30
	80-100	59,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	110,50
		125-150	152,00
		150-175	161,00
4xv.	m.Db.	150-200	175-200
		200-250	430,00



Stranvaesia dauidiana



Stranvaesia dauidiana

**STYRAX - Styracaceae – STORAXBAUM****obassia**, Storaxbaum, Obassie

Höhe: bis 10 m

Wuchs: aufstrebende Zweige; zuerst flockig filzig, später kahl

Laub: dunkelgrün; oval bis fast kreisrund; 7-15 cm lang; unterhalb behaart;  
gestielt

Blüte: Mai bis Juni; verborgene Trauben, ca. 2 cm lang; wohlriechend

Frucht: oval; ca. 2 cm lang

Standort: recht anspruchslos an den Boden

Sonstiges: sehr unempfindlich

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	141,00
		125-150	194,00
		150-175	268,00
		175-200	370,00
4xv.	m.Db.	200-250	600,00
		250-300	845,00




Styrax obassia



Styrax obassia



Symphoricarpos albus laevigatus



Symphoricarpos albus laevigatus

## SYMPHORICARPOS - Caprifoliaceae - SCHNEEBEERE

**albus laevigatus**, Gemeine Schneebeere, Knallerbsenstrauch, Wachsbeere



Synonym: *S. racemosus*, *S. rivularis*

Höhe: 1,5-2 m  
Wuchs: aufrecht, dichtbuschig, Ausläufer treibend  
Laub: eirund; Herbstfärbung gelblich  
Blüte: Juni bis September; rosaweiß  
Frucht: September bis Winter; weiße, kugelige Beeren  
Standort: trocken bis frisch, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	40- 60	5,60	4,02	3,65
		60-100	7,50	5,50	5,00
	Co.	40- 60	12,35	10,90	9,90


### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	38,00	33,60
		125-150	51,90	45,90
		150-175	70,60	62,40

**albus laevigatus 'White Hedge'**, Weiße Heckenbeere

Synonym: *S. doorenbosii* 'White Hedge'

Höhe: bis 1,5 m  
Wuchs: dichtbuschig, breit abgerundet  
Laub: eilänglich  
Blüte: Juni bis September; weiß  
Frucht: September bis Winter; reinweiße, kugelige Beeren; groß  
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig



Symphoricarpos albus laevigatus 'White Hedge'

**chenaultii**, Purpurbeere, Bastardkorallenbeere



Höhe: 1,5-2 m  
Wuchs: dichtbuschig aufrecht, bogig überhängend, Ausläufer treibend  
Laub: rundlich eiförmig; früher Austrieb; Laubfall November  
Blüte: Juni bis August; rosa  
Frucht: September bis November; rötlich rosa bis weißlich; dick kugelig  
Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	40- 60	5,60	4,02	3,65
		60-100	7,50	5,50	5,00
	Co.	40- 60	12,35	10,90	9,90



Symphoricarpos chenaultii

**chenaultii 'Hancock', Niedrige Purpurbeere**


- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: locker ausgebreitet und niederliegend, Ausläufer treibend  
 Laub: rundlich eiförmig; früher Austrieb; Laubfall November  
 Blüte: Juni bis August; rosa; klein  
 Frucht: September bis November; rötlich bis weiß; unbedeutend  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

m.Tb.	30-40	4,15	3,68	3,33
	40-60	4,95	4,37	3,96

Symphoricarpos chenaultii  
'Hancock'**doorenbosii 'Magic Berry', Amethystbeere**

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: kompakt, dichtbuschig, rundlich  
 Laub: eirund; Herbstfärbung rötlich  
 Blüte: Juni bis Juli; rosa Trauben  
 Frucht: August bis Winter; lilarosa Beeren


Symphoricarpos doorenbosii  
'Magic Berry'**orbiculatus, Korallenbeere**

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: straff aufrecht, später locker, breit ausladend  
 Laub: eirund; Herbstfärbung braunrot  
 Blüte: Juni bis Juli; gelblich weiß bis rötlich  
 Frucht: September bis November; rötlich, rosa bis weiß

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	40-60	5,60	4,02	3,65
		60-100	7,50	5,50	5,00
	Co.	40-60	12,35	10,90	9,90

racemosus - siehe S. albus laevigatus



Symphoricarpos orbiculatus

**SYRINGA - Oleaceae - FLIEDER****chinensis, Chinesischer Flieder**

- Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: breitbuschig, locker überhängend  
 Laub: dunkelgrün; eiförmig  
 Blüte: Mai; lilarosa; lange Rispen; duftend  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig →



Syringa chinensis 'Saugeana'

→ chinensis

## chinensis 'Saugeana', Königs-Flieder, Chinesischer Flieder


Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: dichtbuschig, locker überhängend  
 Laub: eiförmig  
 Blüte: Mai; rotlila Rispen; duftend  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	60-100	21,10	18,30
-------	------	--------	-------	-------

### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	138,50
		150-175	229,00	
4xv.	m.Db.	175-200	325,00	
		200-250	495,00	
		250-300	770,00	



Syringa josikaea

## josikaea, Ungarischer Flieder

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: breit aufrecht, trichterförmig  
 Laub: breit elliptisch  
 Blüte: ab Mai bis Juni; helllila; stark duftend  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

### verpflanzte Sträucher


3 Tr.	o.B.	60-100	21,10	18,30
-------	------	--------	-------	-------

### Solitär

3xv.	m.B.	100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	138,50
		150-175	229,00	
4xv.	m.Db.	175-200	325,00	
		200-250	495,00	
		250-300	770,00	



Syringa josikaea



Syringa meyeri 'Palibin'

**meyeri 'Palibin', Chinesischer Zwerg-Duftflieder**Synonym: *S. palibiniana*, *S. microphylla* 'Minor'

Höhe: bis 1,30 m

Wuchs: aufrechter, dicht buschiger Kleinstrauch

Laub: dunkelgrün; gewellt; elliptisch

Blüte: Mai bis Juni; hellrosa; zahlreich; stark und angenehm duftend

Frucht: Kapseln

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig

Sonstiges: frosthart; stadtklimafest

**Sträucher**

Co.	30- 40	24,20	21,40
	40- 60	32,40	28,60

**microphylla 'Superba', Herbst-Flieder, Hänge-Flieder**

Höhe: bis 3 m

Wuchs: breitbuschig aufrecht

Laub: rundlich bis eiförmig

Blüte: Mai, Nachblüte bis Oktober; Knospe lilarosa, später heller; stark duftend

Frucht: Kapseln

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig

**verpflanzte Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	34,20	30,20
----------	--------	-------	-------

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	78,50
		100-125	114,00
		125-150	165,00
		150-175	241,00
4xv.	m.Db.	175-200	355,00
		200-250	530,00

**reflexa, Bogen-Flieder**

Höhe: 3-4 m

Wuchs: trichterförmig, leicht überhängend

Laub: eiförmig zugespitzt; derb; runzelig; Herbstfärbung gelblich

Blüte: Juni; kräftig rosa; überhängende Rispen

Frucht: Kapseln

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschtig

**verpflanzte Sträucher**


3 Tr.	o.B.	60-100	20,50	17,65	16,00
-------	------	--------	-------	-------	-------

**Solitär**


3xv.	m.B.	100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	138,50
		150-175	229,00	



Syringa meyeri 'Palibin'



Syringa microphylla 'Superba'



Syringa reflexa



Syringa reflexa



Syringa swegiflexa

## → reflexa

4xv.	m.Db.	175-200	325,00
		200-250	495,00
		250-300	770,00

**swegiflexa**, Perlen-Flieder

Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: locker aufrecht, trichterförmig  
 Laub: eiförmig; derb; Herbstfärbung gelblich  
 Blüte: Mai; Knospe rot, später tiefrosa; überhängende Rispen  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	21,10	18,30
-------	------	--------	-------	-------

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	138,50
4xv.	m.Db.	150-175	229,00	
		175-200	325,00	
		200-250	495,00	

**vulgaris**, Gemeiner Flieder

Höhe: 4-6 m  
 Wuchs: steif aufrecht, breit ausladend, Ausläufer treibend  
 Laub: breit oval bis herzförmig  
 Blüte: Mai bis Juni; violette, aufrechte Rispen; stark duftend  
 Frucht: Kapseln  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	7,50	5,50	5,00
4 Tr.	o.B.	100-150	10,20	8,00	7,20
	Co.	60-100	16,60	14,65	13,30

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	138,50
4xv.	m.Db.	150-175	229,00	
		175-200	325,00	
		200-250	495,00	



Syringa vulgaris

**vulgaris-Sorten, Edel-Flieder**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: steif aufrecht, breit ausladend

Laub: breit oval bis herzförmig

Blüte: Mai bis Juni; je nach Sorte blau, violett, rosa, weiß oder gelb; gefüllt oder einfach

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschtattig

Sortenname	Größe in cm	Blüten
vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'	400-500	dunkel purpurrot, einfach
vulgaris 'Charles Joly'	300-400	purpurrot innen und rückseits heller, wirkt zweifarbig; reich-gefüllt
vulgaris 'Katharina Havemeyer'	300-400	kobaltlila, rückseits purpur-rosa; halb gefüllt
vulgaris 'Marie Legraye'	300-400	cremeweiße Knospen, später reinweiß
vulgaris 'Michel Buchner'	300-400	lila, weißes Auge; dicht gefüllt
vulgaris 'Mme Antoine Buchner'	400-500	lila weiß, Knospe rosa gefüllt
vulgaris 'Mme Florentine Stepman'	400-500	weiß; einfach
vulgaris 'Mme Lemoine'	300-400	reinweiß; gefüllt
vulgaris 'Mrs. Edward Harding'	300-400	hell purpurrot, später purpur-rosa gefüllt
vulgaris 'Primrose'	300-400	hell primelgelb; einfach
vulgaris 'Ruhm von Horstenstein'	300-400	tiefllilarot, später bläulich; einfach

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	19,00	16,20	14,70
5 Tr.	o.B.	22,30	19,35	17,55
8 Tr.	o.B.	26,90	23,40	21,30

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	82,50	72,80
		100-125	107,50	95,00
		125-150	157,00	
		150-175	229,00	
4xv.	m.Db.	175-200	325,00	
		200-250	495,00	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	530,00
		14- 16	750,00
		16- 18	1.020,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.390,00
		20- 25	1.840,00

Syringa vulgaris  
'Andenken an Ludwig Späth'

Syringa vulgaris 'Marie Legraye'



Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'



Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'



**TAMARIX - Tamaricaceae - TAMARISKE,  
ERIKASTRAUCH****parviflora**, Rosa Frühlings-TamariskeSynonym: *T. tetrandra purpurea*

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breitbuschig, locker, schirmartig

Laub: schuppenartig, eiförmig; blassgrün

Blüte: Mai bis Juni; rosa Rispen

Frucht: Kapseln

Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: blüht am zweijährigen Holz

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	6,75	5,00	4,55
	Co.	60-100	12,35	10,90	9,90

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	80,50		
		125-150	110,50		
		150-200	161,00		

**pentandra**, Heide-Tamariske

Höhe: 3-4 m

Wuchs: dichtbuschig, locker, schirmartig

Laub: schuppenartig, lanzettlich; bläulich grün

Blüte: Juli bis September; rosa; in endständigen Rispen

Frucht: Kapseln

Standort: trocken bis frisch, lehmig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig

**ramosissima**, Sommer-TamariskeSynonym: *T. odessana*

Höhe: 2-3 m

Wuchs: locker aufrecht, ausladend

Laub: schuppenartig, oval; graugrün; Herbstfärbung gelblich

Blüte: Juli bis September; hellrosa; in langen Rispen

Frucht: Kapseln

Standort: trocken bis frisch, sandig, durchlässig, Kalk liebend; sonnig


Sonstiges: extrem trockenheitsverträglich

**verpflanzte Sträucher**

	Co.	40-60	13,00	11,50	10,45
		60-100	14,55	12,85	11,65

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	80,50		
		125-150	110,50		



Tamarix parviflora



Tamarix parviflora




Tamarix ramosissima



Tamarix ramosissima

**Thamnocalamus** - siehe Fargesia-Bambus**TILIA** - Tiliaceae - LINDE**americana 'Nova'**, Schwarz-Linde,  
Amerikanische Linde

- Höhe: 20-25 (-30) m  
 Wuchs: breit kegelförmig, später hochgewölbt  
 Laub: breit eiförmig; später Laubfall  
 Blüte: Juli; gelblich; in hängenden Trugdolden; duftend  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig  
 Sonstiges: Zweige sonnenseits dunkelbraun, große Lentizellen; Winterknospen rot; sehr schnittverträglich; Bienennährgehölz



Tilia americana 'Nova'

**americana 'Redmond'**, Amerikanische Linde

- Höhe: 15- 20 m  
 Wuchs: eher schmal kegelförmig,  
 Laub: breit eiförmig; später Laubfall  
 Blüte: Ende Juli; blassgelb; in hängenden Rispen; duftend; Bienennährgehölz  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis lichtschattig




Tilia americana 'Nova'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Tilia americana 'Nova'



Tilia americana 'Redmond'



Tilia cordata

**cordata**, Winter-Linde, Stein-Linde,  
Kleinblättrige Linde



Baum  
des Jahres  
2016

Synonym: T. parviflora

Höhe: 15-25 m  
Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich  
Laub: rundlich bis herzförmig; unterseits blaugrün; gelbe Herbstfärbung  
Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend  
Frucht: August bis September; Nüsschen  
Standort: frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
Sonstiges: Lebenserwartung bis 200 Jahre, an Stadtstraßen bis 50 Jahre, uralte Riesen bis (angeblich) 1000 Jahre; anspruchsloser als T. platyphyllos

**verpflanzte Heister**


o.B.	150-200	25,50	22,50	20,40
	200-250	31,60	27,90	25,30
	250-300	39,00	34,50	

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**


3xv.	m.Db.	12- 14	270,00	240,00
		14- 16	370,00	330,00
		16- 18	510,00	450,00
		18- 20	680,00	600,00
		20- 25	895,00	790,00
4xv.	m.Db.	20- 25	945,00	835,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.540,00
		35- 40			3.150,00
		40- 45			3.880,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	4.770,00
		45- 50			5.900,00
		50- 60			7.300,00
		60- 70			9.200,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	7.300,00
		50- 60			9.200,00
		60- 70			11.450,00
		70- 80			14.150,00



Tilia cordata



Tilia cordata



Tilia cordata

**cordata 'Vkg 1 bis 6 - ZgG®**, Gebieteigene  
Winter-Linde, Stein-Linde, Kleinblättrige Linde  
aus Vorkommensgebiet 1 bis 6



Synonym: *T. parviflora*

- Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich  
 Laub: rundlich bis herzförmig; unterseits blaugrün; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung bis 200 Jahre, an Stadtstraßen bis 50 Jahre, uralte  
 Riesen bis (angeblich) 1000 Jahre; anspruchsloser als *T. platyphyllos*

#### verpflanzte Heister

o.B.	150-200	38,00	33,60	30,50
	200-250	46,80	41,40	37,60

#### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	310,00
		14- 16	410,00
		16- 18	560,00
		18- 20	740,00
		20- 25	940,00

**cordata 'Cordaley' ©**, Winter-Linde 'Cordaley' ©

- Sortenschutz-Kenn-Nr. LIN 2 -

- Höhe: 10-20 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, später hoch gewölbt bis rundlich, innen dicht,  
 außen etwas aufgelockert  
 Laub: rundlich bis herzförmig; heller grün und größer als 'Greenspire'; gelbe  
 Herbstfärbung  
 Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend  
 Frucht: weniger als die Art  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: eine etwas kompaktere *T. cordata* mit einem sehr kräftigen Aufbau  
 von Stamm und Krone, neigt nicht zu Gabelungen.

#### Hochstämme, Alleebäume


3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00



*Tilia cordata*



*Tilia cordata* 'Cordaley'



*Tilia cordata* 'Cordaley' ©



*Tilia cordata* 'Cordaley' ©



Tilia cordata 'Cordaley'

## → cordata 'Cordaley'

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00



Tilia cordata 'Erecta'

**cordata 'Erecta', Winter-Linde 'Erecta'**

Synonym: T. c. 'Böhlje', T. c. 'Select'

Höhe: 15-20 m

Wuchs: regelmäßig, erst schmal, später breit eiförmig

Laub: schief herzförmig; gelbe Herbstfärbung

Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend

Frucht: August bis September; Nüsschen

Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: Rinde an jungen Trieben bräunlich; sehr windfest

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14			247,00	218,00
		14- 16			335,00	293,00
		16- 18			460,00	405,00
		18- 20			600,00	530,00
		20- 25			795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00



Tilia cordata 'Erecta'



Tilia cordata 'Erecta'

**cordata 'Green Globe', Kugel-Winter-Linde**

- Höhe: bis 8 m  
 Wuchs: dichte, kugelförmige Krone  
 Laub: herzförmig; dunkelgrün; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juli; gelblich weiß; duftend  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00
		20- 25	1.270,00
		25- 30	1.690,00

**cordata 'Greenspire', Stadt-Linde**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: regelmäÙig, geschlossen, eiförmig, später bauchig  
 Laub: rundlich bis schief herzförmig, größer als bei T. cordata; ledrig; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00



Tilia cordata 'Green Globe'




Tilia cordata 'Greenspire'



Tilia cordata 'Greenspire'



Tilia cordata 'Greenspire'




Tilia cordata 'Rancho'



Tilia cordata 'Rancho'



Tilia cordata 'Rancho'



Tilia cordata 'Roelvo'

## cordata 'Rancho', Winter-Linde 'Rancho'



- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: regelmäßig, schmal eiförmig, später breit rundlich  
 Laub: schief herzförmig, fest; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00
		70- 80			10.500,00

## cordata 'Roelvo', Winter-Linde 'Roelvo'

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: Stamm durchgehend; Krone breit kegelförmig bis rundlich, dicht und geschlossen  
 Laub: herzförmig; bis ein Drittel kleiner als T. cordata; im Austrieb auffallend hellgrün  
 Blüte: Anfang Juli; gelblich weiß; hängende Doldentrauben; duftend  
 Frucht: August bis September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

### Hochstämme, Alleebäume

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

TILIA

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00

**euchlora, Krim-Linde**Synonym: *T. europaea* 'Euchlora'

Höhe: 15-20 m

Wuchs: abgerundet kegelig, später hochgewölbt, eiförmig

Laub: rundlich, eiförmig; glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün; gelbe Herbstfärbung

Blüte: Ende Juni bis Anfang Juli; gelb; hängende Trugdolden

Frucht: August bis September; bis Januar haftend; Nüsschen

Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Stammrinde hellgrün; Rinde der Zweige auffallend grün bis gelbgrün gefärbt

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14	150-200	400-500	247,00	218,00
		14- 16			335,00	293,00
		16- 18			460,00	405,00
		18- 20			600,00	530,00
		20- 25			795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00
		70- 80			10.500,00



Tilia cordata 'Roelvo'



Tilia euchlora




Tilia euchlora



Tilia euchlora





Tilia europaea

**europaea, Holländische Linde**

Synonym: T. intermedia, T. vulgaris

Höhe: 30-40 m

Wuchs: regelmäßig eiförmig, später breit ausladend

Laub: schief herzförmig; Herbstfärbung gelb

Blüte: Juni; gelb; hängende Trugdolden; duftend

Frucht: ab September; Nüsschen

Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich;  
sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Zweigrinde gelblich, grünlich oder braunrot



Tilia europaea 'Pallida'

**europaea 'Pallida', Kaiser-Linde**

Synonym: T. pallida

Höhe: 20-30 (-40) m

Wuchs: gleichmäßig kegelförmig, später breit ausladend


Laub: schief herzförmig, glänzend, lange haftend; gelbe Herbstfärbung

Blüte: Juni bis Juli; gelbe Trugdolden; duftend

Frucht: ab September; Nüsschen

Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich;  
sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Triebrinde orangefarben



Tilia europaea 'Pallida'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00
		70- 80			10.500,00



Tilia europaea 'Pallida'

**Form-Bäume, kastenförmig geschnitten**

4xv.	m.Db.	20- 25			2.290,00
		25- 30			3.060,00
5xv.	m.Db.	30- 35			3.880,00
		35- 40			4.770,00
6xv.	m.Db.	40- 45			6.750,00
		45- 50			8.450,00
		50- 60			10.800,00
7xv.	m.Db.	60- 70			13.000,00
		70- 80			16.150,00
		80- 90			19.850,00



Tilia europaea 'Pallida'

**europaea 'Pallida Jubilee', Gold-Linde**

Synonym: T. p. 'Wratislaviensis'

Höhe: 8-12 (-15) m

Wuchs: Krone etwas breiter als von T. europaea 'Pallida', später rundlich  
Laub: im Austrieb gelb, ausgewachsene Blätter vergrünend; Herbstfärbung orange-gelb

Blüte: Juni bis Juli; gelbe Trugdolden; duftend

Frucht: ab September; Nüsschen; bedeutend weniger als bei T. europaea 'Pallida'

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtschtattig



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'

**Hochstämme, Alleebäume**

3xv.	m.Db.	12- 14			247,00
		14- 16			335,00
		16- 18			460,00
		18- 20			600,00
		20- 25			795,00
4xv.	m.Db.	20- 25			845,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'

**flavescens 'Glenleven', Kegel-Linde**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig, später ausladend rundlich

Laub: rundlich bis herzförmig; größer als T. cordata

Blüte: Juli; gelblich weiß; hängende Trugdolden

Frucht: August bis September; Nüsschen


Standort: mäßig trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschtattig



Tilia europaea 'Pallida Jubilee'



Tilia flavescens 'Glenleven'



Tilia flavescens 'Glenleven'

## → flavescens 'Glenleven'

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			247,00	218,00
		14- 16			335,00	293,00
		16- 18			460,00	405,00
		18- 20			600,00	530,00
		20- 25			795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25			845,00	745,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00	
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00	
		35- 40			2.680,00	
		40- 45			3.320,00	
		45- 50			4.410,00	
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00	
		45- 50			5.450,00	
		50- 60			6.750,00	
		60- 70			8.450,00	
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00	
		50- 60			6.750,00	
		60- 70			8.450,00	
		70- 80			10.500,00	

**henryana, Asiatische Linde, Henrys-Linde**

Höhe:	8-12 m
Wuchs:	mittelgroßer Baum, breit oval, lockere Krone
Laub:	rundlich bis herzförmig; auffälliger Rand mit langen "Zähnen"; schöne gelbe Herbstfärbung
Blüte:	auffallende hängende Rispen; cremeweiß; duftend; Anziehungspunkt für alle Insekten
Frucht:	August bis September; Nüsschen; graugrün
Standort:	trocken bis frisch, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig



Tilia flavescens 'Glenleven'



Tilia henryana

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14			475,00	
		14- 16			670,00	
		16- 18			910,00	
4xv.	m.Db.	18- 20			1.280,00	
		20- 25			1.640,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.790,00	
		25- 30			2.220,00	
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.470,00	
		30- 35			3.060,00	
		40- 45			3.970,00	

**mongolica**, Mongolische Linde

- Höhe: 8-12 m  
 Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend  
 Laub: eirundlich, drei- bis fünfflappig, dem Weinlaub ähnlich, unregelmäßig tief gesägt; Austrieb rötlich braun, unterseits bläulich, später glänzend grün; gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juni/Juli; gelbe Trugdolden  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig




Tilia mongolica

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume**


4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00



Tilia mongolica

**platyphyllos**, Sommer-Linde,  
Großblättrige LindeSynonym: *T. grandiflora*

- Höhe: 30-35 (-40) m  
 Wuchs: Krone breit kegelförmig, später breit ausladend  
 Laub: schief rundlich bis herzförmig; weich, behaart; frühe gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juni bis Juli; gelb; hängende Trugdolden; duftend  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung 700 bis 1000 Jahre; Blühreife nach 10 bis 15 Jahren;

Baum  
des Jahres  
1991

Tilia platyphyllos

**platyphyllos 'Örebro'**, Sommer-Linde 'Örebro'

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: kompakt, erst straff aufrecht, später breit kegelförmig  
 Laub: schief rundlich bis herzförmig; frühe, gelbe Herbstfärbung  
 Blüte: Juni bis Juli; hängende Trugdolden; duftend; sehr reich blühend  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Tilia platyphyllos



Tilia platyphyllos 'Rubra'

→ **platyphyllos, platyphyllos 'Örebro'****platyphyllos 'Rubra', Korallenrote Sommer-Linde**

Höhe: 30-35 m  
 Wuchs: erst spitz kegelförmig, später breit eiförmig  
 Laub: schief rundlich bis herzförmig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juni bis Juli; gelb; hängende Trugdolden  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, tiefgründig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Triebe auffallend tiefrot

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	25,50	22,50	20,40
	200-250	31,60	27,90	25,30
	250-300	39,00	34,50	



Tilia platyphyllos 'Rubra'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14		247,00	218,00
		14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25		845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00

**tomentosa, Silber-Linde, Ungarische Linde**Synonym: *T. argentea*


Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: Krone regelmäßig breit kegelig, später rund  
 Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Stammrinde hellgrün



Tilia tomentosa 'Brabant'

**tomentosa 'Brabant', Silber-Linde 'Brabant'**

- Höhe: 20-25 (-30) m  
 Wuchs: geschlossen kegelförmig, später breiter  
 Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden; duftend  
 Frucht: ab September; Nüsschen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: Stammrinde grau



Tilia tomentosa 'Brabant'

**tomentosa 'Szeleste', Silber-Linde 'Szeleste'**

- Höhe: 20-25 m  
 Wuchs: anfangs aufrecht-eiförmig, später breiter  
 Laub: herzförmig; unterseits weißfilzig, gezählter Rand; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Juli; gelbgrün; hängende Trugdolden; stark duftend  
 Frucht: ab September; Nüsschen, filzig behaart  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig



Tilia tomentosa 'Brabant'

**Hochstämme, Alleebäume, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	247,00	218,00
		14- 16	335,00	293,00
		16- 18	460,00	405,00
		18- 20	600,00	530,00
		20- 25	795,00	700,00
4xv.	m.Db.	20- 25	845,00	745,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	500-700	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	500-700	3.580,00
		45- 50			4.410,00
		50- 60			5.450,00
		60- 70			6.750,00
7xv.	m.Db.	45- 50	300-400	700-900	5.450,00
		50- 60			6.750,00
		60- 70			8.450,00
		70- 80			10.500,00

**vulgaris** - siehe T. europaea

Tilia tomentosa 'Brabant'



Tilia tomentosa 'Szeleste'



Toona sinensis

## TOONA - Meliaceae - SURENBAUM

**sinensis**, Chinesischer Surenbaum



Synonym: *Cedrela sinensis*

Höhe: 12-15 m

Wuchs: breit rundlich, locker

Laub: gefiedert, groß; hellgrün; Herbstfärbung gelb

Blüte: Mai bis Juni; grünlich weiß; in hängenden Rispen; Duft streng

Frucht: ab August; holzige Kapsel

Standort: trocken bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig

Sonstiges: junge Triebe werden in China gedünstet und als vitaminreiches Gemüse verzehrt

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	1.020,00
		20- 25	1.240,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.390,00
		25- 30	1.840,00



Toona sinensis

## TRACHYCARPOS - Palmae - HANFPALME

**fortunei**, Chinesische Hanfpalme

Synonym: *Chamaerops excelsa*

Höhe: 2-4 m, am Naturstandort bis 12 m

Wuchs: einstämmig

Laub: fächer- und halbkreisförmig, Blattstiel bis 1 m

Blüte: am Naturstandort April bis Juni; gelbe Rispen

Frucht: am Naturstandort ab Sommer; blauschwarze Beeren

Standort: feucht, lehmig, nährstoffreich; vollsonnig, windgeschützt, Wärme liebend, bedingt frosthart

Sonstiges: Stamm mit braunen Fasern besetzt

### Solitär

Co.	Sth. 1,60 - 1,80 m	250-300	1.590,00
	Sth. 1,80 - 2,00 m	250-300	1.890,00
	Sth. 2,00 - 2,20 m	300-350	2.160,00
	Sth. 2,20 - 2,40 m	300-350	2.830,00



Trachycarpus fortunei



Trachycarpus fortunei

**ULMUS - Ulmaceae - ULME, RÜSTER****carpinifolia, Feld-Ulme, Rot-Rüster**Synonym: *U. minor*

Höhe: 20-35 (-40) m

Wuchs: breit ausladend, kuppelartig

Laub: variabel, meist eilänglich, Blattgrund schief; gelbe Herbstfärbung

Blüte: März bis April, vor Austrieb; rötliche Büschel

Frucht: ab April; Flügelfrucht

Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre; korkreiche Borke, Triebe mit Korkleisten

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	14- 16		335,00	293,00
		16- 18		460,00	405,00
		18- 20		600,00	530,00
		20- 25		795,00	700,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.160,00
		35- 40			2.680,00
		40- 45			3.320,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.410,00
		45- 50			5.450,00
		50- 60			6.750,00

**'Columella'®**, Säulenförmige Ulme

Höhe: 13-15 m (erwartet)

Wuchs: säulenförmig, bis 5 m breit

Laub: dunkelgrün; krausblättrig; um 8 cm

Blüte: März bis April; hellgrün in langstieligen Büscheln


Frucht: flach geflügelte Nüsse; braun

Standort: feucht und luftig, kalkhaltig; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: weitgehend resistent gegen die Ulmenkrankheit

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		270,00
		14- 16		370,00
		16- 18		510,00
		18- 20		680,00
		20- 25		895,00




Ulmus carpinifolia



Ulmus carpinifolia




Ulmus 'Columella'®



Ulmus 'Columella'®





Ulmus glabra

→ 'Columella'®

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.210,00
		25- 30			1.500,00
		30- 35			1.840,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	2.290,00
		35- 40			2.830,00
		40- 45			3.490,00
		45- 50			4.300,00

**glabra, Berg-Ulme, Weiß-Rüster**

Synonym: U. montana

Höhe: 30-40 m

Wuchs: breit rund

Laub: variabel, meist breit oval, Blattgrund schief, rau; Herbstfärbung gelb

Blüte: März bis April, vor Austrieb; bräunliche Büschel

Frucht: ab April; Flügelfrucht

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 400 Jahre

**verpflanzte Heister**

o.B.	150-200	20,50	18,10	16,40
	200-250	25,50	22,50	20,40
	250-300	31,60	27,90	

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14		240,00	213,00
		14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.520,00
		45- 50			5.600,00
		50- 60			6.950,00



Ulmus glabra

**glabra 'Horizontalis',** Lauben-Ulme, Hänge-Ulme

Synonym: U. 'Camperdownii', U. glabra 'Pendula'

- Höhe: bis 5 m  
 Wuchs: flach, kuppelartig, hängend  
 Laub: breit oval; groß, rau; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: März bis April, vor Austrieb, bräunliche Büschel  
 Frucht: ab April; Flügelfrucht  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	340,00
		14- 16	475,00
		16- 18	680,00
		18- 20	900,00
		20- 25	1.050,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.610,00
		25- 30		2.025,00
5xv.	m.Db.	25- 30	150-200	2.160,00
		30- 35		2.680,00
		35- 40		3.320,00

**hollandica 'Clusius',** Ulme 'Clusius'

- Höhe: 15-18 m  
 Wuchs: breit säulenförmig, später breit eiförmig, dicht  
 Laub: spitz oval; klein, derb, lange haftend; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: noch nicht beobachtet  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: ausreichend tolerant gegen die Ulmenkrankheit

**hollandica 'Dodoens',** Ulme 'Dodoens'


- Höhe: bis 15 m  
 Wuchs: junge Kronen säulenförmig, später breit säulenförmig  
 Laub: länglich eiförmig; frischgrün  
 Blüte: unbedeutend  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich; sonnig bis lichtschantig  
 Sonstiges: auf eigener Wurzel widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit




Ulmus glabra 'Horizontalis'



Ulmus glabra 'Horizontalis'




Ulmus hollandica 'Clusius'




Ulmus hollandica 'Dodoens'



Ulmus hollandica 'Lobel'



Ulmus hollandica 'Lobel'



Ulmus hollandica 'Plantijn'



Ulmus hollandica 'Plantijn'

→ **hollandica 'Clusius', hollandica 'Dodoens'**

## hollandica 'Lobel', Ulme 'Lobel'



Höhe: 12-15 m  
Wuchs: geschlossen, schmal säulenförmig, später kegelig  
Laub: spitz oval; klein, derb, lange haftend; Herbstfärbung gelb  
Blüte: nicht beobachtet  
Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich; sonnig bis lichtsattig  
Sonstiges: widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit

## hollandica 'Plantijn', Ulme 'Plantijn'

Höhe: bis 15 m  
Wuchs: schmal eiförmig, später breit kegelförmig  
Laub: breit oval; graugrün, gelbe Herbstfärbung  
Blüte: nicht beobachtet  
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
Sonstiges: widerstandsfähig gegen Ulmenkrankheit

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	240,00	213,00
		14- 16	310,00	270,00
		16- 18	430,00	380,00
		18- 20	585,00	515,00
		20- 25	770,00	680,00

### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00
		25- 30			1.390,00
		30- 35			1.730,00
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00
		35- 40			2.980,00
		40- 45			3.680,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.520,00
		45- 50			5.600,00
		50- 60			6.950,00

## hollandica 'Wredei', Gold-Ulme

Synonym: U. dampieri aurea, U. carpinifolia var. wredei

Höhe: 8-10 m  
Wuchs: locker säulenförmig, später trichterförmig  
Laub: breit oval, gewellt; goldgelb, später gelbgrün  
Blüte: nicht beobachtet  
Frucht: nicht beobachtet  
Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig  
Sonstiges: widerstandsfähig gegenüber der Ulmenkrankheit

**Sträucher**

m.B./Co.	60- 80	26,20	23,10
	80-100	36,00	31,80
	100-125	43,30	38,30

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	70,60
		125-150	98,50
		150-175	141,00
		175-200	198,00

**laevis, Flatter-Ulme**

Synonym: U. effusa

Höhe: bis 30 m

Wuchs: breit säulenförmig bis breit eiförmig

Laub: matt dunkelgrün, unterseits graugrün und fein behaart

Blüte: vor Blattaustrieb; langstielig; flattern im Wind

Frucht: runde Flügel Früchte

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kulturboden; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: bildet im Alter „Stützwurzeln“ (wie bei Tropenbäumen); resistent gegen Ulmenkrankheit; als Straßenbaum nicht geeignet!

**Hochstämme**


3xv.	m.Db.	12- 14		240,00	213,00
		14- 16		310,00	270,00
		16- 18		430,00	380,00
		18- 20		585,00	515,00
		20- 25		770,00	680,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	500-700	1.110,00	980,00
		25- 30			1.390,00	
		30- 35			1.730,00	
5xv.	m.Db.	30- 35	200-300	700-900	2.410,00	
		35- 40			2.980,00	
		40- 45			3.680,00	
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	700-900	4.520,00	
		45- 50			5.600,00	
		50- 60			6.950,00	



Ulmus laevis

Baum  
des Jahres  
2019

Ulmus laevis



Ulmus laevis



Ulmus laevis

## laevis 'VkG 1,2 und 4 - ZgG<sup>®</sup>', Gebietseigene Flatter-Ulme aus Vorkommensgebiet 1, 2 und 4



Synonym: U. effusa

Höhe: bis 30 m

Wuchs: breit säulenförmig bis breit eiförmig

Laub: matt dunkelgrün, unterseits graugrün und fein behaart

Blüte: vor Blattaustrieb; langstielig; flattern im Wind

Frucht: runde Flügelfrüchte

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kulturboden; sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: bildet im Alter „Stützwurzeln“ (wie bei Tropenbäumen); resistent gegen Ulmenkrankheit; als Straßenbaum nicht geeignet!

### Hochstämme

3xv.	m.Db.	12- 14	265,00
		14- 16	345,00
		16- 18	475,00
		18- 20	645,00
		20- 25	850,00

**montana** - siehe U. glabra

## VACCINIUM - Ericaceae - HEIDELBEERE, PREISELBEERE



Vaccinium vitis-idaea 'Koralle'

### vitis-idaea 'Koralle', Großfruchtige Preiselbeere

Höhe: 20-30 cm

Wuchs: niedrig, kriechend, Ausläufer treibend

Laub: immergrün; stumpf eiförmig; klein; derb; glänzend

Blüte: Mai bis Juni; weiß bis rosa Trauben; Nachblüte im August

Frucht: September bis Winter; korallenrot; kugelig; auffallend

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffarm, humos, kalkfrei; licht- bis halbschantig

### Büsche

m.Tb.	15- 20	8,95	7,90	7,15
-------	--------	------	------	------

**VACCINIUM Fruchtsorten** - siehe Obstteil



Vaccinium corymbosum 'Jersey'

**VIBURNUM - Caprifoliaceae - SCHNEEBALL,  
SCHLINGE****bodnantense 'Dawn', Winter-Schneeball**

Höhe: bis 4 m  
 Wuchs: starr, trichterförmig, leicht Ausläufer treibend  
 Laub: lanzettlich bis eiförmig; zerrieben stark würzig riechend; Herbstfärbung bräunlich rot

Blüte: ab November, Hauptblüte März bis April; hellrosa; leicht duftend  
 Frucht: trockene Steinfrucht; selten  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Blüten wohlriechend

**Büsche**

m.B./Co.	60- 80	35,10	31,00
	80-100	44,50	39,30

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	86,50
		125-150	129,50
		150-175	184,00
4xv.	m.Db.	100-150	175-200
		200-250	298,00
			430,00

**burkwoodii, Oster-Schneeball**


Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: dichtbuschig, breit rund  
 Laub: wintergrün; elliptisch; glänzend grün; Herbstfärbung (die bis in das Frühjahr reicht) gelb bis rot, jedoch nur bei einem Teil des Laubes  
 Blüte: April bis Mai; rosa bis weiß; ballförmige Trugdolden; süß duftend  
 Frucht: Steinfrucht  
 Standort: mäßig frisch bis feucht, durchlässig, leicht sauer; sonnig bis lichtsattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	36,00	31,80
	60- 80	51,90	45,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	170,00
		100-125	222,00
		125-150	260,00
4xv.	m.Db.	100-150	125-150
		150-175	268,00
		175-200	385,00
			585,00




Viburnum bodnantense 'Dawn'



Viburnum bodnantense 'Dawn'



Viburnum burkwoodii



Viburnum burkwoodii



Viburnum carlcephalum

**carlcephalum**, Duftender Schneeball

- Höhe: 2-2,5 m  
 Wuchs: breitbuschig, locker, rundlich  
 Laub: breit oval; stumpf grün; rau behaart; Herbstfärbung gelb bis orangefarben  
 Blüte: Mai; Knospen rosa, später weiße Dolden  
 Frucht: Steinfrucht  
 Standort: weite Standortamplitude; nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	29,90	26,40
	40- 60	36,00	31,80
	60- 80	51,90	45,90



Viburnum carlcephalum

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	170,00
		100-125	222,00
		125-150	260,00
4xv.	m.Db.	100-150	268,00
		150-175	385,00
		175-200	585,00

**carlesii**, Koreanischer Schneeball, Wohlriechender Schneeball

- Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: locker, rundlich  
 Laub: breit oval; stumpf graugrün; Herbstfärbung orange bis rotbraun  
 Blüte: April bis Mai; rosa bis weiße Dolden; süß duftend  
 Frucht: Steinfrucht  
 Standort: durchlässig, nährstoffreich, humos, leicht sauer; sonnig bis lichtsattig



Viburnum carlesii

**carlesii 'Aurora'**, Koreanischer Schneeball 'Aurora'

- Höhe: bis 1,5 m  
 Wuchs: locker, breit kugelig  
 Laub: breit oval; stumpf grün; Unterseite dicht behaart  
 Blüte: April bis Mai; Knospen intensiv rot, später weiße Dolden; stark duftend  
 Frucht: ca. 1 cm lang; elliptisch; blauschwarz  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nährstoffreich, leicht sauer; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: sehr schöner Strauch

**Büsche**

m.B./Co.	30- 40	37,00	32,70
	40- 60	44,50	39,30
	60- 80	63,80	56,40



Viburnum carlesii

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-150	60- 80	123,00
			80-100	170,00
			100-125	234,00
4xv.	m.Db.	100-150	125-150	355,00
			150-175	495,00

**davidii**, Immergrüner Kissen-Schneeball

- Höhe: 50-80 cm  
 Wuchs: kompakt, flach rundlich  
 Laub: immergrün, elliptisch; dunkelgrün; lederartig  
 Blüte: Juni; weißlich rosa Doldenrispen  
 Frucht: ab September; rund; kräftig blau  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, bedingt kalkverträglich; licht- bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	20- 25	26,90	23,80
	25- 30	32,40	28,60
	30- 40	44,50	39,30

**farreri**, Duft-Schneeball

Synonym: *V. fragrans*

- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: steif aufrecht, Ausläufer treibend  
 Laub: elliptisch; schwach würzig riechend; Herbstfärbung orange bis rot  
 Blüte: ab November, Hauptblüte Februar bis März; rosa bis weiß; in endständigen Rispen; leicht duftend  
 Frucht: ab Juni; Steinfrucht  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**Büsche**

m.B./Co.	60- 80	35,10	31,00
	80-100	44,50	

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-150	100-125	86,50
			125-150	129,50
			150-175	184,00
4xv.	m.Db.	100-150	175-200	298,00
			200-250	430,00

**lantana**, Wolliger Schneeball

- Höhe: 2-3 (-4) m  
 Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig  
 Laub: eilänglich; unterseits grauwoilig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun  
 Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße, halbkugelige Schirmrispen; strenger Geruch  
 Frucht: ab August; eilänglich; rot, später schwarz  
 Standort: frisch bis trocken, durchlässig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis lichtschantig




*Viburnum carlesii* 'Aurora'



*Viburnum davidii*



*Viburnum farreri*



*Viburnum lantana*





Viburnum lantana

→ lantana

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,75	5,00	4,50
5 Tr.	o.B.	100-150	9,45	7,30	6,60
	Co.	60-100	15,80	13,90	12,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	65,40	57,80	
		150-200	84,50	74,60	
	m.Db.	200-250	126,00		
		250-300	170,00		



Viburnum lantana

**lantana 'Vkg 4 bis 6 - ZgG®', Gebietseigener Wolliger  
Schneeball aus Vorkommensgebiet 4 bis 6**

Höhe: 2-3 (-4) m

Wuchs: breit aufrecht, dichtbuschig

Laub: eilänglich; unterseits grauwoilig; Herbstfärbung gelb bis rotbraun

Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße, halbkugelige Schirmrispen; strenger Geruch

Frucht: ab August; eilänglich; rot, später schwarz

 Standort: frisch bis trocken, durchlässig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis  
lichtschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	9,00	6,80	6,15
5 Tr.	o.B.	100-150	11,95	9,55	8,65



Viburnum opulus

**opulus, Gemeiner Schneeball**

Höhe: 3-4 m

Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig

Laub: rundlich; drei- bis fünfplappig; hellgrün; Herbstfärbung orangerot

Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße flache Schirmrispen; Außenrand steril

Frucht: ab September bis Winter; kugelig; rot; auffallend


Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	6,75	5,00	4,50
5 Tr.	o.B.	100-150	9,45	7,30	6,60
	Co.	60-100	15,80	13,90	12,60

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	65,40	57,80	
		150-200	84,50	74,60	
	m.Db.	200-250	126,00		
		250-300	170,00		



Viburnum opulus

**opulus 'VkG 1 bis 6 - ZgG®**, Gebietseigener Gemeiner  
Schneeball aus Vorkommensgebiet 1 bis 6

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig  
 Laub: rundlich; drei- bis fünfflappig; hellgrün; Herbstfärbung  
 orangerot  
 Blüte: Mai bis Juni; cremeweiße flache Schirmrispen; Außenrand steril  
 Frucht: ab September bis Winter; kugelig; rot; auffallend  
 Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr.	o.B.	60-100	9,00	6,80	6,15
5 Tr.	o.B.	100-150	11,95	9,55	8,65



Viburnum opulus

**opulus 'Roseum'**, Gefüllter Schneeball

Synonym: V. o. 'Sterile'

- Höhe: 3-4 m  
 Wuchs: aufrecht, breit ausladend, annähernd trichterförmig  
 Laub: rundlich; drei- bis fünfflappig; hellgrün; Herbstfärbung orangerot bis  
 dunkelrot  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß, im Verblühen rosa; schneeballartig  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis nass, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig



Viburnum opulus 'Roseum'

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	12,35	9,90	9,00
5 Tr.	o.B.	60-100	14,90	12,30	11,15
	Co.	60-100	19,00	16,80	15,20

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	60,50	53,50
		125-150	78,50	69,10
	m.Db.	150-200	101,50	89,50
		200-250	133,50	



Viburnum opulus 'Roseum'

**plicatum**, Gefüllter Japanischer Schneeball

Synonym: V. tomentosum sterile


- Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: breit ausladend, flach rund  
 Laub: breit eiförmig bis elliptisch; Herbstfärbung in verschiedenen Rottönen  
 Blüte: Mai bis Juni; weiß; ballförmige Trugdolden  
 Frucht: keine  
 Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend;  
 sonnig bis lichtschtig →



Viburnum plicatum



Viburnum plicatum 'Mariesii'



Viburnum plicatum 'Mariesii'

## → plicatum

**plicatum 'Mariesii'**, Breit Wachsender Japanischer SchneeballSynonym: *V. tomentosum mariesii*

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: breit ausladend, etagenförmig

Laub: breit eiförmig; gelbgrün; Herbstfärbung in Rottönen

Blüte: Mai bis Juni; rahmweiß; flache Schirmrispen

Frucht: ab August; rot, zur Reife schwarz; länglich

Standort: lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	36,00	31,80
	60- 80	51,90	45,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	116,50
		100-125	189,00
		125-150	229,00

**plicatum tomentosum**, Hoher Japanischer Schneeball

Höhe: 2-3 m

Wuchs: breit ausladend, rundlich, später schirmartig

Laub: spitz oval; stumpf; Herbstfärbung orangert

Blüte: Mai bis Juni; weiß; flache Schirmrispen; Rand steril

Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	60- 80	34,20	30,20
	80-100	43,30	

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	67,10
		100-125	86,50
	m.Db.	125-150	129,50
		150-175	184,00



Viburnum plicatum tomentosum



Viburnum plicatum 'Watanabe'

**plicatum 'Watanabe'**, Japanischer Zwerg-Schneeball

Höhe: 1-2 m

Wuchs: breit ausladend, gedungen

Laub: elliptisch bis spitz eiförmig; Herbstfärbung weinrot

Blüte: Mai bis August; rahmweiß; flache Schirmrispe; Nachblüte

Frucht: ab August; rot, später blauschwarz

Standort: frisch bis feucht, lehmig, nährstoffreich, humos, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	44,50	39,30
	60- 80	63,80	56,40

**Solitär**

3xv.	m.Db.	80-100	161,00
		100-125	260,00
		125-150	400,00

**pragense, Prager Schneeball**

Höhe: 2-3 m

Wuchs: breitbuschig aufrecht, sparrig

Laub: immergrün; elliptisch eiförmig; glänzend grün

Blüte: Mai bis Juni; weiß; flache Schirmrispen; leicht duftend

Frucht: selten; weniger zierend als die von *V. rhytidophyllum*

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	36,00	31,80
	60- 80	51,90	45,90

**Solitär**

3xv.	m.B.	80-100	170,00
		100-125	222,00
		125-150	260,00

**rhytidophyllum, Immergrüner Zungen-Schneeball**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: steif, trichterförmig, später breit ausladend, bogig überhängend

Laub: immergrün; eilänglich; dicht; runzelig; unterseits braunfilzig

Blüte: Mai bis Juni; cremeweiß; flache Schirmrispen; duftend

Frucht: ab August; glänzend; eiförmig; rot, zur Reife schwarz

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

**Büsche**

m.B./Co.	40- 60	36,00	31,80
	60- 80	51,90	45,90
	80-100	63,80	56,40

**Solitär**


3xv.	m.B.	80-100	98,50	87,00
		100-125	129,50	114,50
		125-150	194,00	
4xv.	m.Db.	100-150	150-175	234,00
			175-200	325,00
			200-250	470,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-250	730,00
			250-300	1.080,00
			300-350	1.590,00



Viburnum plicatum 'Watanabe'



Viburnum pragense




Viburnum pragense



Viburnum rhytidophyllum



Viburnum tinus



Viburnum tinus

## tinus, Lorbeer-Schneeball

Höhe: bis 2 m

Wuchs: aufrecht buschig; sehr dicht

Laub: immergrün; ledrig; glänzend dunkelgrün; elliptisch

Blüte: November bis April; weiß (rosaweiß); duftend; doldenähnlich

Frucht: eiförmig; tiefblau bis schwarz; ungenießbar

Standort: mäßig trocken bis frisch; durchlässige Böden; sandig lehmig; sonnig bis schattig

Sonstiges: frostempfindlich; stadtklimafest (Winterschutz empfehlenswert)

### Sträucher

m.B./Co.	40- 60	53,30
	60- 80	74,30

### Solitär

3xv.	m.B.	60- 80	126,00
		80-100	179,00
	m.Db.	100-125	254,00
		125-150	365,00

## VINCA - Apocynaceae - IMMERGRÜN, SINGRÜN

### major, Großblättriges Immergrün

Höhe: 20-30 cm

Wuchs: kurz aufrecht, niederliegend, kriechend

Laub: immergrün; eiförmig; glänzend grün


Blüte: Mai bis September; blau

Frucht: Balgkapsel

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; schattig bis halbschattig



Vinca major



Vinca minor

### minor, Kleinblättriges Immergrün

Höhe: 10-25 cm

Wuchs: niederliegend, kriechend

Laub: immergrün; elliptisch; dunkelgrün glänzend

Blüte: Mai, Nachblüte im September; blau

Frucht: Balgkapsel

Standort: weite Standortamplitude; alle Kulturböden; licht- bis halbschattig

### minor 'Alba', Weißes Kleinblättriges Immergrün

Höhe: 10-25 cm

Wuchs: niederliegend, kriechend

Laub: immergrün; elliptisch; dunkelgrün glänzend

Blüte: Mai, Nachblüte im September; weiß

Frucht: Balgkapsel

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; licht- bis halbschattig

**Büsche**

5- 7 Tr. m.Tb.	2,95	2,61	2,37
8-12 Tr. m.Tb.	3,55	3,14	2,85

**VITIS Fruchtsorten** - siehe Obstteil**WEIGELA** - Caprifoliaceae - **WEIGELIE**,  
**GLOCKENSTRAUCH****florida**, Hoher Glockenstrauch

Höhe:	3-3,5 m
Wuchs:	aufrecht, breit überhängend
Laub:	elliptisch; hellgrün; lange haftend
Blüte:	Mai bis Juni; rosaweiß, im Verblühen dunkler
Frucht:	holzige Kapsel
Standort:	weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

4 Tr. o.B.	60-100	8,95	6,75	6,10
5 Tr. o.B.	100-150	11,70	9,30	8,45
Co.	60-100	14,55	12,85	11,65

**Solitär**

3xv. m.Db.	125-150	78,50	69,10
	150-200	101,50	89,50
	200-250	145,00	

**florida 'Nana Purpurea'**, Niedriger Glockenstrauch

Höhe:	1-1,5 m
Wuchs:	locker aufrecht, breitbuschig
Laub:	elliptisch bis eilänglich; braunrot
Blüte:	Juni bis Juli; dunkelrosa, innen heller
Frucht:	Balgkapsel
Standort:	weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**verpflanzte Sträucher**

Co.	40- 60	17,50	15,50	14,00
-----	--------	-------	-------	-------

**Solitär**


3xv. m.B.	60- 80	44,50
	80-100	57,60
m.Db.	100-125	76,50
	125-150	104,00



Vinca minor 'Alba'



Weigela florida



Weigela florida



Weigela florida 'Nana Purpurea'



Weigela 'Bristol Ruby'

## Weigela-Hybriden

### 'Bristol Ruby', Weigelia 'Bristol Ruby'

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: aufrecht, breitbuschig, überhängend  
 Laub: elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juli, Nachblüte im Spätsommer; karminrot  
 Frucht: Balgkapsel  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig



Weigela 'Eva Rathke'

### 'Eva Rathke', Weigelia 'Eva Rathke'

Höhe: 1,5-2 m  
 Wuchs: dichtbuschig, breit bogig überhängend  
 Laub: elliptisch  
 Blüte: Juni bis August; karminrot; größer und auffälliger als 'Bristol Ruby'; Nachblüte  
 Frucht: Balgkapsel  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig

### 'Newport Red', Weigelia 'Newport Red'

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: locker aufrecht, breit überhängend  
 Laub: elliptisch  
 Blüte: Juni bis Juli; tiefrot  
 Frucht: Balgkapsel  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig



Weigela 'Eva Rathke'

### 'Styriaca', Weigelia 'Styriaca'

Höhe: 2-2,5 m  
 Wuchs: locker aufrecht, leicht überhängend  
 Laub: elliptisch  
 Blüte: Mai bis Juni; karminrosa, im Verblühen dunkler  
 Frucht: Balgkapsel  
 Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig

#### verpflanzte Sträucher

4 Tr.	o.B.	60-100	12,70	10,20	9,25
5 Tr.	o.B.	100-150	15,30	12,60	11,45
	Co.	60-100	14,55	12,85	11,65

#### Solitär

3xv.	m.Db.	100-125	60,50	53,50
		125-150	78,50	69,10
		150-200	101,50	89,50
		200-250	145,00	



Weigela 'Styriaca'

**WISTERIA - Leguminosae - BLAUREGEN, GLYZINIE****floribunda**, Japanischer Blauregen

- Höhe: 8-10 m  
 Wuchs: schnell- und starkwüchsig; rechts windend  
 Laub: länglich elliptisch; frischgrün; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; violette, lange, hängende Trauben  
 Frucht: grüne Hülsen mit mehreren Samen; giftig!  
 Standort: sonnig; mäßig trocken bis frisch (auch feucht); nährstoffreich; durchlässig  
 Sonstiges: frosthart, aber spätfrostgefährdet; hitzeverträglich; stadtklimafest




Wisteria floribunda

**Kletterpflanzen**

1 Tr.	Co.	60-100	28,40	25,10
ab 2 Tr.	Co.	60-100	35,10	31,00

**Solitär**

Co.	100-150	60,50	53,50
	150-200	84,50	74,60
	200-250	123,00	



Wisteria sinensis

**sinensis**, Chinesischer Blauregen

- Höhe: 8-10 (-15) m  
 Wuchs: hochwindend  
 Laub: unpaarig gefiedert; hellgrün; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: Mai bis Juni; vor Austrieb; violettblaue Trauben  
 Frucht: lange Hülsen; giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig



Wisteria sinensis

**Kletterpflanzen**

1 Tr.	Co.	60-100	28,40	25,10
ab 2 Tr.	Co.	60-100	35,10	31,00

**Solitär**

3xv.	Co.	100-150	60,50	53,50
		150-200	84,50	74,60
		200-250	123,00	
4xv.	Co.	250-300	179,00	
		300-350	254,00	
		350-400	365,00	




Wisteria sinensis 'Alba'





Zelkova serrata



Zelkova serrata

## ZELKOVA - Ulmaceae - ZELKOWE

### serrata, Japanische Zelkowe

- Höhe: bis 25 m  
 Wuchs: rundkronig; malerisch; weit ausladend  
 Laub: zugespitzt eiförmig; scharf gesägt  
 Blüte: April mit Blattaustrieb; grünlich; unbedeutend  
 Frucht: grünliche Steinfrüchte; unbedeutend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch; sandig lehmig bis lehmige Böden; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: etwas spätfrostgefährdet; stadtklima- und windfest; sehr schöne Herbstfärbung

### serrata 'Green Vase', Japanische Zelkowe 'Green Vase'

- Höhe: 15-18 m  
 Wuchs: schmal trichterförmig  
 Laub: zugespitzt eiförmig; scharf gesägt  
 Blüte: April mit Blattaustrieb; grünlich; unscheinbar  
 Frucht: grünliche Steinfrüchte; unbedeutend  
 Standort: mäßig trocken bis frisch; sandig lehmig bis lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: stadtfeste Selektion

#### Hochstämme


3xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	750,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

#### Solitär-Bäume

4xv.	m.Db.	20- 25	150-200	400-500	1.650,00
		25- 30			2.100,00
5xv.	m.Db.	25- 30	200-300	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.530,00
6xv.	m.Db.	40- 45	300-400	900-700	5.900,00
		45- 50			7.300,00



Zelkova serrata



Zelkova serrata 'Green Vase'



Nadelgehölze



**ABIES - Pinaceae - TANNE****balsamea 'Nana', Niedrige Balsam-Tanne**


Höhe: 60 (-100) cm

Wuchs: nestförmig, später flach rundlich

Nadeln: kurz; dicht; unterseits 2 weiße Stomata-Linien

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nahrhaft, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

m.B./Co.	12- 15	16,00	14,00
	15- 20	19,70	17,50
	20- 25	23,20	20,50
3xv. m.B./Co.	25- 30	31,25	27,50
	30- 40	38,60	34,00



Abies balsamea 'Nana'

**concolor, Kolorado-Tanne, Grau-Tanne**

Höhe: 20 (-25) m

Wuchs: spitz kegelförmig, später breiter und lockerer

Nadeln: bis 6 cm; graugrün bis blaugrün; unregelmäßig gescheitelt; haften 8 bis 10 Jahre

Rinde: grau; lange glatt; Harzblasen; später dickborkig bis korkig

Zapfen: ab Oktober; zylindrisch; nach 15 bis 20 Jahren

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahre


3xv. m.B.	80-100	96,50
	100-125	148,50
	125-150	204,00

**Solitär**

4xv. m.Db.	150-175	291,00
	175-200	420,00
	200-225	620,00



Abies concolor



Abies concolor

**homolepis, Nikko-Tanne, Schrauben-Tanne, Scheitel-Tanne**

Höhe: 20 (-30) m

Wuchs: breit kegelförmig, später säulenförmig


Nadeln: bis 2 cm; frischgrün; V-förmig gescheitelt

Rinde: ältere Borke grau; schuppig

Zapfen: ab September; zylindrisch; nach 5 bis 8 Jahren

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, humos, kalkempfindlich; sonnig bis lichtschattig


3xv. m.B.	80-100	85,00
	100-125	145,00
	125-150	210,00



Abies homolepis



Abies koreana - Sämling



Abies koreana - Sämling

## koreana Sämling, Korea-Tanne

Höhe: 6-8 m  
 Wuchs: regelmäßig kegelförmig  
 Nadeln: bis 2 cm; dunkelgrün; büstenförmig nach vorne gerichtet  
 Rinde: grau bis braun; Borke im Alter rau  
 Zapfen: September bis Winter; zylindrisch; violettviolett, zur Reife braun  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, humose Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	60-70	65,40
		70-80	86,50
		80-100	120,00
4xv.	m.B.	100-125	170,00
		125-150	216,00
		150-175	298,00

### Solitär

5xv.	m.Db.	175-200	510,00
		200-225	695,00

## nordmanniana, Nordmanns-Tanne, Kaukasus-Tanne

Höhe: 20-25 (-30) m hoch  
 Wuchs: breit kegelförmig, voll beastet  
 Nadeln: bis 3 cm; dunkelgrün; nicht gescheitelt  
 Rinde: glatt; grau, später grauschwarz; plattenartig gebrochen  
 Zapfen: zylindrisch; bis 15 cm lang; nach 15 bis 20 Jahren  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, lehmig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahre


3xv.	m.B.	80-100	104,00	92,00
		100-125	145,00	128,00
		125-150	198,00	175,00

### Solitär

4xv.	m.Db.	150-175	268,00
		175-200	385,00
		200-225	495,00
5xv.	m.Db.	100-150	770,00
		225-250	1.080,00
		250-275	1.500,00
6xv.	m.Db.	150-200	2.340,00
		300-350	3.230,00
		350-400	4.410,00
7xv.	m.Db.	200-300	4.770,00
		450-500	5.900,00
		500-600	7.300,00
		600-700	9.200,00



Abies nordmanniana



Abies nordmanniana

**procera 'Glauca', Silber-Tanne**Synonym: *A. nobilis* 'Glauca'

Höhe: Stamm bildend 15-20 m (in der Heimat über 60 m); stammlos gezogen aus Seitentrieben 3-5 m

Wuchs: unregelmäßig, breit kegelförmig

Nadeln: bis 3,5 cm; blauweiß; dicht; unterseits gescheitelt

Rinde: braun bis schwarz; mit Harzbeulen, später schuppig

Zapfen: ab September; zylindrisch, nach 5 bis 8 Jahren;

größte Zapfen aller Abiesarten; auffallend

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig

Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 700 Jahre

**flach gezogen**

3xv.	m.B./Co.	30- 40	37,50
		40- 50	48,00
		50- 60	57,00
4xv.	m.B./Co.	60- 70	75,00
		70- 80	110,00

**Solitär**


5xv.	m.Db.	80-100	189,00
		100-125	230,00

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	30- 40	37,50
		40- 50	48,00
		50- 60	57,00
4xv.	m.B./Co.	60- 70	75,00
		70- 80	110,00
		80-100	165,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	100-125	230,00
		125-150	330,00
		150-175	478,50



Abies procera 'Glauca'



Abies procera 'Glauca'



Abies procera 'Glauca'

**ARAUCARIA - Araucariaceae - SCHMUCKTANNE****araucana, Chilenische Anden-Tanne**Synonym: *A. imbricata*

Höhe: 8-12 m


Wuchs: eiförmig, später breit schirmförmig auf astlosem, hohem Stamm

Nadeln: dreieckig bis lanzettlich, ledrig, scharf zugespitzt; glänzend dunkelgrün

Rinde: schwarzgrau; schuppig

Zapfen: kugelförmig; braun; zerfallend; bis 18 cm lang; enthält bis 300 Samen; essbar

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, humos, nahrhaft, kalkempfindlich; sonnig



Araucaria araucana



Araucaria araucana

→ **araucana**

Stammumfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.
		1 Stück    ab 10 Stück    ab 50 Stück
3xv. m.B./Co.	30- 40 40- 50	85,00 130,00
4xv. m.B./Co.	50- 60 60- 80	249,00 355,00

**Solitär**

5xv. m.Db.	80-100 100-125 125-150	495,00 699,00 935,00
------------	------------------------------	----------------------------

## CALOCEDRUS - Cupressaceae - FLUSS-ZEDER, RAUCH-ZYPRESSE

### decurrens, Kalifornische Fluss-Zeder

Synonym: Libocedrus decurrens

Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig, Gipfel abgerundet  
 Nadeln: schuppenförmig  
 Rinde: dunkelrotbraun; in Streifen abblättern; attraktiv  
 Zapfen: eiförmig länglich, glockenartig auseinandergespreizt; hellbraun; Reife im 1. Jahr

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, humos, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig


Sonstiges: wird sehr alt; über 1.000 Jahre alte Exemplare sind bekannt

**Solitär**

3xv. m.Db.	125-150 150-175	142,00 205,00
4xv. m.Db.	175-200 200-225	320,00 505,00
5xv. m.Db.	225-250 250-275	765,00 1.120,00



Calocedrus decurrens



Calocedrus decurrens

## CEDRUS - Pinaceae - ZEDER

### atlantica, Atlas-Zeder


Höhe: 15-25 (-40) m  
 Wuchs: großer Baum, breit kegelförmig, unregelmäßig  
 Nadeln: bis 2,5 cm; bläulich grün  
 Rinde: Borke schwarzgrau; schuppig oder plattenartig aufreißend  
 Zapfen: 5-7,5 cm lang; tonnenförmig,  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: Atlas-Zedern können 900 Jahre alt werden



Cedrus atlantica

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreis in Euro exkl. MwSt.		
			1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
3xv.	m.B./Co.	80-100 100-125 125-150	65,00 95,00 145,00		
<b>Solitär</b>					
4xv.	m.Db.	150-175 175-200 200-225	194,00 254,00 355,00		
5xv.	m.Db.	100-150	225-250 250-275 275-300	950,00 1.330,00 2.440,00	
6xv.	m.Db.	150-200	300-350 350-400	3.200,00 4.150,00	
7xv.	m.Db.	200-300	400-450 450-500	5.245,00 7.040,00	



Cedrus atlantica 'Glauca'

## atlantica 'Glauca', Blau-Zeder, Blaue Atlas-Zeder

Höhe: 20-25 (-40) m

Wuchs: breit kegelförmig, später schirmartig

Nadeln: bis 2 cm; silbrig grau

Rinde: Borke schwarzgrau; schuppig oder plattenartig aufreißend

Zapfen: nach 10 bis 20 Jahren; tonnenförmig, Reife nach 2 bis 3 Jahren

Standort: mäßig trocken bis frisch, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig

Sonstiges: gut winterhart



Cedrus atlantica 'Glauca'

3xv.	m.B./Co.	80-100 100-125 125-150	65,00 96,50 145,00		
------	----------	------------------------------	--------------------------	--	--

### Solitär

4xv.	m.Db.	150-175 175-200 200-225	194,00 276,00 400,00		
5xv.	m.Db.	100-150	225-250 250-275 275-300	990,00 1.390,00 2.540,00	
6xv.	m.Db.	150-200	300-350 350-400	3.320,00 4.300,00	
7xv.	m.Db.	200-300	400-450 450-500 500-600	5.450,00 7.300,00 9.200,00	



Cedrus atlantica 'Glauca'

## deodara, Himalaja-Zeder

Höhe: 10-15 (-20) m

Wuchs: breit kegelförmig, später ausladend, stumpf kegelig

Nadeln: bis 5 cm; blau- oder graugrün; weich; lang

Rinde: graubraun; Borke rau; schwärzlich


Zapfen: ei- bis tonnenförmig; zwei bis drei Jahre bis zur Reife

Standort: mäßig trocken bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, Kalk meidend; sonnig bis lichtschattig



Cedrus deodara





Cedrus libani  
äußere Zone: hier 50 Jahre

## → deodara

3xv.	m.B./Co.	80-100	59,00
		100-125	89,00
		125-150	137,00
4xv.	m.B./Co.	150-175	198,00
		175-200	291,00
		200-225	385,00
		<b>Solitär</b>	100-150
5xv.	m.Db.	225-250	895,00
		250-275	1.240,00

**libani**, Libanon-Zeder

- Höhe: 25-40 m  
 Wuchs: kegelförmig, später breit ausladend  
 Nadeln: bis 4cm; dunkelgrün  
 Zapfen: fassförmig, bis 10 cm  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, humos, sandig lehmig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig, Wärme liebend  
 Sonstiges: im Schlosspark zu Weinheim an der Bergstraße steht eine vor 200 Jahren gepflanzte Libanon-Zeder, deren mächtiger Stamm mittlerweile einen Durchmesser von über 150 cm aufweist

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	660,00
		225-250	930,00
5xv.	m.Db.	250-275	1.450,00
		275-300	2.135,00
		300-350	3.280,00

**CHAMAECYPARIS** - Cupressaceae -  
**SCH EINZYPRESSE****lawsoniana 'Alumii'**, Blaue Hecken-Zypresse

- Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: schmal bis breit kegelförmig, dicht  
 Nadeln: schuppenförmig; erst blau bereift, später graublau  
 Äste: erst aufrecht, dann abstehend  
 Zapfen: klein, kugelig, hart; braun  
 Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschtig



Cedrus libani



Chamaecyparis lawsoniana



Chamaecyparis lawsoniana  
'Alumii'

**lawsoniana 'Columnaris'**Syn.: *C. law. 'Columnaris Glauca'*, Blaue Säulen-Zypresse

Höhe: 7-10 m

Wuchs: säulenförmig, dicht geschlossen

Nadeln: schuppenförmig; silbergrau

Äste: straff aufrecht, auch Zweige

Zapfen: klein, kugelig, hart; braun

Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschantig

m.B./Co.	40- 60	11,70	10,35	9,40
	60- 80	16,20	14,25	12,95
	80-100	22,30	19,70	17,90

3xv.	m.B./Co.	100-125	37,00	32,70	29,70
		125-150	49,30	43,60	
		150-175	68,90	60,90	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	175-200	120,00	
		200-225	175,00	

5xv.	m.Db.	225-250	310,00	
		250-275	460,00	

**lawsoniana 'Ellwoodii'**, Blaue Kegel-Zypresse

Höhe: 2-3 m

Wuchs: geschlossen, eiförmig, bauchig

Nadeln: fedrig; stahlblau bis graugrün

Standort: alle frische bis feuchte, nährstoffreiche Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

m.B./Co.	30- 40	9,50	8,30
	40- 50	13,25	11,90
	50- 60	17,40	15,40

3xv.	m.B.	60- 80	27,70
		80-100	38,00

**lawsoniana 'Glauca Spek'**


Höhe: 8-12 m

Wuchs: schmal kegelförmig, angenehm locker

Nadeln: schuppenförmig; graublau

Äste: kräftig, ansteigend

Zapfen: klein, kugelig, hart; braun

Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden;  
sonnig bis lichtschantigChamaecyparis lawsoniana  
'Columnaris'Chamaecyparis lawsoniana  
'Columnaris'Chamaecyparis lawsoniana  
'Ellwoodii'Chamaecyparis lawsoniana  
'Glauca Spek'



Chamaecyparis lawsoniana  
'Golden Wonder'

→ lawsoniana 'Glaucu Spek'

### lawsoniana 'Golden Wonder'

Höhe: 8-12 m  
Wuchs: breit kegelförmig, aufrecht, fächerförmig  
Nadeln: schuppenförmig; goldgelb, auch im Winter  
Äste: schrägaufrecht, wenig übernickend  
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschtattig

### lawsoniana Ivonne'

Höhe: 5-7 m  
Wuchs: schmal kegelförmig, ziemlich geschlossen  
Nadeln: goldgelb bis reingelb; auch im Winter; im Schatten grüngelb  
Äste: aufrecht, wenig übernickend  
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschtattig

### lawsoniana 'Silver Queen'

Höhe: 10-15 m  
Wuchs: schmal kegelförmig, ziemlich geschlossen  
Nadeln: schuppenförmig; Austrieb rahmweiß bis gelblich grün, später graugrün  
Äste: schräg ansteigend, Spitzen nickend  
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun  
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschtattig



Chamaecyparis lawsoniana  
'Silver Queen'

### lawsoniana 'Stewartii'

Höhe: 8-12 m  
Wuchs: schmal kegelförmig, stark wachsend, erst locker, später dichter  
Nadeln: schuppenförmig; Austrieb goldgelb, später grüngelb  
Äste: flach abstehend, teils nickend  
Zapfen: klein, kugelig, hart; braun  
Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschtattig

	m.B./Co.	50-60	21,90	19,20
		60-80	30,50	27,00
3xv.	m.B.	80-100	41,00	36,00
		100-125	60,00	54,00
		125-150	84,50	

### Solitär

4xv.	m.Db.	150-175	161,00
		175-200	234,00
		200-225	345,00
5xv.	m.Db.	225-250	505,00



Chamaecyparis lawsoniana  
'Stewartii'

**lawsoniana 'Van Pelt's Blue'**

Höhe: 6-8 m

Wuchs: schlank kegelförmig, dicht geschlossene Säulenform

Nadeln: schuppenförmig; dicht anliegend; stahlblau

Äste: straff aufrecht

Zapfen: klein, kugelig, hart; braun

Standort: frische bis feuchte, nährstoffreiche Böden; sonnig bis lichtschantig

	m.B./Co.	40- 60	11,70	10,35
		60- 80	16,20	14,25
3xv.	m.B.	80-100	22,30	19,70
		100-125	37,00	32,70

**Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	57,60	50,90
		150-175	80,50	70,90
		175-200	120,00	
5xv.	m.Db.	200-225	268,00	
		225-250	370,00	

**nootkatensis 'Pendula', Mähnen-Zypresse,  
Notka-Zypresse**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: breit ausladend, unregelmäßig, locker, kegelförmig

Nadeln: schuppenförmig, dunkelgrün

Rinde: graubraun; später rau, plattenartig aufreißend

Zapfen: kugelig; braun; Reife in zwei Jahren, nach 10 Jahren erstmalig fruchtend

Standort: alle gleichmäßig feuchten Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	100-125	103,00	
		125-150	155,00	
4xv.	m.Db.	150-175	216,00	
		175-200	325,00	
		200-225	460,00	
5xv.	m.Db.	225-250	695,00	
		250-275	970,00	

**obtusa 'Nana Gracilis', Muschel-Zypresse**


Höhe: 1,5-2,5 m

Wuchs: kompakt, rundlich, später stumpf kegelig

Nadeln: schuppenförmig, dick; dunkelgrün

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, humos; licht- bis halbschantig

	m.B./Co.	15- 20	21,00	18,50
		20- 25	26,50	23,50
		25- 30	42,00	36,50

Chamaecyparis nootkatensis  
'Pendula'Chamaecyparis nootkatensis  
'Pendula'Chamaecyparis obtusa  
'Nana Gracilis'



Chamaecyparis pisifera  
'Boulevard'

→ obtusa 'Nana Gracilis'

3xv.	m.B./Co.	30- 35	72,50	64,10
		35- 40	123,00	108,50
		40- 50	175,00	

**Solitär**

4xv.	m.B./Co.	50- 60	260,00	
		60- 70	385,00	
		70- 80	495,00	

**pisifera 'Boulevard', Kleine Silber-Zypresse**

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: regelmäßig kegelförmig, später breiter und lockerer  
 Nadeln: nadelartig; silbergrau; fein, dicht  
 Standort: alle frische bis feuchte, durchlässige, nährhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B./Co.	20- 25	12,60	11,10
		25- 30	16,00	14,10
		30- 40	23,10	
		40- 50	29,90	
		50- 60	40,10	



Chamaecyparis pisifera  
'Filifera Aurea'

**pisifera 'Filifera Aurea', Faden-Zypresse 'Filifera Aurea'**

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: geschlossen, breit kegelförmig, überhängend  
 Nadeln: schuppenförmig; goldgelb  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nährhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**pisifera 'Filifera Aurea Nana', Gelbe Faden-Zypresse**

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: geschlossen, breitkugelig, überhängend  
 Nadeln: schuppenförmig; goldgelb  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nährhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschantig



Chamaecyparis pisifera  
'Filifera Aurea Nana'

**pisifera 'Filifera Nana', Grüne Faden-Zypresse**

Höhe: bis 2,0 m hoch; 3-4 m breit  
 Wuchs: breitbuschig; überhängend; Zweige fadenförmig  
 Nadeln: frischgrün  
 Standort: weite Standortamplitude, alle frische bis feuchte, durchlässige, nährhafte Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B./Co.	20- 25	16,00	14,00
		25- 30	20,40	18,00
		30- 40	35,60	
		40- 50	46,50	
		50- 60	63,50	



Chamaecyparis pisifera  
'Filifera Nana'


**CRYPTOMERIA - Taxodiaceae - SICHEL-TANNE****japonica, Japanische Sichel-Tanne**

- Höhe: 10-15 m; in der Heimat bis 30 m  
 Wuchs: anfangs schlank pyramidal, später breiter  
 Nadeln: dunkelgrün; spiralg locker angeordnet; sichelförmig nach innen gewölbt  
 Äste: spiralg angeordnet; dicht  
 Rinde: rotbraun; dick; weiche Fasern  
 Zapfen: kugelig; bis 3 cm dick; stehend; Reife im 1. Jahr  
 Standort: frische bis feuchte, tiefgründige, lehmige Kulturböden; bevorzugt luffeuchte, milde Lagen

3xv.	m.B./Co.	40- 60	35,00
		60- 80	47,00
		80-100	74,30
4xv.	m.B.	100-125	145,00
		125-150	210,00
		150-175	298,00



Cryptomeria japonica




Cryptomeria japonica

**CUPRESSOCYPARIS - Cupressaceae -  
BAUM-ZYPRESSE, BASTARD-ZYPRESSE****leylandii, Grüne Baum-Zypresse**

- Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: dicht, säulenförmig, später breit eiförmig  
 Nadeln: schuppenförmig; dunkelgrün  
 Rinde: rotbraun  
 Standort: alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

	m.B./Co.	60- 80	22,30	19,70
		80-100	30,70	27,10
3xv.	m.B.	100-125	40,10	35,40
		125-150	53,30	47,10
		150-175	74,30	
		175-200	129,50	



Cupressocyparis leylandii

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	234,00
		225-250	325,00
		250-275	510,00
		275-300	730,00
5xv.	m.Db.	300-350	920,00
		350-400	1.280,00
		400-450	1.790,00
		450-500	2.470,00



Cupressocyparis leylandii

Cupressocyparis leylandii  
'Castlewellan Gold'

## leylandii 'Castlewellan Gold', Gelbe Baum-Zypresse

Höhe: 7-12 m; in der Heimat bis 15 m

Wuchs: wie die Art, jedoch schwachwüchsiger

Nadeln: schuppenförmig; goldgelb; bronzegelbe Winterfärbung

Rinde: rotbraun

Standort: alle frischen, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtschtattig

	m.B./Co.	40- 60	13,60	12,00
		60- 80	20,40	18,00
		80-100	33,00	29,00
3xv.	m.B./Co.	100-125	45,00	40,00
		125-150	63,50	57,50
		150-175	88,50	
		175-200	155,00	



Cupressus arizonica 'Glauca'

## CUPRESSUS - Cupressaceae - ZYPRESSE

### arizonica 'Glauca', Blaunadlige Arizona-Zypresse

Höhe: 6-8 m

Wuchs: schmal pyramidal bis streng kegelförmig, dicht

Nadeln: silbergrau

Zapfen: kugelig

Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig kiesig, sandig humos bis lehmig, kalkverträglich; sonnig; geschützt

Sonstiges: sehr schnittverträglich

	m.B.	80-100	57,10
		100-125	77,50
		125-150	106,00

#### Solitär

3xv.	m.Db.	150-175	145,00
		175-200	195,00
4xv.	m.Db.	200-225	237,00
		225-250	295,00
		250-300	360,00



Cupressus arizonica 'Glauca'

### sempervirens 'Stricta', Säulen-Zypresse

Höhe: 8-10 m, in der Heimat 20-30 m

Wuchs: schmal säulenförmig

Nadeln: dunkelgrün; angenehmer Harzduft

Zapfen: kugelig; hellbraun; bis 4 cm

Standort: trocken bis frisch, tiefgründig, durchlässig, schwach sauer bis alkalisch, nährstoffreich, sandig kiesig, sandig humos bis lehmig, kalkverträglich; sonnig; nicht ausreichend winterhart, nur für milde, geschützte Standorte

Sonstiges: sehr schnittverträglich



Cupressus sempervirens 'Stricta'

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

GINKGO

Co.	80-100	54,50
	100-125	74,30
	125-150	101,50

**Solitär**

3xv. Co.	150-175	141,00
	175-200	184,00

**Solitär**

4xv. Co.	200-225	229,00
	225-250	283,00
	250-300	400,00
	300-350	530,00
	350-400	715,00
	400-450	990,00
	450-500	1.240,00



Cupressus sempervirens 'Stricta'

## GINKGO - Ginkgoaceae - FÄCHERBLATTBAUM, GINKGOBAUM

### biloba, Fächerblattbaum, Ginkgobaum

Höhe: 20-30 m

Wuchs: sehr variabel, Krone kegelförmig

Nadeln: sommergrün; fächerförmig, eingeschnitten oder gelappt; ledrig;  
Herbstfärbung tiefgelb; auffallend

Rinde: Triebe metallisch braun; Borke grau, gefurcht

Blüte: April bis Mai, mit Austrieb; zweihäusig

Frucht: kugelig; gelb; Samen außen fleischig; nach ca. 20 Jahren

Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis  
lichtschattig

Sonstiges: werden bis 1000 Jahre alt; in Europa seit 1730

3xv. m.B.	125-150	67,10
	150-175	80,50
	175-200	116,50
	200-250	157,00

**Solitär**

4xv. m.Db.	250-300	222,00
	300-350	315,00
	350-400	460,00


5xv. m.Db.	350-400	660,00
	400-500	845,00
	500-600	1.210,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv. m.Db.	10- 12	285,00
	12- 14	340,00
4xv. m.Db.	14- 16	475,00
	16- 18	680,00
	18- 20	900,00
	20- 25	1.270,00



Ginkgo biloba



Ginkgo biloba




→ Ginkgo biloba



## → biloba

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

5xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.330,00 1.805,00
6xv.	m.Db.	25- 30 30- 35 35- 40	100-150	500-700	2.135,00 2.650,00 3.280,00
6xv.	m.Db.	30- 35 35- 40 40- 45	150-200	500-700	2.980,00 3.680,00 4.520,00
7xv.	m.Db.	40- 45 45- 50 50- 60	200-300	700-900	5.050,00 6.950,00 8.650,00



Ginkgo biloba



Ginkgo biloba 'Autumn Gold'

**biloba 'Autumn Gold', Gelber Fächerblattbaum, Ginkgobaum**

Höhe: 15-25 m  
 Wuchs: malerisch, breit pyramidal  
 Nadeln: sommergrün; fächerförmig, eingeschnitten oder gelappt; ledrig; Herbstfärbung tiefgelb; auffallend  
 Rinde: Triebe metallisch braun; Borke grau, gefurcht  
 Blüte: April; grün  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12 12- 14			291,00 400,00
4xv.	m.Db.	14- 16 16- 18 18- 20 20- 25			545,00 750,00 1.050,00 1.390,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25 25- 30	100-150	400-500	1.690,00 2.100,00
6xv.	m.Db.	25- 30 30- 35	100-150	500-700	2.410,00 2.950,00

**biloba 'Fastigiata' Säulen-Fächerblattbaum**


Höhe: 15-20 m  
 Breite: 6-8 m  
 Wuchs: Krone schlank aufrecht, in der Jugend schwachwüchsig  
 Nadeln: fächerförmig; mattgrün; Herbstfärbung gelb  
 Rinde: Stämme stark gefurcht; grau; längsrisbig  
 Blüte: April bis Mai, mit Austrieb  
 Frucht: bisher nicht beobachtet; männliche Selektion  
 Standort: sonnig; absolut standorttolerant



Ginkgo biloba 'Fastigiata'

**Solitär**

3xv.	m.B.	125-150	161,00
		150-175	222,00
		175-200	310,00
4xv.	m.Db.	200-225	485,00
		225-250	695,00
		250-275	970,00
5xv.	m.Db.	275-300	1.180,00
		300-350	1.640,00



Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'®

**biloba 'Fastigiata Blagon'®, Säulen-Fächerblattbaum**

Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, dichttriebzig  
 Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: kurze Kätzchen vorm Austrieb  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

3xv.	m.B./Co.	150-175	265,00
		175-200	420,00
4xv.	mB./Co.	200-250	580,00
		250-300	825,00
5xv.	m.Db.	300-350	1.300,00
		350-400	1.805,00



Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'®

**Hochstämme**

4xv.	m.Db.	12- 14	560,00
		14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
		18- 20	1.460,00
5xv.	m.Db.	20- 25	2.040,00
		25- 30	2.830,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	60-100	400-500	2.220,00
		25- 30			3.060,00
		30- 35			3.970,00

**biloba 'Mariken', Kugel-Fächerblattbaum**

Höhe: variabel, 2-2,5 m  
 Wuchs: kugelförmig  
 Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb  
 Blüte: bisher nicht beobachtet  
 Frucht: bisher nicht beobachtet  
 Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig



Ginkgo biloba 'Mariken'



→ Ginkgo biloba 'Mariken'

## → biloba 'Mariken'

**Hochstämme**

4xv.	m.Db.	12- 14	560,00
		14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
5xv.	m.Db.	18- 20	1.460,00
		20- 25	2.040,00

**biloba 'Princeton Sentry',  
Fächerblattbaum 'Princeton Sentry'**

Höhe: 12-15 m

Wuchs: schmal kegelförmig

Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb

Blüte: kurze Kätzchen vorm Austrieb

Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich

Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	295,00
		200-250	410,00
4xv.	m.Db.	200-250	580,00
		250-300	825,00
		300-350	1.150,00
5xv.	m.Db.	350-400	1.365,00
		400-500	1.900,00
		500-600	2.650,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	12- 14	400,00
		14- 16	545,00
		16- 18	795,00
		18- 20	1.050,00
		20- 25	1.390,00

**Solitär-Stammbüsche**

5xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.590,00
		25- 30			2.100,00
6xv.	m.Db.	25- 30	100-150	500-700	2.340,00
		30- 35			2.910,00
		35- 40			3.580,00
7xv.	m.Db.	30- 35	150-200	500-700	3.230,00
		35- 40			3.970,00
		40- 45			4.900,00



Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'



Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'

**biloba 'Saratoga', Fächerblattbaum 'Saratoga'**

- Höhe: 12-15 m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, im Alter breit pyramidal  
 Nadeln: sommergrün; fächerförmig, tief gelappt, langstielig, schmal; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb  
 Frucht: bisher nicht beobachtet da männlich  
 Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

m.B.	100-125	142,50
	125-150	197,00

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	294,80
		200-250	407,00
4xv.	m.Db.	200-250	462,00
		250-300	660,00
		300-350	929,00
5xv.	m.Db.	350-400	1.364,00
		400-500	1.903,00

**biloba 'Tit', Zwerg-Ginkgobaum, Entenfußbaum, Elefantenoehrbaum**

- Höhe: 2-4 m hoch, 2 m breit  
 Wuchs: buschig, kompakt  
 Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb  
 Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb  
 Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich  
 Standort: alle tiefgründigen, frischen, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	175-200	379,50
		200-250	534,00
4xv.	m.Db.	200-250	765,00
		250-300	1.065,00
		300-350	1.485,00

**Hochstämme**


4xv.	m.Db.	12- 14	451,00
		14- 16	643,50
		16- 18	900,00
		18- 20	1.265,00
		20- 25	1.750,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

5xv.	m.Db.	20- 25	100-150	400-500	1.940,00
		25- 30			2.680,00



Ginkgo biloba 'Saratoga'



Ginkgo biloba 'Saratoga'



Ginkgo biloba 'Tit'



Ginkgo biloba 'Tit'

**biloba 'Tremonia', Säulenfächerblattbaum**

Höhe: 10-12 m

Wuchs: malerisch säulenförmig oval, offene Krone

Nadeln: sommergrün; fächerförmig, nicht gelappt; Herbstfärbung gelb

Blüte: grün; unauffällig, April/Mai

Frucht: bisher nicht beobachtet, da männlich

Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**Solitär**

3xv.	m.Db.	150-200	294,40
		200-250	407,00
4xv.	m.Db.	200-250	462,00
		250-300	660,00
		300-350	929,00
5xv.	m.Db.	350-400	1.364,00
		400-500	1.903,00
		500-600	2.680,00

**Hochstämme**

4xv.	m.Db	12- 14	560,00
		14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
		18- 20	1.460,00
		20- 25	1.850,00

**Solitär-Bäume**

5xv.	m.Db.	20- 25	1.980,00
		25- 30	2.470,00

**biloba 'Troll', Kugel-Fächerblattbaum**

Krone: bis 80 cm hoch, bis 100 cm breit

Wuchs: dichtbuschig, gedrunen, Zuwachs 2-4 cm im Jahr

Nadeln: sommergrün; fächerförmig; Herbstfärbung goldgelb

Blüte: kurze Kätzchen vor dem Austrieb

Frucht: bisher nicht beobachtet

Standort: alle tiefgründigen, frischen, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

**Hochstämme**

4xv.	m.Db.	12- 14	560,00
		14- 16	795,00
		16- 18	1.080,00
5xv.	m.Db.	18- 20	1.460,00
		20- 25	2.040,00
		25- 30	2.790,00

**JUNIPERUS - Cupressaceae - WACHOLDER,  
SADEBAUM****chinensis 'Blaauw', Blauer Strauch-Wacholder**Synonym: *J. media* 'Blaauw'

Höhe: 2-3 m

Wuchs: trichterförmig

Nadeln: schuppenförmig; graublau

Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	30- 40	32,20
		40- 50	48,50
		50- 60	61,50

**Solitär**

4xv.	m.B.	60- 70	107,00
		70- 80	165,00
5xv.	m.Db.	80-100	241,00
		100-125	335,00

**chinensis 'Plumosa Aurea', Gelber Moos-Wacholder**Synonym: *J. media* 'Plumosa Aurea'

Höhe: 2-3 m

Wuchs: unregelmäßig, trichterförmig

Nadeln: schuppenartig; dunkelgelb, im Winter bronze

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	30- 40	37,60	33,00
		40- 50	46,50	41,00
		50- 60	70,50	
4xv.	m.B./Co.	60- 70	103,00	
		70- 80	160,00	
		80-100	208,00	

**communis 'Hibernica', Irischer Säulen-Wacholder**

Höhe: 3-5 m


Wuchs: schmal säulenförmig

Nadeln: nadelartig, scharf zugespitzt, nicht stechend; blaugrau


Zapfen: kugelige Beeren; erst grau, zur Reifezeit im zweiten Jahr schwarzblau

Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig


	m.B./Co.	40- 60	19,50	17,20
		60- 80	30,50	27,00
3xv.	m.B.	80-100	43,30	
		100-125	60,50	
		125-150	107,50	



Juniperus chinensis 'Blaauw'

Juniperus chinensis '  
Plumosa Aurea'

Juniperus communis 'Hibernica'



Juniperus communis 'Hibernica'



Juniperus communis 'Repanda'

→ communis 'Hibernica'

### Solitär

4xv.	m.Db.	150-175	210,00
		175-200	325,00
		200-225	495,00
5xv.	m.Db.	225-250	730,00
		250-275	1.050,00

### communis 'Repanda', Flacher Kriech-Wacholder

Höhe: 30-50 cm  
Wuchs: kriechend, flach, Boden aufliegend, geschlossen  
Nadeln: dunkelgrün, silbrig gestreift; weich; dicht; im Winter bräunlich  
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B./Co.	20-30	12,20	10,50
		30-40	17,80	15,50
3xv.	m.B./Co.	40-50	23,90	21,00
		50-60	35,00	31,50



Juniperus communis 'Suecica'

### communis 'Suecica', Schwedischer Säulen-Wacholder

Höhe: 3-5 m  
Wuchs: breit säulenförmig, Triebspitzen nickend  
Nadeln: bläulich grün; spitz; stechend  
Zapfen: kugelige Beeren; grün, zur Reifezeit im zweiten Jahr schwarzblau  
Standort: trocken bis frisch, durchlässig, humos, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B.	40-60	19,50	17,20
		60-80	30,50	27,00
3xv.	m.B.	80-100	43,30	
		100-125	60,50	
		125-150	107,50	

### Solitär

4xv.	m.Db.	150-175	210,00
		175-200	325,00




Juniperus horizontalis 'Glauca'

### horizontalis 'Glauca', Blauer Teppich-Wacholder

Höhe: bis 30 cm  
Wuchs: kriechend, mattenartig, Boden aufliegend  
Nadeln: schuppenförmig; stahlblau  
Standort: alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B./Co.	20-25	12,20	10,50
		25-30	14,80	13,00
		30-40	21,50	19,00
		40-50	24,00	21,50



Juniperus horizontalis 'Glauca'

**media 'Hetzii'**, Grauer Strauch-WacholderSynonym: *J. chinensis* 'Hetzii', *J. virginiana* 'Hetz'

Höhe: 3-5 m

Wuchs: ausladend, trichter- bis kegelförmig

Nadeln: schuppenartig; graublau

Rinde: rotbraun; Borke rau

Zapfen: kugelige Beeren; blaugrün, zur Reifezeit im zweiten Jahr braun; nach 5 bis 10 Jahren erster Fruchtansatz

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

**breit gezogen**

	m.B./Co.	30- 40	17,00
		40- 60	22,00
3xv.	m.B.	60- 80	43,00
		80-100	65,00
		100-125	106,00
		125-150	140,00

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	60- 80	50,00
		80-100	75,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	125,50
		125-150	175,00

**media 'Old Gold'**, Gelber Strauch-WacholderSynonym: *J. chinensis* 'Old Gold'

Höhe: 80-100 cm, bis 2 m breit

Wuchs: kompakt, nestförmig

Nadeln: schuppen- bis nadelartig; goldgelb bis gelbgrün

Zapfen: selten bzw. nicht beobachtet

Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	30- 40	21,00
		40- 50	32,20

4xv.	m.B./Co.	50- 60	56,00
		60- 80	80,00

**media 'Pfitzeriana'**, Pfitzer-WacholderSynonym: *J. chinensis* 'Pfitzeriana'

Höhe: 3-4 m

Wuchs: breit ausladend, malerisch

Nadeln: schuppig bis nadelartig; blaugrün

Zapfen: männliche Pflanze

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: außergewöhnlich wärme- und trockenheitsverträglich



Juniperus media 'Hetzii'



Juniperus media 'Old Gold'




Juniperus media 'Old Gold'







Juniperus media 'Pfitzeriana'



Juniperus media 'Pfitzeriana'

→ media 'Pfitzeriana'

**breit gezogen**

	m.B./Co.	30-40	16,60
		40-60	21,70
3xv.	m.B.	60-80	40,10
		80-100	60,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	110,50
		125-150	157,00

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	60-80	55,00
		80-100	75,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	140,00
		125-150	210,00
5xv.	m.Db.	125-150	325,00
		150-175	465,00
		175-200	660,00

**media 'Pfitzeriana Aurea', Gelber Pfitzer-Wacholder**

Synonym: *J. chinensis* 'Pfitzeriana Aurea'

Höhe: 2,5-3,5 m

Wuchs: breit ausladend, trichterförmig

Nadeln: schuppen- bis nadelartig; häufig gelb bis gelbgrün

Zapfen: männliche Pflanzen

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschatig



Juniperus media 'Pfitzeriana Aurea'



Juniperus sabinia 'Tamariscifolia'

**breit gezogen**

	m.B./Co.	30-40	21,50
		40-60	25,50
3xv.	m.B./Co.	60-80	50,00
		80-100	70,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	125,00
		125-150	185,00

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	50-60	40,00
		60-80	65,00
		80-100	90,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	150,00
		125-150	210,00
		150-175	310,00
5xv.	m.Db.	125-150	415,00
		150-175	560,00
		175-200	775,00

**sabina 'Tamariscifolia', Tamarisken-Wacholder**

Höhe: 50-80 cm


Wuchs: breit, flach, geschlossen, später kissenförmig

Nadeln: bläulich grün bis graugrün; spitz

Standort: weite Standortamplitude, alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	20- 30	13,20	11,60
	30- 40	17,40	15,20

3xv. m.B./Co.	40- 50	27,70	24,50
	50- 60	38,00	33,60



Juniperus sabina 'Tamariscifolia'

**scopulorum 'Skyrocket', Raketen-Wacholder**

Synonym: J. virginiana 'Skyrocket'

Höhe: 6-8 m


Wuchs: streng säulenförmig

Nadeln: schuppig bis nadelartig; blaugrau

Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	50- 60	18,50
	60- 80	26,50

3xv. m.B.	80-100	42,00
	100-125	58,00
	125-150	96,50



Juniperus scopulorum 'Skyrocket'

**Solitär**

4xv. m.Db.	150-175	170,00
	175-200	245,00
	200-225	340,00

5xv. m.Db.	225-250	510,00
	250-275	675,00
	275-300	990,00



Juniperus scopulorum 'Skyrocket'

**squamata 'Blue Star', Blauer Stern-Wacholder**

Höhe: 70-90 cm

Wuchs: kompakt, polsterförmig

Nadeln: silberblau; dicht; spitz

Standort: weite Standortamplitude, alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	15- 20	14,30	12,75
	20- 25	17,00	15,00

3xv. m.B./Co.	25- 30	25,50	22,50
	30- 40	35,10	31,00



Juniperus squamata 'Blue Star'

**Solitär**

4xv. m.Db.	40- 50	60,50
	50- 60	82,50



Juniperus squamata 'Blue Star'

**squamata 'Meyeri', Blauzeder-Wacholder**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: trichterförmig offen bis säulenförmig dicht

Nadeln: silbrig blau; stehend

Standort: alle trockenen bis frischen, durchlässigen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B./Co	40- 50	25,50	23,00
		50- 60	34,50	31,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	60- 70	51,00	
		70- 80	78,00	



Juniperus squamata 'Meyeri'

**virginiana 'Canaertii', Fruchtender Zypressen-Wacholder**

Höhe: 6-8 m

Wuchs: dicht, breit kegelförmig, später breit eiförmig

Nadeln: schuppenartig; dunkel- bis frischgrün

Rinde: braun; Borke rau

Zapfen: ab September; kugelige Beeren; blau bereift; Reife im ersten Jahr

Standort: alle Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

**virginiana 'Glauca', Grauer Zypressen-Wacholder**

Höhe: 5-10 m

Wuchs: geschlossen, säulenförmig, später annähernd kegelförmig

Nadeln: meist schuppenartig; stahlblau

Rinde: rot bis graubraun; Borke glatt


Zapfen: ab September; kugelige Beeren; blau bereift; Reife im ersten Jahr

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden, sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B.	60- 80	49,30	
		80-100	74,30	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	101,50	
		125-150	145,00	
		150-175	198,00	
5xv.	m.Db.	175-200	310,00	
		200-225	485,00	
		225-250	770,00	



Juniperus virginiana 'Canaertii'




Juniperus virginiana 'Glauca'

**LARIX - Pinaceae - LÄRCH****decidua, Europäische Lärche**Synonym: *L. europaea*

- Höhe: 25-30 (-40) m  
 Wuchs: schmal kegelförmig, später locker und ungleichmäßiger  
 Nadeln: sommergrün; hellgrüne Büschel; Herbstfärbung gelb  
 Rinde: hellbraun bis gelb; Borke schuppig  
 Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche Blüte rot, aufrecht, männliche Blüte gelb, auffallend  
 Zapfen: eiförmig; braun; Schuppenrand nicht umgebogen  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis lichtsattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung 200 bis 400 (-800) Jahre

Baum  
des Jahres  
2012

Larix decidua



Larix decidua

**kaempferi, Japanische Lärche**Synonym: *L. leptolepis*

- Höhe: 25-30 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, später ungleichmäßig, locker  
 Nadeln: sommergrün; blaugrüne Büschel; späte, gelbe Herbstfärbung  
 Rinde: rotbraun; Borke graubraun; tief gefurcht; schuppig  
 Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche und männliche Blüten gelb  
 Zapfen: eiförmig bis rund; Schuppen rosettenartig  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	125-150	41,00
	150-200	56,00
	200-250	76,00

**Solitär**


3xv.	m.Db.	250-300	165,00
		300-350	250,00
		350-400	365,00
4xv.	m.Db.	150-200	715,00
		400-500	990,00

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	14- 16	545,00
		16- 18	750,00
		18- 20	945,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	20- 25	1.390,00
		25- 30	1.640,00
		30- 35	2.290,00



Larix kaempferi



Larix kaempferi



Larix kaempferi 'Pendula'


## kaempferi 'Pendula', Japanische Hänge-Lärche

- Höhe: sehr variabel, 6-10 m  
 Wuchs: Hängeform  
 Nadeln: sommergrün; blaugrüne Büschel; späte, gelbe Herbstfärbung  
 Rinde: rotbraun; Borke graubraun; tief gefurcht, schuppig  
 Blüte: April, vor Austrieb; einhäusig; weibliche und männliche Blüten gelb  
 Zapfen: eiförmig bis rund; Schuppen rosettenartig  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B.	125-150	79,00
		150-175	117,00

### Solitär

4xv.	m.Db.	175-200	220,00
		200-250	325,00
		250-300	460,00



Metasequoia glyptostroboides

## METASEQUOIA - Taxodiaceae - URWELTMAMMUTBAUM

### glyptostroboides, Chinesisches Rotholz

- Höhe: bis 40 m  
 Wuchs: spitz kegelförmig, später breiter  
 Nadeln: sommergrün; frischgrün; gegenständig; Herbstfärbung gelbbraun, kupfer- bis rostrot  
 Rinde: rotbraun; Borke rissig  
 Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüten gelbgrün, endständig, männliche Blüten in kätzchenartigen Ähren  
 Zapfen: kugelig; dunkelbraun  
 Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, nährstoffreich, kalkverträglich; sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B.	125-150	55,00
		150-175	66,50
		175-200	86,50
		200-250	125,50

### Solitär

4xv.	m.Db.	225-250	182,00
		250-275	252,00
		275-300	346,50
		300-350	495,00
5xv.	m.Db.	350-400	875,00
		400-450	1.220,00
		450-500	1.695,00
6xv.	m.Db.	500-600	2.980,00
		600-700	4.650,00



Metasequoia glyptostroboides



Metasequoia glyptostroboides

**Hochstämme, Stammbüsche**

3xv.	m.Db.	12- 14	270,00
		14- 16	370,00
		16- 18	510,00
		18- 20	680,00
		20- 25	895,00

**Solitär-Bäume, -Stammbüsche**

4xv.	m.Db.	25- 30	1.500,00
		30- 35	2.290,00
		35- 40	2.830,00
5xv.	m.Db.	40- 45	4.050,00
		45- 50	5.800,00
		50- 60	7.350,00
6xv.	m.Db.	60- 70	9.200,00
		70- 80	11.880,00



Microbiota decussata



Microbiota decussata

## MICROBIOTA - Cupressaceae - ZWERG-LEBENSBAUM, FÄCHER-WACHOLDER

**decussata, Teppich-Thuja**

Höhe: 30-35 cm hoch; bis 150 cm breit

Wuchs: flach kriechend; Zweigspitzen überhängend; feintriebig

Nadeln: frischgrün; schuppenförmig; im Winter kupfrig braun verfärbend

Standort: sonnig bis schattig; humose, sauer bis alkalische, frische Böden

Sonstiges: toleriert zeitweise Trockenheit

Co.	20- 30	14,00	12,20
	30- 40	16,40	14,00

**PICEA - Pinaceae - FICHTE****abies, Rot-Fichte, Gewöhnliche Fichte**Synonym: *P. excelsa*

Höhe: 30-50 m

Wuchs: gleichmäßig spitz kegelförmig

Nadeln: dunkelgrün; vierkantig; etwas stechend

Rinde: rotbraun, später grau- bis schwarzbraun; Borke grau; schuppig abblätternd

Blüte: April bis Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurn, groß; männliche Blüte rot


Zapfen: hängend; zylindrisch; rotbraun; nach ca. 10 Jahren

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, nahrhaft, lehmig, Kalk vertragend; sonnig bis halbschattig

Sonstiges: Lebenserwartung 100 bis 600 Jahre

Baum  
des Jahres  
2017

Picea abies



Picea abies



Picea abies

→ abies

3xv.	m.B./Co.	80-100	48,00	43,00
		100-125	60,00	53,00
		125-150	88,50	79,00
		150-175	121,50	107,50
		175-200	167,50	150,00

**Solitär**

4xv.	m.B.	200-225	231,00
		225-250	320,00
		250-275	451,00

5xv.	m.Db.	275-300	726,00
		300-350	1.012,00
		350-400	1.364,00

6xv.	m.Db.	400-450	2.079,00
		450-500	2.860,00



Picea abies 'Nidiformis'

**abies 'Nidiformis', Nest-Fichte**

Höhe: 80-120 cm  
 Wuchs: nestförmig, später unregelmäßig halbkugelig  
 Nadeln: hellgrün; unterseits gescheitelt; früher Austrieb  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nahrhaften Kulturböden; sonnig bis halbschattig

m.B./Co.	20- 30	20,30	17,90
	30- 40	26,50	24,00

3xv.	m.B./Co.	40- 50	36,00
		50- 60	51,50

4xv.	m.B./Co.	60- 70	86,50
		70- 80	135,00



Picea breweriana


**breweriana, Mähnen-Fichte, Siskiyou-Fichte**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: regelmäßig kegelförmig, Zweige mähnenartig, im Alter bis 2 m tief herabhängend  
 Nadeln: dunkelgrün glänzend; radial angeordnet  
 Rinde: graubraun, später grau bis schwarz; Borke rau, leicht rissig  
 Zapfen: zylindrisch; nach ca. 10 bis 20 Jahren; sehr selten  
 Standort: alle frischen bis feuchten, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

Sonstiges: Rinde rötlich; abblätternd

3xv.	m.B./Co.	40- 50	87,00
		50- 60	106,20

4xv.	m.B./Co.	60- 70	132,00
		70- 80	165,00
		80-100	200,00



Picea breweriana

**Solitär**

5xv.	m.Db.	100-125	400,00
		125-150	560,00
		150-175	795,00
6xv.	m.Db.	175-200	1.240,00

**glauca 'Conica', Zuckerhut-Fichte**

Höhe: 2-3 m  
 Wuchs: regelmäßig, dicht geschlossen, kegelförmig  
 Nadeln: hellgrün; weich; radial gestellt  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nährhaften Kulturböden; sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	20,30	18,00
		50- 60	27,50	24,30
		60- 70	38,60	34,00
		70- 80	53,00	47,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	80-100	91,00
		100-125	138,60

**glauca 'Echiniformis', Blaue Igel-Fichte**

Höhe: 40-60 cm  
 Wuchs: abgeflacht, halbrund  
 Nadeln: graublau bereift; radial angeordnet  
 Standort: alle frischen bis feuchten, nährhaften Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

m.B./Co.	15- 20	23,50	20,50	
	20- 25	29,50	25,50	
3xv.	m.B./Co.	25- 30	35,00	31,00
		30- 35	49,00	43,50

**omorika, Serbische Fichte**

Höhe: 15-30 m  
 Wuchs: schmal, fast säulenförmig  
 Nadeln: glänzend dunkelgrün; bis 2 cm  
 Rinde: braun, später grau bis schwarzbraun; Borke rau, rissig  
 Blüte: Mai; einhäusig; weibl. Blüten purpurrot, aufrecht, männliche rötlich gelb

Zapfen: länglich eiförmig; violett; nach ca. 5 bis 10 Jahren; zur Reife im zweiten Jahr braun

Standort: alle tiefgründigen, durchlässigen, nie staunassen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B.	80-100	42,90	38,00
		100-125	54,50	49,00
4xv.	m.B.	125-150	79,90	71,00
		150-175	108,30	96,00
		175-200	152,00	




Picea glauca 'Conica'



Picea glauca 'Echiniformis'



Picea omorika



Picea omorika





Picea omorika

→ omorika

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	216,00
		225-250	298,00
		250-275	420,00
5xv.	m.Db.	275-300	675,00
		300-350	945,00
		350-400	1.320,00
		400-450	2.040,00
6xv.	m.Db.	450-500	2.830,00
		500-550	3.680,00
		550-600	5.050,00
7xv.	m.Db.	600-700	6.950,00



Picea omorika 'Nana'

**omorika 'Nana', Serbische Kegel-Fichte**

Höhe: 4-5 m

Wuchs: breit kegelförmig, später lockerer

Nadeln: frischgrün, bläulich silbrige Unterseite

Standort: alle durchlässigen, nicht nassen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	25- 30	46,50
		30- 40	66,50
		40- 50	78,00
4xv.	m.B./Co.	50- 60	123,00
		60- 70	161,00



Picea orientalis

**Solitär**

5xv.	m.Db.	70- 80	298,00
		80-100	420,00
		100-125	600,00

**orientalis, Sapindus-Fichte, Orientalische Fichte**

Höhe: 20-30 m, in der Heimat 40-60 m

Wuchs: regelmäßig breit kegelförmig

Nadeln: dunkelgrün; stark glänzend; 8 mm kurz


Rinde: schwarzbraun; Borke rau; schuppig

Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurviolett, männliche Blüte rot, auffallend

Zapfen: länglich eiförmig; violett, zur Reife braun; nach ca. 10 bis 15 Jahren

Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	80-100	80,00
		100-125	108,30
4xv.	m.B.	125-150	177,00
		150-175	244,00



Picea orientalis

**orientalis 'Aurea', Orientalische Gold-Fichte**Synonym: *P. orientalis* 'Aureospicata'

Höhe: 10-15 m

Wuchs: breit kegelig

Nadeln: Austrieb intensiv rahmgelb bis goldgelb, später vergrünend

Rinde: schwarzbraun; Borke rau, schuppig

Blüte: Mai; einhäusig; weibliche Blüte purpurviolett, männliche Blüte rot, auffallend

Zapfen: länglich eiförmig; violett, zur Reife braun

Standort: weite Standortamplitude, alle frischen bis feuchten, nährstoffreichen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B./Co.	50- 60	70,20	62,00
		60- 70	82,00	73,50
		70- 80	95,50	83,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	80-100	143,00
		100-125	175,00
		125-150	234,00

**pungens 'Glauca', Blaue Stech-Fichte**

Höhe: 15-20 m

Wuchs: gleichmäßig kegelförmig

Nadeln: blaugrün bis blaugrau; scharf stechend

Rinde: grau- bis rotbraun; Borke gefurcht, schuppig

Zapfen: eilänglich; hellbraun; nach ca. 10 bis 15 Jahren

Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

3xv.	m.B.	80-100	78,00
		100-125	114,50
		125-150	173,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	150-175	237,50
		175-200	400,00
		200-225	545,00
		225-250	750,00


**pungens 'Glauca Globosa', Kleine Blau-Fichte**

Höhe: 1,5-2 m

Wuchs: anfangs locker und unregelmäßig, später flach kugelig, kompakt

Nadeln: silberblau; dicht; nahezu radial stehend

Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtsattig



Picea pungens 'Glauca'




Picea pungens 'Glauca'



Picea pungens 'Glauca'



→ Picea pungens 'Glauca Globosa'



Picea pungens 'Koster'

→ **pungens 'Glauca Globosa'**

m.B./Co.		15- 20	26,00	23,00
		20- 25	31,30	27,50
3xv.	m.B./Co.	25- 30	42,20	37,30
		30- 40	59,00	
4xv.	m.B./Co.	40- 50	89,00	
		50- 60	129,50	

**pungens 'Koster', Blau-Fichte (Veredlung)**

Höhe: 10-20 m

Wuchs: breit kegelförmig

Nadeln: silberblau; radial angeordnet; spitz; stechend

Rinde: graubraun; Borke schuppig

Zapfen: eilänglich; hellbraun

Standort: weite Standortamplitude, alle mäßig trockenen bis frischen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschattig

m.B./Co.		40- 50	68,90	60,90
		50- 60	76,50	67,40
3xv.	m.B./Co.	60- 70	96,50	
		70- 80	126,00	
		80-100	165,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	222,00	
		125-150	298,00	
		150-175	410,00	
5xv.	m.Db.	175-200	660,00	
		200-225	920,00	



Picea pungens 'Koster'



Pinus aristata



Pinus aristata

**PINUS - Pinaceae - KIEFER, FÖHRE**

**aristata, Grannen-Kiefer, Fuchsschwanz-Kiefer**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: langsam wachsender, aufrechter, kleiner Baum

Nadeln: 2- 4 cm lang; dicht anliegend; mit weißlichen Harzflocken besetzt

Äste: kandelaberartig verzweigt

Rinde: weißgraue bis rotbraune Schuppen

Zapfen: eiförmig; 4- 8 cm groß; bedornete Schuppen

Standort: sonnig; eher trocken; anspruchslos

Sonstiges: sehr frosthart und dekorativ

3xv.	m.B./Co.	30- 40	51,90	
		40- 50	65,40	
4xv.	m.B.	50- 60	116,50	
		60- 80	165,00	
		80-100	234,00	

**cembra**, Zirbel-Kiefer, Arve

Höhe: 15-20 (-25) m

Wuchs: im Flachland kegel- bis eiförmig, im Gebirge breit ausladend, locker, bizarr

Nadeln: blaugrün; zu fünft; weich; 3 bis 5 Jahre haftend

Rinde: Triebe braunorange, filzig; Borke schwarzbraun, rau, rissig

Zapfen: eiförmig; violett, zur Reife im dritten Jahr zimtbraun, Samen essbar

Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, sandig kiesig bis lehmig, kalkverträglich; sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: Lebenserwartung bis 600 Jahre

3xv.	m.B./Co.	50- 60	66,00
		60- 70	85,00
		70- 80	109,00
4xv.	m.B.	80-100	170,00
		100-125	234,00
		125-150	325,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	150-175	675,00
		175-200	895,00
		200-225	1.180,00

**contorta**, Dreh-Kiefer

Höhe: 5-10 m

Wuchs: breit bis schmal kegelförmig, später aufgelockert, malerisch

Nadeln: zweinadelig; frischgrün bis gelbgrün; gedreht

Rinde: rotbraun; Borke gefurcht oder schuppig


Zapfen: eiförmig; viele Jahre geschlossen am Baum; nach ca. 10 bis 15 Jahren

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B.	80-100	79,50	70,00
		100-125	118,00	107,00
		125-150	177,00	
		150-175	231,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	175-200	380,00	
		200-225	560,00	
5xv.	m.Db.	150-200	225-250	1.125,00
		250-275	1.485,00	
		275-300	1.970,00	




Pinus cembra



Pinus cembra



Pinus contorta



Pinus contorta

**leucodermis, Schlangenhaut-Kiefer, Bosnische Kiefer**

Höhe: 8-10 (-12) m  
 Wuchs: kompakt, schmal kegelförmig  
 Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; pinselartig gehäuft; starr; steif  
 Rinde: grauschwarz, fedrig geteilt; Borke schuppig  
 Zapfen: länglich bis eiförmig; schwarz  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, Kalk liebend, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	43,00	38,50
		50- 60	68,50	60,50
		60- 70	81,00	72,00
4xv.	m.B.	70- 80	110,00	
		80-100	146,00	
		100-125	224,00	

**Solitär**

5xv.	m.Db.	125-150	420,00	
		150-175	620,00	
		175-200	820,00	

**mugo, Berg-Kiefer, Latsche, Leg-Föhre**


Synonym: P. montana

Höhe: niederliegend 2-3 (-5) m, baumartig 5-7 (-10) m  
 Wuchs: variabel, breitbuschig bis schmal kegelförmig  
 Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; starr; oft sichelförmig oder leicht gedreht  
 Rinde: graubraun; Borke schuppig  
 Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb- bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren  
 Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, nährstoffarm, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

m.B./Co.	30- 40	26,90	23,80	
	40- 60	40,10	35,40	
3xv.	m.B./Co.	60- 80	65,40	57,80

**Solitär**


3xv.	m.B.	60- 80	60- 80	93,50
			80-100	123,00
			100-125	175,00
4xv.	m.Db.	80-100	100-125	234,00
			125-150	298,00
			150-175	385,00
4xv.	m.Db.	100-125	125-150	460,00
			150-175	600,00
			175-200	675,00
5xv.	m.Db.	125-150	150-175	715,00
			175-200	945,00
			200-250	1.240,00



Pinus leucodermis



Pinus mugo



Pinus mugo



Pinus mugo

**mugo 'Gnom', Kegel-Kiefer**

Höhe: 2-3 m

Wuchs: anfangs kompakt kugelig, später breit kegelförmig

Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; glänzend

Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	20- 25	33,30	29,40
	25- 30	40,10	35,40
3xv. m.B./Co.	30- 40	50,60	44,70
	40- 50	63,80	56,40
	50- 60	91,00	80,50

**Solitär**

4xv. m.Db.	60- 70	106,00	
	70- 80	148,50	

**mugo 'Mini Mops', Mini Mops-Kiefer**

Höhe: bis 30 cm hoch; 80-100 cm breit

Wuchs: kissenförmiger Zwergstrauch

Zapfen: zweinadelig; dunkelgrün; bis 2 cm

Standort: weite Standortamplitude, mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: als Hexenbesen aus Pinus mugo 'Mops' entstanden

m.B./Co.	10- 15	44,20	
	15- 20	54,50	
	20- 25	66,50	
3xv. m.B./Co.	25- 30	82,00	
	30- 35	95,00	
	35- 40	115,00	

**mugo 'Mops', Kissen-Kiefer**

Höhe: 80-100 (-150) cm

Wuchs: kompakt, flachkugelig, später kissenförmig

Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün

Standort: weite Standortamplitude, mäßig trocken bis feucht, durchlässig, humos oder mineralisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

m.B./Co.	15- 20	32,50	28,50
	20- 25	40,00	36,50
3xv. m.B./Co.	25- 30	48,50	43,00
	30- 40	65,00	58,00
	40- 50	87,50	78,00

**Solitär**

4xv. m.B./Co.	50- 60	126,00	
	60- 70	179,00	
	70- 80	241,00	




Pinus mugo 'Gnom'



Pinus mugo 'Mini Mops'




Pinus mugo 'Mops'



Pinus mugo 'Mops'



Pinus mugo 'Mops'



Pinus mugo mugus

**mugo mugus, Krummholz-Kiefer**

Höhe: 1-2 m

Wuchs: Äste niederliegend, breitbuschig, unregelmäßig

Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; dicht

Rinde: graubraun; Borke schuppig

Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb- bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren

Standort: mäßig trocken bis feucht, sandig bis lehmig, kiesig, humos, durchlässig, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

	m.B./Co.	30- 40	29,60	26,00
3xv.	m.B./Co.	40- 50	43,00	39,00
		50- 60	54,20	48,00

**Solitär**

4xv.	m.B.	60- 80	40- 60	106,00
			60- 80	155,00
4xv.	m.B.	80-100	40- 60	155,00
			60- 80	192,50
			80-100	244,00
5xv.	m.Db.	100-125	60- 80	244,00
			80-100	341,00
			100-125	410,00
6xv.	m.Db.	125-150	80-100	495,00
			100-125	730,00
			125-150	920,00
			150-175	1.210,00

**mugo pumilio, Kriech-Kiefer, Zwerg-Kiefer**

Höhe: 1-1,5 m

Wuchs: kissenförmig, gedrungen, abgeflacht

Nadeln: zweinadelig; tiefgrün; kurz; dicht

Zapfen: eiförmig bis kegelig; gelb bis dunkelbraun; nach ca. 5 bis 8 Jahren

Standort: mäßig trocken bis feucht, alle Kulturböden; sonnig bis lichtsattig

	m.B./Co.	20- 25	26,60	23,50
		25- 30	35,00	31,50
3xv.	m.B./Co.	30- 40	53,00	48,00
		40- 50	86,00	75,00

**Solitär**

4xv.	m.B./Co.	50- 60	103,00
		60- 70	165,00
		70- 80	210,00
5xv.	m.Db.	80-100	279,50
		100-125	390,00
		125-150	545,00



Pinus mugo pumilio

**nigra ssp. nigra, Österreichische Schwarz-Kiefer**Synonym: *P. nigra* var. *austriaca*

Höhe: 15-25 m

Wuchs: breit eiförmig, später oft schirmförmig abgeflacht

Nadeln: zweinadelig; dunkelgrün; steif und stehend

Rinde: Borke grauschwarz, tief gefurcht; Borkenplatten durch hellere Streifen mosaikartig getrennt

Zapfen: eiförmig; hellbraun; nach ca. 10 Jahren

Standort: trocken bis frisch, sandig kiesig bis lehmig, Kalk liebend, alle Kulturböden; sonnig

Sonstiges: Lebenserwartung 300 bis 400 Jahre; Höhenwachstum endet nach ca. 100 Jahren

3xv.	m.B.	80-100	76,00	68,00
		100-125	112,00	98,50
		125-150	168,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	150-175	234,00
		175-200	345,00
		200-225	510,00

5xv.	m.Db.	150-200	200-225	800,00
		225-250	1039,00	
		250-275	1.330,00	
		275-300	1.695,00	

6xv.	m.Db.	200-300	275-300	1.880,00
		300-350	2.405,00	
		350-400	3.055,00	
		400-450	3.865,00	

7xv.	m.Db.	300-400	400-450	6.040,00
		450-500	7.510,00	
		500-600	9.395,00	
		600-700	11.655,00	

8xv.	m.Db.	400-600	600-700	14.990,00
		700-800	17.900,00	
		800-900	21.945,00	

**Formgehölz**


5xv.	m.Db.	125-150	175-200	1.775,00
		200-225	2.205,00	
		150-200	200-225	3.305,00
		225-250	3.970,00	
		250-275	4.750,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.410,00
		25- 30		1.860,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.795,00
		35- 40		3.650,00
		40- 45		4.730,00



Pinus nigra ssp. nigra




Pinus nigra ssp. nigra



Pinus nigra ssp. nigra

Pinus nigra ssp. nigra -  
Formgehölz






Pinus parviflora 'Glauca'

6xv.	m.Db.	45- 50	200-300	6.655,00
		50- 60		8.745,00
		60- 70		11.550,00

**parviflora 'Glauca', Blaue Mädchen-Kiefer**

Höhe: 4-6 (-10) m  
 Wuchs: eiförmig, später unregelmäßig, locker, malerisch  
 Nadeln: fünfnadelig; silbrig blau; sichelförmig gebogen; pinselförmig gedrängt  
 Rinde: hellgrau; Borke grauschwarz; schuppig  
 Zapfen: eiförmig; viele Jahre am Baum bleibend; nach ca. 5 bis 10 Jahren  
 Standort: mäßig trocken bis frisch, durchlässig, nahrhaft, humos, bedingt kalkverträglich; sonnig



Pinus parviflora 'Glauca'

	m.B./Co.	50- 60	79,90	71,00
3xv.	m.B./Co.	60- 70	98,00	88,00
		70- 80	132,00	117,00
		80-100	168,00	
4xv.	m.Db.	100-125	271,50	
		125-150	379,00	
		150-175	533,00	

**Solitär**

5xv.	m.Db.	175-200	929,50	
		200-225	1.365,00	
		225-250	1.903,00	
6xv.	m.Db.	150-200	1.804,00	
		225-250	2.380,00	
		250-275	3.110,00	



Pinus parviflora 'Glauca'

**peuce, Pinsel-Kiefer, Mazedonische Kiefer, Rumelische Weymouths-Kiefer**

Höhe: 10-15 m  
 Wuchs: dicht geschlossen, breit eiförmig  
 Nadeln: fünfnadelig; grün bis graugrün; steif; spitz; nicht stechend  
 Rinde: Triebe grünlich, kahl; Borke graubraun, leicht schuppig  
 Zapfen: zylindrisch; hellbraun; harzig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nahrhaft, kalkverträglich; sonnig



Pinus peuce

3xv.	m.B./Co.	60- 70	44,20	38,50
		70- 80	58,50	52,00
		80-100	88,50	78,20
		100-125	125,50	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	187,00	
		150-175	252,00	
		175-200	400,00	
5xv.	m.Db.	200-225	770,00	
		225-250	1.100,00	

**pumila 'Glauca', Blaue Pummel-Kiefer**Synonym: *P. pumila* 'Osthoek'

Höhe: 1-1,5 m  
 Wuchs: dicht, kissenförmig, später rundlich  
 Nadeln: fünfnadelig; grau- bis blaugrün; dicht; weich  
 Zapfen: eiförmig; purpurviolett; zur Reife gelblich braun  
 Standort: alle mäßig trockenen bis frischen, durchlässigen, humosen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B./Co.	25- 30	50,50
		30- 40	80,00
		40- 50	100,50




Pinus pumila 'Glauca'

**strobus, Weymouths-Kiefer, Seiden-Kiefer, Strobe**

Höhe: 20-30 m  
 Wuchs: kegelförmig, später locker, abgerundet kegelig  
 Nadeln: fünfnadelig; blaugrün; dünn; weich; pinselartig  
 Rinde: Triebe graubraun, glänzend; Borke rau, rissig  
 Zapfen: schmal; zylindrisch; braun; nach 10 bis 15 Jahren  
 Standort: weite Standortamplitude, alle tiefgründigen, nährstoffreichen, mäßig kalkhaltigen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B.	100-125	72,50
		125-150	105,00
3xv.	m.Db.	150-175	163,00
		175-200	220,00



Pinus strobus

**Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	175-200	330,00
			200-225	430,00
		150-200	200-225	695,00
			225-250	990,00
			250-275	1.350,00

**strobus 'Radiata', Streichel-Kiefer**Synonym: *P. strobus* 'Nana'

Höhe: 1,5-2 (-3) m  
 Wuchs: gedrungen, flach kugelig, später unregelmäßig breitkegelig  
 Nadeln: fünfnadelig; blaugrün  
 Zapfen: schmal; zylindrisch; braun; nach 10 bis 15 Jahren  
 Standort: weite Standortamplitude, alle tiefgründigen, nährstoffreichen, mäßig kalkhaltigen Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

3xv.	m.B./Co.	30- 40	45,00	39,50
		40- 50	58,50	53,00
		50- 60	77,00	68,20




Pinus strobus



Pinus strobus 'Radiata'

## **sylvestris**, Föhre, Gewöhnliche Kiefer

- Höhe: 10-30 (-40) m  
 Wuchs: variabel, meist locker kegelförmig, später schirmförmig  
 Nadeln: zweinadelig; blau- bis graugrün  
 Rinde: Triebe braun bis oliv, später intensiv rotbraun; Borke hellbraun bis schwärzlich, plattenartig aufreißend  
 Zapfen: ei- bis kegelförmig; graubraun; nach ca. 5 Jahren  
 Standort: trocken bis frisch, durchlässig, sandig bis lehmig, sauer bis schwach alkalisch, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschatig  
 Sonstiges: Lebenserwartung bis zu 500 Jahren



Pinus sylvestris



Pinus sylvestris



Pinus sylvestris



Pinus sylvestris

3xv.	m.B.	100-125	72,50	64,10
		125-150	104,00	92,00
3xv.	m.Db.	150-175	148,50	131,00
		175-200	210,00	185,00

### **Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	175-200	310,00
			200-225	430,00
5xv.	m.Db.	150-200	200-225	795,00
			225-250	1.050,00
			250-275	1.320,00

### **Solitär**

6xv.	m.Db.	200-300	250-275	1.540,00
			275-300	1.940,00
			300-350	2.410,00
			350-400	2.980,00
7xv.	m.Db.	300-400	350-400	4.070,00
			400-450	5.600,00
			450-500	7.700,00
			500-600	10.200,00
			600-700	12.700,00
8xv.	m.Db.	400-600	600-700	15.300,00
			700-800	17.900,00
			800-900	20.950,00

### **Formgehölz**

5xv.	m.Db.	150-200	175-200	2.680,00
			200-225	3.230,00
		200-300	350-400	9.200,00
			400-450	10.800,00
			450-500	12.700,00

### **Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.410,00
		25- 30		1.860,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.795,00
		35- 40		3.650,00

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück

PINUS

6xv.	m.Db.	40- 45	200-300	5.115,00
		45- 50		6.655,00
		50- 60		8.745,00
		60- 70		11.550,00

## *sylvestris* 'Fastigiata', Säulen-Kiefer

Höhe: 8-10 m

Wuchs: schmal säulenförmig, später bauchig eiförmig

Nadeln: zweinadelig; blaugrau bis blaugrün; steif; dick

Rinde: Triebe braun bis oliv, später rotbraun; Borke schwärzlich, plattenartig aufreißend

Zapfen: eiförmig; graubraun; zahlreich

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig

3xv.	m.B./Co.	50- 60	64,90
		60- 80	81,00
		80-100	99,90

### Solitär

4xv.	m.Db.	100-125	145,00
		125-150	198,00
		150-175	276,00
		175-200	385,00

## *sylvestris* 'Norske Typ', Föhre 'Norske Typ'

Synonym: *P. sylvestris* 'Typ Norwegen'

Höhe: 10-12 m

Wuchs: kompakt, malerisch

Nadeln: gedreht; zweinadelig; 4-7 cm lang

Äste: unregelmäßig; dicht stehend, bis zum Boden reichend

Rinde: Triebe braun bis oliv, später intensiv rotbraun; Borke hellbraun bis schwärzlich, plattenartig aufreißend

Zapfen: ei- bis kegelförmig; graubraun; 3-7 cm lang


Standort: wie die Art, jedoch sonnig

Sonstiges: industrie- und stadtklimafest; trockenheitsresistent; anspruchslos; frosthart

3xv.	m.B.	80-100	56,00	49,50
		100-125	86,50	76,50

### Solitär

3xv.	m.Db.	125-150	129,00	114,00
		150-175	189,00	167,00
4xv.	m.Db.	125-150	150-175	260,00
		175-200	385,00	
		200-225	545,00	
5xv.	m.Db.	150-200	200-225	865,00
		225-250	1.080,00	
		250-275	1.350,00	



Pinus sylvestris 'Fastigiata'



Pinus sylvestris 'Fastigiata'



→ Pinus sylvestris 'Norske Typ'



Pinus sylvestris 'Watereri'

→ **sylvestris 'Norske Typ'**

6xv.	m.Db.	200-300	250-275	1.540,00
			275-300	2.040,00
			300-350	2.600,00
			350-400	3.320,00

**sylvestris 'Watereri', Silber-Kiefer**

Synonym: P. s. 'Pumila', P. s. 'Nana'

Höhe: 4-5 m

Wuchs: breit kegelförmig bis rundlich, kompakt, kugelig, später locker schirmförmig

Nadeln: zweinadelig; blaugrau bis stahlblau; dick

Rinde: rotbraun; Borke dunkelbraun, plattenartig aufreißend

Standort: mäßig trocken bis frisch, sandig bis lehmig, kiesig, alle Kulturböden; sonnig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	63,80	56,40
		50- 60	78,50	69,10

**Solitär**

4xv.	m.Db.	60- 70	116,50
		70- 80	152,00
		80-100	204,00

5xv.	m.Db.	80-100	80-100	353,00
		100-125	470,00	

5xv.	m.Db.	100-125	100-125	675,00
		125-150	895,00	
		150-175	1.180,00	



Pinus sylvestris 'Watereri'



Pinus wallichiana

**wallichiana, Tränen-Kiefer**

Synonym: P. griffithii, P. excelsa

Höhe: 20-25 (-30) m

Wuchs: locker, breit kegelförmig, wuchtig

Nadeln: fünfnadelig; bläulich grün bis silbrig; dünn; schlaff hängend; weich

Rinde: dunkelgrün; Borke grau, rissig, platt abblättern

Zapfen: zylindrisch; groß; hängend; hellbraun; nach 10 bis 15 Jahren


Standort: mäßig trocken bis feucht, durchlässig, nahrhaft, Kalk meidend; sonnig

3xv.	m.B.	80-100	73,50
		100-125	97,90
		125-150	147,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	150-175	265,50
		175-200	390,50
		200-225	565,00

5xv.	m.Db.	225-250	1.069,00
		250-275	1.330,00
		275-300	1.650,00



Pinus wallichiana

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreise in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück**PSEUDOTSUGA**

6xv.	m.Db.	200-300	300-350	2.445,00
			350-400	3.035,00

## **PSEUDOTSUGA** - Pinaceae - DOUGLASIE, DOUGLASFICHTE

**menziesii caesia**, Graue Douglasie

Synonym: *P. douglasii*

Höhe: 30-40 m

Wuchs: spitz kegelförmig, später lockerer, breit ausladend

Nadeln: graugrün; kammartig gescheitelt; Zitronenduft

Rinde: dunkelgrau; Borke glatt mit Harzbeulen, später schwarzgrau; tief gefurcht und schuppig

Zapfen: eilänglich; ab September bis Oktober; nach 15 bis 20 Jahren

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, tiefgründig, lehmig, humos, nährstoffreich, Kalk vertragend; sonnig bis lichtsattig


Sonstiges: Lebenserwartung 500 bis 700 Jahre

3xv.	m.B.	150-175	135,50
		175-200	178,00
		200-225	230,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-150	200-225	385,00
			225-250	545,00
			250-300	770,00

5xv.	m.Db.	150-200	275-300	1.350,00
			300-350	1.890,00
			350-400	2.600,00



*Pseudotsuga menziesii caesia*



*Pseudotsuga menziesii caesia*



*Sciadopitys verticillata*

## **SCIADOPITYS** - Taxodiaceae - SCHIRM-TANNE

**verticillata**, Japanische Schirm-Tanne

Höhe: 8-10 m, in der Heimat bis 40 m

Wuchs: dicht, schmal kegelförmig, später lockerer, aber schmal

Nadeln: tiefgrün; extrem dick; quirlig; bis 12 cm lang

Rinde: gelbbraun; Borke glatt, später rau


Zapfen: länglich; eiförmig; graubraun

Standort: feucht bis frisch, durchlässig, nährstoffreich, humos, kalkempfindlich; sonnig bis lichtsattig


3xv.	m.B./Co.	30- 40	57,60
		40- 50	62,10
4xv.	m.B./Co.	50- 60	76,50
		60- 70	93,50
		70- 80	145,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	80-100	216,00
		100-125	335,00



*Sciadopitys verticillata*



Sequoia sempervirens

## SEQUOIA - Taxodiaceae - KÜSTEN-MAMMUTBAUM, REDWOOD

### sempervirens, Küsten-Mammutbaum

Höhe: 20-30 m, am Heimatstandort über 100 m

Wuchs: schmal pyramidenförmig

Nadeln: nadelförmig, dunkelgrün

Zapfen: eiförmig, klein, hängend

Standort: frisch bis mäßig feucht, tiefgründig, durchlässig, mäßig nährstoffreich, humos (kalkverträglich); sonnig

Sonstiges: wegen der rötlichen Borke und des ebenfalls rötlichen Holzes auch als "Redwood" bezeichnet

#### Solitär

4xv.	m.Db.	125-150	440,00
		150-175	615,00
		175-200	875,50
5xv.	m.Db.	200-250	1.220,00
		250-300	1.695,00
		300-350	2.380,00

## SEQUIADENDRON - Taxodiaceae - MAMMUTBAUM

### giganteum, Riesen-Mammutbaum

Synonym: Sequoia gigantea

Höhe: 30-40 (-60) m, in der Heimat 80-90 m

Wuchs: spitz kegelförmig, später unregelmäßig abgerundet

Nadeln: blaugrün; schuppenartig; scharf zugespitzt; dicht anliegend

Rinde: rotbraun; Borke rau, weichfaserig, rissig, im Alter 50 bis 60 cm dick, brennt nicht


Zapfen: eiförmig; rotbraun; Reife im zweiten Jahr

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, nährstoffreich, humos, Kalk verträglich; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: Lebenserwartung 3000 bis 4000 Jahre; in der Jugend außerhalb des Weinbauklimas nicht zuverlässig frosthart



Sequoiadendron giganteum



Sequoiadendron giganteum

m.B./Co.	30- 40	70,60
	40- 50	84,50
3xv.	50- 60	104,00
	60- 80	161,00
	80-100	204,00

#### Solitär

4xv.	m.Db.	100-125	315,00
		125-150	450,00
		150-175	640,00
		175-200	895,00

Stamm-  
umfang

Größe in cm

Stückpreis in Euro exkl. MwSt.  
1 Stück ab 10 Stück ab 50 Stück**TAXODIUM**

5xv.	m.Db.	200-250	1.350,00
		250-300	1.980,00
		300-350	2.910,00
6xv.	m.Db.	350-400	4.410,00
		400-450	6.600,00
		450-500	9.200,00
		500-600	12.700,00

**TAXODIUM - Taxodiaceae - SUMPF-ZYPRESSE****distichum**

Höhe: 30-40 (-50) m

Wuchs: regelmäßig, spitz kegelförmig, später lockerer und breit

Nadeln: sommergrün; wechselständig; frischgrün; Herbstfärbung bronzerot

Rinde: hellbraun, später rotbraun; Borke längsrisig

Zapfen: kugelig; grün, zur Reifezeit ab Oktober braun

Standort: feucht bis nass oder im flachen Wasser, Kalk meidend, nährstoffreich,


3xv.	m.B./Co.	80-100	39,60
		100-125	56,00
		125-150	78,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	150-175	103,50
		175-200	143,50
		200-225	280,00

5xv.	m.Db.	225-250	391,00
		250-300	585,00
		300-350	875,50

6xv.	m.Db.	350-400	1.220,00
		400-450	1.805,00
		450-500	2.520,00



Taxodium distichum



Taxodium distichum



Taxodium distichum

**TAXUS - Taxaceae - EIBE****baccata, Gemeine Eibe**

Höhe: 10-15 (-20) m

Wuchs: stark variierend, meist dicht kegelförmig bis eiförmig, später ungleichmäßig rundlich


Nadeln: schwarzgrün; linealisch zugespitzt, glänzend

Rinde: rotbraun, später Borke graubraun; schuppig; faserig

Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

m.B./Co.	30- 40	19,00	16,80	15,20
	40- 50	23,60	20,80	18,90

Baum  
des Jahres  
1994

Taxus baccata





Taxus baccata

## → baccata

3xv.	m.B./Co.		50- 60	32,40	28,60	26,00
			60- 70	40,10	35,40	32,10
			70- 80	53,30	47,10	
			80-100	68,90	60,90	
			100-125	89,00	78,50	
4xv.	m.B.		125-150	141,00	124,50	
			150-175	194,00	171,00	
			175-200	268,00	237,00	

## Solitär

4xv.	m.Db.	60- 80	60- 80	63,80	56,40
			80-100	86,50	76,50
			100-125	127,00	106,00
			125-150	161,00	142,00
4xv.	m.Db.	80-100	80-100	148,50	131,00
			100-125	204,00	180,00
			125-150	283,00	250,00
			150-175	400,00	350,00
			175-200	545,00	480,00
			200-225	730,00	645,00



Taxus baccata

## Solitär

4xv.	m.Db.	100-125	100-125	229,00
			125-150	315,00
			150-175	450,00
			175-200	640,00
			200-225	895,00
5xv.	m.Db.	125-150	125-150	370,00
			150-175	560,00
			175-200	895,00
			200-225	1.340,00
			225-250	1.240,00
6xv.	m.Db.	125-150	250-275	1.540,00
			125-150	370,00
			150-175	560,00
			175-200	895,00
			200-225	1.340,00



Taxus baccata

6xv.	m.Db.	125-150	225-250	1.640,00
			250-275	2.160,00
			275-300	2.600,00
			300-350	3.490,00
			150-175	995,00
6xv.	m.Db.	150-200	175-200	1.270,00
			200-225	1.720,00
			225-250	2.150,00
			250-275	2.670,00
			275-300	3.320,00
			300-350	4.890,00



Taxus baccata

7xv.	m.Db.	200-250	200-225	2.040,00
			225-250	2.540,00
			250-275	3.150,00
			275-300	3.960,00
			300-350	4.890,00
			350-400	6.570,00
			200-225	2.040,00

**Kegel**

4xv.	m.Db./Co.	60- 70	129,50
		70- 80	170,00
		80- 90	222,00
		90-100	291,00
5xv.	m.Db./Co.	100-125	450,00
		125-150	640,00
		150-175	920,00
		175-200	1.240,00

**Kugel**

3xv.	m.B./Co.	25- 30	67,10
		30- 35	93,50
		35- 40	133,00
4xv.	m.Db./Co.	40- 50	170,00
		50- 60	275,00
		60- 70	400,00
		70- 80	695,00
5xv.	m.Db./Co.	80- 90	945,00
		90-100	1.320,00
		100-110	1.540,00
6xv.	m.Db./Co.	110-120	2.160,00
		120-130	2.830,00

**Würfel**

4xv.	m.Db./Co.	45- 50	247,00
		50- 55	365,00
		55- 60	495,00
		60- 70	670,00
5xv.	m.Db./Co.	70- 80	870,00
		80- 90	1.115,00
		90-100	1.440,00
6xv.	m.Db./Co.	100-110	1.990,00
		110-120	2.400,00
		120-130	2.970,00

**baccata 'Aureovariegata', Goldgelbe Strauch-Eibe**

Höhe: 4-5 (-8) m

Wuchs: breit ausladend, dichtbuschig

Nadeln: kräftig gelb; linealisch


Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	41,10
		50- 60	54,60

**Solitär**

4xv.	m.B./Co.	60- 70	74,30
		70- 80	114,00
		80-100	161,00



Taxus baccata - Formen




Taxus baccata



Taxus baccata - Würfel



Taxus baccata 'Aureovariegata'



Taxus baccata 'Dovastoniana'

**baccata 'Dovastoniana', Adlerschwinge-Eibe**

- Höhe: aufrechte Form 6-8 m; breitbuschige Form bis 2 m  
 Wuchs: breit kegelförmig oder flach ausgebreitet  
 Nadeln: dunkelgrün; linealisch  
 Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	60- 70	46,50
		70- 80	52,00
4xv.	m.Db.	80-100	76,00
		100-125	130,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	125-150	229,00
		150-175	325,00
		175-200	510,00
6xv.	m.Db.	125-150	1.050,00
		200-225	1.430,00



Taxus baccata 'Dovastoniana'

**baccata 'Dovastonii Aurea',  
Gelbe Adlerschwinge-Eibe**

- Höhe: aufrechte Form 4-6 m, breitbuschige Form bis 2 m  
 Wuchs: breit kegelförmig oder flach ausgebreitet  
 Nadeln: grün mit tiefgelbem Rand; linealisch  
 Frucht: kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

**aufrecht gezogen**

3xv.	m.B./Co.	50- 60	47,90	43,00
		60- 70	55,20	49,90
		70- 80	72,00	
4xv.	m.B.	80-100	128,60	
		100-125	159,50	

**Solitär**

5xv.	m.Db.	125-150	268,00
		150-175	410,00
		175-200	620,00



Taxus baccata 'Dovastonii Aurea'

Taxus baccata  
'Dovastonii Aureovariegata'

**baccata 'Fastigiata', Säulen-Eibe**

Höhe: 4-7 m

Wuchs: geschlossen säulenförmig, später vasenähnlich

Nadeln: schwarzgrün; radial stehend; sichelförmig gekrümmt

Frucht: weibliche Form kugelig; dunkelroter, fleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig; reich fruchtend

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	30-40	29,90	26,20
		40-50	37,60	32,20
		50-60	45,30	39,90
		60-70	61,60	54,50
4xv.	m.B./Co.	70-80	84,15	74,40
		80-90	106,50	94,00
		90-100	128,15	114,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	100-120	231,00	
		120-140	305,00	
		140-160	462,00	
6xv.	m.Db.	160-180	660,00	
		180-200	929,50	
		200-225	1.298,00	
7xv.	m.Db.	225-250	1.859,00	
		250-275	2.440,00	

**baccata 'Fastigiata Aureomarginata',****Gelbe Säulen-Eibe**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: schmal säulenförmig, später vasenähnlich

Nadeln: grün, goldgelb gerandet


Frucht: bei weiblicher Form kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig


3xv.	m.B./Co.	30-40	39,90	35,30
		40-50	48,10	43,00
		50-60	57,60	51,00
4xv.	m.B./Co.	60-70	72,50	64,10
		70-80	86,50	77,00
		80-90	120,00	105,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	90-100	194,00	
		100-120	276,00	
		120-140	355,00	
		140-160	495,00	
6xv.	m.Db.	160-180	640,00	
		180-200	865,00	



Taxus baccata 'Fastigiata'



Taxus baccata 'Fastigiata'



Taxus baccata 'Fastigiata'



Taxus baccata 'Fastigiata Aureomarginata'

**baccata 'Fastigiata Robusta',** Schmale Säulen-Eibe

Höhe: bis 8 m

Wuchs: straff säulenförmig, senkrecht aufgerichtete Äste

Nadeln: stumpf frischgrün; radial stehend

Frucht: weibliche Form kugelig; dunkelroter, fleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

Sonstiges: frosthärter als *Taxus baccata* 'Fastigiata'

3xv.	m.B./Co.	30- 40	29,90	26,20
		40- 50	37,60	32,20
		50- 60	45,30	39,90
		60- 70	61,60	54,50
4xv.	m.B./Co.	70- 80	84,15	74,40
		80- 90	106,50	94,00
		90-100	128,15	114,00

**Solitär**

5xv.	m.Db.	100-120	231,00
		120-140	305,00
		140-160	462,00
6xv.	m.Db.	160-180	660,00
		180-200	929,50
		200-225	1.298,00
		225-250	1.859,00
250-275	2.440,00		

**baccata 'Nissens Corona',** Kronen-Eibe

Synonym: T. b. 'Aprather Typ 1'

Höhe: 1 m

Wuchs: dichtbuschig, flach ausgebreitet, etwa fünfmal so breit wie hoch

Nadeln: Austrieb bronze, später hellgrün; linear

Frucht: selten

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtsattig

Sonstiges: sehr frosthart und gesund

**baccata 'Nissens Präsident',** Flügel-Eibe

Synonym: T. b. 'Aprather Typ 3'

Höhe: 1,5-2 m


Wuchs: locker, trichterförmig, etwa dreimal so breit wie hoch

Nadeln: Austrieb hellgrün, später dunkelgrün; linear

Frucht: selten

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich; sonnig bis lichtsattig


Sonstiges: sehr frosthart und gesund



Taxus baccata 'Nissens Corona'



Taxus baccata 'Nissens Corona'



Taxus baccata 'Nissens Präsident'

	Stamm- umfang	Größe in cm	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.	
			1 Stück	ab 10 Stück ab 50 Stück
	m.B./Co.	30- 40	31,50	28,00
		40- 50	43,00	38,00
3xv.	m.B./Co.	50- 60	60,00	53,00
		60- 70	80,50	70,50
		70- 80	108,50	

**Solitär**

4xv.	m.B.	80-100	204,00	
		100-125	210,00	
		125-150	470,00	
5xv.	m.Db.	150-175	683,00	
		175-200	952,00	

**baccata 'Overeynderi', Kegel-Eibe**

Höhe: 4-5 m

Wuchs: dicht geschlossen, kegelförmig

Nadeln: schwarzgrün; linear; spitz

Frucht: selten

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis lichtschattig

3xv.	m.B.	40- 50	32,90	29,00
		50- 60	39,50	34,60
		60- 70	45,50	42,00

**Solitär**

4xv.	m.B.	70- 80	66,50	
		80-100	96,00	
		100-125	181,50	
5xv.	m.Db.	125-150	294,50	
		150-175	407,00	
6xv.	m.Db.	80-100	175-200	705,00
		200-225	930,00	

**baccata 'Repandens', Kissen-Eibe, Tafel-Eibe**

Höhe: bis 50 cm

Wuchs: niedrig, dichtbuschig, kissenförmig

Nadeln: tiefgrün; sichelförmig gebogen

Frucht: selten; kugelig; rotfleischiger Arillus;  
nur der Samen ist giftigStandort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich,  
Kalk liebend; lichtschattig bis halbschattig

Sonstiges: extrem robust und schattenverträglich

	m.B./Co.	20- 25	23,50	21,00
		25- 30	27,00	24,00
		30- 40	32,20	28,50
3xv.	m.B.	40- 50	49,50	
		50- 60	59,90	
		60- 70	79,00	




Taxus baccata 'Overeynderi'



Taxus baccata 'Overeynderi'



Taxus baccata 'Repandens'



→ Taxus baccata 'Repandens'



Taxus baccata 'Washingtonii'

→ **baccata 'Repandens'****Solitär**

4xv.	m.B.	70- 80 80-100	132,00 193,00
5xv.	m.Db.	100-125 125-150	335,00 530,00

**baccata 'Washingtonii', Strauch-Eibe Washingtonii**

Höhe: 2-3 m

Wuchs: dichtbuschig, abgeflacht rundlich

Nadeln: grünlich gelb, gelb gerandet; im Winter bronze; sichelförmig nach oben gekrümmt

Frucht: selten; kugelig; roter Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig



Taxus baccata 'Washingtonii'

	m.B./Co.	30- 40 40- 50	39,50 49,00	35,00 43,50
3xv.	m.B.	50- 60 60- 70	60,00 72,00	54,00

**Solitär**

4xv.	m.B.	70- 80 80-100	110,00 167,00
5xv.	m.Db.	100-125 125-150 150-175	257,50 380,00 561,00

**cuspidata 'Nana', Japanische Zwerg-Eibe**

Höhe: 1-2 m

Wuchs: unregelmäßig, flach ausgebreitet, später breit ausladend

Nadeln: mattgrün; kurz; linear; kurz zugespitzt; radial stehend

Frucht: selten; kugelig; roter Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig



Taxus cuspidata 'Nana'

	m.B./Co.	25- 30 30- 40	30,00 42,00	26,50 37,50
3xv.	m.B./Co.	40- 50 50- 60	50,20 64,50	44,50 57,00

**Solitär**

4xv.	m.B.	60- 70 70- 80 80-100	89,00 129,50 179,00
5xv.	m.Db.	100-125 125-150 150-175	275,00 410,00 620,00



Taxus cuspidata 'Nana'

**media 'Hicksii', Fruchtende Becher-Eibe**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: breit säulenförmig, später annähernd trichterförmig

Nadeln: dunkelgrün; glänzend; radial; an Seitentrieben zweizeilig stehend

Frucht: bei weiblicher Form kugelig; rotfleischiger Arillus; nur der Samen ist giftig

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; licht- bis halbschattig

m.B./Co.	30- 40	20,30	18,00	16,00
	40- 50	25,30	22,30	20,50
	50- 60	32,20	28,50	
3xv.	60- 70	39,00	35,00	
	70- 80	57,00	50,50	
	80-100	91,50	82,00	

**Solitär**

4xv.	m.B./Co.	100-125	147,00	
4xv.	m.Db.	125-150	252,00	
		150-175	311,50	
		175-200	460,00	
5xv.	m.Db.	80-100	175-200	615,00
		200-225	875,00	
5xv.	m.Db.	100-125	200-225	1.150,00
		225-250	1.350,00	

**media 'Hilli', Nichtfruchtende Becher-Eibe**

Höhe: 3-5 m

Wuchs: buschig kegelförmig; dichte, aufrecht strebende Zweige

Nadeln: hellgrün; glänzend; 2 cm lang

Frucht: keine


Standort: frisch bis feucht, durchlässig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis absonnig

Sonstiges: stadtklimafest; frosthart; widerstandsfähig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	32,90	29,00
		50- 60	40,00	35,50
		60- 70	48,50	43,50
		70- 80	67,00	60,00
4xv.	m.B./Co	80-100	100,00	
		100-125	181,50	
		125-150	285,00	

**Solitär**

5xv.	m.Db.	80-100	150-175	495,00
		175-200	705,00	
		200-225	930,00	



Taxus media 'Hicksii'



Taxus media 'Hicksii'




Taxus media 'Hilli'



**THUJA - Cupressaceae - LEBENSBAUM**

**occidentalis, Abendländischer Lebensbaum**

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: kegelförmig, später breiter und abgerundet  
 Nadeln: schuppenförmig; dachziegelartig angeordnet; grün, im Winter bronze; aromatisch riechend  
 Rinde: rotbraun; Borke in Streifen ablösend  
 Blüte: April bis Mai; einhäusig; männliche Blüte gelblich, weibliche Blüte unscheinbar  
 Zapfen: schmal elliptisch; grün; zur Reife im Herbst hellbraun  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: Lebenserwartung über 1500 Jahre



Thuja occidentalis



Thuja occidentalis



Thuja occidentalis



Thuja occidentalis 'Brabant'

	m.B./Co.	60-80	19,00	17,00	15,50
		80-100	25,00	18,60	16,90
		100-125	31,60	27,90	25,30
3xv.	m.B./Co.	125-150	57,60	50,90	
		150-175	74,30	65,70	
		175-200	101,50	89,50	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	189,00		
		225-250	298,00		
		250-275	450,00		
5xv.	m.Db.	275-300	715,00		
		300-350	990,00		
		350-400	1.390,00		
		400-450	1.940,00		

**occidentalis 'Brabant', Lebensbaum 'Brabant'**

- Höhe: 13-18 m  
 Wuchs: kegelförmig; dicht verzweigt; durchgehender Hauptstamm  
 Nadeln: schuppenförmig; dachziegelartig angeordnet; frischgrün; im Winter nicht verfärbend  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich, lehmig; sonnig bis halbschattig  
 Sonstiges: hervorragende Heckenpflanze

	m.B./Co.	60-80	17,90	15,80	14,50
		80-100	22,30	19,70	17,90
		100-125	33,30	29,40	26,70
3xv.	m.B.	125-150	57,60	50,90	
		150-175	74,30	65,70	
		175-200	101,50	89,50	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	198,00		
		225-250	310,00		

**occidentalis 'Columna', Säulen-Lebensbaum**

Höhe: 5-8 (-10) m

Wuchs: schmal säulenförmig

Nadeln: schuppenförmig; dunkelgrün; glänzend, auch im Winter

Zapfen: selten

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, Kalk liebend, nährstoffreich, lehmig;  
sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	40-60	19,50	17,20	15,60
		60-80	25,50	22,50	20,40
		80-100	32,40	28,60	26,00
3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,70	
		125-150	74,30	65,70	
		150-175	116,50	103,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	175-200	152,00		
		200-225	216,00		
		225-250	310,00		
5xv.	m.Db.	250-275	460,00		
		275-300	695,00		
		300-350	1.020,00		
6xv.	m.Db.	350-400	1.430,00		
		400-450	1.980,00		
		450-500	2.760,00		



Thuja occidentalis 'Brabant'



Thuja occidentalis 'Columna'

**occidentalis 'Smaragd', Lebensbaum 'Smaragd'**

Höhe: 4-6 m

Wuchs: gleichmäßig, spitz kegelförmig

Nadeln: glänzend frischgrün, auch im Winter

Zapfen: selten

Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
sonnig bis halbschattig

	m.B./Co.	30-40	13,40	11,85	10,75
		40-60	17,90	15,80	14,55
		60-80	23,60	20,80	18,90
		80-100	29,90	26,40	24,00
3xv.	m.B.	100-125	50,60	44,10	
		125-150	74,30	65,70	
		150-175	116,50	103,00	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	175-200	175,00		
		200-225	254,00		
		225-250	370,00		
5xv.	m.Db.	250-275	560,00		
		275-300	845,00		
		300-350	1.240,00		



Thuja occidentalis 'Smaragd'



Thuja occidentalis 'Smaragd'



Thuja occidentalis 'Sunkist'

**occidentalis 'Sunkist', Lebensbaum 'Sunkist'**

Höhe: 3-5 m  
 Wuchs: gleichmäßig kegelförmig  
 Nadeln: goldgelb, im Winter bronzefarben  
 Zapfen: selten  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	40- 50	19,70	17,50
		50- 60	25,30	22,20
		60- 70	41,80	36,50
		70- 80	58,50	53,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	80-100	77,60
		100-125	106,20
5xv.	m.Db.	125-150	138,50
		150-175	182,00
		175-200	237,50



Thuja occidentalis 'Tiny Tim'

**occidentalis 'Tiny Tim', Lebensbaum 'Tiny Tim'**

Höhe: 0,6-1 m  
 Wuchs: kugelförmig, rundlich  
 Nadeln: frischgrün, im Winter bronzefarben  
 Zapfen: selten  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, lehmig, nährstoffreich, Kalk liebend;  
 sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B./Co.	15- 20	11,10	9,80
		20- 25	13,00	11,50
3xv.	m.B./Co.	25- 30	17,90	
		30- 40	22,30	
		40- 50	29,20	



Thuja occidentalis 'Tiny Tim'

**orientalis 'Pyramidalis Aurea', Gelber Orientalischer Säulen-Lebensbaum**

Höhe: 3-4 m; in der Heimat bis 6 m  
 Wuchs: schmal säulenförmig; kurze, dicht verzweigte Äste und Zweige  
 Nadeln: schuppenförmig; intensiv goldgelb; dicht; im Winter nicht verfärbend  
 Standort: mäßig trocken bis feucht; schwach sauer bis alkalisch; leichte Böden bevorzugend

Sonstiges: Winterschutz ratsam

3xv.	m.B.	60- 80	40,10	35,40
		80-100	54,60	48,30
		100-125	78,90	69,50

**Solitär**

4xv.	m.Db.	125-150	129,50
		150-175	198,00
		175-200	247,00

**plicata 'Atrovirens', Grüner Lebensbaum**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: kegelförmig

Nadeln: schuppenförmig; derb; tiefgrün; glänzend; aromatisch riechend

Zapfen: eirundlich; grün, zur Reife im Herbst hellbraun

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig

m.B./Co.	60- 80	17,90	15,80	14,50
	80-100	22,30	19,70	17,90
	100-125	33,30	29,40	26,70
3xv. m.B.	125-150	57,60	50,90	
	150-175	74,30	65,70	
	175-200	101,50	89,50	

**Solitär**

4xv. m.Db.	200-225	198,00		
	225-250	310,00		
	250-275	470,00		

**plicata 'Aurescens', Großer Goldspitzen-Lebensbaum**Synonym: *T. gigantea* 'Aurescens'

Höhe: 8-12 m; in der Heimat bis 15 m

Wuchs: spitz bis breit kegelförmig; dicht; raschwüchsig; bis auf den Boden beaset

Nadeln: schuppenförmig; glänzend; Triebspitzen grünlich gelb, später weißlich gestreift

Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden, jedoch nicht trocken; sonnig bis lichtschantig

Sonstiges: Stadtklima- und windfest; frosthart

m.B./Co.	60- 80	17,90	15,80	14,50
	80-100	22,30	19,70	17,90
	100-125	33,30	29,40	26,70
3xv. m.B.	125-150	57,60	50,90	
	150-175	74,30	65,70	
	175-200	101,50	89,50	

**Solitär**

4xv. m.Db.	200-225	198,00		
	225-250	310,00		
	250-275	470,00		

**plicata 'Excelsa', Großer Lebensbaum**

Höhe: 10-15 m

Wuchs: gleichmäßig kegelförmig


Nadeln: schuppenförmig; extrem dick und derb; dunkelgrün; glänzend; dachziegelartig angeordnet; aromatisch riechend

Zapfen: eirund; grün, zur Reife im Herbst hellbraun


Standort: weite Standortamplitude, alle Kulturböden; sonnig bis lichtschantig



Thuja plicata 'Atrovirens'



Thuja plicata 'Atrovirens'



Thuja plicata 'Atrovirens'



Thuja plicata 'Aurescens'



Thuja plicata 'Excelsa'

→ plicata 'Excelsa'

m.B./Co.		60-80	17,90	15,80	14,50
		80-100	22,30	19,70	17,90
		100-125	33,30	29,40	26,70
3xv.	m.B.	125-150	57,60	50,90	
		150-175	74,30	65,70	
		175-200	101,50	89,50	

**Solitär**

4xv.	m.Db.	200-225	198,00		
		225-250	310,00		
		250-275	470,00		
5xv.	m.Db.	275-300	695,00		
		300-350	990,00		
		350-400	1.390,00		
6xv.	m.Db.	400-450	1.970,00		
		450-500	2.680,00		



Thuja plicata 'Excelsa'

**Hochstamm**

4xv.	m.Db.	16- 18	575,00		
		18- 20	750,00		
		20- 25	1.050,00		
5xv.	m.Db.	25- 30	1.640,00		
		30- 35	2.290,00		
		35- 40	2.980,00		
6xv.	m.Db.	40- 45	4.070,00		
		45- 50	5.900,00		

**THUJOPSIS - Cupressaceae - HIBA**

**dolabrata**, Breitblättriger Lebensbaum, Hiba-Lebensbaum

Höhe: 4-10 m, in der Heimat 30-35 m

Wuchs: breit kegelförmig

Nadeln: schuppenförmig; glänzend grün, unterseits weißfleckig; dickledrig; im Winter leicht bronzefarbig

Zapfen: breit eiförmig; blaugrün, zur Reife im Winter braun

Standort: frisch bis feucht, tiefgründig, durchlässig, humos, mäßig kalkverträglich; sonnig bis lichtschatig

	m.B./Co.	30- 40	43,30		
3xv.	m.B.	40- 50	54,60		
		50- 60	75,00		
		60- 80	101,50		



Thujaopsis dolabrata

**TSUGA - Pinaceae - HEMLOCKTANNE,  
SCHIERLINGSTANNE****canadensis**, Kanadische Hemlocktanne

- Höhe: 15-20 m  
 Wuchs: breit kegelförmig, später ausladender und lockerer  
 Nadeln: dunkelgrün; glänzend; unterseits mit zwei weißen Stomata-Linien; linealisch; abgerundet; zweizeilig stehend  
 Rinde: Triebe gelblich; behaart  
 Zapfen: rundlich bis eiförmig; kurz gestielt; hellbraun  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

3xv.	m.B.		80-100	66,50	59,00
			100-125	76,00	67,00
			125-150	95,00	84,00

**Solitär**

4xv.	m.Db.	100-125	125-150	120,00	175,00
5xv.	m.Db.	125-150	175-200	341,50	472,50
			200-250		
5xv.	m.Db.	150-200	175-200	535,00	810,00
			200-250		
			250-300	1.255,00	

**canadensis 'Nana'**, Kissen-Hemlocktanne

- Höhe: 80-100 cm  
 Wuchs: kompakt, halbkugelig, oft nestförmig  
 Nadeln: dunkelgrün; glänzend; kurz; zweizeilig  
 Zapfen: selten  
 Standort: frisch bis feucht, durchlässig, humos, nahrhaft, Kalk liebend; sonnig bis halbschattig

	m.B./Co.		20- 25	15,30	13,50
			25- 30	19,00	16,80
3xv.	m.B./Co.		30- 40	27,70	24,50
			40- 50	45,60	40,30




Tsuga canadensis



Tsuga canadensis



Tsuga canadensis



Tsuga canadensis 'Nana'





Obstgehölze





Eine genaue Beschreibung der Obstsorten und -arten können Sie unserem Planungshelfer II für Stadtgrün, Garten und Landschaft „Obstbäume in der Verwendung“ entnehmen.

## Actinidia chinensis - Actinidiaceae - Kiwi, Chinesischer Strahlengriffel

Die chinesische Stachelbeere ist vor allem wegen ihres hohen Vitamin C-Gehaltes beliebt. Wichtige Anbauggebiete befinden sich heute in Neuseeland und Italien. Bei uns gedeihen Kiwis am besten im Weinbauklima. Da die Früchte erst im Oktober bis November ausreifen, können Frühfröste den Ertrag schmälern. Kiwis sind zweihäusig - man rechnet für eine ausreichende Befruchtung eine männliche auf acht weibliche Pflanzen.

Co. 60-100 28,00 24,50

## Actinidia chinensis, deliciosa, arguta -Kiwi, Kiwibeere

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Jenny	walnussgroß, mittel- bis dunkelbraun, behaart	Küchen-/Tafelobst	selbstfruchtbar
Hayward	groß, dunkelbraun, behaart	Tafelobst	weiblich
Issai	stachelbeergroß, glatte Schale	Küchen-/Tafelobst	selbstfruchtbar
Weiki	walnussgroß, glatte Schale	Tafelobst	zweihäusig

Co. 60-100 34,20 30,20

## Castanea sativa - Fagaceae - Marone; Esskastanie

Synonym: *C. vesca*

### 'Doree de Lyon', Esskastanie 'Doree de Lyon'

Die Esskastanien lieben heiße Sommer und reagieren leicht empfindlich auf strenge Fröste. Die Bodenansprüche sind für alle Arten und Sorten deckungsgleich: optimal sind gut durchlässige, lehmige, frische, nährstoffreiche Böden, die einen pH-Wert unter 6,3 aufweisen.

Die als Maronen bekannten Früchte sind voller gesundheitsfördernder Inhaltsstoffe und ein Hausmittel gegen Durchfall. Ihre reichliche Nektar- und Pollenproduktion macht sie zu einer Trachtpflanze für Hummeln und Bienen. Die Sorte 'Doree de Lyon' stammt aus einer französischen Sämlingsselektion und ist in Südostfrankreich verbreitet. Sie ist selbstunfruchtbar, schwächer wachsend als die Art, frühreifend, mit goldgelbem Fruchtfleisch.

### verpflanzte Heister

m.B./Co. 150-200 86,50  
200-250 107,50

### Hochstamm

m.B./Co 8- 10 216,00  
10- 12 315,00



Kiwi - Actinidia chinensis



Kiwi - Actinidia chinensis



Esskastanie - Castanea sativa



Esskastanie - Castanea sativa

Haselnuss - Corylus avellana  
'Hallesche Riesennuss'

→ Marone; Esskastanie

**Hochstämme**

3xv.	m.Db.	12- 14	430,00
		14- 16	620,00
		16- 18	865,00
		18- 20	1.210,00
4xv.	m.Db.	20- 25	1.590,00
		25- 30	2.100,00

**Corylus avellana - Betulaceae - Haselnuss****Großfrüchtige Sorten**

Die Haselnuss-Kultursorten stellen einerseits gewisse Ansprüche an den Boden, der tiefgründig und mäßig feucht sein sollte, andererseits sind sie pH-Wert-tolerant. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Befruchtung sollte man immer verschiedene Sorten benachbarn. Die Kultursorten können durchaus den Platz von Corylus avellana übernehmen, wenn neben ästhetischen Aspekten auch der Nutzen von Interesse ist.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Größe / Breite
Cosford	rundlich, hellbraun	500-700 x 200-300 cm
Hallesche Riesennuss	sehr groß, breit kegelförmig	500-700 x 200-300 cm
Nottingham Fruchtbare	rundlich, bis 2 cm	500-700 x 150-250 cm
Rotblättrige Lambertnuss	mittel, länglich, rot	500-700 x 400-500 cm
Rotblättrige Zellernuss	mittel, länglich, dunkel	400-600 x 150-200 cm
Webbs Preisnuss	groß, länglich, hell	300-600 x 150-250 cm
Wunder aus Bollweiler	sehr groß, breit kegelförmig	300-500 x 150-250 cm

Haselnuss - Corylus avellana  
'Rotblättrige Lambertnuss'

Corylus avellana

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100	22,30	19,70	17,30
4 Tr.	o.B.	100-150	30,70	27,10	24,60
	Co.	60-100	26,20	23,10	

**Solitär**

3xv.	m.B.	100-125	80,50	70,90
		125-150	104,00	92,00
4xv.	m.B.	150-200	137,00	121,00
		200-250	179,00	158,00



Quitte - Cydonia Apfelquitte

**Cydonia, Mespilus - Rosaceae - Quitte, Mispel**

Quitten haben ähnliche Bodenansprüche wie Birnen. Sie sind typische Verarbeitungsfrüchte, die zur Herstellung von Saft, Gelee und Marmelade genutzt werden.

Mispeln sind verhältnismäßig standorttolerant. Ob trocken oder feucht, sonnig bis halbschattig, die Mispel zeigt sich anpassungsfähig und pflegeleicht. Wie Quitten wird sie zur Herstellung von Gelees und Marmeladen genutzt. Zudem dient sie als Aromageber für Weine und Branntweine.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Bereczki-Birnenquitte	groß, breit birnenförmig	Küchenobst	
Konstantinopeler Apfelquitte	groß, apfelförmig	Küchenobst	starkwulstig
Portugiesische Birnenquitte	groß, birnenförmig	Küchenobst	leichte Wolle
Holländische Riesenmispel	groß, rund, rau	Küchenobst	

**Büsche, zweijährig**

o.B.	35,10	31,00
Co.	41,10	36,30

**Halbstämme**

2xv.	o.B.	ab 6 cm	38,00	33,60
	Co.	ab 6 cm	46,40	41,60

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7- 8	57,60	50,90
		8- 10	68,90	60,90
Co.		7- 8	120,00	
		8- 10	170,00	
3xv.	m.Db.	12- 14	345,00	
		14- 16	495,00	
		16- 18	715,00	
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.320,00	



Quitte - Cydonia Birnenquitte

Mespilus Germanica  
'Holländische Riesenmispel'**HIPPOPHAE - Elaeagnaceae - SANDDORN**

Die Sanddorn-Kultursorten stellen wenig Ansprüche an ihren Standort, bevorzugen aber einen durchlässigen, mäßig trockenen bis frischen Boden in sonniger bis halbschattiger Lage. Zudem sind sie salztolerant. Im Vergleich zur wilden Form sind die Kultursorten weniger bedornt, was die Ernte erleichtert. Um möglichst viele der saftigen, orangefarbenen Beeren ernten zu können, die auch Zitronen des Nordens genannt werden, empfiehlt es sich neben den weiblichen Pflanzen mindestens eine männliche Pflanze zu setzen. Die Pflanzen erreichen eine Größe zwischen 3 und 4 Meter. Ein ausgezeichnetes Gehölz als Nahrungsquelle für Insekten und Vögel.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Hergo	zahlreich, mittelgroß, hellorange	Küchenobst	weiblich, leicht lösend
Leikora	zahlreich, groß, orange	Küchenobst	weiblich
Pollmix	keine, da männlich	Befruchtersorte	

**verpflanzte Sträucher**

C 3	60-100	17,10
-----	--------	-------

**Solitär**

3xv.	m.Db.	125-150	89,00
		150-200	129,00
		200-250	184,00

Sanddorn - Hippophae  
rhamnoides 'Hergo'Sanddorn - Hippophae  
rhamnoides 'Leikora'



Walnuss - Juglans regia 'Saturn'

## Juglans regia und Veredlungen- Juglandaceae - Walnuss

Walnüsse bevorzugen tiefgründige und nährstoffreiche Standorte. Aufgrund ihrer Blütezeit sind Spätfrostlagen zu vermeiden. Zwar ist bis zur Ertragsreife eines Walnussbaumes etwas Geduld notwendig; ab dem 10. bis 15. Lebensjahr sind dann aber nennenswerte Erträge erzielbar, die viele Jahrzehnte andauern können. Legt der Verwender Wert auf klar definierte Fruchtigenschaften und/oder ist der Raum begrenzt, sollte nach Veredlungen von Edelsorten gefragt werden.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Größe	Sonstiges
Apollo	groß, rundoval	10-15 m	selbstfruchtbar
Franquette	kegelförmig	12-15 m	lang haftende Früchte
Jupiter	groß, länglich	15-20 m	regelmäßiger Ertrag
Lake	groß, oval	15-20 m	extrem frosthart
Mars	groß, oval	10-15 m	stark ölhaltig
Parisiene	kegelförmig	12-18 m	hoher Fettanteil
Seifersdorfer Runde	kugelig	4-8 m	glatte Schale
Saturn	groß, rund	15-20 m	absolut frosthart

### verpflanzte Heister, Veredlungen

Co.	150-200	86,50
	200-250	107,50

### Hochstamm, Veredlungen

3xv.	m.Db.	10- 12	298,00
		12- 14	430,00
		14- 16	620,00
		16- 18	865,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.210,00
		20- 25	1.590,00
		25- 30	2.100,00

Walnuss - Juglans regia  
'Franquette'

Walnuss - Juglans regia 'Mars'

Walnuss - Juglans regia,  
männliche Blüten

## Malus - Rosaceae - Apfel

Aufgrund seiner guten Verwendbarkeit und Lagerfähigkeit ist der Apfel weltweit eine der wichtigsten Obstarten. Die meisten Kultursorten sind in Deutschland für einen Anbau bis auf Höhen von 600 Metern gut geeignet, wobei spätfrostgefährdete Lagen zu meiden sind. Lagen mit einer ausgeprägten Temperaturkurve zwischen den Herbsttagen und -nächten bieten die Gefahr einer wenig ausgeprägten Fruchtausfärbung.

Die Bodenansprüche stehen bei allen Kulturäpfeln im Zusammenhang mit der verwendeten Unterlage. Schwach wachsende Unterlagen beeinflussen Fruchttrag und -qualität positiv, verlangen aber dementsprechend bessere Böden. Streuobst-Sorten auf Sämlingen erreichen im Allgemeinen nicht die Fruchtgröße von Edelsorten, zeigen sich aber wesentlich robuster und anspruchsloser.

Sortenname	Fruchtfarbe	Verwendung	Geschmack
Alkmene	goldgelb/ ziegelrot gestreift	Tafelobst	zart säuerlich, aromatisch
Ananasrenette	goldgelb	Most-/Tafelobst	fruchtig, würzig
Baumanns Renette	leuchtend rot	Most-/Tafelobst	angenehm säuerlich
Bäumchensapfel	grün/orange rötlich	Mostapfel	wenig Säure
Biesterfelder Renette	grüngelb/rot	Tafelobst	würzig, sehr aromatisch
Bittenfelder Sämling	grün	Mostapfel	saftig, säuerlich
Brettacher	hellbraunrot	Mostapfel	fruchtig herb
Danziger Kantapfel	kräftig rot	Most-/Küchen-/ Tafelobst	milde Säure
Discovery	gelbgrün/orangerot	Tafelobst	knackig, süß
Dülmener Herbstrosenapfel	gelblich grün/rötlich gelb	Küchen-/Tafelobst	säuerlich, aromatisch
Eifeler Rambour	grünlich gelb mit rot	Most-/Tafelobst	mittlerer Säuregehalt
Elstar	gelb/intensiv rot	Tafelobst	mild säuerlich, edel
Engelsberger Renette	gelb	Mostobst	ausgeglichen sauer
Erbachhofer Weinapfel	kräftig rotgestreift	Mostobst	würzig
Florina	dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	süß säuerlich
Freiherr von Berlepsch	goldgelb/rot	Tafelobst	aromatisch, wein säuerlich
Gala	gelb/leuchtend rot	Tafelobst	süß, aromatisch, saftig
Geheimrat Dr. Oldenburg	grün/gelb/orangerot	Tafelobst	mild säuerlich
Gelber Bellefleur	zitronengelb	Tafelobst	bananenähnlich
Gelber Edelapfel	gelb	Most-/Küchen-/ Tafelobst	saftig, sauer
Gewürzluikenapfel	gelb/rot marmoriert	Most-/Küchen-/ Tafelobst	saftig säuerlich
Gloster 69	kräftig dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	aromatisch feine Säure
Golden Delicious	grüngelb	Tafelobst	süß, aromatisch, saftig
Goldparmäne	gelbrot	Tafelobst	muskatartig, süß



Apfel - Malus 'Bittenfelder Sämling'



Apfel - Malus 'Braeburn'



Apfel - Malus 'Ley's Roter Cox'



Apfel - Malus 'Danziger Kantapfel'



Apfel - Malus 'Elstar'



Apfel - Malus 'Gala'

Apfel - Malus  
'Geheimrat Dr. Oldenburg'

Apfel - Malus 'Gewürzluiken'

Sortenname	Fruchtfarbe	Verwendung	Geschmack
Goldrenette von Blenheim	goldgelb/rot	Tafelobst	renettenartig, würzig, aromatisch
Graue Herbstrenette	grünbraun	Küchen-/Tafelobst	wein säuerlich, würzig, schmackhaft
Idared	grünlich gelb, flächig dunkelrot	Tafelobst	fein säuerlich
Ingrid Marie	gelb/kräftig rot	Küchen-/Tafelobst	fein säuerlich
Jakob Fischer	hellgelb	Tafelobst	saftig, fein säuerlich
Jakob Lebel	hellgelb/orangerot	Most-/Küchen-/ Tafelobst	angenehme Säure
Jamba 69	gelblich grün/leuch- tendrot	Tafelobst	saftig, fein säuerlich
James Grieve	gelb/rot	Tafelobst	saftig, säuerlich
Jonagold	grüngelb/flächig karminrot	Tafelobst	süß, saftig
Kaiser Wilhelm	gelber Grund, intensiv gerötet	Most-/Küchen-/ Tafelobst	würzig, wenig Säure
Kardinal Bea	dunkelrot mit grün	Küchenobst	süßsauer, angenehme Säure
Landsberger Renette	hellgelb/gerötet	Most-/Tafelobst	leicht aromatisch, saftig
Ley's Roter Cox	gelblich, intensivrot	Küchen-/Tafelobst	süß aromatisch, saftig
Luxemburger Renette	gelblich grün	Most-/Tafelobst	renettenartig würzig
Luxemburger Triumph	grün-gelb mit rot	Küchenobst	starkwürzig
Melrose	gelb/bläulich rot	Küchen-/Tafelobst	süß, fruchtig, aromatisch
Öhringer Blutstreifling	rot mit gelb	Most-/Küchenobst	geringe Säure
Ontarioapfel	gelb/violettrot	Tafelobst	süß säuerlich
Pilot	gelb/orangerot	Tafelobst	säuerlich süß
Pinova	zinnoberrot	Tafelobst	saftig, fest
Piros	leuchtendrot	Tafelobst	fein säuerlich
Prinz Albrecht von Preussen	grün gelb mit rot	Most-/Küchen-/ Tafelobst	saftig, süßsauer
Prinzenapfel	gelb/kräftig gerötet	Most-Küchenobst	angenehme Säure, saftig
Purpurroter Cousinot	intensiv rot	Most-/Küchenobst	fest, saftig
Rebella	grüngelb mit rot	Tafelapfel	kräftig, aromatisch süß
Red Topaz	orange/gelblich	Küchen-/Tafelobst	saftig, süß säuerlich
Retina	gelblich/rot	Tafelobst	süß säuerlich
Rhein. Bohnapfel	grünlich gelb/ gerötet	Most-/Küchenobst	säuerlich, saftig
Rheinischer Krummstiel	grüngelb/rot marmoriert	Küchen-/Tafelobst	fein säuerlich, saftig
Rhein. Schafsnase	gelb/rötlich gestreift	Mostobst	säuerlich, nicht würzig

Sortenname	Fruchtfarbe	Verwendung	Geschmack
Rheinischer Winterrambour	grünlich gelb/ gerötet	Most-/Küchen-/ Tafelobst	schwach-süß säuerlich
Riesenboiken	grün mit wenig rot	Most-/Tafelobst	mild säuerlich, mäßig saftig
Rote Goldparmäne	flächig rot	Tafelobst	muskatartig, süß
Rote Sternrenette	dunkelrot	Mostobst	angenehme Säure
Roter Bellefleur	gelb/rot, gestreift	Küchen-/Tafelobst	süßer, würziger Geschmack
Roter Berlepsch	goldgelb/flächig rot	Tafelobst	aromatisch, wein säuerlich
Roter Boskoop	dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	erfrischend, säuerlich
Roter Eiserapfel	rot/bläulich gestreift	Most-/Küchenobst	mäßig saftig
Roter Gravensteiner	rot geflammt	Tafelobst	süßsauer, aromatisch
Roter James Grievé	flächig rot Pollenspender	Küchen-/Tafelobst	saftig, säuerlich
Roter Jonagold	grünlich gelb/flächig karminrot	Tafelobst	süß, saftig, aroma-tisch
Roter Jonathan	grüngelb/dunkelrot	Tafelobst	säuerlich
Roter Trierer Weinapfel	grünlich gelb/bläu- lich rot	Mostobst	starke Säure, hoher Zuckergehalt
Rubinette (Rafzubin)	gelb/leuchtend rot	Tafelobst	süß, vorzügliches Aroma
Rubinola	gelborange	Küchen-/Tafelobst	würzig, leicht säuerlich
Schöner aus Boskoop	grünlich gelb	Küchen-/Tafelobst	säuerlich, saftig
Schöner von Nordhausen	gelb/gerötet	Most-/Küchen-/ Tafelobst	angenehm säuerlich,
Schöner von Wiltshire	hellgelb/gerötet	Küchen-/Tafelobst	zartwürzig
Summerred	dunkel bis braunrot	Tafelobst	saftig, leicht säuerlich
Topaz	grün	Küchen-/Tafelobst	saftig, süß säuerlich
Weißer Klarapfel	gelblich weiß bis hellgelb	Tafelobst	mild säuerlich, saftig
Weißer Winter- glockenapfel	gelb/gerötet	Tafelobst	erfrischend säuerlich
Weißes Seiden- hemdchen	gelblich weiß	Most-/Tafelobst	würzig, zimtartig
Wettringer Taubenapfel	weißlich gelb mit intensiv rot	Most-/Tafelobst	saftig, süß säuerlich
Wiesenapfel	grüngelb/rot	Mostobst	spritzige Säure
Zuccalmaglio- renette	goldgelb/gerötet	Tafelobst	edelwürzig, süß säuerlich



Apfel - Malus 'Ingrid Marie'



Apfel - Malus 'Jakob Lebel'

Apfel - Malus 'Prinz Albrecht von  
Preußen'Apfel - Malus  
'Rheinischer Krummstiel'





Apfel - Malus 'Roter Jonagold'

## → Apfel - Malus 'Fruchtsorten'

**Veredlungen, einjährig**

o.B.	17,50	15,40	14,00
Co.	24,80	21,90	19,90

**Veredlungen, einjährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen**

o.B.	18,50	16,30	14,75
Co.	26,20	23,10	21,00

**Büsche, zweijährig**

o.B.	29,20	25,80	23,40
Co.	38,00	33,60	30,50

**Büsche, zweijährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen**

o.B.	30,70	27,20	24,60
Co.	40,10	35,40	32,10

**Halbstämme**

2xv.	o.B. ab 6 cm	36,00	31,80	28,80
	Co. ab 6 cm	45,60	40,30	36,60

**Schrägalter**

1 Etage Co.	82,50
U-Form Co.	184,00

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7- 8	57,60	50,90
		8- 10	68,90	60,90
Co.		7- 8	120,00	106,00
		8- 10	170,00	150,00

**Hochstämme und Halbstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	241,00	213,00
		12- 14	345,00	305,00
		14- 16	495,00	435,00
		16- 18	715,00	630,00
4xv.	m.Db.	18- 20	970,00	
		20- 25	1.320,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.540,00
		25- 30		1.940,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.910,00
		35- 40		3.580,00
		40- 45		4.410,00



Apfel - Malus 'Rote Sternrenette'



Apfel - Malus 'Pinova'

Apfel - Malus  
'Zuccalmaghiorenette'

## Prunus armeniaca, nucipersica, persica - Rosaceae - Pfirsich, Aprikose, Nektarine

Der Pfirsich wird aufgrund seines hohen Wärmebedarfs vor allem im Weinbauklima angebaut. Der Boden sollte dabei ausreichend feucht und nährstoffreich sein; durchlässige Lössböden gelten als ideal.

Nektarinen und Aprikosen stellen in Bezug auf den Boden etwa die gleichen Ansprüche. Die Wärmebedürftigkeit betreffend sind sie etwas anspruchsloser.

Alle drei Obstarten sind selbstfruchtbar und somit hinsichtlich der Befruchtung problemlos.

Sind die entsprechenden Standortbedingungen gegeben, zählen ihre Früchte zu den köstlichsten Delikatessen.

Sortenname	Frucht	Sonstiges
------------	--------	-----------

### Pfirsich

Amsden	hell- bis dunkelrot, weißfleischig	saftig, würzig
Anneliese Rudolph	gelbgrün, sonnenseits rot, weißfleischig	saftig, fein säuerlich
Benedicte	gelb/rot, groß und süß	resistent gegen Kräuselkrankheit
Früher Roter Ingelheimer	gelb, sonnenseits rot	süß aromatisch,
Kernechter vom Vorgebirge	gelb/rotorange, fest + süß	späte Sorte, hoher Ertrag
Redhaven	karminrot bis orange gelb	saftig, löst gut vom Stein
Rekord von Alfter	gelb, sonnenseits rot	leicht säuerlich, gutes Aroma
Revita	rotbackig auf gelbem Grund	pikant süß, saftig
Roter Weinbergpfirsich	außen und innen rot	der Klassiker; wenig anfällig
South Haven	gelb bis orangerot	kräftig aromatisch, saftig
Plattpfirsich (Ufo)	gelb/rot, wohlschmeckend	wenig Säure, gute Frosthärte

### Aprikose

Bergeron	gelb bis orange, sehr saftig, aber fest	sehr robust, selbstfruchtend
Hargrand	mattorange, fest	Standortsorte für Obstanbau
Heidesheimer Frühe	gelb, sonnenseits gerötet	aromatisch, gut steinlösend
Nancyaprikose	sattgelb, rote Backen	braucht einen geschützten Standort
Ungarische Beste	leuchtend gelb	sehr beliebte Aprikosensorte, gut steinlösend

### Nektarinen

Flavortop	gelb, rot überzogen	warme, geschützte Lagen
Independence	rot, Fruchtfleisch grüngelb	warme, geschützte Lagen



Pfirsich - Prunus persica



Pfirsich - Prunus persica 'Redhaven'



Aprikose - Prunus armeniaca



Nektarine Prunus nucipersica

## → Pfirsich, Aprikose, Nektarine

**Büsche, zweijährig, auf Pflaume**

	o.B.		33,30	29,40	26,70
	Co.		41,20	36,30	33,00

**Halbstämme**

2xv.	o.B.	ab 6 cm	35,10	31,00	28,10
	Co.	ab 6 cm	45,60	40,30	36,60

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7- 8	57,60	50,90	
		8- 10	68,90	60,90	
	Co.	7- 8	120,00	106,00	
		8- 10	170,00	150,00	

Sauerkirsche - Prunus cerasus  
'Schattenmorelle'Süßkirsche - Prunus  
'Büttners Rote Knorpel'Süßkirsche - Prunus  
Dönnissens Gelbe Knorpel'**Prunus avium, cerasus - Rosaceae - Süß-/  
Sauerkirsche**

Vereinfacht lässt sich sagen, dass Sauerkirschen vor allem als Küchenobst Verwendung finden, während Süßkirschen ein delikates Frischobst sind.

Sauerkirschen stellen im Vergleich zu Süßkirschen weniger Ansprüche an Boden und Lage. Selbst auf leichteren Sandböden kann bei einer geeigneten Sorten-Unterlagen-Kombination noch ein erfolgreicher Anbau möglich sein. Aber auch Süßkirschen bleiben mit ihren Standortansprüchen im Rahmen. Sind die Böden durchlässig, lehmhaltig und ausreichend durchlüftet, gedeihen die Edelsorten optimal. Entscheidend für den Ernteerfolg sind jedoch möglichst geringe bis keine Niederschläge während der Erntezeit.

Da fast alle Süßkirschensorten selbst unfruchtbar sind, erhöht eine Sortenmischung die Befruchtungsrate erheblich.

Die Reifetermine der verschiedenen Kirscharten werden in Kirschwochen angegeben, die einen Zeitraum von etwa sieben Wochen (1. bis 7. Kirschwoche) umfassen. Grundlage für diese bewährte Methode ist die Tatsache, dass zwar die Reihenfolge der sortenspezifischen Fruchtreife relativ konstant ist, die absoluten Erntetermine aber regional und Jahrgangsweise schwanken können. Üblicherweise beginnt die 1. Kirschwoche in den Anbaugebieten etwa Mitte Juni.

Sortenname	Frucht- eigenschaft	Verwendung	Sonstiges
<b>Süßkirschen</b>			
Burlat	dunkelrot, fest	Tafelobst	früh, großfruchtig
Büttners Rote Knorpel	gelb/rot	Küchen-/Tafelobst	wertvoll, spät
Dönnissens Gelbe Knorpel	hellgelb, fest	Küchen-/Tafelobst	
Große Prinzessin	gelb/leuchtend rot, fest	Küchen-/Tafelobst	frostempfindlich
Große Schwarze Knorpel	rotbraun bis schwarz, fest	Tafelobst	altbewährt, ertragssicher
Hedelfinger Riesen	braunrot, knackig fest	Tafelobst	groß, transportfest

Sortenname	Frucht- eigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Karina	groß, dunkelrot	Tafelobst	wenig platzanfällig, lange Erntezeit
Kassins Frühe Herzkirsche	braunschwarz, weich	Tafelobst	relativ anspruchslos
Kordia	braunschwarz, fest	Tafelobst	hohe Erträge
Lapins	glänzend rot, fest	Tafelobst	sehr aromatisch, platzfest
Oktavia	rot bis dunkelrot	Tafelobst	würzig aromatisch, platzfest, selbst- fruchtbar
Regina	rotbraun, fest	Tafelobst	sehr groß, platzfest
Sam	rotbraun, fest	Küchen-/Tafelobst	mittelgroß, platzfest
Schneiders Späte Knorpel	dunkelrot, sehr fest	Küchen-/Tafelobst	hervorragender
Sunburst	dunkelrot, mittel- fest	Tafelobst	selbstfruchtbar
<b>Sauerkirschen</b>			
Karneol	groß, schwarzrot	Küchen-/Tafelobst	moniliafester als andere
Ludwigs Frühe	leuchtend rot	Küchen-/Tafelobst	geschützte Lagen
Morina	groß, rundlich, braunrot	Küchen-/Tafelobst	robust gegen Monilia
Morellenfeuer	dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	anpassungsfähig
Safir	dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	sehr robust
Schattenmorelle	dunkelbraunrot	Küchen-/Tafelobst	vielseitigste Sorte

**Büsche, zweijährig**

o.B.	29,90	26,40	24,00
Co.	38,00	33,60	30,50

**Büsche, zweijährig, auf schwachwüchsigen Unterlagen**

o.B.	45,60	40,30	36,60
Co.	54,60	48,30	43,90

**Halbstämme**

2xv.	o.B.	ab 6 cm	35,10	31,00	28,10
	Co.	ab 6 cm	45,60	40,30	36,60

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7- 8	57,60	50,90
		8- 10	68,90	60,90
	Co.	7- 8	120,00	106,00
		8- 10	170,00	150,00

**Hochstämme und Halbstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	241,00	213,00
		12- 14	345,00	305,00
		14- 16	495,00	435,00
		16- 18	715,00	630,00

Süßkirsche - Prunus  
'Große Prinzessin'Süßkirsche - Prunus  
'Hedelfinger Riesen'

Süßkirsche - Prunus 'Kordia'



→ Süßkirsche - Prunus 'Sunburst'

## → Süß-/ Sauerkirsche

**Hochstämme und Halbstämme**

4xv.	m.Db.	18- 20		970,00
		20- 25		1.320,00

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.540,00
		25- 30		1.940,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.910,00
		35- 40		3.580,00
		40- 45		4.410,00

**Prunus** *italianica*, *syrica*- Rosaceae - Pflaume,  
**Zwetsche, Mirabelle, Reneklode**

Diese Gruppe ist enorm vielschichtig; sei es in Bezug auf Geschmack, Form oder Verwendungsmöglichkeiten. Sie eignet sich zum Frischverzehr, als Trockenfrüchte, als kandierte Früchte, zur Saft- und Branntweingewinnung, als Sirup, Mus, Kuchenbelag und vieles mehr.

Der Standort sollte nährstoffreich und warm sein. Ein pH-Wert zwischen 6 und 7 wird als ideal angesehen. Dabei ist eine relativ hohe Bodenfeuchte durchaus vorteilhaft. Auch ein Anbau in höheren, raueren Lagen, wenn diese nicht ausgesprochen spätfrostgefährdet sind, ist sinnvoll.



Zwetsche - Prunus  
'Bühler Frühzwetsche'



Mirabelle - Prunus  
'Mirabelle von Nancy'



Pflaume – Prunus  
'Ontariopflaume'

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Anna Späth	violettblau, eiförmig	Küchen-/Tafelobst	späte Reifezeit
Auerbacher	rotviolett, eiförmig	Küchen-/Tafelobst	stark beduftet
Bühler Frühzwetsche	blau bereift, rund bis eirund	Tafelobst	Frühsorte
Cacaks Schöne	blauviolett, eiförmig	Küchen-/Tafelobst	frühe, hohe Erträge
Ersinger Frühzwetsche	braunrot bis blau	Küchen-/Tafelobst	größte Frühzwet- sche
Geisenheimer Top	mittelgroß, dunkel- blau	Küchen-/Tafelobst	robuste Sorte
Graf Althans Reneklode	grüngelb, rundlich	Küchen-/Tafelobst	anspruchslos, aromatisch
Große Grüne Reneklode	grün bis gelbgrün, kugelig	Küchen-/Tafelobst	edel gewürzt
Hauszwetsche	schwarzblau, länglich oval	Küchen-/Tafelobst	wertvollste Pflaume
Italienische Zwetsche	groß, langoval, violettblau	Küchen-/Tafelobst	saftreich, gut stein- lösend
Jojo	mittelgroß, dunkel- violett	Küchen-/Tafelobst	scharkaresistent
Königin Viktoria	hellorange/rötlich	Küchen-/Tafelobst	großfruchtig
Lützelsacher Frühzwetsche	dunkelblau	Küchen-/Tafelobst	dottergelbes Fleisch
Mirabelle von Nancy	hellgelb, rot gepunktet	Most-/Küchen-/ Tafelobst	süß, fruchtig, vitaminreich

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Ontariopflaume	goldgelb, rundlich bis oval, berostet	Küchen-/Tafelobst	robuste Sorte zum Einmachen
Ortenauer	dunkelblau, länglich oval	Küchen-/Tafelobst	beste Backpflaume
Oullins Reneklude	grüngelb, rot gepunktet	Küchen-/Tafelobst	robust, ertragreich
President	dunkelviolettblau	Küchen-/Tafelobst	spät reifend, groß
Ruth Gerstetter	dunkelblau, breit oval	Küchen-/Tafelobst	frostfreie Lagen
The Czar	dunkelblau/violett	Küchen-/Tafelobst	sehr saftreich
Wagenheimer Frühzwsche	dunkelviolettblau, rundlich oval	Küchen-/Tafelobst	robust
Zimmers Frühzwsche	rot bis dunkelblau, oval	Küchen-/Tafelobst	frühe Sorte

Zwsche - Prunus  
'Hauszwsche'

Zwsche - Prunus 'Ortenauer'

**Büsche, zweijährig, auf Sämling**

o.B.	29,90	26,40	24,00
Co.	38,00	33,60	30,50

**Büsche, zweijährig, auf vegetativ vermehrten Unterlagen**

o.B.	35,10	31,00	28,10
Co.	44,50	39,30	35,70

**Halbstämme**

2xv.	o.B.	ab 6 cm	35,10	31,00	28,10
	Co.	ab 6 cm	45,60	40,30	36,60

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7-8	57,60	50,90
		8-10	68,90	60,90
Co.	7-8	120,00	106,00	
	8-10	170,00	150,00	

Zwsche - Prunus  
'Geisenheimer Top'**Hochstämme und Halbstämme**

3xv.	m.Db.	10-12	241,00	213,00
		12-14	345,00	305,00
		14-16	495,00	435,00
		16-18	715,00	630,00
4xv.	m.Db.	18-20	970,00	
		20-25	1.320,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20-25	100-150	1.540,00
		25-30		1.940,00
5xv.	m.Db.	30-35	150-200	2.910,00
		35-40		3.580,00
		40-45		4.410,00

Zwsche - Prunus 'Cacaks  
Schöne'



Birne - Pyrus 'Boc's Flaschenbirne'



Birne - Pyrus 'Conference'



Birne - Pyrus 'Gräfin von Paris'



Birne - Pyrus 'Gute Graue'

## Pyrus - Rosaceae - Birne

Diese Obstart bevorzugt wärmere Standorte. Zwar ist ihr Anbau auch in kühleren Lagen möglich, doch fehlt dem Fruchtfleisch dann der richtige Schmelz, der die Birne zu einer der wohlschmeckendsten Früchte macht. Da die Birne noch vor dem Apfel blüht, sollte auch hier auf spätfrostgefährdete Lagen verzichtet werden.

Die Bodenansprüche sind mit denen des Apfels vergleichbar; auch hier sind unterlagenspezifische Eigenschaften beachtenswert. Um kleinere Bäume zu erziehen, werden Birnen oft auf Quittenunterlagen veredelt. Diese neigen auf sehr alkalischen Böden mit hohen pH-Werten zu Chlorosen. Auf solchen Standorten zeigen sich Sämlingsunterlagen robuster und starkwüchsig.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Alexander Lucas	leuchtend gelb/ gerötet	Tafelobst	für Hausgärten
Bunte Julibirne	rötlich orange, streifig oder verwaschen	Tafelobst	frühe Sorte
Bosc's Flaschenbirne	hellgrün/zimtfarbig berostet	Most-/Tafelobst	
Clapps Liebling	gelbrot gestreift	Tafelobst	hohe Erträge
Conferencebirne	grünlich gelb/braun berostet	Tafelobst	für Hausgärten
Frühe von Trevoux	rötlich mit gelb	Tafelobst	sehr reich fruchtend
Gellerts Butterbirne	gelb/berostet	Tafelobst	auch Frostlagen
Gräfin von Paris	grüngelb, dicht punktiert	Tafelobst	für Hausgärten
Gute Graue	gelbgrün/zimtbraun berostet	Küchen-/Tafelobst	widerstandsfähig
Gute Luise v. Avranches	gelbgrün/verwaschen, gerötet	Tafelobst	für Hausgärten
Köstliche von Charneu	gelbgrün/rötliche Streifen	Küchen-/Tafelobst	hohe Erträge
Madame Verte	trübgelb/matt/gerötet	Tafelobst	Spaliersorte
Neue Poiteau	gelblich grün/trüb gerötet	Küchen-/Tafelobst	Massenträger
Oberösterreichische Weinbirne	gelbgrün	Mostobst	guter Straßen- Feldbaum
Pastorenbirne	grüngelb/braunrot	Küchen-/Tafelobst	Massenträger,
Pleiner Mostbirne	grün/rau	Mostobst	robust
Schweizer Wasserbirne	grün/braunrot verwaschen	Mostobst	geeigneter Straßenbaum
Sievernicher Mostbirne	grünlich gelb, berostet	Mostobst	sehr saftig, kräftige Säure, hoher Zuckergehalt
Vereins Dechantsbirne	gelbgrün/gerötet	Tafelobst	für Hausgärten
Williams- christbirne	goldgelb/schwach gerötet	Küchen-/Tafelobst	hervorragend, großfruchtig

**Büsche, zweijährig, auf Sämling**

o.B.	32,40	28,60	26,00
Co.	42,20	37,30	33,90

**Büsche, zweijährig, auf Quitte**

o.B.	38,00	33,60	30,50
Co.	45,60	40,30	36,60

**Büsche, zweijährig, mit Zwischenveredlung auf Quitte**

o.B.	43,30	38,30	34,80
Co.	48,10	42,50	38,60

**Halbstämme**

2xv.	o.B.	ab 6 cm	39,00	34,50	31,30
	Co.	ab 6 cm	50,60	44,70	40,60

**Schrägspalier**

1 Etage Co.	86,50
U-Form Co.	148,50

**Hochstämme**

2xv.	o.B.	7- 8	63,80	56,40
		8- 10	76,50	67,40
	Co.	7- 8	133,50	118,00
		8- 10	190,00	168,00

**Hochstämme und Halbstämme**

3xv.	m.Db.	10- 12	270,00	240,00
		12- 14	390,00	345,00
		14- 16	565,00	500,00
		16- 18	805,00	705,00
4xv.	m.Db.	18- 20	1.100,00	
		20- 25	1.350,00	

**Solitär-Bäume**

4xv.	m.Db.	20- 25	100-150	1.540,00
		25- 30		1.940,00
5xv.	m.Db.	30- 35	150-200	2.910,00
		35- 40		3.580,00
		40- 45		4.410,00



Birne - Pyrus 'Pastorenbirne'



Birne - Pyrus 'Williams Christbirne'

**Rheum - Polygonaceae - Rhabarber, rotstielig**

Man zählt ihn nicht unbedingt zu den typischen „Obstarten“. Systematisch betrachtet gehört er zu den Knöterichgewächsen. Rhabarber entwickelt enorm große Blätter, deren Stiele zu Kompott verarbeitet werden; außerdem wirkt Rhabarber verdauungsfördernd.

**kräftige Wurzelklumpen in Sorten**

o.B.	4,28	3,78	3,43
Co.	10,80	9,55	8,65



Rhabarber - Rheum





Johannisbeere - Ribes rubrum  
'Jonkher van Tets'



Johannisbeere - Ribes nigrum



Johannisbeere - Ribes nigrum  
'Silvergieters Schwarze'



Jostabeere - Ribes x nigridolaria  
'Josta'

## Ribes nigrum, rubrum, sativa, x nidigrolaria - Grossulariaceae - Johannisbeere, schwarz, rot, weiß, Jostabeere

Die Ansprüche und Verwendungsmöglichkeiten gleichen denen der Stachelbeeren. Auch leichtere Böden sind bei ausreichender Feuchte Erfolg versprechend. Schwarze Johannisbeeren haben aufgrund ihres außergewöhnlich hohen Vitamin-C-Gehaltes eine ernährungsphysiologisch bedeutsame Stellung.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
<b>Rote Sorten</b>			
Heros	groß, mittelrot	Küchen-/Tafelobst	mild aromatisch
Jonkheer van Tets	groß, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	aromatisch
Red Lake	groß, leuchtend rot	Küchen-/Tafelobst	mild aromatisch
Rolan	langtraubig, feste Beeren	Küchen-/Tafelobst	intensives Aroma
Rondom	mittel bis groß, dunkelgrün	Küchen-/Tafelobst	mild aromatisch
Rote Vierländer	mittellang, traubig, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	säuerlich, kräftiges Aroma
Rovada	sehr groß, mittelrot	Küchen-/Tafelobst	intensives Aroma
<b>Schwarze Sorten</b>			
Rosenthals Langtraubige	groß, blauschwarz	Küchen-/Tafelobst	stark aromatisch
Silvergieters Schwarze	groß, blauschwarz	Küchen-/Tafelobst	aromatisch
Titania	groß, blauschwarz	Küchen-/Tafelobst	mehltauresistent
<b>Weißer Sorte</b>			
Weißer Versailler	mittel, gelblich weiß	Küchenobst	aromatisch
<b>Josta</b>			
Josta	groß, dunkelviolett-schwarz	Küchen-/Tafelobst	mehltaufest

### verpflanzte Sträucher

3 - 4 Tr. o.B.		5,30	4,68	4,25
5 - 7 Tr.		6,75	5,95	5,40
ab 8 Tr.		7,70	6,80	6,15
3 Tr. Co.		13,80	12,20	11,05

### Fußstämme

3 - 4 Tr. o.B.	Sth. 40-50	13,80	12,20	11,05
ab 5 Tr.		14,55	12,85	11,65
3 Tr. Co.		24,80	21,90	19,90

### Stämme

3 - 4 Tr. o.B.	Sth. 80-90	14,90	13,15	11,95
ab 5 Tr.		16,60	14,65	13,30
3 Tr. Co.		27,70	24,50	22,20

## Ribes uva-crispa - Grossulariaceae - Stachelbeere

Diese Obstart gilt als anspruchslos. Ausreichende Wasserversorgung und vollsonnige, luftumspülte Lagen stärken ihre Widerstandskraft gegenüber Mehltau-Pilzen. Die Frucht wird entweder frisch verzehrt oder zu Marmelade, Wein und Saft verarbeitet.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Captivator	dunkelrot, mittelgroß	Küchen-/Tafelobst	dornelos, mehltautolerant
Dr. Bauers Rokula	groß, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	unbehaart, mehltaufest
Gelbe Triumphbeere	mittel bis groß, gelbgrün	Küchenobst	stark behaart
Grüne Kugel	groß, hellgrün	Küchen-/Tafelobst	schwach behaart
Hinnonmäki-gelb	mittel, dunkelgelb	Küchen-/Tafelobst	unbehaart, mehltaufest
Hinnonmäki-rot	süß, rot	Küchen-/Tafelobst	mehltauresistent
Hönings Früheste	mittel bis groß goldgelb	Küchen-/Tafelobst	angenehm süß
Invicta®	groß, grün	Küchen-/Tafelobst	schwach behaart, mehlttauresistent
Maiherzog	mittel, braun bis schwarzrot	Küchen-/Tafelobst	frühe Sorte, platzfest
Rote Triumphbeere	groß, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	stark behaart
Tatjana	grüngelb, aromatisch	Küchen-/Tafelobst	sehr resistent
Weißer Triumphbeere	groß, weißgrün	Küchen-/Tafelobst	fein behaart



Stachelbeere - Ribes uva-crispa



Stachelbeere - Ribes uva-crispa 'Invicta'



Stachelbeere - Ribes uva-crispa in Sorten

### verpflanzte Sträucher

3 - 4 Tr. o.B.	11,70	10,35	9,40
5 - 7 Tr.	13,80	12,20	11,05
ab 8 Tr.	14,90	13,15	11,95
3 Tr. Co.	16,60	14,65	13,30

### Fußstämme

4 Tr. o.B.	Sth. 40- 50	17,90	15,80	14,35
ab 7 Tr.		19,00	16,80	15,20
3 Tr. Co.		27,70	24,50	22,20

### Stämme

4 Tr. o.B.	Sth. 80- 90	19,00	16,80	15,20
ab 7 Tr.		19,90	17,60	16,00
3 Tr. Co.		28,40	25,10	22,80

Brombeere - Rubus fruticosus  
'Black Satin'Brombeere - Rubus fruticosus  
'Thornless Evergreen'

## Rubus fruticosus - Rosaceae - Brombeere, Taybeere

Bis auf staunasse Böden ist die Brombeere standorttolerant. Gepaart mit Sonne und den passenden Erziehungsmaßnahmen bieten die Pflanzen die Gewähr für eine ertragreiche Ernte von qualitativ hochwertigen Früchten. Diese können frisch verzehrt werden. Brombeer-Gelee, -Saft oder -Wein zählen zu den ausgesuchten Obstköstlichkeiten.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Black Satin	großfrüchtig	Küchen-/Tafelobst	kräftig rankend
Loch Ness (Nessy)	sehr groß, süß	Küchen-/Tafelobst	Wuchs mittelstark
Theodor Reimers	sehr aromatisch, süß	Küchen-/Tafelobst	stark rankend
Thornfree	süß säuerlich, aromatisch	Küchen-/Tafelobst	kräftig rankend
Thornless Evergreen	süß säuerlich	Küchen-/Tafelobst	fast immergrün
Wilsons Frühe	süß, fest	Küchen-/Tafelobst	robust, frosthart

m.Tb. 18,50 16,30

### Tayberry - Taybeere

Die Kreuzung aus Brombeere und Himbeere zählt zu den jüngsten Obstarten. Ihre Ranken erinnern an die Brombeere, auch verbleibt der Zapfen, brombeerenähnlich, beim Ernten an der Frucht. Dieses Beerenobst ist außerordentlich wohlschmeckend und ertragreich.

m.Tb. 20,50 18,10

Himbeere - Rubus idaeus  
'Autumn Bliss 5'Himbeere - Rubus idaeus  
'Malling Promise'

## Rubus idaeus - Rosaceae - Himbeere

Die Himbeere ist anspruchsvoller als die Brombeere; entscheidend für den Ertrag ist eine ausreichende Wasserversorgung. Neben der Verarbeitung zu Kuchenbelägen, Marmeladen und Säften ist der Frischverzehr der Himbeere außerordentlich beliebt. Damit dies nicht nur im Sommer möglich ist, wurde das Sortiment um herbstragende Sorten erweitert. Somit ist ein Genuss der delikaten Früchte von Ende August bis zum Frost möglich.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Preisgruppe
Aroma Queen	groß, hellrot, süß	Küchen-/Tafelobst	2
Autumn Bliss	sehr groß, mittelrot	Küchen-/Tafelobst	2
Himbo Top	große Frucht + Ertrag	Küchen-/Tafelobst	2
Korbfüller	sehr groß, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	2
Malling Promise	groß, mittel-/dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	2
Schönemann	sehr groß, dunkelrot	Küchen-/Tafelobst	1
Tulameen	sehr aromatisch	Küchen-/Tafelobst	2
ZEFA 3 Herbsterte	sehr groß, mittelrot	Küchen-/Tafelobst	2

**Preisgruppe 1**

A-Qualität	6,75	5,95	5,40
m.Tb.	14,15	12,50	11,35

**Preisgruppe 2**

A-Qualität	7,95	7,00	6,35
m.Tb.	17,50	15,40	14,00

**Sambucus nigra - Caprifoliaceae - Holunder****Großfrüchtige Sorten**

Der Holunder gehört zu den wiederentdeckten Wildobstarten. Das Gehölz ist wenig krankheits- und schädlingsanfällig. Die Früchte werden ausschließlich zur Verwertung genutzt. Man verarbeitet sie zu Gelee und Saft. Auch Holunderwein ist eine ausgesprochene Köstlichkeit. Daneben nutzt man Holundersaft als Medizin bei Erkältungs- und Atemwegserkrankungen.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Hamburg	große Einzelbeeren	Saft, Gelee, Marmelade, Wein	
Haschberg	kleinfrüchtig, ertragreich	Verarbeitung	kaum frostgefährdet

**verpflanzte Sträucher**

3 Tr.	o.B.	60-100 100-150	17,90 22,30	15,80 19,70	14,35 17,90
	Co.	60-100	26,90	23,80	21,60



Holunder - Sambucus nigra



Holunder - Sambucus 'Haschberg'



Heidelbeere - Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'

**Vaccinium corymbosum - Ericaceae - Kultur-  
Heidelbeere**

Die Gruppe der Kultur-Heidelbeeren stellt eine Ausnahme im Bereich der Obstarten dar. Ihre Bodenansprüche decken sich mit denen anderer Heidepflanzen bzw. Ericaceen, d.h. ein pH-Wert von 4 bis 5 ist ideal. Zudem reagieren die Pflanzen auf eine gute Wasserversorgung, vor allem in sonniger Lage, positiv. In Bezug auf das Nährstoffangebot ist die Heidelbeere äußerst genügsam. Bis zum Vollertrag benötigt die Pflanze verhältnismäßig lange. Die Geduld des Verwenders wird aber durch die Ernte der exquisiten Beeren belohnt. Diese schätzt der Kenner entweder frisch oder zu edlen Marmeladen bzw. Belägen verarbeitet.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung
Berkeley	sehr groß, hellblau	Küchen-/Tafelobst
Bluecrop	sehr groß, dunkelblau	Küchen-/Tafelobst
Blueray	sehr groß, hellblau	Küchen-/Tafelobst
Coville	groß, dunkelblau	Küchen-/Tafelobst
Duke	sehr groß, hellblau	Küchen-/Tafelobst
Earlyblue	groß, hellblau, frühreifend	Küchen-/Tafelobst
Goldtraube	groß, mittelblau	Küchen-/Tafelobst
Jersey	groß, hellblau	Küchen-/Tafelobst



Heidelbeere - Vaccinium corymbosum 'Jersey'





Wein - Vitis vinifera

→ Kultur-Heidelbeere  
**verpflanzte Sträucher**

Co.	30- 40	14,90	13,15
	40- 60	20,50	18,10
	60- 80	28,40	25,10

## Vaccinium vitis-idaea - Ericaceae - Preiselbeere

Preiselbeeren haben in etwa die gleichen Standortbedürfnisse wie bei den Kultur-Heidelbeeren beschrieben. Auch Preiselbeeren vereinen wiederum Nutzen und Zierde. Zum einen als Kompottobst, das sogar zweimal im Jahr geerntet werden kann, zum anderen als Zierpflanze, um beispielsweise den Boden dekorativ abzudecken.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Verwendung	Sonstiges
Koralle	mittel, hellrot	Küchen-/Tafelobst	auch als Bodendecker

### Büsche

m.Tb.	7,95	7,00	6,35
-------	------	------	------

## Vitis vinifera - Vitaceae - Weinrebe

Sicherlich ist dies kein alltägliches Beerenobst. Aber selbst wenn kein Weinbauklima vorhanden ist, ist bereits der funktionelle Nutzen dieses Rankers außerordentlich hoch. Er ziert triste Mauern und spendet an Pergolen kühlenden Schatten. Zudem werden im Zusammenhang mit Tafeltrauben oft zu hohe Standortanforderungen genannt. Tafeltrauben sollten jedoch nicht der Funktion von erwerbsmäßig genutzten Weintrauben gerecht werden müssen, sondern als saftiges Beerenobst erfreuen. Und das gedeiht auch auf ärmeren Böden und weniger begünstigten Standorten außerhalb der klassischen Weinbaugebiete.

Sortenname	Fruchteigenschaft	Preisgruppe
Blauer Burgunder	mittel bis groß, mattblau	1
Blauer Portugieser	mittel bis groß, schwarzblau	1
Gelbe Seidentraube	mittel bis groß, hellgrün	1
Lakemont (Syn. New York)	hellgrün, süß, kernlos	2
Millenium	hellgrün, süß, kernlos, groß	2
Muscat Bleu	groß, schwarzblau	2
Phoenix	groß, gelbgrün	2
Regent	mittel bis groß, dunkelblau	2
Vanessa	rosarot, süß, kernlos, resistent	2
Venus	rosarot, knackig, kernlos	2
Weißer Gutedel	groß, gelbgrün	1

### Preisgruppe 1

m.Tb.	60- 80	15,30	13,50	12,25
-------	--------	-------	-------	-------

### Preisgruppe 2, Mehltolerante Sorten

m.Tb.	60- 80	20,50	18,10	16,40
-------	--------	-------	-------	-------



Wein - Vitis vinifera



Wein - Vitis vinifera 'Regent'



Wein - Vitis vinifera



Stauden, Farne,  
Wasserpflanzen,  
Ziergräser,  
Gewürzpflanzen



## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

## Art, Sorte, Blütenfarbe

## Blütezeit

Höhe  
in cmStand-  
ortPreis-  
gruppe

## Stauden

**Acaena** Stachelnüsschen

buchananii grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt

**Rosaceae**

Juni–Juli

10

△○ C

magellanica (glaucophylla) grünlich weiß, unscheinbar, blaugrünes Laub

Juni–Juli

10

△○ C

microphylla 'Kupfertepich' weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte

Juni–Juli

10

△○ C

**Acanthus** Bärenklau**Acanthaceae**

mollis Weiche Bärenklau, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck

Juli–Aug

125

○ F

**Achillea** Schafgarbe**Asteraceae**

clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub

Juni–Juli

50

○ D

filipendulina 'Coronation Gold' goldgelb, Dauerblüher

Juni–Sept

70

○ D

filipendulina 'Credo' hellgelb, großblumig

Juni–Okt

120

○ D

filipendulina 'Heinrich Vogeler' weiß, wüchsig

Juni–Sept

100

○ D

filipendulina 'Parker' gelb

Juni–Sept

120

○ C

filipendulina 'Walter Funcke' leuchtend rot, graues Laub

Juni–Sept

70

○ D

millefolium 'Apfelblüte' rosa

Juni–Aug

60

○ D

millefolium 'Lilac Beauty' hellviolett

Juni–Aug

60

○ E

millefolium 'T. F. Pink Grapefruit' orangerosa

Juni–Aug

50

○ E

millefolium 'T. F. Pomegranate'® rot

Juni–Sept

60

○ E

millefolium 'Kirschkönigin' rote Töne

Juni–Sept

70

○ C





Achillea filipendulina 'Parker'



Aconitum carmichaelii 'Arendsii'



Aconitum napellus



Agastache rugosa 'Blue Fortune'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
millefolium 'Paprika' tiefrot, auffälliger Farbton	Juni–Aug	60	○	D
millefolium 'Sauce Seduction' tiefrosa	Juni–Aug	60	○	E
millefolium 'Sunny Seduction' hellgelb	Juni–Aug	60	○	E
millefolium 'Terracotta' rotbraun	Juni–Aug	80	○	D
ptarmica 'The Pearl' weiß, gefüllt	Juli–Sept	70	○	B
tomentosa Polsterschafgarbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	15	△○	B
<b>Acinos Alpen-Steinquendel</b>	<b>Lamiaceae</b>			
alpinus rotviolett, heimische Alpenstaude	Mai–Aug	15	△○	D
<b>Aconitum Eisenhut</b>	<b>Ranunculaceae</b>			
× cammarum 'Bicolor' weißblau	Juli–Aug	100	○●	E
carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte	Sept–Okt	100	○●	E
henryi 'Spark' violettblau, verzweigte Blütenstiele	Aug–Okt	120	○●	E
napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	110	○●	E
napellus 'Album' weiß	Juli–Aug	100	○●	F
<b>Aconogonon (Syn. Polygonum) Knöterich</b>	<b>Polygonaceae</b>			
speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) cremeweiß, wüchsig	Juli–Sept	150	○	F
<b>Aethionema Steintäschel</b>	<b>Ranunculaceae</b>			
armenum 'Warley Rose' rosa, graublaues Blatt, wärmeliebend	Mai–Juni	15	△○	E
<b>Agapanthus Schmucklilie</b>	<b>Liliaceae</b>			
africanus (Syn. umbellatus) blau, Kübelpflanze	Juni–Aug	100	○	F
africanus 'Albus' weiß	Juli–Aug	100	○	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
africanus 'Black Panther'® dunkelviolett fast schwarz	Juli–Aug	100	○	H
<b>Agastache</b> Duftnessel, Mexikonessel	<b>Lamiaceae</b>			
× cultorum 'Black Adder' dunkelblauviolett	Juli–Okt	70	○	E
barberi 'Firebird' hellorange, duftend, Dauerblüher	Juli–Sept	35	○	E
barberi 'Summer Glow'® gelb, kompakt	Juni–Sept	65	○	E
foeniculum 'Golden Jubilee' blau, gelbblättrig	Juni–Sept	60	○	E
foeniculum 'Summer Sky'® violettblau, kompakt	Juni–Sept	50	○	E
mexicana 'Cotton Candy'® rosa, kompakt	Juni–Sept	65	○	E
mexicana 'Red Fortune' leuchtend rot	Juli–Sept	70	○	E
rugosa 'After Eight'® dunkelviolettblau	Juni–Okt	45	○	E
rugosa 'Alabaster' weiß, Duft, Schutz vor Wintermässe	Juli–Sept	65	○	E
rugosa 'Blue Fortune' blauviolett	Juli–Sept	70	○	E
rugosa 'Heatwave'® dunkelrosa	Juni–Sept	40	○	E
<b>Ajuga</b> Günsel	<b>Lamiaceae</b>			
reptans 'Atropurpurea' violettblau, braunrotes Blatt, Bodendecker	Apr–Mai	15	●●	B
reptans 'Black Scallop'® violettpurpur, dunkelrotes Blatt	Apr–Mai	15	○●	D
reptans 'Braunherz' violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck	Apr–Mai	15	○●	B
reptans 'Burgundy Glow' violettblau, schwachwüchsig, Blatt grün-rosa-weiß	Apr–Mai	15	●●	C
reptans 'Chocolate Chip' blau, schokoladenbraunes Blatt	Mai–Juni	10	●●	B
reptans 'Evening Glow' violettblau, glänzend rotes Laub	Apr–Mai	15	○●	B
<b>Alcea</b> Stockrose	<b>Lamiaceae</b>			
Ficifolia-Hybriden Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○	C
rosea 'Nigra' schwarzrot, einfach blühend	Juli–Sept	225	○	C
rosea 'Pleniflora Gelb' gefüllt	Juni–Sept	180	○	C
rosea 'Pleniflora Rosa' gefüllt	Juni–Sept	180	○	C
rosea 'Pleniflora Rot' gefüllt	Juni–Sept	180	○	C
rosea 'Pleniflora Weiß' gefüllt	Juni–Sept	180	○	C
<b>Spotlight-Serie ungefüllte, farbechte Sorten</b>				
'Blacknight' schwarzpurpur, einfach	Juni–Sept	180	○	E

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
'Mars Magic' rot, einfach	Juni–Sept	180	○	E
'Polarstar' weiß mit gelber Mitte, einfach	Juni–Sept	180	○	E
'Sunshine' zitronengelb, einfach	Juni–Sept	180	○	E
<b>Alchemilla</b> Frauenmantel	<b>Rosaceae</b>			
epipsila grünlich gelb	Juni–Juli	35	◐●	D
erythropoda grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△○	C
mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	◐●	B
mollis 'Thriller' grünlich gelb, graugrünes Blatt	Juni–Juli	35	◐●	G
<b>Allium</b> Zier-Lauch	<b>Liliaceae</b>			
aflatunense 'Purple Sensation' Kugellauch, purpurviolett	Mai–Juni	80	○	E
christophii Sternkugel-Lauch, amethystfarben	Juni–Juli	50	○	E
giganteum Riesen-Lauch, violettblau, groß	Juli–Aug	130	○	H
karataviense Blauzungen-Lauch, violettrosa	Apr–Mai	30	△○	E
macleanii 'Globemaster' purpurviolett, großblumig	Juni–Juli	90	○	H
senescens ssp. senescens rosa	Juli–Sept	45	○	E
sphaerocephalon purpurrot, kugelig, mehrblütig, Duft	Juni–Juli	60	△○	D
stipitatum 'Mount Everest' weiß, Blätter lange grün	Apr–Juni	110	○	G
<b>Alyssum (syn. Aurinia)</b> Steinkraut, Steinkresse	<b>Brassicaceae</b>			
montanum 'Berggold' Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster	Apr–Mai	15	△○	A
saxatile 'Goldkugel' tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	△○	B
<b>Anacyclus</b> Ringblume	<b>Asteraceae</b>			
pyr. var. depressus weißrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen	Juni–Aug	10	△○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Anaphalis</b> <i>Perlkörbchen</i>	<b>Asteraceae</b>			
margaritacea 'Neuschnee' weiß	Juli–Sept	45	○	B
triplinervis 'Silberregen' weiß	Aug–Okt	35	○	C
triplinervis 'Sommerschnee' weiß, kompakte Sorte	Juli–Sept	20	○	C
<b>Anchusa</b> <i>Ochsenzunge</i>	<b>Boraginaceae</b>			
azurea blau, vor Winternässe schützen	Juni–Juli	120	○	E
azurea 'Dropmore' blau, kompakter als die Art	Juni–Juli	100	○	E
azurea 'Loddon Royalist' blau	Juni–Juli	80	○	E
<b>Anemone</b> <i>Anemone, Windröschen</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
blanda 'Blue Shades' Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne	März–Apr	15	○●	C
blanda 'Charmer' dunkelrosa	März–Apr	10	○●	C
blanda 'White Splendour' reinweiß, großblumig	März–Apr	10	○●	C
hupehensis 'Little Princess'® hellrosa, einfach, buschig	Aug–Okt	50	●	G
hupehensis 'Ouverture' hellrosa, reichblütig	Juli–Sept	100	●	E
hupehensis 'Praecox' rosarot	Aug–Sept	70	●	E
hupehensis 'September Charme' Herbst-Anemone, hellviolettrosa	Aug–Okt	70	●	E
hupehensis 'Splendens' rosa, reichblütig	Aug–Okt	80	●	E
japonica 'Andrea Atkinson' weiß, robuste Sorte	Sept–Okt	100	●	F
japonica 'Fantasy Cinderella'® rosa, kompakt	Sept–Okt	45	●	F
japonica 'Honorine Jobert' reinweiß, altbewährte Sorte	Aug–Okt	100	●	E
japonica 'Königin Charlotte' reinrosa, bewährte Sorte	Aug–Okt	90	●	E
japonica 'Pamina' rosarot, gefüllt	Aug–Okt	80	●	E
japonica 'Prinz Heinrich' dunkelrot, gefüllt	Sept–Okt	100	●	E
japonica 'Rotkäppchen' rosarot, halbgefüllt	Aug–Okt	60	●	E
japonica 'Serenade' rosa, halbgefüllt, robuste reichblühende Sorte	Aug–Okt	120	○●	E
japonica 'Whirlwind' weiß, gefüllt, reichblühend	Aug–Okt	100	●	E
nemorosa Busch-Windröschen, weiß	März–Mai	15	●	C
sylvestris Wald-Anemone, weiß	Mai–Juni	25	○●	C
tomentosa 'Robustissima' hellrosa, wüchsig, besonders für naturnahe Gärten	Aug–Sept	130	○●	D



Alyssum saxatile 'Goldkugel'



Anemone hupehensis 'September Charm'



Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'



Asphodeline lutea

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Angelica</b> Engelwurz	<b>Apiaceae</b>			
<i>gigas</i> Große Engelwurz, tiefrot, dekoratives Blatt	Juli–Sept	100	○	E
<b>Antennaria</b> Katzenpfötchen	<b>Asteraceae</b>			
<i>dioica</i> 'Rubra' rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt	Mai–Juni	15	△○	B
<i>dioica</i> var. <i>borealis</i> (Syn. <i>tomentosa</i> ) weiß, silbriges Blatt	Mai–Juni	10	△○	B
<b>Anthemis</b> Hundskamille	<b>Asteraceae</b>			
<i>tinctoria</i> 'Kelwayi' hellgelb, Dauerblüher	Juli–Sept	50	○	C
<i>tinctoria</i> 'Susanna Mitchell' cremeweiß	Juni–Sept	35	○	G
<b>Aquilegia</b> Akelei	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>alpina</i> Alpen-Akelei, reinblau	Mai–Juni	40	○	C
<i>caerulea</i> 'Biedermeier' Farbmischung, kompakt	Mai–Juni	30	○○●	C
<i>caerulea</i> 'Blue Star' hellblau-weiß, großblütig	Mai–Juni	60	○○●	C
<i>caerulea</i> 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern') purpurrot mit weißer Glocke	Mai–Juni	60	○○●	C
<i>caerulea</i> 'Kristall' weiß	Mai–Juni	65	○○●	C
<i>caerulea</i> 'Maxistar' gelb	Mai–Juni	60	○○●	C
<i>caerulea</i> 'McKana' großblütige Farbvariation	Mai–Juni	75	○○●	C
<i>flabellata</i> var. <i>pumila</i> 'Ministar' blau mit weiß, für Steingarten und Trog	Mai–Juni	15	△●	C
<i>vulgaris</i> blaue Töne, heimische Wildform	Mai–Juni	65	○○●	C
<b>Arabis</b> Gänsekresse	<b>Brassicaceae</b>			
× <i>arendsii</i> 'Compinkie' rosa	Apr–Mai	10	△○	A
<i>blepharophylla</i> 'Frühlingszauber' purpurrot, polsterartig	März–Mai	15	△○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
caucasica 'Plena' weißgefüllt	Apr–Mai	20	△○	D
caucasica 'Schneehaube' weiß, kompakte Sorte	Apr–Mai	15	△○	A
caucasica 'Variegata' weiß, grünweißes Blatt	Apr–Mai	15	△○	C
ferdinandi-coburgii 'Old Gold' weiß, grüngelbes Blatt	Apr–Juni	10	△○	C
ferdinandi-coburgii 'Variegata' weiß, polsterartig, grünweißes Blatt	Apr–Mai	10	△○	C
procurrens 'Glacier' weiß, mattenartig	Apr–Juni	10	△○	B
<b>Arctanthemum</b> Grönlandmargarite, Syn. Dendranthema	<b>Asteraceae</b>			
arcticum weiß	Okt	30	○	C
arcticum 'Roseum' hellrosa	Sept–Okt	40	○	C
<b>Arenaria</b> Sandkraut	<b>Caryophyllaceae</b>			
montana weiß, großblütig, anspruchslos	Mai–Juni	10	△○	B
<b>Armeria</b> Grasnelke	<b>Plumbaginaceae</b>			
juniperifolia rosa	Apr–Mai	5	△○	D
maritima 'Alba' reinweiß	Mai–Juli	15	△○	A
maritima 'Düsseldorfer Stolz' purpurrot, vegetative Sorte	Mai–Juli	20	△○	B
maritima 'Splendens' rosarot, gesunde, wüchsige Sorte	Mai–Juni	15	△○	A
maritima 'Vesuv' rot, rotes Laub, vegetative Sorte	Mai–Juli	15	△○	C
<b>Arnica</b> Echte Arnika, Berg-Wohlerleih	<b>Asteraceae</b>			
montana tiefgelb, heimische Arzneipflanze	Mai–Juli	40	△○	E
<b>Artemisia</b> Edelraute, Beifuß, Wermut	<b>Asteraceae</b>			
abrotanum gelblich, alte Heil- und Gewürzpflanze	Juli–Okt	100	○	C
arborescens 'Powis Castle' weiblich, duftendes silbergraues Blatt	Juli–Sept	80	○	E
schmidtiana 'Nana' weiß, silbriges weiches Laub, vor Nässe schützen	Juni–Juli	25	△○	D
stelleriana gelblich weiß, weißgraues schönes Blatt	Juli–Aug	35	○	D
<b>Arum</b> Aronstab	<b>Araceae</b>			
italicum gelblich weiß, rote Fruchtstände, leichte Blattmaserung, giftig	Apr–Mai	35	●●	E
<b>Aruncus</b> Geißbart	<b>Rosaceae</b>			
aethusifolius weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung	Juni–Juli	30	●	C
dioicus (Syn. sylvestris) weiß, ausdauernde, heimische Waldstaude	Juni–Juli	180	●●	D

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<i>dioicus</i> 'Kneiffii' TC, Geschlitzter Wald-Geißbart, weiß, geschlitztes Blatt	Juni–Juli	100	◐●	G
<b>Asarum</b> Haselwurz	<b>Aristolochiaceae</b>			
<i>europaeum</i> bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch	März–Apr	10	◐	E
<b>Asclepias</b> Seidenpflanze	<b>Asclepiadaceae</b>			
<i>tuberosa</i> gelborange, weiße Samenfäden, Bienenweide	Juni–Aug	75	○	E
<b>Asphodeline</b> Junkerlilie	<b>Liliaceae</b>			
<i>lutea</i> gelb, kerzenartig	Mai–Juni	80	○	E
<b>Aster</b> Aster	<b>Asteraceae</b>			
× frikartii 'Wunder von Stäfa' großblumig, blauviolett	Aug–Sept	70	○	E
<i>alpinus</i> 'Albus' Alpen-Aster, reinweiß, remontierend	Mai–Juni	25	△○	B
<i>alpinus</i> 'Dunkle Schöne' dunkelviolett	Mai–Juni	25	△○	B
<i>alpinus</i> 'Happy End' rosa	Mai–Juni	35	△○	B
<i>amellus</i> 'Blue King' dunkelviolett, standfest, hohe Vitalität	Aug–Sept	50	○	E
<i>amellus</i> 'Dr. Otto Petschek' blauviolett, großblumig	Sept–Okt	70	○	E
<i>amellus</i> 'Rosa Erfüllung' (Syn. 'Pink Zenith') violettrosa, wüchsige Sorte	Aug–Okt	50	○	D
<i>amellus</i> 'Rudolf Goethe' violettblau	Aug–Sept	50	○	D
<i>amellus</i> 'Veilchenkönigin' dunkelviolett, gute Farbwirkung	Sept–Okt	55	○	E
<i>divaricatus</i> Wald-Aster, weiß, lockere Blüten, Dauerblüher	Sept–Okt	75	◐○	D
<i>dumosus</i> 'Apollo' weiß	Sept–Okt	40	○	B
<i>dumosus</i> 'Augenweide' Kissen-Aster, violettblau	Sept–Okt	20	○	B
<i>dumosus</i> 'Heinz Richard' dunkelrosa	Sept–Okt	40	○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' <i>violettrosa</i>	Sept–Okt	40	○	B
dumosus 'Herbstpurzel' <i>violett</i>	Sept–Okt	30	○	B
dumosus 'Kassel' <i>bläulich rot</i>	Sept–Okt	30	○	B
dumosus 'Kristina' <i>weiß, großblumig</i>	Sept–Okt	40	○	B
dumosus 'Mittelmeer' <i>blau, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	40	○	B
dumosus 'Prof A. Kippenberg' <i>blauviolett, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	30	○	B
dumosus 'Rosenwichtel' <i>dunkelrosa</i>	Sept–Okt	25	○	B
dumosus 'Starlight' <i>rot</i>	Sept–Okt	40	○	B
ericoides 'Schneetanne' <i>weiß, kleinblumig, reichblühend, Wuchs aufrecht</i>	Sept–Nov	120	○	D
ericoides 'Blue Wonder' <i>blau</i>	Sept–Nov	80	○	D
ericoides 'Snow Flurry' (Syn. panson's 'Snow Flurry') <i>Teppich-Aster, weiß</i>	Sept–Okt	15	△○	D
laevis 'Blauschleier' <i>Glatte Garten-Aster, blauviolett</i>	Sept–Okt	100	○	D
lateriflorus 'Lady in Black' <i>hellviolett, rötliches Blatt</i>	Sept–Okt	100	○	E
linosyris <i>Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt</i>	Aug–Okt	55	○	D
novae-angliae 'Alma Pötschke' <i>Raubblatt-Aster, rot, leuchtende Farbe</i>	Sept–Okt	90	○	D
novae-angliae 'Andenken an P. Gerber' <i>Raubblatt-Aster, rosarot</i>	Sept–Okt	150	○	D
novae-angliae 'Barr's Blue' <i>blauviolett, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	150	○	D
novae-angliae 'Barr's Pink' <i>violettrosa, großblumig</i>	Aug–Okt	150	○	D
novae-angliae 'Herbstschnee' <i>weiß, halbgefüllt</i>	Sept–Okt	130	○	D
novae-angliae 'Purple Dome' <i>violett, standfest und kompakt</i>	Sept–Okt	60	○	D
novae-angliae 'Rudelsburg' <i>violettrosa</i>	Sept–Okt	130	○	D
novae-angliae 'Septemberrubin' <i>rubinrot</i>	Aug–Okt	145	○	D
novi-belgii 'Crimson Brocade' <i>rot</i>	Sept–Okt	100	○	D
novi-belgii 'Fuldatal' <i>purpurviolett, halbgefüllt, großblumig</i>	Sept–Okt	100	○	D
novi-belgii 'Karminkuppel' <i>purpurrot</i>	Sept–Okt	100	○	D
novi-belgii 'Lady Frances' <i>tiefrosa</i>	Aug–Okt	100	○	D
novi-belgii 'Lassie' <i>rosa</i>	Sept–Okt	90	○	D
novi-belgii 'Patricia Ballard' <i>rosa, gefüllt</i>	Sept–Okt	100	○	D
novi-belgii 'Royal Ruby' <i>dunkelrot, gefüllt, kompakte Sorte</i>	Sept–Okt	65	○	D





Aster alpinus



Astilbe x arendsii 'Fanal'

Aubrieta x cultorum  
'Hamburger Stadtpark'

Bergenia cordifolia

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
novi-belgii 'Sarah Ballard' rosa gefüllt	Sept–Okt	90	○	D
novi-belgii 'Schöne von Dietlikon' blauviolett	Sept–Okt	120	○	D
novi-belgii 'White Ladies' weiß	Sept–Okt	100	○	D
pyrenaicus 'Lutetia' lilarosa	Aug–Okt	65	○	D
sedifolius 'Nanus' blaue Sternchenblüten	Sept–Okt	40	○	D
tongolensis 'Wartburgstern' Vorsommer-Aster, blauviolett	Mai–Juni	35	○	C
<b>Astilbe</b> Prachtspiere	<b>Saxifragaceae</b>			
× arendsii 'Anita Pfeifer' tiefrosa	Juli–Sept	70	●	E
× arendsii 'Brautschleier' reinweiß	Juli–Sept	85	●	E
× arendsii 'Cattleya' purpurrosa	Juli–Sept	100	●	E
× arendsii 'Fanal' dunkelrot, kompakt, dunkles Laub	Juli–Sept	65	●	E
× arendsii 'Spinell' rubinrot, Laubaustrieb rot	Juli–Sept	80	●	E
chinensis var. pumila Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker	Aug–Sept	35	●	B
chinensis var. taquetii 'Purpurlanze' lange purpurrote Blütenrispen	Juli–Aug	100	●	D
chinensis var. taquetii 'Superba' purpurrosa, großblumig	Juli–Aug	110	●	D
glaberrima 'Hennie Graafland' hellrosa, schönes Laub	Juli–Aug	30	△○	E
glaberrima 'Sprite' hellrosa, zierendes Blatt	Juli–Aug	35	●	E
japonica 'Deutschland' weiß	Juni–Juli	45	●	E
japonica 'Mainz' violettrosa	Juni–Juli	50	●	E
japonica 'Montgomery' dunkelrot, dunkles Laub	Juni–Juli	60	●	E
thunbergii 'Straußenfeder' purpurrosa	Juli–Aug	90	●	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Astilboides (Syn. Rodgersia)</b> <i>Tafelblatt, Schaublatt</i>	<b>Saxifragaceae</b>			
<i>tabularis</i> grünlich weiß, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude	Juni	100	☉	F
<b>Astrantia</b> <i>Sterndolde</i>	<b>Apiaceae</b>			
<i>major</i> weißrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude	Juni–Aug	50	☉	C
<i>major</i> 'Moulin Rouge'® karminrot, Dauerblüher	Juni–Sept	45	☉	G
<i>major</i> 'Primadonna' rot	Juni–Aug	50	☉	F
<i>major</i> 'Roma'® silbrig rosa	Juni–Sept	50	☉☉	G
<i>major</i> 'Snowstar' weiß, großblütig	Juni–Sept	70	☉	G
<i>major</i> 'Star of Billion' silbrig rosa	Juni–Aug	75	☉☉	G
<b>Aubrieta</b> <i>Blaukissen</i>	<b>Brassicaceae</b>			
× <i>cultorum</i> 'Alba' weiß	Apr–Mai	10	△○	C
× <i>cultorum</i> 'Dr. Mules Variegated' blau, gelbgerandetes Laub	Apr–Mai	10	△○	C
× <i>cultorum</i> 'Hamburger Stadtpark' blauviolett, schöne kompakte Polster	Apr–Mai	10	△○	B
× <i>cultorum</i> 'Ida' purpurrot, schöne Polster	Apr–Mai	10	○	B
× <i>cultorum</i> 'Kitte Rose' dunkelrosa	Apr–Mai	10	△○	B
× <i>cultorum</i> 'Schloß Eckberg' blauviolett, großblumig	Apr–Mai	10	△○	B
× <i>cultorum</i> 'Silberrand' violett, weißgrünes Laub, schöne auffällige Sorte	Apr–Mai	10	△○	B
× <i>cultorum</i> 'Tauricola' hellblauviolett	Apr–Mai	10	△○	B
<b>Azorella</b> <i>Andenpolster</i>	<b>Apiaceae</b>			
<i>trifurcata</i> grünlich gelb, feste Polster	Mai–Juni	5	△○	D
<i>trifurcata</i> 'Nana' (Syn. 'Minor') gelblich, flache Teppiche	Mai–Juni	3	△○	D
<b>Bergenia</b> <i>Bergenie, Riesensteinbrech</i>	<b>Saxifragaceae</b>			
<i>cordifolia</i> rosa	Apr–Mai	40	☉●	C
<i>cordifolia</i> 'Abendglut' rot	Apr–Mai	30	☉●	E
<i>cordifolia</i> 'Baby Doll' zartrosa, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	☉☉	E
<i>cordifolia</i> 'Eroica' (Syn. 'Ouverture') purpurviolett	Apr–Mai	35	☉☉	E
<i>cordifolia</i> 'Morgenröte' leuchtend purpurrosa	Apr–Mai	35	☉☉	E
<i>cordifolia</i> 'Rotblum' rot	Apr–Mai	50	☉☉	D

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
cordifolia 'Silberlicht' weiß, wüchsig	Apr–Mai	35	◐●	E
<b>Bistorta (Syn. Polygonum)</b> Knöterich	<b>Polygonaceae</b>			
affinis 'Kabouter' rosa, guter Bodendecker	Juli–Sept	15	△○	B
affinis 'Superbum' rosa, bekannte Sorte	Juli–Sept	25	◐●	B
amplexicaulis 'Album' Kerzen-Knöterich, weiß, wertvoll	Juli–Okt	90	◐●	G
amplexicaulis 'Inverleith' rot, kompakter Wuchs	Juli–Nov	50	◐●	G
amplexicaulis 'Orange Field' orangerosa	Juli–Okt	100	◐●	G
amplexicaulis 'Pink Elephant' hellrosa	Juli–Okt	100	◐●	G
amplexicaulis 'Speciosum' tiefrot	Juli–Okt	120	○	G
officinalis 'Superbum' hellrosa	Mai–Aug	80	◐●	E
<b>Boltonia</b> Sternwolken-Scheinaster	<b>Asteraceae</b>			
asteroides 'Snowbank' weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig	Aug–Sept	120	○	E
<b>Brunnera</b> Kaukasusvergissmeinnicht	<b>Boraginaceae</b>			
macrophylla hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	40	◐●	D
macrophylla 'Hadspen Cream' blau, gelbgerandetes Laub	Apr–Mai	50	◐●	F
macrophylla 'Jack Frost'® blau, silbrig weißes Laub	Apr–Mai	40	◐●	G
macrophylla 'Looking Glass' blau, weißsilbrig Blatt	Apr–Mai	30	◐●	H
macrophylla 'Mr Morse'® weiss, silbrig weißes Laub	Apr–Juni	35	◐●	G
<b>Buglossoides</b> Steinsame	<b>Boraginaceae</b>			
purpureoerulea rötlich, später blau, wüchsig	Apr–Juni	30	◐●	C
<b>Bupthalmum</b> Ochsenauge, Gelbe Scheinmargerite	<b>Asteraceae</b>			
salicifolium gelb, schöne Knospe	Juni–Aug	45	○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Calamintha</b> Bergminze	<b>Lamiaceae</b>			
nepeta 'Triumphator' weiß, duftendes Blatt, Dauerblüher	Juli–Sept	35	○	C
nepeta 'Blue Cloud' hellblauviolett, lockerer Wuchs	Juli–Sept	40	○	C
<b>Campanula</b> Glockenblume	<b>Campanulaceae</b>			
carpatica 'Blaue Clips' Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau	Juni–Juli	20	△○	A
carpatica 'Weiße Clips' weiß	Juni–Juli	20	△○	A
cochleariifolia 'Bavaria Blue' dunkelblau	Juni–Aug	10	△○	C
cochleariifolia 'Bavaria White' weiß	Juni–Aug	10	△○	C
garganica blauviolett, sternförmige Blüten, schöne Polster ohne Ausläufer	Juni–Juli	10	△○	C
garganica 'Erinus Major' blauviolett, schöne Polster ohne Ausläufer	Juni–Aug	15	△○	D
glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○●	B
glomerata 'Alba' reinweiß	Juni–Aug	35	○●	B
glomerata 'Dahurica' dunkelviolett	Juni–Aug	60	○	B
lactiflora 'Loddon Anne' Dolden-Glockenblume, zartrosa	Juni–Aug	90	○●	E
lactiflora 'Prichard' hellviolett, großblütig	Juni–Aug	80	○●	E
latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	○●	C
latifolia var. macrantha 'Alba' weiß, großblumig	Juni–Juli	100	○●	D
persicifolia 'Chettle Charme' weiß, blauer Rand	Juni–Juli	80	○●	G
persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiß	Juni–Juli	80	○●	B
persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○●	B
portenschlagiana Polster-Glockenblume, violett, anspruchslos	Juni–Aug	15	△○	C
portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○	C
poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Aug	15	△○	C
poscharskyana 'Blauranke' hellviolettblau, wüchsig	Juni–Sept	20	△○	D
poscharskyana 'Blue Rivulet'® lavendelblau	Juni–Sept	15	△○	D
poscharskyana 'Blue Waterfall' blau	Juni–Sept	10	△○	G
poscharskyana 'E. H. Frost' weiß	Juni–Sept	15	△○	C
poscharskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○	C
poscharskyana 'Stella' dunkelviolett, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○	C



Campanula glomerata 'Alba'



Centaurea macrocephala



Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'

Crocosmia x crocosmiiflora  
'George Davidson'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
rotundifolia 'Olympica' Wiesen-Glockenblume, blau, reichblühend	Juli–Aug	20	△○	C
trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett	Juli–Aug	80	○●	C
<b>Carlina</b> Silberdistel	<b>Asteraceae</b>			
acaulis ssp. simplex silberweiß	Juli–Aug	30	△○	D
<b>Catananche</b> Rasselblume	<b>Asteraceae</b>			
caerulea violettblau, wärmeliebend	Juli–Aug	60	○	C
<b>Centaurea</b> Flockenblume	<b>Asteraceae</b>			
dealbata rosa	Juni–Juli	70	○	C
macrocephala Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude	Juli–Aug	125	○	C
montana Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig	Mai–Juli	40	○	C
montana 'Black Sprite' violett-schwarz	Mai–Juni	40	○●	F
<b>Centranthus</b> Spornblume	<b>Valerianaceae</b>			
ruber 'Albus' reinweiß, Dauerblüher, aussamend	Juni–Sept	60	○	C
ruber 'Coccineus' leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen	Juni–Sept	60	○	C
<b>Cerastium</b> Hornkraut	<b>Plumbaginaceae</b>			
tomentosum 'Silberteppich' weiß, silbrige Polster	Mai–Juni	15	△○	A
<b>Ceratostigma</b> Scheinbleiwurz	<b>Asteraceae</b>			
plumbaginoides blau, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	25	△○	D
<b>Chamaemelum (Syn. Anthemis)</b> Römische Scheinkamille	<b>Scrophulariaceae</b>			
nobile 'Plena' weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend	Juni–Aug	20	△○	C
nobile 'Treneague' Duft-, Rasenkamille, nicht blühend		10	△○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Chelone</b> <i>Schlangenkopf, Schildblume</i>	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>obliqua tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude</i>	Aug–Okt	80	○●	D
<i>obliqua 'Alba' schöne wüchsige Rabattenstaude</i>	Aug–Okt	80	○●	E
<b>Chiastophyllum</b> <i>Goldtröpfchen</i>	<b>Crassulaceae</b>			
<i>oppositifolium gelb, überhängende Rispen</i>	Juni–Juli	20	△●	C
<b>Chrysanthemum</b> <i>Winteraster</i>	<b>Asteraceae</b>			
× hortorum 'Anastasia' (Syn. 'Anja's Bouquet') <i>violettrosa, Pompon</i>	Sept–Okt	70	○	D
× hortorum 'Bienchen' <i>gelbbraun, gefüllt</i>	Sept–Okt	70	○	D
× hortorum 'Fellbacher Wein' <i>weinrot halbgefüllt</i>	Okt–Nov	70	○	D
× hortorum 'Mandarine' <i>goldbronze, gefüllt</i>	Sept–Okt	60	○	D
× hortorum 'Poesie' <i>weiß, gefüllt</i>	Aug–Okt	90	○	D
<i>arcticum</i> siehe <i>Arcanthemum arcticum</i>				
<i>coccineum</i> siehe <i>Tanacetum coccineum</i>				
<i>leucanthemum</i> siehe <i>Leucanthemum vulgare</i>				
<i>maximum</i> siehe <i>Leucanthemum maximum</i>				
<b>Chrysogonum</b> <i>Goldkörbchen</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>virginianum tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker, reichblühend</i>	Mai–Aug	20	○	D
<b>Chrysopsis</b> <i>Goldaster</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>speciosa 'Golden Sunshine' gelb, sehr empfehlenswerte Rarität</i>	Sept–Nov	120	○	E
<b>Cimicifuga</b> <i>Silberkerze</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>japonica</i> var. <i>acerina</i> <i>Ahornblättrige Silberkerze, weiß</i>	Aug–Sept	90	●●	F
<i>racemosa</i> var. <i>cordifolia</i> <i>weiß, verzweigt</i>	Aug–Sept	180	●●	F
<i>ramosa</i> <i>weiß</i>	Sept–Okt	180	●●	F
<i>ramosa</i> 'Atropurpurea' <i>weiß, braunrotes Blatt, wertvoll</i>	Sept–Okt	180	●	G
<i>ramosa</i> 'Chocoholic' <sup>®1</sup> <i>cremrosa, dunkelrotes Blatt</i>	Aug–Okt	80	●●	H
<i>ramosa</i> 'Pink Spike' <i>hellrosa, dunkelbraunrotes Blatt</i>	Aug–Okt	150	●●	H
<i>simplex</i> 'Brunette' <i>gelblich weiß</i>	Sept–Okt	150	●●	H
<i>simplex</i> 'White Pearl' <i>silberweiße Blütenkerzen</i>	Sept–Okt	130	●●	F

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Convallaria</b> <i>Maiglöckchen</i>	<i>Liliaceae</i>			
<i>majalis</i> weiß, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude	Mai	25	◐●	C
<i>majalis</i> weiß, duftende Blüte, rote Früchte, Blühkeime	Mai	25	◐●	E
<b>Coreopsis</b> <i>Mädchenauge</i>	<i>Asteraceae</i>			
<i>grandiflora</i> 'Schnittgold' gelb	Juni–Aug	60	○	B
<i>grandiflora</i> 'Sonnenkind' tiefgelb, reichblühend, kompakt	Juni–Aug	40	○	B
<i>grandiflora</i> 'Sunray' tiefgelb, halbgefüllt	Juni–Aug	70	○	B
<i>lanceolata</i> 'Sterntaler' gelb mit braunem Ring, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○	B
<i>rosea</i> 'American Dream' hellrosa	Aug–Sept	25	○	D
<i>verticillata</i> (Syn. vert. 'Grandiflora') gelb, reichblühend, nadelförmiges Blatt	Juni–Sept	55	○	C
<i>verticillata</i> 'Golden Gain' leuchtend gelb, wüchsig	Juli–Sept	45	○	G
<i>verticillata</i> 'Moonbeam' hellgelb	Juni–Sept	50	○	D
<i>verticillata</i> 'Zagreb' tiefgelb, reichblühend	Juni–Sept	25	○	C
<b>Corydalis</b> <i>Leichensporn</i>	<i>Papaveraceae</i>			
<i>flexuosa</i> 'Purple Leaf' blau, dunkelgrünes Blatt im Austrieb rötlich purpur	Apr–Juni	30	◐	E
<i>lutea</i> Schein-Leichensporn, gelb, Dauerblüher	Mai–Okt	30	◐●	C
<b>Cotula</b> (Syn. <i>Leptinella</i> ) <i>Fiederpolster</i>	<i>Asteraceae</i>			
<i>dioica</i> gelblich	Mai–Juni	5	△○	B
<i>potentillina</i> gelblich, graugrüner Rasen	Juli–Aug	5	△○	B
<i>squalida</i> gelb grünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker	Juli–Aug	5	△○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Crambe</b> <i>Meerkohl</i>	<b>Brassicaceae</b>			
<i>cordifolia</i> weiß, großer Blütenstand	Juni–Juli	150	○	F
<b>Crocsmia</b> <i>Garten-Montbretie</i>	<b>Irdaceae</b>			
× <i>crocsmiiflora</i> 'Emily McKenzie' orangeroth	Juli–Sept	60	○	E
× <i>crocsmiiflora</i> 'George Davidson' gelb	Juli–Sept	55	○	E
× <i>crocsmiiflora</i> 'Lucifer' rot	Juli–Sept	100	○	E
<b>Cyclamen</b> <i>Alpenveilchen</i>	<b>Primulaceae</b>			
<i>coum</i> Frühlings-Alpenveilchen, rosarote Farben, Humusboden mit Kalk	Feb–März	10	●●	F
<i>coum</i> 'Album' weiß, Blattschmuck	Feb–März	10	○●	F
<i>hederifolium</i> 'Perlent Teppich' Herbst-Alpenveilchen, reinweiß	Sept–Okt	15	●●	F
<i>hederifolium</i> 'Rosent Teppich' rosa	Sept–Okt	15	●●	F
<b>Cymbalaria</b> <i>Mauer-Zimbelkraut</i>	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>muralis</i> hellviolett, absonnige Lage	Juni–Sept	10	△○	B
<b>Darmera</b> <i>Schildblatt, Schirmsteinbrech</i>	<b>Saxifragaceae</b>			
<i>peltata</i> rosa, großes Blatt, orangegelbe Herbstfärbung	Mai–Juni	65	○●	E
<b>Delosperma</b> <i>Mittagsblume</i>	<b>Aizoaceae</b>			
<i>cooperi</i> purpurrot, fleischiges Blatt, Dauerblüher, vor Winternässe schützen	Juni–Okt	15	△○	C
<i>nubigenum</i> 'Lesotho' gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz	Mai–Juni	5	△○	C
spec. 'Graaf Reineth' weiß	Mai–Sept	10	○	C
<b>Delphinium</b> <i>Rittersporn</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
× <i>belladonna</i> 'Atlantis' dunkelviolettblau, sehr schön	Juli–Aug	80	○	F
× <i>belladonna</i> 'Bellamosum' violettblau	Juni–Aug	120	○	D
× <i>belladonna</i> 'Capri' hellblau, weißes Auge	Juni–Okt	120	○	F
× <i>belladonna</i> 'Moerheimii' weiß	Juni–Okt	120	○	F
× <i>belladonna</i> 'Piccolo' leuchtend blau	Juni–Okt	100	○	F
× <i>belladonna</i> 'Völkerfrieden' tiefblau	Juni–Okt	120	○	F
× <i>cultorum</i> Magic Fountain 'Dunkelblau, Biene dunkel' standfeste Sorte	Juni–Sept	80	○	D
× <i>cultorum</i> Magic Fountain 'Dunkelblau, Biene weiß' standfeste Sorte	Juni–Sept	80	○	D





Darmera peltata



Dicentra spectabilis



Dictamnus albus



Draba bruniifolia

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
× cultorum Magic Fountain 'Himmelblau, Biene weiß' <i>standfeste Sorte</i>	Juni–Sept	80	○	D
× cultorum Magic Fountain 'Lilarosa, Biene weiß' <i>violettrosa, standfest</i>	Juni–Sept	80	○	D
× cultorum Magic Fountain 'Weiß, Biene dunkel' <i>standfeste Sorte</i>	Juni–Sept	80	○	D
× ruyssii 'Pink Sensation' <i>rosa</i>	Juni–Sept	100	○	F
elatum 'Finsteraarhorn' <i>blau, braunes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	160	○	F
elatum 'Gewitterstimmung' <i>dunkellila</i>	Juni–Sept	150	○	F
elatum Highlander S. 'Sweet Sensation' <i>lilablau, gefüllt</i>	Juni–Juli	100	○	H
elatum 'Jubelruf' <i>blau, weißes Auge</i>	Juni–Sept	180	○	F
elatum 'Lanzenträger' <i>enzianblau, weißes Auge, remontierend</i>	Juni–Sept	180	○	F
elatum 'Ouverture' <i>blau mit rosa, braunes Auge</i>	Juni–Sept	160	○	F
elatum 'Sommerwind' <i>hellblau, weißes Auge</i>	Juni–Aug	160	○	F
elatum 'Waldenburg' <i>dunkelblau, schwarzes Auge</i>	Juni–Sept	150	○	F
F1-Hybride 'Double Innocence' <i>cremeweiß gefüllt, standfest, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	F
F1-Hybride 'Purple Passion' <i>dunkellila, weiße Biene, standfest, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	F
F1-Hybride 'Royal Aspirations' <i>tiefblau, weiße Biene, standfest, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	F
F1-Hybride 'Sunny Skies' <i>hellblau mit weißer Biene, standfest</i>	Juni–Sept	160	○	F
F1-Hybride 'Sweethearts' <i>rosa, weiße Biene, standfest, gesund</i>	Juni–Sept	160	○	F
F1-Serie New Millenium 'Dusky Maiden' <i>rosa, Auge braun, remontierend</i>	Juni–Juli	160	○	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
grandiflorum 'Blauer Zwerg' violettblau, Zwergform	Juni–Sept	40	○	D
Pacific-Hybride 'Astolat' rosa	Juni–Sept	180	○	D
Pacific-Hybride 'Black Knight' dunkelviolet	Juni–Sept	180	○	D
Pacific-Hybride 'Blue Bird' mittelblau	Juni–Sept	180	○	D
Pacific-Hybride 'Galahad' reinweiß	Juni–Sept	180	○	D
Pacific-Hybride 'King Arthur' dunkelviolet, weiße Mitte	Juni–Sept	150	○	D
Pacific-Hybride 'Summer Skies' hellblau	Juni–Sept	180	○	D
<b>Dianthus</b> Nelke	<b>Caryophyllaceae</b>			
arenarius weiß, konkurrenzschwach, duftend	Juni–Aug	20	△○	C
carthusianorum rosarot, heimische Karthäuser-Nelke	Juni–Sept	40	△○	C
deltoides 'Albus' Heide-Nelke, weiß	Juni–Aug	15	△○	A
deltoides 'Brillant' rot	Juni–Aug	15	△○	A
deltoides 'Leuchtfunk' scharlachrot, dunkles Laub	Juni–Aug	15	△○	A
gratianopolitanus 'Badenia' (Syn. caesius) rosarot	Mai–Juni	10	△○	C
gratianopolitanus 'Dinetta Lilac' lilarosa	Juni–Juli	20	△○	D
gratianopolitanus 'Dinetta Pink' rosa, doppeltes, graugrünes Blatt	Juni–Juli	20	△○	D
gratianopolitanus 'Eydangeri' violettrosa	Mai–Juni	15	△○	C
gratianopolitanus 'Feuerhexe' rot	Mai–Juni	10	△○	C
gratianopolitanus 'Rotkäppchen' purpurrot	Mai–Juli	15	△○	C
gratianopolitanus 'Rubin' dunkelrot, kompakte graublauer Polster	Mai–Juni	10	△○	C
gratianopolitanus 'Stäfa' rosa	Mai–Juni	10	△○	C
plumarius 'David' leuchtend rot	Juni–Juli	25	△○	D
plumarius 'Desmond' rot, halbgefüllt	Juni–Juli	25	△○	D
plumarius 'Doris' rosa mit rotem Ring	Juni–Juli	30	△○	D
plumarius 'Haytor' weiß, gefüllt	Juni–Juli	30	△○	D
plumarius 'Heidi' purpurrot, gefüllt	Juni–Juli	25	△○	D
plumarius 'Maggie' rosa gefüllt mit roter Mitte	Juni–Juli	25	△○	D
<b>Dicentra</b> Tränendes Herz, Herzblume	<b>Papaveraceae</b>			
eximia Herzblume, purpurrosa, farnartiges Laub	Mai–Aug	25	●○	D
formosa 'King of Hearts' rosa	Mai–Aug	25	○●	H

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

### Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<i>formosa</i> 'Luxuriant' dunkelrot, Langblüher	Juni–Aug	30	◐○	E
<i>spectabilis</i> <i>Tränendes Herz</i> , rosarot, bekannte Bauerngartenstaude	Mai–Juni	80	◐○	E
<i>spectabilis</i> 'Alba' reinweiß	Mai–Juni	70	◐○	E
<i>spectabilis</i> 'Valentine' orangerot, dunkleres Blatt	Mai–Juni	60	○○◐	G
<b>Dictamnus</b> <i>Diptam</i> , Brennender Busch	<b>Rutaceae</b>			
<i>albus rosa</i> , wärmeliebend, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○○◐	F
<i>albus</i> 'Albiflorus' weiß, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○○◐	F
<b>Digitalis</b> <i>Fingerhut</i>	<b>Scrophulariaceae</b>			
× <i>mertonensis</i> <i>orangerosa</i>	Juni–Juli	65	○○◐	C
<i>ferruginea</i> 'Gelber Herold' gelb, zweijährig	Juli–Aug	140	○○◐	C
<i>grandiflora</i> <i>Großblütiger Fingerhut</i> , gelb, großblumig	Juni–Aug	75	○	C
<i>lutea</i> hellgelb	Juni–Aug	80	◐	B
<i>purpurea</i> 'Alba' weiß, zweijährig, Bienenweide	Juni–Juli	100	○○◐	C
<i>purpurea</i> 'Excelsior' rosa, rot, weiß, großblütig, zweijährig	Juni–Juli	120	○○◐	B
<i>purpurea</i> 'Gloxiniaeflora' rosarote Farbmischung, großblütig	Juni–Juli	125	○○◐	B
<b>Dodecatheon</b> <i>Götterblume</i> , Sternschnuppenblume	<b>Primulaceae</b>			
<i>meadia</i> <i>dunkelrosa</i> , <i>graziöse Blüten</i>	Mai–Juni	30	◐	D
<b>Doronicum</b> <i>Gämswurz</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>orientale</i> 'Little Leo' gelb, kompakter Wuchs	Apr–Mai	35	○○◐	D
<i>orientale</i> 'Magnificum' tiefgelb, großblumig	Apr–Mai	35	○○◐	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Draba</b> <i>Felsenblümchen</i>	<b>Brassicaceae</b>			
<i>aizoides</i> tiefgelb, schöner Frühlingsblüher	März–Apr	10	△○	B
<b>Dryas</b> <i>Silberwurz</i>	<b>Rosaceae</b>			
× <i>suendermannii</i> weiß, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz	Juni–Juli	15	△○	D
<i>octopetala</i> weiß, halbwintergrün, schwach wachsend	Juni–Juli	15	△○	D
<b>Echinacea</b> <i>Purpursonnenhut</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>purpurea</i> 'Alba' (Syn. 'White Swan') weiß	Juli–Sept	70	○	C
<i>purpurea</i> 'Baby Swan White' weiß, Wuchs verzweigt, kompakt	Juli–Sept	50	○	E
<i>purpurea</i> 'Doppeldecker' purpurrot, zweiter Blütenkranz	Juli–Sept	90	○	E
<i>purpurea</i> 'Fatal Attraction' <sup>®1</sup> TC, rosarot	Juli–Sept	75	○	H
<i>purpurea</i> 'Green Jewel' <sup>®1</sup> grüne, 10 cm große Blüten	Juni–Sept	50	○	H
<i>purpurea</i> 'Harvest Moon' <sup>®1</sup> TC, orangegelb	Juli–Sept	65	○	H
<i>purpurea</i> 'Kims Knee High' <sup>®1</sup> TC, dunkelpurpur, kompakt	Juli–Sept	50	○	G
<i>purpurea</i> 'Kims Mophead' <sup>®1</sup> TC, weiß, kompakt	Juni–Sept	45	○	G
<i>purpurea</i> 'Leuchtstern' purpurrot	Juli–Sept	80	○	C
<i>purpurea</i> 'Little Magnus' purpurrosa	Juli–Sept	45	○	H
<i>purpurea</i> 'Magnus' tiefrot	Juli–Sept	100	○	C
<i>purpurea</i> 'Mistral' <sup>®1</sup> rosa	Juli–Sept	30	○	H
<i>purpurea</i> 'PowWow White' weiß	Juli–Sept	80	○	G
<i>purpurea</i> 'Razzmatazz' <sup>®1</sup> TC, purpurroter Pompon	Juli–Sept	90	○	H
<i>purpurea</i> 'Sundown' <sup>®1</sup> TC, purpurorange, reichblühend	Juli–Sept	90	○	H
<i>purpurea</i> 'Sunrise' <sup>®1</sup> TC, gelb	Juli–Sept	80	○	H
<i>purpurea</i> 'Sunset' <sup>®1</sup> TC, orangerot	Juli–Sept	80	○	H
<i>purpurea</i> 'Tomato Soup' <sup>®1</sup> rot	Juni–Sept	70	○	H
<b>Echinops</b> <i>Kugeldistel</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>banaticus</i> 'Blue Globe' dunkelblau	Juli–Sept	125	○	E
<i>ritro</i> violettblaue Blütenköpfe	Juli–Sept	80	○	D
<i>ritro</i> 'Veitchs Blue' violettblau, Bienenweide, remontierend	Juli–Sept	65	○	E


 Epimedium x youngianum  
'Niveum'


Eremurus robustus



Erodium x variable 'Bishop'



Euphorbia polychroma 'Bonfire'®

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Epimedium</b> <i>Elfenblume</i>	<b>Berberidaceae</b>			
grandiflorum 'Akebono' hellrosa, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	30	●○	F
x perralchicum 'Frohneiten' gelb, Bodendecker	Apr–Mai	30	●○	D
x rubrum rot	Apr–Mai	30	●○	D
x versicolor 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	30	●○	D
x warleyense 'Orangekönigin' hellorange, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	35	●○	D
x youngianum 'Niveum' weiß	Apr–Mai	20	●○	E
x youngianum 'Roseum' (Syn. 'Lilacinum') hellviolett	Apr–Mai	20	●○	E
grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	●○	E
pinnatum ssp. colchicum (Syn. 'Elegans') gelb, Bodendecker	Apr–Mai	35	●○	E
<b>Eremurus</b> <i>Steppenkerze, Lilienschweif</i>	<b>Liliaceae</b>			
x isabellinus 'Ruiter's-Hybride' gelbe bis rote Farbtöne, wüchsige Sorte	Juni–Juli	160	○	G
robustus <i>Riesen-Steppenkerze, hellrosa bis gelbweiß, kostbare Art</i>	Juni–Juli	250	○	I
stenophyllus var. stenophyllus (Syn. bungei) reingelbe Blütenkerzen	Juni–Juli	100	○	H
<b>Erigeron</b> <i>Feinstrahl, Berufkraut</i>	<b>Asteraceae</b>			
x cultorum 'Dunkelste Aller' blau, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○	D
x cultorum 'Rosa Juwel' violettrosa	Juni–Aug	70	○	C
x cultorum 'Rotes Meer' rot, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○	D
x cultorum 'Seabreeze'® rosa, kompakt	Aug–Okt	30	○	E
x cultorum 'Sommerneuschnee' weiß bis zartrosa	Juni–Aug	60	○	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Erinus</b> <i>Alpen-Leberbalsam</i>	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>alpinus purpurrosa, reichblühende Felsenstaude</i>	Mai–Juli	10	△○	C
<b>Eriophyllum</b> <i>Wollblatt</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>lanatum gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden</i>	Juni–Aug	25	△○	B
<b>Erodium</b> <i>Reiherschnabel</i>	<b>Geraniaceae</b>			
× <i>variabile 'Bishop' rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum</i>	Mai–Sept	10	△○	D
<i>reichardii 'Album' weiß</i>	Mai–Sept	5	△○	D
<b>Eryngium</b> <i>Edeldistel, Mannstreu</i>	<b>Apiaceae</b>			
× <i>zabelli 'Big Blue' silbrig blau</i>	Juli–Aug	80	○	H
<i>alpinum 'Blue Star' tief blauviolett, großblumig</i>	Juli–Aug	80	○	E
<i>planum zahlreiche blaue Blütenköpfe</i>	Juli–Aug	90	○	C
<i>variifolium blaugraue Blütenköpfe, Blatt dekorativ marmoriert, kompakt</i>	Juli–Aug	40	○	E
<b>Eupatorium</b> <i>Wasserdost</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>fistulosum 'Atropurpureum' dunkelpurpurrot, rote Stängel</i>	Juli–Sept	180	○●	E
<i>rugosum 'Chocolate' weiß, rotbraunes Laub</i>	Juli–Sept	70	○●	E
<b>Euphorbia</b> <i>Wolfsmilch</i>	<b>Euphorbiaceae</b>			
× <i>martinii grünelb, wintergrün, schönes Laub</i>	Mai–Juli	60	○	F
× <i>martinii 'Ascot Rainbow'® gelbgrün</i>	Apr–Aug	50	○	F
<i>amygdaloides 'Purpurea' grünelb, rotblättrig</i>	Apr–Juni	40	●	E
<i>amygdaloides var. robbiae grünlich gelb, schöne Winterfärbung</i>	Apr–Mai	30	●	E
<i>characias 'Humpty Dumpty' gelb, grünes Blatt, kompakter Wuchs</i>	April–Juni	80	○	F
<i>characias ssp. wulfenii gelbgrün, grünes Laub</i>	Apr–Juni	70	○	F
<i>characias ssp. wulfenii 'Silver Swan'® hellgelb</i>	Apr–Juni	60	○	F
<i>cyparissias 'Fens Ruby' (Syn. 'Cl. Howard') gelb, roter Austrieb, attraktiv</i>	Mai–Juni	25	○	D
<i>dulcis 'Chameleon' gelbgrün, purpurrotes Laub, Herbstfärbung</i>	Mai–Aug	35	○	E
<i>griffithii 'Fireglow' orangerot, Herbstfärbung</i>	Mai–Juli	70	○	F
<i>myrsinites Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe</i>	Mai–Juli	20	△○	C
<i>polychroma Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude</i>	Mai–Juni	35	○	C
<i>polychroma 'Bonfire'® gelb, rotlaubig, schöne Herbstfärbung</i>	April–Mai	30	○	F

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<i>seguieriana</i> subsp. <i>niciana</i> hellgelb, graugrünes Blatt	Mai–Aug	40	○	E
<b>Filipendula</b> <i>Mädesüß, Spierstaude</i>	<b>Rosaceae</b>			
<i>purpurea</i> 'Elegans' hellrosa Blütendolden	Juli–Aug	90	○◐	E
<i>rubra</i> 'Venusta' rosarot, helleres Laub	Juli–Aug	150	○◐	E
<i>ulmaria</i> weiß, heimische Wildstaude	Juni–Aug	110	○◐	C
<i>vulgaris</i> (Syn. <i>hexapetala</i> ) weiß, heimische Wildstaude	Juni–Juli	50	○◐	C
<b>Fragaria</b> <i>Zier-Erdbeere</i>	<b>Rosaceae</b>			
<i>chiloense</i> 'Chaval' weiß, empfehlenswerter Bodendecker	Apr–Okt	15	○◐	B
<i>vesca</i> 'Rosea' rosa, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○◐	D
<i>vesca</i> 'Rubra' rot, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○◐	D
<b>Fritillaria</b> <i>Kaiserkrone, Schachbrettblume</i>	<b>Liliaceae</b>			
<i>imperialis</i> 'Lutea Maxima' Kaiserkrone, gelb	Apr–Mai	80	○	I
<i>imperialis</i> 'Rubra Maxima' rot, vor Spätfrost schützen	Apr–Mai	80	○	I
<b>Fuchsia</b> <i>Fuchsie</i>	<b>Oenotheraceae</b>			
<i>magellanica</i> 'Alba' weiß	Juli–Sept	40	●	E
<i>magellanica</i> 'Madame Cornelissen' rotweiß, Dauerblüher	Juli–Sept	70	●	E
<i>magellanica</i> 'Riccartonii' dunkelrotviolett	Juli–Sept	70	●	E
<i>magellanica</i> var. <i>gracilis</i> rot, Dauerblüher, feines Laub	Juli–Okt	70	●	E
<b>Gaillardia</b> <i>Kokardenblume</i>	<b>Asteraceae</b>			
× <i>grandiflora</i> 'Burgunder' (Syn. × <i>grandiflora</i> ) tiefrot	Juli–Sept	70	○	B
× <i>grandiflora</i> 'Kobold' gelb mit rot, gedrungene Sorte	Juli–Sept	25	○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Gaura</b> <i>Prachtkerze</i>	<b>Oenotheraceae</b>			
lindheimeri 'Summer Breeze' weiß, rosa Staubgefäße	Juli–Sept	100	○	D
lindheimerii 'Siskiyou Pink' dunkelrosa, Dauerblüher	Juli–Okt	80	○	E
lindheimerii 'Whirling Butterflies' weiß, Staunässe vermeiden	Juni–Okt	80	○	E
<b>Gentiana</b> <i>Enzian</i>	<b>Gentianaceae</b>			
acaulis Stängelloser Enzian, tiefblau, lehmiger Standort	Mai–Juni	10	△○	F
cruciata blauviolett, anspruchslos, kalkliebend	Juli–Aug	30	△○	E
septemfida var. lagodechiana Sommer-Enzian, violettblau	Juli–Aug	15	△○	D
sino-ornata Herbst-Enzian, blau, niederliegende Triebe, saurer Boden	Sept–Okt	15	△●	F
<b>Geranium</b> <i>Storchschnabel</i>	<b>Geraniaceae</b>			
× cantabrigiense 'Berggarten' purpurrosa, reichblühend, Teppich bildend	Mai–Juni	35	△○	B
× cantabrigiense 'Biokovo' weiß, reichblühend	Mai–Juli	30	△○	B
× cantabrigiense 'Harz' weiß, wüchsig, Teppich bildend	Mai–Juni	25	△○	B
× cantabrigiense 'Karina' purpurrosa	Mai–Juni	25	△○	B
× cantabrigiense 'Rosalina' hell-purpurrosa, rötliche Herbstfärbung	Mai–Juni	25	△○	B
× cantabrigiense 'Saint Ola' weiß, größere Blüten als 'Biokovo'	Mai–Juni	30	△○	B
× cultorum 'Blushing Turtle'® rosa, kompakt	Juni–Sept	60	○●	H
× cultorum 'Eureka Blue' blau, groß, Dauerblüher	Juni–Sept	60	○●	G
× cultorum 'Orkney Cherry'® rosa, bronzefarbiges Laub	Mai–Okt	25	△○	G
× magnificum (Syn. platypetalum) blauviolett, wüchsig, Herbstfärbung	Mai–Juni	65	○●	C
× magnificum 'Rosemoor' blauviolett, guter Bodendecker	Mai–Juli	35	○●	C
× oxonianum 'Claridge Druce' violettrosa, wüchsig	Juni–Juli	50	○●	C
× oxonianum 'Claridge Druce' violettrosa, wüchsig	Juni–Juli	50	○●	D
× oxonianum 'Rosenlicht' dunkelrosa, sehr schöne Sorte	Mai–Juli	40	●	C
× oxonianum 'Wargrave Pink' tief orangerosa, altbewährte Sorte	Mai–Juli	35	●	C
× procurrens 'Ann Folkard' purpurrot, großblumig	Juli–Aug	15	○●	F
× wallichianum 'Pink Penny'® rosa, Dauerblüher	Juni–Nov	45	○●	H
× wallichianum 'Rozanne'® violettblau, Dauerblüher	Juni–Aug	45	○●	G
cinereum 'Ballerina' violettrosa geaderte Blüten, reich blühend	Mai–Juni	15	△○	D





Gentiana acaulis



Geranium himalayense 'Gravetye'



Geum coccineum 'Borisii'



Gunnera tinctoria

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
cinereum 'Giuseppii' <i>purpurrot</i>	Mai–Juni	15	△○	D
cinereum 'Laurence Flatman' <i>violettrosa, dunkler als 'Ballerina'</i>	Mai–Juni	15	△○	D
cinereum 'Thumbing Heart'® <i>rosa mit dunkler Mitte</i>	Juni–Juli	15	△○	F
cinereum var. <i>subcaulescens purpurrot</i>	Juni–Juli	15	△○	D
dalmaticum <i>rosa, schwachwüchsige Art, rote Herbstfärbung</i>	Mai–Juni	10	△○	D
endressii <i>rosa, bodendeckend</i>	Juni–Aug	50	○●	B
gracile 'Sirak' <i>violettrosa, große geaderte Blüte, guter Bodendecker</i>	Juni–Juli	55	○●	D
himalayense 'Gravetye' <i>blau, Blüten rot geadert</i>	Mai–Juni	35	○●	B
himalayense 'Plenum' (Syn. 'Birch Double') <i>hellblau, gefüllt</i>	Mai–Juni	40	○●	D
ibericum 'Vital' <i>blauviolett, guter Bodendecker</i>	Mai–Juni	60	○	C
macrorrhizum <i>purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung</i>	Mai–Juli	40	○●	B
macrorrhizum 'Bevan's Variety' <i>purpurrot</i>	Mai–Juli	40	○●	B
macrorrhizum 'Ingwersen' <i>hellrosa, Teppich bildend</i>	Juni–Juli	40	○●	B
macrorrhizum 'Olympos' <i>dunkelrosa</i>	Mai–Juli	35	○●	C
macrorrhizum 'Spessart' <i>weiß, bekannter Flächendecker</i>	Mai–Juni	40	○●	B
maculatum 'Espresso' <i>rosa, braunes Laub</i>	Juni–Juli	45	○	F
nodosum <i>rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker</i>	Mai–Okt	40	●●	D
phaeum <i>purpurschwarz, heimische Art, wüchsig</i>	Mai–Juli	60	○●	E
phaeum 'Samobor' <i>bräunlich purpur, braungeflecktes Laub</i>	Mai–Juli	50	○●	D
pratense 'Hocus Pocus'® <i>lavendel-purpur</i>	Mai–Aug	50	○	F
pratense 'Johnsons Blue' <i>violettblau, reichblühend</i>	Juni–Aug	50	○●	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
psilostemon 'Dragon Heart' <sup>®</sup> lilarot mit dunklem Auge	Juni–Okt	50	○●	G
psilostemon 'Patricia' hellrot, schwarze Mitte	Mai–Juni	60	○●	F
renardii weiß mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub	Mai–Juni	30	○	D
renardii 'Philippe Vapelle' violett, wüchsig, reich blühend	Mai–Juni	60	○	D
renardii 'Tschelda' hellviolett mit dunklen Adern	Mai–Juni	30	○	E
renardii 'Terre Franche' violettblau, guter Bodendecker	Mai–Juni	55	○	D
sanguineum 'Album' weiß, wüchsig, gelborange Herbstfärbung	Mai–Juni	40	○	C
sanguineum 'Apfelblüte' zartrosa, reichblühend	Mai–Juni	25	○●	C
sanguineum 'Elsbeth' karminrot	Mai–Juni	35	○	C
sanguineum 'Max Frei' leuchtend rot, reichblühend, kompakt	Mai–Juni	20	○	C
sanguineum 'Nanum' karminrot, reichblühend, kompakt	Mai–Juni	20	○	C
sanguineum 'Tiny Monster' violettrot, Dauerblüher, gute Sorte	Mai–Okt	45	○	D
sanguineum var. striatum zartrosa, rötliche Herbstfärbung	Mai–Juni	25	○●	C
sylvaticum 'Mayflower' hellblau, weiße Blütenmitte	Mai–Juli	50	●	D
versicolor rosaweiß, violett geadert	Juni–Aug	35	●●	C
wlassovianum dunkelviolett, schöne Herbstfärbung	Juli–Aug	45	○●	D
<b>Geum</b> Nelkenwurz	<b>Rosaceae</b>			
× heldreichii 'Georgenberg' orangegelb, wüchsig, flacher im Wuchs	Mai–Juli	25	○●	D
chiloense 'Feuerball' (Syn. 'Mrs. Bradshaw') rot, halbgefüllt, großblumig	Juli–Aug	50	●	C
chiloense 'Fire Storm' leuchtend orange, halbgefüllt	Juni–Aug	40	○●	G
chiloense 'Goldball' (Syn. 'Lady Strathaden') tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Aug	50	●	C
coccineum 'Borisii' orangerot	Mai–Juli	30	○●	C
coccineum 'Koi' orange	Mai–Aug	20	○●	G
<b>Gillenia</b> Dreiblattsperie	<b>Rosaceae</b>			
trifoliata weiß mit rötlichem Blütenkelch, Rarität	Juni–Juli	70	○●	F
<b>Globularia</b> Kugelblume				
cordifolia blau, langsamwüchsig	Mai–Juli	10	○	E
<b>Gunnera</b> Mammutblatt	<b>Gunneraceae</b>			
tinctoria (Syn. chilensis) rotbraun, dekorative Riesenstaude	Juli–Aug	200	○	I

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Gypsophila</b> Schleierkraut	<b>Caryophyllaceae</b>			
paniculata 'Bristol Fairy' weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte	Juli–Aug	100	○	F
paniculata 'Flamingo' rosa, halbgefüllt	Juli–Aug	110	○	F
paniculata 'Schneeflocke' weiß, z. T. gefüllt	Juli–Aug	85	○	C
repens Zwerg-Schleierkraut, weiß, einfach	Mai–Juli	20	△○	A
repens 'Rosea' hellrosa, einfach	Mai–Juli	15	△○	A
repens 'Rosenschleier' zartrosa, gefüllt	Juni–Aug	35	△○	C
<b>Helenium</b> Sonnenbraut	<b>Asteraceae</b>			
× cultorum 'Baudirektor Linne' Garten-Sonnenbraut, rotbraun, Bienenweide	Juli–Sept	135	○	E
× cultorum 'Double Trouble' sonnengelb, doppelter Blütenkranz	Juli–Okt	80	○	E
× cultorum 'Goldrausch' gelb	Juli–Aug	150	○	E
× cultorum 'Kanaria' leuchtend gelb	Juli–Aug	110	○	E
× cultorum 'Moerheim Beauty' rotbraun	Juli–Aug	100	○	E
× cultorum 'Rubinzweig' rubinrot	Aug–Sept	90	○	E
× cultorum 'Ruby Tuesday' dunkelrot	Juli–Sept	70	○	E
× cultorum 'Waltraut' gelbbraun	Juni–Aug	90	○	E
× cultorum 'Wyndley' orangegelb, niedrige Sorte	Juni–Aug	85	○	E
bigelovii 'The Bishop' Sommer-Sonnenbraut, gelb	Juni–Aug	60	○	E
hoopesii Frühsommer-Sonnenbraut, orangegelb, großblumig	Mai–Juni	60	○	C
<b>Helianthemum</b> Sonnenröschen	<b>Cistaceae</b>			
× cultorum 'Bronzeteppich' bräunlich, flache Polster	Mai–Juli	15	△○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
× cultorum 'Cerise Queen' <i>purpurrot, gefüllt, lockere Polster</i>	Mai–Juli	20	△○	B
× cultorum 'Dompfaff' <i>rosaziegelrot</i>	Mai–Juli	15	△○	B
× cultorum 'Eisbär' <i>weiß, einfach, graulaubig</i>	Mai–Juli	20	△○	B
× cultorum 'Elfenbeinglanz' <i>hellgelb, goldgelbe Mitte</i>	Mai–Juli	20	△○	B
× cultorum 'Golden Queen' <i>tiefgelb, einfach, reichblühend, grünlaubig</i>	Mai–Juli	20	△○	B
× cultorum 'Hartwood Ruby' <i>dunkelrot, einfach</i>	Mai–Juli	15	△○	E
× cultorum 'Lawrensons Pink' <i>purpurrosa, einfach, grünlaubig</i>	Mai–Juli	15	△○	B
× cultorum 'Rubin' <i>dunkelrot, gefüllt, grünlaubig</i>	Mai–Juli	20	△○	B
× cultorum 'Snow Queen' <i>weiß</i>	Mai–Juli	15	△○	B
× cultorum 'Sterntaler' <i>tiefgelb, flach wachsend</i>	Mai–Juli	15	△○	B
× cultorum 'Watergate Orange' <i>orange gelb</i>	Mai–Juli	20	○	B
<b>Helianthus</b> <i>Sonnenblume</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>atrorubens goldgelb, einfach</i>	Aug–Sept	180	○	E
<i>decapetalus 'Capenoch Star' gelb, einfach</i>	Aug–Sept	180	○	E
<i>decapetalus 'Soleil d'Or' tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher</i>	Aug–Okt	180	○	E
<i>microcephalus 'Lemon Queen' hellgelb, standfest</i>	Aug–Sept	150	○	E
<i>salicifolius Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher</i>	Sept–Okt	250	○	E
<i>tuberosus siehe Küchengarten</i>				
<b>Helichrysum</b> <i>Strohblume</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>italicum siehe Küchengarten</i>				
<i>thianshanicum 'Goldkind' gelb, weißwolliges Blatt</i>	Juni–Juli	25	○	B
<b>Heliopsis</b> <i>Sonnenauge</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>scabra 'Goldgefieder' tiefgelb, gefüllt</i>	Juli–Sept	130	○	E
<i>scabra 'Karat' goldgelb</i>	Juli–Sept	130	○	E
<i>scabra 'Sommersonne' tiefgelb, halbgefüllt</i>	Juli–Sept	120	○	E
<b>Helleborus</b> <i>Christrose, Lenzrose, Nieswurz</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>argutifolius (Syn. lividus ssp. corsicus) Korsische Nieswurz, gelbgrün</i>	März–Apr	40	●●	F
<i>foetidus Palmblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art</i>	März–Apr	40	●	F
<i>niger Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden</i>	Jan–Apr	25	○●	E



Helichrysum thianshanicum



Helleborus niger



Hepatica nobilis



Hosta x fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata')

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
orientalis rot, Lenzrose, rote Farben, robust	Feb–Apr	30	☉●	G
<b>Hemerocallis</b> Taglilie	<b>Liliaceae</b>			
× cultorum 'Aten' orange, großblütig	Juni–Sept	100	○	E
× cultorum 'Atlas' hellgelb, großblumig	Juni–Sept	100	○	E
× cultorum 'Baby Betsy' kirschrot weißer R., kleinblütig	Juni–Aug	50	○	G
× cultorum 'Bumble Bee' orange mit rosarotem Ring	Juni–Aug	30	○	F
× cultorum 'Chicago Apache' scharlachrot, gefranstes Blatt	Juni–Sept	75	○	F
× cultorum 'Corky' zitronengelb, kleinblumig	Juni–Sept	75	○	E
× cultorum 'Crimson Pirate' dunkelrot, großblumig	Juni–Sept	70	○	E
× cultorum 'Frans Hals' gelb mit orange	Juni–Sept	75	○	E
× cultorum 'Gentle Shepherd' cremefarben, Schlund grünlich	Juni–Sept	75	○	G
× cultorum 'Going Bananas®' gelb, grüner Schlund	Juni–Okt	50	○	G
× cultorum 'Little Lassie' violettpurpur mit grünem Schlund	Juni–Sept	60	○	F
× cultorum 'Luxury Lace' hellrosa	Juli–Sept	75	○	E
× cultorum 'Maikönigin' gelb, duftend, früh blühend	Mai–Juni	55	○	E
× cultorum 'Pink Damask' rosa, mittelgroße Blüten	Juni–Sept	90	○	E
× cultorum 'Sammy Russel' tiefrot, kleinblütig	Juni–Sept	70	○	E
× cultorum 'Stella d'Oro' gelb	Juni–Sept	40	○	E
× cultorum 'Summer Wine' hellweinrot, großblumig	Juni–Sept	65	○	E
citrina hellgelb, duftend	Juni–Aug	100	○●	E
fulva aprikosenrot	Juli–Aug	100	○	E
lilioasphodelus (Syn. flava) Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend	Mai–Juni	75	○●	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<i>middendorffii</i> gelb bis zartorange	Mai–Juni	40	○●	E
<i>minor</i> Zwerg-Taglilie, hellgelb, überreich frühblühende Wildart	Mai–Juni	40	○●	E
<i>thunbergii</i> zitronengelb mit dunklerem Schlund, reichblühend	Juli–Aug	70	○●	E
<b>Hepatica</b> Leberblümchen	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>nobilis</i> blau, wertvolle heimische Waldstaude, frühblühend	März–Apr	10	●●	E
<b>Herniaria</b> Bruchkraut	<b>Caryophyllaceae</b>			
<i>glabra</i> 'Serpillifolia' grünlich weiß	Juni–Aug	3	△○	B
<b>Hesperis</b> Nachtviole	<b>Brassicaceae</b>			
<i>matronalis</i> violett, duftend	Mai–Juli	65	○●	C
<b>Heuchera</b> Purpurglöckchen, Purpurblatt	<b>Saxifragaceae</b>			
× <i>brizoides</i> 'Regina' TC, rosa Blüten, rotes marmoriertes Blatt, kompakt	Juli–Aug	50	○●	F
× <i>cultorum</i> Little Cuties 'Coco'® zartrosa, schwarzrotes Blatt	Juli–Aug	30	○●	F
× <i>cultorum</i> 'Marmalade'® pink, orangegelbes Laub	Mai–Juni	45	○●	F
× <i>cultorum</i> 'Obsidian' weiß, schwarzrotbraunes, glänzendes Laub	Juni–Aug	35	○●	F
× <i>villosa</i> 'Caramel'® gelblich weiß, bernsteinfarbenes Laub	Juni–Aug	40	○●	F
× <i>villosa</i> 'Citronella'® cremeweiß, zitronengelbes Blatt	Juni–Aug	40	●	F
'Apple Crisp' weiß, grün gekrauste Blätter	Juni–Aug	25	○●	F
<i>micrantha</i> 'Berry Smoothie' creme-weiß, rosa Laub	Juni–Sept	55	○●	G
<i>micrantha</i> 'Black Beauty'® pink, dunkles weinrotes Laub	Juni–Juli	60	○●	F
<i>micrantha</i> 'Can Can' rosa, rotbraunes gewelltes Laub	Juni–Juli	60	○●	F
<i>micrantha</i> 'Cappuccino' weiß, rotbraunes dunkles Blatt	Juni–Juli	50	○●	F
<i>micrantha</i> 'Chocolate Ruffles'® TC, weiß, rotbraunes, attraktives Laub	Mai–Juli	60	○●	F
<i>micrantha</i> 'Palace Purple' weiß, rotes Blatt	Juli–Aug	50	○●	C
<i>micrantha</i> 'Peach Flambé'® weiß, hellorange	Mai–Juli	40	○●	F
<i>micrantha</i> 'Plum Pudding'® TC, grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt	Juni–Aug	60	○●	F
<i>micrantha</i> 'Rachel' rosa, braunrotes Blatt, wertvolle Sorte	Juli–Aug	60	○●	E
<i>micrantha</i> 'Venus' bläulich grüne Blätter, mit dunkler Blattzeichnung	Juni–Juli	30	○●	F
<i>sanguinea</i> 'Leuchtkäfer' rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart	Mai–Juli	50	○●	B
<i>sanguinea</i> 'White Cloud' weiße Blüten, grüne Blätter	Mai–Juli	50	○●	D

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
× <b>Heucherella</b> <i>Silberglockchen</i>	<b>Saxifragacea</b>			
tiarelloides 'Quicksilver' TC, weiß, stark marmoriertes silbrigrotes Blatt	Mai–Juli	40	○◐	F
tiarelloides 'Stoplight'® gelbes Laub mit roter Mitte	Mai–Juli	40	○◐	G
<b>Hieracium</b> <i>Habichtskraut</i>	<b>Asteraceae</b>			
aurantiacum orangeroth, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Aug	30	△○	A
pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub	Juni–Aug	20	△○	A
<b>Hosta</b> <i>Funkie, Herzblattlilie</i>	<b>Liliaceae</b>			
× cultorum 'August Moon' violett, goldfarbenedes Blatt, wüchsig	Juni–Aug	55	●◐	E
× cultorum 'El Nino'® blaugrau-grünes Blatt, lila Blüten	Juli–Okt	65	●◐	G
× cultorum 'Empress Wu' helllavendel, dunkelgrün, Riesenhosta	Juli–Aug	120–140	●◐	G
× cultorum 'Honshy' dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand	Juli–Aug	60	◐●	G
× cultorum 'Little Sunspot' helllila, goldgelbes Blatt mit grünen Rand	Juni–Juli	20	◐●	G
× cultorum 'Red October' violett, grünes Blatt, rote Stiele	Juli–Okt	40	◐●	G
× cultorum 'Revolution'® TC, violett, Blatt cremegelb-grün	Juni–Aug	60	●◐	G
× cultorum 'Twilight'® lavendelblau, Blatt grün mit hellgelben Rand	Juni–Juli	50	◐●	G
× fortunei 'Albo-marginata' Große Weißrand-Funkie, violett	Juli–Aug	80	○◐	E
× fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') hellviolett, Blatt zweifarbig	Juli–Aug	70	○◐	E
× fortunei 'Aureo-marginata' Goldrand-Funkie, violett, gelber Blattrand	Juli–Aug	60	○◐	E
× fortunei 'Fire and Ice' violett, Blatt weiß mit grünem Rand	Juni–Juli	65	○◐	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
× fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust	Juni–Juli	75	○●	F
× fortunei 'Gold Standard' violett, gelbliches Blatt, wüchsig	Juni–Aug	75	○●	F
× fortunei 'Patriot' violett, graugrünes Blatt mit weißem breiten Rand	Juni–Juli	65	○●	F
× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust	Juli–Aug	55	○●	F
× tardiana 'June' hellviolett, grau-blassgelbes Blatt	Juli–Sept	40	○●	H
× tokudama 'Blue Mouse Ears' violett, blaugüne Blätter	Juni–Juli	25	○●	G
× undulata 'Mediovariegata' hellviolett, weißgrünes Blatt	Juni–Juli	50	●●	E
lancifolia Lanzen-Funkie, dunkelviolett, schmales grünes Blatt	Aug–Sept	50	●●	E
nakaiana 'Golden Tiara' kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig	Juni–Aug	45	●●	F
nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt	Juni–Aug	130	●●	F
plantaginea 'Royal Standard' weiß, duftend, grünes Blatt	Aug–Sept	80	●●	E
plantaginea 'So Sweet' TC, weiß, grünes Blatt mit weißem Rand	Aug–Sept	50	●●	F
plantaginea 'Sum and Substance' hellviolett, Blatt gelbgrün, schneckenresistent	Aug–Sept	80	○●	G
sieboldiana 'Big Daddy' weiblich violett, großes blaugraues Blatt	Juli–Aug	90	○●	F
sieboldiana 'Blue Angel' weiblich violett, großes blaugraues Blatt	Juli–Sept	110	○●	F
sieboldiana 'Elegans' Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt	Juni–Juli	70	○●	F
sieboldiana 'Francess Williams' TC, Blaue Gelbrand-Funkie, weiblich vio.	Juni–Aug	75	●●	F
sieboldiana 'Great Expectations' weiß, gelbe Blattmitte	Juli–Aug	75	○●	G
ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt	Juli–Aug	85	●●	E
<b>Hypericum</b> Johanniskraut	<b>Hypericaceae</b>			
calycinum gelb, großblütig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	○●	C
polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△○	B
<b>Iberis</b> Schleifenblume	<b>Brassicaceae</b>			
sempervirens 'Appen-Etz' weiß, frühblühend, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	△○	B
sempervirens 'Fischbeck' weiß	Apr–Mai	20	△○	B
sempervirens 'Masterpiece'® <sup>1</sup> große weiße Blüten, Dauerblüher	März–Mai	30	○	E
sempervirens 'Snowflake' weiß, starkwüchsig	Apr–Mai	20	△○	B





Iris sibirica 'Niklas Sea'



Knautia macedonica



Lathyrus latifolius 'Rote Perle'



Ligularia dentata 'Desdemona'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiß, kompakt, beste Sorte	Apr–Mai	15	△○	B
<b>Incarvillea</b> Freilandgloxinie	<b>Bignoniaceae</b>			
delavayi rosarote Trompetenblüten	Juli–Aug	50	○	E
delavayi 'Snow Top' weiß, großblumig	Juli–Aug	45	○	E
<b>Inula</b> Alant	<b>Asteraceae</b>			
ensifolia 'Compacta' Zwerg-Alant, leuchtend gelb, kompakt	Juli–Aug	20	△○	B
magnifica Riesen-Alant, gelbe Dolden, groBblaube Solitärstauden	Juli–Aug	180	○	D
<b>Iris</b> Schwertlilie	<b>Iridaceae</b>			
× barbata-elatior 'Ambassadeur' rot	Mai–Juni	80	○	E
× barbata-elatior 'Blue Staccato' weißblau	Mai–Juni	90	○	F
× barbata-elatior 'Dark Triumph' dunkelblau	Mai–Juni	90	○	E
× barbata-elatior 'Framboise' himbeerfarben	Mai–Juni	80	○	F
× barbata-elatior 'Gilbert' weiß	Mai–Juni	70	○	E
× barbata-elatior 'Goldfackel' goldgelb	Mai–Juni	90	○	E
× barbata-elatior 'Harbour Blue' mittelblau	Mai–Juni	100	○	E
× barbata-elatior 'Interpol' violett-schwarz	Mai–Juni	95	○	F
× barbata-elatior 'Irish Tune' zitronengelb	Mai–Juni	80	○	F
× barbata-elatior 'One Desire' rosa	Mai–Juni	70	○	E
× barbata-elatior 'Princess Caroline de Monaco' hellblau-orange	Mai–Juni	90	○	F
× barbata-elatior 'Rheinländerin' hellblau	Mai–Juni	80	○	E
× barbata-elatior 'Ribbon Round' weiß, blauer Rand	Mai–Juni	90	○	E
× barbata-elatior 'Top Gun' apricot mit rotviolett	Mai–Juni	80	○	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
× barbata-elatior 'Yes' weißgelb	Mai–Juni	70	○	F
× barbata-media 'Hamburger Nacht' dunkelviolet	Apr–Mai	35	○	E
× barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○	E
× barbata-nana 'Die Braut' weiß	Apr–Mai	30	△○	E
× barbata-nana 'Gleaming Gold' gelb	Apr–Mai	30	△○	E
× barbata-nana 'Pepita' blau	Apr–Mai	25	△○	E
sibirica 'Niklas Sea' violett	Mai–Juni	90	○	E
sibirica 'White Swirl' weiß, großblumig	Mai–Juni	80	○	E
setosa 'Baby Blue' violettblau mit gelber Zeichnung	Mai–Juni	35	○	F
<b>Jasione</b> Sandglockchen	<b>Campanulaceae</b>			
laevis 'Blaulicht' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○	B
<b>Jovibarba</b> Wirbelsteinwurz	<b>Crassulaceae</b>			
globulifera ssp. hirta weiß, kleine grüne Rosetten, im Winter rot	Juli–Aug	15	△○	B
<b>Kirengeshoma</b> Wachsglocke	<b>Saxifragaceae</b>			
palmata hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude	Sept–Okt	90	●	F
<b>Knautia</b> Witwenblume	<b>Dipsacaceae</b>			
macedonica purpurrot	Juli–Aug	80	○	E
macedonica 'Mars Midget' dunkelpurpurrot, kompakt	Juli–Aug	45	○	E
<b>Kniphofia</b> Fackellilie	<b>Asphodelaceae</b>			
hirsuta 'Fire Dance' orange mit gelb, Zwergsorte	Juni	40	○	G
× praecox (Syn. uvaria 'Grandiflora') gelbrot	Juli–Sept	110	○	D
uvaria 'Elvira'® leuchtend orangerot, Staunässe vermeiden	Juli–Sept	100	○	H
<b>Lamiaeum</b> Goldnessel	<b>Lamiaceae</b>			
galeobdolon 'Florentinum' gelb, sich ausbreitend	Mai–Juni	25	●●	B
<b>Lamium</b> Taubnessel	<b>Lamiaceae</b>			
maculatum 'Beacon Silver' purpurrosa, silbriges, grüngerandetes Blatt	Mai–Juli	20	●●	B
maculatum 'Red Nancy' dunkelrosa, silberweißes Blatt	Mai–Juli	20	●●	B
maculatum 'White Nancy' weiß, silberweißes Blatt	Mai–Juli	20	●●	B

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Lathyrus</b> <i>Platterbse, Staudenwicke</i>	<b>Fabaceae</b>			
latifolius 'Rosa Perle' <i>Staudenwicke, rosa, rankend</i>	Juni–Aug	180	◐○	C
latifolius 'Rote Perle' <i>Staudenwicke, rot, rankend</i>	Juni–Aug	180	◐○	C
latifolius 'Weiße Perle' <i>Staudenwicke, weiß, rankend</i>	Juli–Aug	180	◐○	C
vernus <i>Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch</i>	Apr–Mai	30	◐	C
<b>Lavandula</b> <i>Lavendel</i>	<b>Lamiaceae</b>			
× intermedia 'Edelweiß' <i>weiß</i>	Juli–Aug	40	○	C
× intermedia 'Grappenhall' <i>hellviolett, starkwüchsig, schönes Laub</i>	Juli–Aug	70	○	C
angustifolia 'Arctic Snow' <i>weiß</i>	Juni–Aug	40	○	E
angustifolia 'Blue Cushion' <i>blau, kompakter Wuchs</i>	Juli–Aug	30	○	E
angustifolia 'Dwarf Blue' <i>dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt</i>	Juli–Aug	30	○	C
angustifolia 'Essence Purple' <i>purpurviolett</i>	Juli–Aug	25	○	E
angustifolia 'Hidcote Blue' <i>dunkelblauviolett</i>	Juli–Aug	40	○	C
angustifolia 'Munstead' <i>blauviolett, schöne Sorte</i>	Juli–Aug	40	○	C
angustifolia 'Provence' <i>blauviolett, schöne Sorte</i>	Juli–Aug	40	○	C
angustifolia 'Rosea' <i>hellrosa, Rarität</i>	Juli–Aug	40	○	C
angustifolia 'Siesta' <i>dunkelblau</i>	Juli–Aug	35	○	C
<b>Lavatera</b> <i>Buschmalve</i>	<b>Malvaceae</b>			
olbia 'Baby Barnsley' <i>weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher</i>	Juli–Okt	70	○	E
olbia 'Barnsley' <i>weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher</i>	Juli–Okt	100	○	E
olbia 'Bredon Springs' <i>dunkelrosa</i>	Juni–Okt	140	○	E
olbia 'Burgundy Wine' <i>weinrot</i>	Juli–Okt	140	○	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
olbia 'Frederique' weiß	Juli–Okt	110	○	E
olbia 'Rosea' reinrosa	Juli–Okt	140	○	E
thuringiaca rosa, einfache Blütenchalen, reichblühend	Juli–Okt	140	○	C
<b>Leontopodium</b> Edelweiß	<b>Asteraceae</b>			
alpinum silbrig weiß, bekannte Alpenstaude	Juni–Aug	15	△○	A
<b>Leucanthemum</b> Margerite	<b>Asteraceae</b>			
× superbum 'Alaska' weiß, einfach	Juli–Aug	100	○	C
× superbum 'Banana Cream'® <sup>1</sup> halbgefüllt, zitronengelb	Juni–Sept	50	○	G
× superbum 'Christine Hagemann' Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt	Juli–Aug	80	○	E
× superbum 'Engelina'® <sup>1</sup> weiß, gefüllt	Juli–Sept	50	○	H
× superbum 'Fair Lady'® <sup>1</sup> weiß, gefüllt	Juni–Aug	60	○	E
× superbum 'Gruppenstolz' Sommer-Margerite, weiß	Juli–Aug	50	○	G
× superbum 'Silberprinzesschen' weiß, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○	C
× superbum 'Wirral Supreme' weiß, dichtgefüllt	Juli–Aug	80	○	E
vulgare 'Maikönigin' Wiesenmargerite, weiß, einfach	Mai–Juni	70	○	B
<b>Lewisia</b> Bitterwurz	<b>Portulacaceae</b>			
cotyledon 'Regenbogen' weiß-gelb-rosarote Farbmischung	Mai–Juni	20	△●	D
longipetala 'Little Plum' purpurrosa, wertvoll	Mai–Juni	20	△●	D
<b>Liatris</b> Prachtscharte	<b>Asteraceae</b>			
spicata purpurviolett, bekannte Rabatten- und Schnittstaude	Juli–Sept	80	○	C
spicata 'Floristan Weiß' weiß, seltenere Form	Juli–Sept	80	○	C
spicata 'Kobold' violett, kleinere Form	Juli–Sept	40	○	C
<b>Ligularia</b> Goldkolben, Kreuzkraut	<b>Asteraceae</b>			
dentata 'Desdemona' goldgelb, rötliches Laub	Aug–Sept	100	●	E
dentata 'Dunkellaubig' orangegeb, dunkles Laub	Juli–Aug	100	●	E
przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt	Juli–Aug	100	●	E
stenocephala 'Little Rocket' hellgelb	Juli–Aug	60	●	G
<b>Limonium</b> Steppenschleier, Strandflieder	<b>Plumbaginaceae</b>			
latifolium violettblaue Blüenschleier	Juni–Juli	60	○	B



Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'

Lupinus polyphyllus

Lysimachia punctata

Malva moschata

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Linaria</b> Leinkraut	<b>Scrophulariaceae</b>			
purpurea 'Canon J. Went' rosa	Juli–Aug	60	○	C
<b>Linum</b> Garten-Lein, Flachs	<b>Linaceae</b>			
flavum 'Compactum'	Juni–Aug	25	△○	C
perenne 'Nanum Saphir' leuchtend blau, reichblühend	Juni–Aug	25	△○	B
<b>Liriope</b> Lilientraube	<b>Convallariaceae</b>			
muscari 'Big Blue' blauviolett	Aug–Okt	50	●	F
<b>Lithodora</b> Südlicher Steinsame	<b>Boraginaceae</b>			
diffusa 'Alba' weiß, seltene Form	Apr–Juli	20	△○	E
diffusa 'Heavenly Blue' tiefblau, herrlicher Kleinstrauch	Mai–Juli	20	△○	D
<b>Lobelia</b> Stauden-Lobelia	<b>Campanulaceae</b>			
× splendens 'Elmfeuer' scharlachrot, purpurrotes Blatt	Juli–Okt	70	○	D
cardinalis rot	Juli–Sept	80	○	D
<b>Lupinus</b> Lupine, Wolfsbohne	<b>Fabaceae</b>			
polyphyllus 'Edelknabe' purpurrot	Juli–Aug	100	○	D
polyphyllus 'Fräulein' cremeweiß	Juli–Aug	100	○	D
polyphyllus 'Kastellan' blau mit weißer Fahne	Juli–Aug	100	○	D
polyphyllus 'Kronleuchter' leuchtend gelb	Juli–Aug	100	○	D
polyphyllus 'Schlossfrau' rosa mit weißer Fahne	Juli–Aug	100	○	D
<b>West-Country-Serie</b>				
polyphyllus (West Country Serie) 'Gladiator'® rotgelb	Mai–Aug	60	○	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
polyphyllus (West Country Serie) 'Manhattan Lights' <sup>®1</sup> <i>purpurgelb</i>	Mai–Aug	60	○	G
polyphyllus (West Country Serie) 'Persian Slipper' <sup>®1</sup> <i>violettweiß</i>	Mai–Aug	60	○	G
polyphyllus (West Country Serie) 'Saffron' <sup>®1</sup> <i>gelb</i>	Mai–Aug	60	○	G
polyphyllus (West Country Serie) 'Polar Princess' <sup>®1</sup> <i>weiß</i>	Mai–Aug	60	○	G
polyphyllus (West Country Serie) 'Towering Inferno' <sup>®1</sup> <i>orange-gelb</i>	Mai–Aug	75	○	G
<b>Lychnis (Syn. Silene)</b> <i>Lichtnelke</i>	<b>Caryophyllaceae</b>			
<i>alpina</i> <i>Alpen-Lichtnelke, purpurrot</i>	Mai–Juni	15	△	B
× <i>arkwrightii</i> 'Vesuvius' <i>orangerot, roter Blattaustrieb</i>	Juni–Aug	40	○	C
<i>chalconica</i> <i>Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude</i>	Juni–Juli	80	○	B
<i>coronaria dunkelrosa, graufilziges Blatt, versamend</i>	Juni–Juli	70	○	C
<i>coronaria</i> 'Alba' <i>weiß</i>	Juli–Aug	70	○	C
<i>viscaria</i> 'Feuer' <i>Pechnelke, rot</i>	Mai–Juni	40	○	A
<b>Lysimachia</b> <i>Felberich, Gilbweiderich</i>	<b>Primulaceae</b>			
<i>ciliata</i> 'Firecracker' <i>gelb, rotblättrig, auffällig</i>	Juni–Aug	70	○●	D
<i>clethroides</i> <i>Schnee-Felberich, weiß, orangefarbene Herbstfärbung</i>	Juli–Sept	80	○●	E
<i>nummularia</i> <i>Pfennigkraut, tiefgelb</i>	Mai–Juli	5	●○	A
<i>punctata</i> <i>Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude</i>	Juni–Aug	80	●○	B
<i>punctata</i> 'Hometown Hero' <i>gelb, reichblühend, kompakt</i>	Juni–Aug	50	●○	E
<b>Lythrum</b> <i>Blut-Weiderich</i>	<b>Lythraceae</b>			
<i>salicaria</i> 'Robert' <i>karminrot, Bienenweide</i>	Juli–Aug	70	○●	E
<i>salicaria</i> 'Rote Hybriden' <i>rot, Dauerblüher</i>	Juli–Sept	100	○●	B
<b>Macleaya</b> <i>Federmohn</i>	<b>Papaveraceae</b>			
<i>cordata</i> <i>gelblich weiß, wüchsige Blattschmuckstaude</i>	Juli–Aug	250	○●	E
<b>Malva</b> <i>Malve</i>	<b>Malvaceae</b>			
<i>alcea</i> 'Fastigiata' <i>Rosenpappel, tiefrosa</i>	Juni–Sept	90	○	C
<i>moschata</i> <i>Moschus-Malve, hellrosa, duftend</i>	Juni–Sept	70	○	C
<i>moschata</i> 'Alba' <i>weiß, duftend</i>	Juni–Sept	60	○	C
<b>Monarda</b> <i>Indianernessel</i>	<b>Lamiaceae</b>			
<i>didyma</i> 'Fireball' <sup>®1</sup> <i>rot, kompakter Wuchs</i>	Juli–Sept	40	○	G

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz


Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
fistulosa 'Croftway Pink' rosa	Juli–Sept	120	○	C
fistulosa 'Gardenview Scarlet' purpurrot, wenig mehltauanfällig	Juli–Sept	100	○	C
fistulosa 'Präriebrand' dunkelpurpur	Juli–Sept	100	○	C
fistulosa 'Schneewittchen' weiß, hellgrünes Laub	Juli–Sept	100	○	C
<b>Mukdenia (Syn. Aceriphyllum) Ahornblatt</b>	<b>Saxifragaceae</b>			
rossii 'Karasuba' weiß, bronzegrünes Blatt	Apr–Juni	30	●	F
<b>Nepeta Katzenminze</b>	<b>Lamiaceae</b>			
× faassenii violettblau, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○	B
× faassenii 'Blauknirps' blauviolett	Juni–Sept	30	○	C
× faassenii 'Six Hills Giant' violettblau, starkwüchsig	Mai–Sept	80	○	B
× faassenii 'Walkers Low' violett, sehr wertvolle Sorte	Juni–Sept	70	○	B
grandiflora 'Blue Danube' blauviolett	Mai–Juli	85	○	D
nervosa 'Schneehäschen' weiß	Juli–Sept	40	○	D
<b>Oenothera Nachtkerze</b>	<b>Oenotheraceae</b>			
macrocarpa (Syn. missouriensis) gelb, großblütig, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○	C
speciosa 'Siskiyou' hellrosa, Dauerblüher	Juni–Sept	35	○	E
tetragona 'Erica Robin' gelb, bunter Blattaustrieb	Juni–Aug	45	○	D
<b>Omphalodes Gedenkemein, Nabelnüsschen</b>	<b>Boraginaceae</b>			
verna blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	12	○●	C
verna 'Alba' weiß, wertvolle farbliche Ergänzung	Apr–Mai	12	○●	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Ophiopogon</b> <i>Schlangenbart</i>	<b>Convallariaceae</b>			
japonicus <i>weißlich, violette Früchte</i>	Juli–Aug	15	●	E
japonicus 'Minor' <i>weiß, grasartiges Laub</i>	Juli–Aug	10	●	E
planiscapus 'Nigrescens' <i>zartviolett, schwarzgrünes Blatt, Rarität</i>	Juni–Aug	20	●	G
<b>Origanum</b> <i>Heidegünsel, Dost</i>	<b>Lamiaceae</b>			
laevigatum 'Herrenhausen' <i>Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher</i>	Aug–Sept	50	○	C
vulgare 'Compactum' <i>hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet</i>	Juli–Sept	15	△○	B
vulgare 'Thumbles Variety' <i>hellviolett, goldgelbes Blatt</i>	Juni–Sept	25	△○	C
<b>Paeonia</b> <i>Pfingstrose</i>	<b>Paeoniaceae</b>			
<b>Einfach blühende</b>				
× lactiflora 'Bowl of Beauty' <i>violettrosa, groß, duftend</i>	Mai–Juni	70	○	I
× lactiflora 'Dancing Butterfly' (Syn. 'Fen Yu Nu') <i>rosa, einfach</i>	Mai–Juni	90	○	I
× lactiflora 'Flame' <i>rot, einfach</i>	Juni	60	○	I
× lactiflora 'Jan van Leeuwen' <i>weiß, einfach</i>	Mai–Juni	60	○	I
<b>Gefüllt blühende</b>				
× lactiflora 'Bunker Hill' <i>hellrot</i>	Mai–Juni	90	○	I
× lactiflora 'Festiva Maxima' <i>weiß, mit rotem Knopf</i>	Mai–Juni	100	○	I
× lactiflora 'Inspecteur Lavergne' <i>dunkelrot, duftend</i>	Mai–Juni	80	○	I
× lactiflora 'Sarah Bernhard' <i>hellrosa, duftend</i>	Mai–Juni	100	○	I
× lactiflora 'Shirley Temple' <i>weiß-zartrosa, gefüllt, großblütig</i>	Mai–Juni	100	○	I
officinalis 'Alba Plena' <i>Bauern-Pfingstrose, weiß, gefüllt</i>	Mai–Juni	80	○	I
officinalis 'Rosea Plena' <i>rosa, ballförmig</i>	Mai–Juni	80	○	I
officinalis 'Rubra Plena' <i>dunkelrot, gefüllt</i>	Mai–Juni	80	○	I
<b>Papaver</b> <i>Mohn</i>	<b>Papaveraceae</b>			
miyabeum 'Pacino' <i>Zwergiger Island-Mohn, schwefelgelb</i>	Mai–Juli	15	△○	B
nudicaule 'Gartenzwerg' <i>Island-Mohn, kompakte Farbmischung</i>	Mai–Aug	20	△○	A
orientale 'Beauty of Livermere' <i>tiefrot</i>	Mai–Juni	100	○	C
orientale 'Harvest Moon' <i>orangerot</i>	Mai–Juni	80	○	F
orientale 'Helen Elizabeth' <i>rosa</i>	Mai–Juni	80	○	F






Papaver orientale 'Türkenlouis'



Phlox subulata 'Atropurpurea'



Physalis alkekengi var. franchetii



Potentilla atrosanguinea

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
orientale 'Königin Alexandra' orangerosa, Bienenweide	Mai–Juni	80	○	D
orientale 'Perry's White' weiß, innen schwarz gefleckt, Rarität	Mai–Juni	80	○	F
orientale 'Türkenlouis' leuchtend rot, innen schwarz gefleckt, R. gefranst	Mai–Juni	80	○	F
<b>Penstemon</b> Bartfaden	<b>Scrophulariaceae</b>			
× cultorum 'Apple Blossom' großblütiger Bartfaden, rosa, weißes Herz	Juni–Aug	40	○	E
× cultorum 'Schönholzeri' dunkelrot	Juli–Nov	65	○	E
× cultorum 'White Bedder' weiß	Juli–Sept	50	○	E
digitalis 'Husker Red' weiß, rötlichbraunes Laub, wintergrün	Juli–Aug	90	○	E
<b>Petrrohagia (Syn. Tunica)</b> Felsennelke	<b>Caryophyllaceae</b>			
saxifraga zartosa, wüchsige Staude, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△○	A
<b>Phlomis</b> Brandkraut	<b>Lamiaceae</b>			
russeliana (Syn. samia) gelb, schöner Fruchtschmuck	Juni–Aug	80	○	D
tuberosa tiefviolett, Heil- und Medizinpflanze, Bienenweide	Juni–Juli	120	○	D
<b>Phlox</b> Flammenblume	<b>Polemoniaceae</b>			
douglasii 'Crackerjack' Teppich-Flammenblume, rot	Apr–Mai	10	△○	B
douglasii 'Lilac Cloud' lila	Apr–Mai	10	△○	B
douglasii 'Red Admiral' purpurrot, dichte Polster	Mai–Juni	10	△○	B
douglasii 'White Admiral' weiß	Mai–Juni	10	△○	B
paniculata 'Amethyst' Hohe Flammenblume, dunkelviolet	Juli–Sept	70	○●	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
paniculata 'Blue Paradise' <i>blau mit dunklem Auge, sehr schöne Farbe</i>	Juli–Sept	90	○●	E
paniculata 'Bright Eyes' <i>hellrosa mit rotem Auge</i>	Juli–Sept	70	○●	E
paniculata 'Cosmopolitan' <i>rosa, Zwergsorte</i>	Juli–Sept	40	○●	G
paniculata 'Europa' <i>weiß mit rotem Auge</i>	Juli–Sept	70	○●	E
paniculata 'Fondant Fancy' <i>rosalila, rotes Auge, kompakt</i>	Juli–Sept	40	○●	F
paniculata 'Fujiyama' <i>weiß</i>	Juli–Sept	70	○●	E
paniculata 'Kirchenfürst' <i>violettrot, v. Karl Foerster</i>	Juli–Sept	100	○●	E
paniculata 'Orange Perfection' <i>orange</i>	Juli–Sept	70	○●	E
paniculata 'Purple Kiss' <i>purpurviolett, Zwergsorte</i>	Juli–Aug	40	○●	G
paniculata 'Starfire' <i>rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel</i>	Juli–Sept	85	○●	E
paniculata 'Tenor' <i>purpurrosa</i>	Juli–Sept	70	○●	E
paniculata 'Uspech' <i>violettblau mit weißem Auge</i>	Juli–Sept	80	○●	E
paniculata 'Yonique White' <i>hellweiss, duftend</i>	Juli–Sept	40	○●	G
paniculata 'White Admiral' <i>weiß</i>	Juli–Sept	90	○●	E
stolonifera 'Blue Ridge' <i>hellblau, lockere Doldentrauben</i>	Apr–Juni	25	○●	C
stolonifera 'Home Fires' <i>tiefrosa, lockere Doldentrauben</i>	Apr–Juni	25	○●	C
subulata 'Amazing Grace' <i>Teppich-Flammenblume, weiß</i>	Apr–Mai	10	△○	B
subulata 'Atropurpurea' <i>purpurrot, wüchsige Sorte</i>	Apr–Mai	10	△○	B
subulata 'Bavaria' <i>weiß mit blau</i>	Mai–Juni	15	△○	B
subulata 'Benita' <i>hellblau</i>	Apr–Mai	10	○	B
subulata 'Emerald Cushion Blue' <i>hellviolett, wüchsige Sorte</i>	Apr–Mai	15	△○	B
subulata 'Kimono Pink-White' <i>rosaweiß gestreift</i>	Apr–Mai	15	△○	B
subulata 'Purple Beauty' <i>blau bis purpurblau</i>	Apr–Mai	15	△○	B
subulata 'Samson' <i>lachsrot, starkwüchsig</i>	Apr–Mai	15	△○	B
subulata 'White Delight' <i>reinweiß, wüchsig</i>	Apr–Mai	15	△○	B
subulata 'Zwergenteppich' <i>dunkelrosa, kompakt</i>	Apr–Mai	10	△○	B
<b>Phuopsis (Syn. Crucianella)</b> <i>Schein-, Rosenwaldmeister</i>	<b>Rubiaceae</b>			
stylosa rosa	Juni–Aug	20	△○	B

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Physalis</b> <i>Lampionblume, Blaskirsche</i>	<b>Solanaceae</b>			
alk. var. <i>franchetii</i> weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend	Juni	65	○●	C
alk. var. <i>franchetii</i> 'Zwerg' weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Zwergform	Juni	25	○●	C
<b>Physostegia</b> <i>Garten-Gelenkblume</i>	<b>Lamiaceae</b>			
virginiana 'Bouquet Rose' violettrosa	Juli–Sept	75	○	C
virginiana 'Schneekrone' weiß	Juli–Sept	60	○	C
<b>Platycodon</b> <i>Ballonblume, Ballonblüte</i>	<b>Campanulaceae</b>			
grandiflorus 'Fuji Pink' rosa, schön	Juli–Aug	45	○●	C
grandiflorus 'Fuji White' reinweiß	Juli–Aug	45	○●	C
grandiflorus 'Mariesii' blauviolett	Juli–Aug	50	○●	C
<b>Polemonium</b> <i>Jakobsleiter, Himmelsleiter</i>	<b>Polemoniaceae</b>			
caeruleum blau, farnähnliches Blatt	Juni–Juli	90	○●	B
caeruleum 'Album' weiß	Juni–Juli	80	○●	C
reptans 'Blue Pearl' leuchtend blau	Mai–Juni	30	●	C
<b>Polygonatum</b> <i>Salomonssiegel, Weißwurz</i>	<b>Liliaceae</b>			
biflorum (Syn. <i>commutatum</i> ) weiße Glocken, überhängend, wüchsig	Mai–Juni	120	●●	F
multiflorum weiß, heimische Wildart	Mai–Juni	60	●●	E
<b>Polygonum</b> <i>Knöterich</i>	<b>Convallariaceae</b>			
affine siehe <i>Bistorta affinis</i>				
amplexicaule siehe <i>Bistorta amplexicaulis</i>				
bistorta siehe <i>Bistorta officinalis</i>				

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Potentilla</b> Fingerkraut	<b>Rosaceae</b>			
atrosanguinea dunkelrot	Juni–Aug	45	○●	B
aurea gelb, schöne Polsterstaude	Mai–Juli	15	△○	A
crantzii 'Golddrausch' tiefgoldgelb	Mai–Aug	15	△○	E
megalantha (Syn. fragiformis) tiefgelb, silbrig behaartes Blatt	Mai–Juli	20	△○	B
nepalensis 'Miss Willmott' tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeer-ähnliches Blatt	Juni–Sept	50	○	B
neumanniana (Syn. verna) gelb, dichte Polster	Apr–Mai	10	△○	B
thurberi 'Monarch's Velvet' himbeerrot	Juni–Juli	40	○	E
tridentata 'Nuuk' Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker	Juni–Aug	10	△○	D
<b>Primula</b> Primel, Schlüsselblume	<b>Primulaceae</b>			
× bullesiana Etagen-Primel, gelbrote Mischung	Juni–Aug	60	●	C
× pubescens Garten-Aurikel, Farbmischung, großblumig	Apr–Juni	20	●	B
beesiana Etagen-Primel, violett purpur mit orangenem Auge	Juni–Aug	60	●	C
bulleyana Etagen-Primel, orange gelb	Juni–Aug	60	●	C
capitata ssp. mooreana Kopfige Schlüsselblume, blauviolett	Juli–Sept	25	●	D
denticulata Kugel-Primel, violett	März–Mai	25	●	B
denticulata 'Alba' weiß	März–Mai	25	●	B
denticulata 'Rubin' tiefpurpurrot	März–Mai	25	●	B
elatior hellgelb, Wildform	März–Apr	20	●	B
florindae Glocken-Primel, hellgelb, duftend	Juli–Aug	50	●	C
japonica 'Millers Crimson' karminrot	Mai–Juli	60	●	C
rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	A
veris ssp. veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	●	B
vialii Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform	Juni–Juli	50	●	E
vulgaris ssp. vulgaris (Syn. acaulis) gelb, heimisch	März–Apr	10	●	B
<b>Prizelago (Syn. Hutchinsia)</b> Gämskresse	<b>Brassicaceae</b>			
alpina ssp. alpina weiß	Mai–Juli	10	○	C
<b>Prunella</b> Braunelle	<b>Lamiaceae</b>			
grandiflora purpurviolett	Juli–Aug	20	△○	B



Primula vialii



Pulsatilla vulgaris



Salvia nemorosa 'Caradonna'



Santolina chamaecyparissus

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Pulmonaria</b> Lungenkraut	<b>Boraginaceae</b>			
dacica (Syn. angustifolia) 'Azurea' dunkelblau, schöner Frühjahrsblüher	März–Apr	25	☉	C
dacica 'Blaues Meer' dunkelblau	März–Apr	30	☉	C
officinalis 'Dora Bielefeld' leuchtend rosa, silbrig geflecktes Blatt, wüchsig	März–Mai	30	☉	C
rubra tiefrot, große behaarte grüne Blätter	Apr–Mai	30	☉	C
saccharata 'Sissinghurst White' weiß, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30	☉	D
<b>Pulsatilla</b> Kuhschelle, Küchenschelle	<b>Ranunculaceae</b>			
vulgaris violett, Knospen behaart, schöner Samenstand	März–Apr	20	△○	C
vulgaris 'Alba' weiß, seltene Form	März–Apr	20	△○	C
vulgaris 'Rubra' rot, auffällige Farbe	März–Apr	20	△○	C
<b>Rheum</b> Zier-Rhabarber	<b>Polygonaceae</b>			
palmatum var. tanguticum rote Blütenrispen, dekoratives großes Blatt	Mai–Juni	200	○	E
<b>Rodgersia</b> Schaublatt	<b>Saxifragaceae</b>			
aesculifolia grünlich weiß, kastanienähnliches Laub	Juni–Juli	130	●☉	F
henrici hellrosa	Juni–Juli	125	●☉	F
pinnata gelblich weiß	Juni–Juli	110	●☉	F
pinnata 'Chocolate Wings' rosa, rotes Laub	Juni–Aug	80	●☉	H
podophylla 'Rotlaub' gelblich weiß, im Austrieb grünlich braunes Blatt	Juni–Juli	115	●☉	G
sambucifolia weiß	Juni–Juli	90	☉	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
tabularis siehe Astilboides				
Rosmarinus officinalis siehe Küchengarten				
<b>Rudbeckia</b> Sonnenhut	<b>Asteraceae</b>			
fulgida 'Early Bird Gold' <sup>®</sup> dunkelgelb	Juli–Sept	60	○	H
fulgida 'Little Goldstar' gelb, sehr reichblühend	Juli–Sept	40	○	G
fulgida var. deami gelb	Aug–Sept	90	○	C
fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' tiefgelb, bekannte Rabattenstaude	Aug–Okt	60	○	C
laciniata 'Goldquelle' hellgelb, gefüllt	Aug–Sept	75	○	E
nitida 'Herbstsonne' goldgelbe wüchsige Solitärstaude	Aug–Sept	200	○	E
purpurea siehe Echinacea				
triloba tiefgelb mit schwarzer Mitte	Juli–Sept	115	○	C
<b>Sagina</b> Sternmoos	<b>Caryophyllaceae</b>			
subulata weiß, bodenbegründende Staude, trittfester Rasenersatz	Juni–Juli	5	△○	A
<b>Salvia</b> Salbei	<b>Lamiaceae</b>			
nemorosa 'Adrian' Steppen-Salbei, weiß, wertvoll	Juni–Sept	40	○	D
nemorosa 'Blauhügel' hellblau, kompakter Wuchs	Juni–Sept	40	○	C
nemorosa 'Blaukönigin' blauviolett, Sämlingssorte	Juni–Sept	40	○	B
nemorosa 'Caradonna' dunkelviolett, schwarze Blütenstiele	Juni–Sept	60	○	D
nemorosa 'Mainacht' dunkelviolettblau, früh blühend	Mai–Sept	50	○	D
nemorosa 'Marcus' <sup>®</sup> violett	Juni–Sept	30	○	E
nemorosa 'Ostfriesland' violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte	Juni–Sept	40	○	C
nemorosa 'Sensation Deep Rose' rosa	Juni–Sept	30	○	C
nemorosa 'Viola Klose' dunkelblau, früh blühend	Mai–Sept	35	○	E
officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig	Juni–Aug	45	○	E
officinalis 'Icterina' (Syn. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○	C
officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend	Juni–Aug	45	○	C
officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weißes Blatt	Juni–Aug	50	○	C
pratensis 'Rose Rhapsody' rosa, reichblühend	Juni–Aug	50	○	E

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz


Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<i>sclarea</i> Muskatteller-Salbei, lila, zweijährig	Juni–Aug	125	○	E
<i>verticillata</i> 'Purple Rain' purpurviolett	Mai–Sept	45	○	E
<b>Sanguisorba</b> Wiesenknopf	<b>Rosaceae</b>			
<i>officinalis</i> 'Tanna' braunrot	Juni–Aug	50	◐●	E
<b>Santolina</b> Heiligenkraut	<b>Asteraceae</b>			
<i>chamaecyparissus</i> gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, Duftstrauch	Juli–Aug	40	○	C
<i>rosmarinifolia</i> gelb, grünes Blatt, duftend	Juli–Aug	50	○	D
<b>Saponaria</b> Seifenkraut	<b>Caryophyllaceae</b>			
× <i>olivana</i> 'Bressingham' rosarot	Juni–Juli	4	△○	E
<i>ocymoides</i> purpurrosa, duftend, überhängende Triebe	Mai–Juli	20	△○	A
<b>Saxifraga</b> Steinbrech	<b>Saxifragaceae</b>			
× <i>arendsii</i> 'Ingeborg' dunkelrosa	Apr–Mai	15	△●	B
× <i>arendsii</i> 'Peter Pan' rot	Apr–Mai	15	△●	B
× <i>arendsii</i> 'Pixie' rot	Apr–Mai	10	△●	B
× <i>arendsii</i> 'White Star' weiß	Apr–Mai	15	△●	B
× <i>urbium</i> weiß	Juni–Juli	15	●	C
× <i>urbium</i> 'Aureopunctata' rosa, gelbgepunktetes Laub	Juni–Juli	15	●	C
× <i>urbium</i> 'Clarence Elliott' rosa, reichblühend	Juni–Juli	15	●	C
<i>cotyledon</i> 'Southside Seedling' weiß mit rot, rosettenartig	Juni–Juli	50	△○	D
<i>cuneifolia</i> Kleiner Schatten-Steinbrech, weiß, kleine Schattenstaude	Juni–Aug	20	●	C
<i>paniculata</i> (Syn. <i>aizoon</i> ) Rosetten-Steinbrech, weiß	Mai–Juni	20	△○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Scabiosa</b> <i>Garten-Skabiose</i>	<b>Dipsacaceae</b>			
caucasica 'Perfecta' violettblau	Juli–Sept	70	○	D
caucasica 'Perfecta Alba' weiß	Juli–Sept	70	○	D
columbaria 'Butterfly Blue' blau, Dauerblüher, wertvoll	Juli–Sept	40	○	E
columbaria 'Pink Mist' rosa, Dauerblüher	Juli–Sept	40	○	E
japonica var. alpina violettblau, zwergig	Juli–Sept	25	○	D
<b>Sedum</b> <i>Mauerpfeffer, Fettblatt</i>	<b>Crassulaceae</b>			
× cultorum 'Immergrünchen' gelb, verträgt Schatten, wüchsig	Juni–Aug	10	△○	A
acre gelb, ausbreitend, starkwüchsig	Juni–Juli	5	△○	A
acre 'Aureum' gelb, gelbe Triebspitzen	Juni–Juli	5	△○	B
acre 'Minor' gelb, schöne Zwergform	Juni–Juli	3	△○	B
album weiß	Juni–Aug	10	△○	A
album 'Coral Carpet' Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich	Juni–Juli	5	△○	A
album 'Murale' hellrosa	Juni–Aug	10	△○	A
cauticum karminrot, blaugraues fleischiges Blatt	Aug–Sept	15	△○	C
cauticola 'Bertram Anderson' dunkelrot, schwarzrotes Blatt	Aug–Sept	20	△○	C
floriferum 'Weihenstephaner Gold' goldgelb, wichtiger Bodendecker	Juli–Aug	15	△○	A
floriferum 'Weihenstephaner Gold Variegata' goldgelb, Blatt grüngelb	Juni–Juli	15	○	D
kamschaticum 'Variegatum' orangegelb, weißbuntes Blatt	Juli–Aug	15	△○	B
oreganum Oregon-Fettblatt, gelb, dickliches Blatt, polsterbildend	Juli–Aug	6	△○	B
pachyclados weiß, blaugrünes Laub	Juni–Juli	5	△○	B
reflexum 'Angelina' Nickendes Fettblatt, gelb, grüngelbes Blatt	Juli–Aug	15	△○	B
sexangulare gelb	Juni–Juli	7	△○	A
spathulifolium 'Cape Blanco' gelb, silberweiße Rosetten	Juni–Juli	10	△○	B
spathulifolium 'Purpureum' gelb, rötliche fleischige Blätter	Juni–Juli	10	△○	B
spectabile 'Brillant' purpurrosa	Aug–Sept	45	○	D
spectabile 'Carl' rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebiger	Aug–Sept	45	○	E
spectabile 'Purple Emperor' rosa, dunkleres Laub	Aug–Sept	40	○	E
spectabile 'Stardust' weiß	Aug–Sept	35	○	E





Sedum telephium 'Autumn Joy'

Silene x robotii  
'Rolly's Favourite®'

Stachys byzantina



Symphytum grandiflorum

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
spurium 'Album Superbum' weiß, gut bodendeckend, immergrün	Juli–Aug	15	△○	A
spurium 'Fuldaglut' purpurrot, rotes Blatt	Juli–Aug	10	△○	A
spurium 'Voodoo' leuchtend rosa, tiefrotes Blatt	Juli–Aug	15	△○	A
telephium 'Herbstfreude' braunrot, Herbstblüher	Aug–Sept	60	○	D
telephium 'Mr. Goodbud®' rosarot	Aug–Okt	40	○	E
telephium 'Xenox®' rosarot, dunkelbraunes Blatt	Aug–Okt	40	○	F
telephium ssp. maximum 'Matrona' rosa Dolden, rötliches Blatt	Aug–Okt	50	○	E
<b>Sempervivum</b> Hauswurz, Steinrose	<b>Crassulaceae</b>			
× cultorum in Sorten, grün	Juni–Juli	10	△○	B
× cultorum in Sorten, grün, mit roter Spitze	Juni–Juli	10	△○	B
× cultorum in Sorten, rot	Juni–Juli	10	△○	B
× cultorum in Sorten, silbrig	Juni–Juli	10	△○	B
arachnoideum 'Rheinkiesel' rosa, silbrig überspinnene Rosetten	Juni–Juli	10	△○	B
ciliosum Borisii gelb, stark behaarte graugüne Rosetten	Juni–Juli	15	△○	B
<b>Sidalcea</b> Präriemalve, Garten-Schmuckmalve	<b>Malvaceae</b>			
oregana 'Stark's Hybrid' rosa	Juli–Sept	70	○	C
<b>Silene</b> Leimkraut	<b>Caryophyllaceae</b>			
× robotii 'Rolly's Favourite®' rosa, reichblühend	Apr–Mai	30	△○	G
schafta rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten	Aug–Sept	10	△○	A
uniflora 'Weißkehlchen' (Syn. vulg. ssp. marit.) weiß, Blatt graugrün, wüchsig	Juni–Aug	20	△○	A

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Sisyrinchium</b> <i>Binsenlilie</i>	<b>Iridaceae</b>			
<i>angustifolium violettblau, schwertförmiges Blatt</i>	Mai–Juni	20	△○	C
<i>californicum gelb, schwertförmiges Blatt</i>	Mai–Juni	15	△○	C
<b>Smilacina</b> <i>Schattenblume, Duftsiegel</i>	<b>Convallariaceae</b>			
<i>racemosa weiß, rote Früchte</i>	Mai–Juni	90	●	G
<b>Solidago</b> <i>Goldrute</i>	<b>Asteraceae</b>			
× <i>cultorum</i> 'Strahlenkrone' <i>tiefgelb, wichtige Sorte</i>	Juli–Aug	60	○	C
× <b>Solidaster</b> <i>Goldrutenaster</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>luteus hellgelb, reichverzweigte Blüten</i>	Juli–Sept	65	○	D
<b>Stachys</b> <i>Ziest</i>	<b>Lamiaceae</b>			
<i>byzantina</i> 'Silky Fleece' <i>violettrosa, grauweißes Laub</i>	Juli–Aug	25	△○	C
<i>byzantina</i> 'Silver Carpet' <i>blühfaul, weißfilziges Laub</i>	Juli–Aug	20	△○	C
<i>grandiflora</i> 'Superba' <i>purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen</i>	Juli–Aug	40	●	C
<i>monnieri</i> 'Hummelo' <i>rosa, sehr wertvoll</i>	Juli–Sept	45	○	E
<b>Stokesia</b> <i>Kornblumenaster</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>laevis hellblau, schöne große Blüten</i>	Aug–Sept	40	○	D
<i>laevis</i> 'Mary Gregory' <i>hellgelb</i>	Juli–Sept	40	○	F
<b>Symphytum</b> <i>Beinwell</i>	<b>Boraginaceae</b>			
<i>grandiflorum</i> <i>gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen</i>	Apr–Mai	25	○●	B
<i>grandiflorum</i> 'Hidcote Blue' <i>hellblau</i>	Apr–Mai	30	○●	C
<b>Tanacetum</b> <i>Bunte Margerite</i>	<b>Asteraceae</b>			
<i>coccineum</i> 'Robinson's Rosa' (Syn. <i>Chrysanthemum cocc.</i> ) <i>rosa</i>	Mai–Juli	90	○	C
<i>coccineum</i> 'Robinson's Rot' <i>rot</i>	Mai–Juli	90	○	C
<b>Tellima</b> <i>Falsche Alraunwurzel</i>	<b>Saxifragaceae</b>			
<i>grandiflora grünlich</i>	Mai–Juni	60	●	B
<b>Teucrium</b> <i>Gamander</i>	<b>Lamiaceae</b>			
× <i>lucidrys</i> (Syn. <i>chamaedrys hort.</i> ) <i>purpurrosa, glänzendes Blatt</i>	Juli–Aug	30	△○	B
<i>chamaedrys</i> <i>rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander</i>	Juli–Aug	25	△○	B
<b>Thalictrum</b> <i>Wiesenraute</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>aquilegifolium violettrosa, akeleiblätrig, heimische Art</i>	Mai–Juli	110	○●	D

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
delavayi (Syn. dipterocarpum) <i>hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub</i>	Juli–Sept	140	●	D
rochebrunianum 'Elin' <i>rosa hellgelb, Laub graublau</i>	Juni–Aug	220	○◐	F
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>	<b>Lamiaceae</b>			
× citriodorus 'E. B. Anderson' <i>hellviolett, goldgelbe Polster, duftend</i>	Juli–Aug	15	△○	B
× citriodorus 'Golden Dwarf' <i>hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt</i>	Juni–Juli	15	△○	B
× citriodorus 'Silver Queen' <i>rosa, silbriger Blattrand, duftend</i>	Juni–Aug	15	△○	C
cerlerioides 'Duftkissen'® <i>hellrosa, aromatisch, ISU-Diplom</i>	Juni–Aug	20	△○	D
comosus 'Doone Valley' <i>hellviolett, gelbgrünes Blatt</i>	Juli–Aug	10	△○	B
doerfleri 'Bressingham Seedling' <i>rosa, üppige Polster</i>	Mai–Juli	5	△○	B
praecox 'Minus' (Syn. serpyllum 'Pygmaeus') <i>violett, kompakte Polster</i>	Juni–Juli	5	△○	B
praecox 'Red Carpet' <i>rotviolett, kompakt</i>	Mai–Aug	5	△○	B
praecox var. pseudolanuginosus <i>rosa, wolliges Blatt, starkwüchsig</i>	Mai–Juni	5	△○	B
pulegioides 'Foxley' <i>weiß, Blatt grün-weiß-rosa panaschiert, Zitronenduft</i>	Juli–Aug	10	○	B
serpyllum 'Albus' <i>weiß, hellgrüner Bodendecker</i>	Juni–Aug	5	△○	B
serpyllum 'Coccineus' <i>purpurrot</i>	Juni–Aug	5	△○	B
serpyllum 'Creeping Red' <i>rot, wüchsig</i>	Juni–Aug	5	△○	B
serpyllum 'Magic Carpet' <i>karminrosa, aromatisches Laub</i>	Juni–Aug	5	△○	B
serpyllum 'Purple Beauty' (Syn. 'Atropurpureus') <i>violettrot</i>	Juni–Aug	5	△○	B
vulgaris 'Compactus' <i>hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude</i>	Juli–Sept	10	△○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Tiarella</b> Schaumblüte	<b>Saxifragaceae</b>			
<i>cordifolia</i> weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker	Apr–Mai	20	●●	B
<i>cordifolia</i> 'Moorgrün' weiß, kleinlaubig	Apr–Mai	25	●●	B
<i>wherryi</i> weiß, horstig, Herbstfärbung	Apr–Mai	25	●●	B
<b>Tradescantia</b> Dreimasterblume	<b>Commelinaceae</b>			
× <i>andersoniana</i> 'Innocence' reinweiß	Juni–Sept	50	○	E
× <i>andersoniana</i> 'Karminglut' purpurrot	Juni–Sept	40	○	E
× <i>andersoniana</i> 'Leonora' dunkelviolet	Juni–Sept	40	○	E
<b>Tricyrtis</b> Krötenlilie	<b>Calochortaceae</b>			
<i>hirta</i> hellviolet	Aug–Okt	50	●	D
<b>Trollius</b> Trollblume	<b>Ranunculaceae</b>			
<i>chinensis</i> 'Golden Queen' orangegelb, offene Blütenschalen	Juni–Juli	70	○	E
<i>europaeus</i> citroengelb	Mai–Juni	60	○	E
<i>pumilus</i> Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg	Juni–Juli	25	△○	D
<b>Verbascum</b> Königskerze	<b>Scrophulariaceae</b>			
× <i>cultorum</i> 'Jackie in Pink' hellrosa, kompakte Sorte	Juli–Aug	50	○	F
<i>bombyciferum</i> 'Polarsommer' gelb, weißfilziges Laub	Juni–Aug	160	○	C
<i>nigrum</i> gelb, heimische Wildstaude	Juli–Aug	130	○	C
<i>olympicum</i> gelb, graufilziges Blatt	Juni–Aug	180	○	C
<i>phoeniceum</i> 'Violetta' violettpurpur	Mai–Juni	50	○	C
<b>Verbena</b> Eisenkraut	<b>Verbenaceae</b>			
<i>bonariense</i> blauviolett, schöner Langblüher	Juli–Okt	100	○	E
<i>bonariensis</i> 'Lollipop®' blauviolett, Zwergform	Mai–Okt	60	○	E
<i>bonariensis</i> 'Lollipop®' blauviolett, Zwergform	Mai–Okt	60	○	G
<b>Vernonia</b> Arkansas-Scheinaster	<b>Asteraceae</b>			
<i>crinita</i> rotviolette Blütenschirme	Aug–Okt	200	○	F
<b>Veronica</b> Ehrenpreis	<b>Scrophulariaceae</b>			
× <i>cultorum</i> 'Inspire Blue' blau	Juni–Aug	60	○	E
× <i>cultorum</i> 'Inspire Pink' hellrosa	Juni–Aug	60	○	E



Veronica prostrata

Veronica teucrium 'Knallblau'

Yucca filamentosa

 Calamagrostis x acutiflora  
'Karl Foerster'

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
gentianoides <i>hellblau</i>	Mai–Juni	40	○	C
longifolia 'Blauriesin' <i>leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte</i>	Juli–Aug	90	○	E
longifolia 'Schneeriesin' <i>weiß, wüchsige robuste Sorte</i>	Juli–Aug	90	○	E
peduncularis 'Georgian Blue' <i>dunkelblau, schöner Austrieb, Herbstfärbung</i>	Apr–Juli	20	△○	C
prostrata <i>blau, kriechend</i>	Mai–Juni	10	△○	C
prostrata 'Mrs. Holt' <i>rosa</i>	Mai–Juni	10	△○	D
spicata 'Azzurro' <i>violett</i>	Juni–Juli	40	○	E
spicata 'Blauteppich' <i>leuchtendblau</i>	Juni–Juli	10	△○	C
spicata 'Rosa Zwerg' <i>rosa</i>	Juli–Aug	25	△○	C
spicata 'Rotfuchs' (Syn. 'Red Fox') <i>kirschrot</i>	Juni–Juli	30	△○	C
spicata ssp. incana 'Silbersee' <i>tiefviolettblau</i>	Juni–Juli	15	△○	C
teucrium 'Kapitän' <i>dunkelblau, standfest</i>	Mai–Juli	30	△○	C
teucrium 'Knallblau' <i>leuchtend blau, gute Farbwirkung</i>	Mai–Juli	30	△○	C
teucrium 'Königsblau' <i>dunkelblau, anspruchslos</i>	Mai–Juli	35	△○	B
<b>Veronicastrum</b> <i>Ehrenpreis</i>				
				<b>Scrophulariaceae</b>
virginicum 'Diana' <i>weiße Blütenkerzen</i>	Juli–Sept	100	○	E
virginicum 'Roseum' <i>hellrosa</i>	Juli–Sept	125	○	E
<b>Vinca</b> <i>Immergrün</i>				
				<b>Apocynaceae</b>
major <i>blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig</i>	Apr–Mai	30	●●	C
major 'Variegata' <i>blauviolett, weißbuntes Blatt, geschützter Standort</i>	Apr–Mai	30	●●	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
minor 'Alba' weiß, starkwüchsig	Apr–Mai	15	●●	B
minor 'Atropurpurea' weinrot	Apr–Mai	15	●●	C
minor 'Bowles' tiefblau, großblütig, wertvolle Sorte	Apr–Mai	15	●●	B
minor 'Marie'® violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10	●●	C
<b>Viola</b> Veilchen	<b>Violaceae</b>			
labradorica Labrador-Veilchen, violett, schöner dunkler Blattschmuck	Apr–Mai	15	●	B
odorata 'Königin Charlotte' Duft-Veilchen, blauviolett, reichblühend	März–Apr	15	●	B
sororia 'Albiflora' Pfingst-Veilchen, weiß	Mai–Juni	15	●	B
sororia 'Blue Diamond' dunkelblau	Mai–Juni	15	●	C
sororia 'Freckles' weißlich, violett gefleckte Blüte	Mai–Juni	15	●	B
<b>Waldsteinia</b> Waldsteinie, Golderdbeere	<b>Rosaceae</b>			
geoides gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung	Apr–Juni	20	●●	B
ternata gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker	Apr–Juni	15	●●	A
<b>Yucca</b> Palmilie	<b>Agavaceae</b>			
filamentosa große weiße Blütenglocken, Solitärstaude	Juli–Aug	130	○	F
filamentosa 'Bright Edge' weiß, grünes Blatt / gelber Rand	Juli–Aug	100	○	G

## Gräser

<b>Achnatherum</b> Silber-Ährengras	<b>Poaceae</b>			
brachytricha siehe Calamagrostis arundinacea var. brachytricha				
calamagrostis gelbbraune Ähren	Juni–Sept	90	○	E
<b>Bouteloua</b> Moskitogras	<b>Poaceae</b>			
gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand	Juli–Aug	40	△○	C
<b>Briza</b> Zittergras	<b>Poaceae</b>			
media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art	Mai–Aug	40	○	B
<b>Calamagrostis</b> Garten-Reitgras, Sandrohr	<b>Poaceae</b>			
× acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras	Juli–Aug	150	○	E
× acutiflora 'Overdam' gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt	Juli–Aug	130	○●	E

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
brachytricha <i>Diamantgras, graurosa farbener Lampenputzer</i>	Aug–Sept	100	◐●	E
<b>Carex</b> Segge – <b>Staupe des Jahres 2015</b>	<b>Cyperaceae</b>			
albula 'Frosted Curls' <i>silbergrüne Blätter</i>	Mai–Juni	30	○	E
buchananii <i>Fuchsrote Segge, rotbraune Halme, auffällige Art</i>	Juli	40	○	D
caryophyllea 'The Beatles' <i>Nelkenartige Segge braungrün</i>	Apr–Mai	35	◐●	E
comans 'Kupferflamme' <i>rotbraunes Laub</i>	Juli	25	○	E
conica 'Snowline' <i>hellgrün, weißgerandetes Blatt, zierlich</i>	Apr–Mai	25	●	D
dolichostachya 'Silver Sceptre' <i>bräunlich, weißgrünes Blatt</i>	Apr–Mai	40	●	D
foliosissima 'Icedance' (Syn. morowii 'Icedance') <i>gelbbraun, weißgerandet</i>	Juni–Juli	40	●●	C
foliosissima 'Icedance' (Syn. C. morowii 'Icedance') <i>gelbbraun</i>	Juni–Juli	40	●●	E
foliosissima 'Irish Green' <i>grün, überhängend</i>	Mai–Juni	30	◐●	E
grayi <i>Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte</i>	Juli–Aug	60	●○	D
hachijoensis 'Evergold' <i>gelbgrünes Blatt</i>	Apr–Mai	30	●○	D
montana <i>Berg-Segge, goldgelb, überhängend</i>	März–Mai	20	●○	C
morrowii 'Aureovariegata' <i>goldbraune Ähren, gelber Blattrand, wertvoll</i>	März–Mai	40	●●	D
morrowii 'Goldband' <i>grün mit gelbem Rand</i>	Juni–Juli	40	●	E
morrowii 'Variegata' <i>Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand</i>	Juni–Juli	40	●	C
muskingumensis <i>Palmwedel-Segge braune Ähren, Feuchtwiesen, Bachränder</i>	Juni–Aug	70	●○	C
ornithopoda 'Variegata' <i>Vogelfuß-Segge, gelbgrün, weißgrünes Blatt</i>	Apr–Juni	25	●	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<i>pendula</i> Riesen-Segge, grünlich, dunkelgrüne Ähren	Juni–Juli	100	☉	C
<i>plantaginea</i> Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegründendes Waldgras	Mai–Juni	35	☉	D
<i>sylvatica</i> Wald-Segge, bräunlich	Mai–Juni	50	☉☉	C
<i>testacea</i> bräunlich, orangebronzes Blatt	Mai–Juni	45	☉☉	E
<i>umbrosa</i> Schatten-Segge, schmales grünes Blatt	Apr–Mai	20	☉☉	C
<b>Chasmanthium (Syn. Uniola)</b> Plattährengras	<b>Poaceae</b>			
<i>latifolium</i> braun, plattgedrückte Ähren	Aug–Okt	100	☉☉	D
<b>Cortaderia</b> Pampasgras	<b>Poaceae</b>			
<i>selloana</i> vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion	Sept–Okt	220	○	G
<i>selloana</i> 'Pumila' silberweiße Wedel, Zwergform	Aug–Okt	120	○	G
<i>selloana</i> 'Rosea' bräunlichrosa Wedel	Sept–Okt	200	○	F
<b>Deschampsia</b> Schmiele	<b>Poaceae</b>			
<i>cespitosa</i> grünliche lockere Rispen, heimisches Waldgras	Juni–Aug	100	☉☉	C
<i>cespitosa</i> 'Bronzeschleier' goldbraune lockere Rispen	Juni–Juli	100	☉☉	C
<i>cespitosa</i> 'Goldschleier' gelblich grün	Juni–Juli	100	☉☉	C
<i>cespitosa</i> 'Tauträger' gelblich grüne, überhängende Rispen	Juli–Aug	100	☉☉	C
<b>Festuca</b> Schwingel	<b>Poaceae</b>			
<i>amethystina</i> Amethyst-Schwingel, dunkelviolet, Laub wintergrün bläulich	Juni–Juli	25	△○	B
<i>cinerea</i> 'Blauglut'	Mai–Juli	25	△○	B
<i>cinerea</i> 'Elijah Blue' gelblich braun, blaue Horste	Mai–Juli	20	△○	B
<i>cinerea</i> 'Uchte' gelblich braun, blaue, wüchsige Horste	Juni–Juli	30	△○	B
<i>gautieri</i> (Syn. <i>scoparia</i> ) Bärenfell-Schwingel, gelbgrün	Juli–Aug	15	△○	B
<i>gautieri</i> 'Pic Carlit' gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt	Juni–Juli	10	△○	B
<b>Hakonechloa</b> Japan-Berggras	<b>Poaceae</b>			
<i>macra</i> grünlich, ausladend, schöne Herbstfärbung	Juli–Okt	45	☉	F
<i>macra</i> 'Albostrata' grünlich, Blatt grünweiß	Aug–Okt	30	☉	G
<i>macra</i> 'Aureola' grünlich, Laub gelbgrün gestreift	Aug–Okt	40	☉	F





Cortaderia selloana



Luzula nivea



Sesleria caerulea



Blechnum spicant

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer</b>	<b>Poaceae</b>			
sempervirens 'Saphirsprudel' gelblich, aufrechte Ähren, Blatt breit, stahlblau	Juli–Aug	110	○	C
<b>Hystrix Flaschenbürstengras</b>	<b>Poaceae</b>			
patula grünlich gelb, flaschenbürstenförmige Grannen	Juni–Aug	90	○	C
<b>Imperata Japanisches Blutgras</b>	<b>Poaceae</b>			
cylindrica 'Red Baron' Blatt vom Austrieb bis zum Herbst rot, blüht selten		40	○	F
<b>Koeleria Schillergras</b>	<b>Poaceae</b>			
glauca grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○	B
<b>Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen, Blaustrandhafer</b>	<b>Poaceae</b>			
arenarius gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd	Juni–Aug	115	○	E
<b>Luzula Marbel, Hainsimse</b>	<b>Juncaceae</b>			
nivea Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt	Juni–Aug	40	●●	B
pilosa 'Igel' bräunlich	Apr–Juni	25	●●	C
sylvatica Wald-Marbel, bräunlich, breites Blatt	Apr–Mai	50	●●	A
sylvatica 'Marginata' bräunlich, silbrig weißer Blattrand	Apr–Mai	40	●●	C
sylvatica 'Tauernpass' bräunlich, breitblättrig	Apr–Mai	30	●●	C
sylvatica ssp. sieberi 'Farnfreund' bräunlich, zierliche Auslese	Apr–Mai	30	●●	B
<b>Melica Perlgras</b>	<b>Poaceae</b>			
ciliata blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos	Mai–Juni	50	○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Miscanthus</b> <i>Chinaschilf</i>	<b>Poaceae</b>			
<i>giganteus</i> 'Aksel Olsen' (Syn. <i>floridulus</i> ) <i>Riesen-Chinaschilf, blüht selten</i>	Sept–Okt	300	○	F
<i>sinensis</i> 'Ferner Osten' <i>rötlich, später silbrig</i>	Sept–Okt	160	○	G
<i>sinensis</i> 'Gracillimus' <i>schmales überhängendes Blatt, blüht selten</i>	Sept–Okt	150	○	F
<i>sinensis</i> 'Graziella' <i>blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend</i>	Aug–Okt	130	○	G
<i>sinensis</i> 'Große Fontäne' <i>silbrig rosa, überhängender Wuchs</i>	Aug–Okt	250	○	G
<i>sinensis</i> 'Kleine Fontäne' <i>silbrig rosa, feines überhängendes Blatt</i>	Juli–Sept	160	○	G
<i>sinensis</i> 'Kleine Silberspinne' <i>bräunlich silbern, schmalblättrig</i>	Juli–Sept	120	○	G
<i>sinensis</i> 'Little Zebra®' <i>gelbgrün gestreiftes Blatt</i>	Aug–Sept	120	○	H
<i>sinensis</i> 'Malepartus' <i>rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte</i>	Aug–Okt	200	○	G
<i>sinensis</i> 'Morning Light' <i>weißsilbrig, schmaler, weißer Blattrand</i>	Aug–Okt	120	○	G
<i>sinensis</i> 'Silberfeder' <i>silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte</i>	Aug–Okt	200	○	F
<i>sinensis</i> 'Silberspinne' <i>schmales Blatt, rötlichsilberne Blüte</i>	Sept–Okt	150	○	G
<i>sinensis</i> 'Sirene' <i>silbrig rosafarben, schmales Blatt</i>	Aug–Okt	230	○	F
<i>sinensis</i> 'Strictus' (Syn. 'Zebrinus Strictus') <i>Zebraschilf, Querstreifen, gelblich</i>	Sept–Okt	150	○	G
<i>sinensis</i> 'Variegatus' <i>silbrig gestreiftes Blatt, wertvolle Sorte</i>	Aug–Okt	125	○	G
<i>sinensis</i> 'Yakushima Dwarf' <i>silbrig weiß, schmales Blatt</i>	Aug–Okt	100	○	G
<i>sinensis</i> 'Zebrinus' <i>silbrig weiß, gelbgrün gestreiftes Blatt</i>	Aug–Okt	130	○	G
<b>Molinia</b> <i>Pfeifengras</i>	<b>Poaceae</b>			
<i>arundinacea</i> 'Fontäne' <i>überhängende gelblich braune Rispen</i>	Aug–Okt	180	○	E
<i>arundinacea</i> 'Karl Foerster' <i>gelblich braune Ähren, Herbstfärbung</i>	Aug–Sept	200	○	E
<i>arundinacea</i> 'Windspiel' <i>starkwüchsig, Herbstfärbung</i>	Aug–Sept	200	○	E
<i>caerulea</i> 'Edith Dudszus' <i>schwärzlich braun</i>	Aug–Okt	90	○●	C
<i>caerulea</i> 'Heidebraut' <i>schwarzbraune Ähren</i>	Aug–Okt	70	○	C
<i>caerulea</i> 'Moorhexe' <i>schwarzbraune Ähren, Herbstfärbung</i>	Aug–Okt	80	○	C
<i>caerulea</i> 'Variegata' <i>schönes weißbuntes Blatt, schwärzlich braune Rispen</i>	Aug–Okt	50	○	C
<b>Panicum</b> <i>Ruten-Hirse, Zier-Hirse</i>	<b>Poaceae</b>			
<i>virgatum</i> 'Heavy Metal' <i>grünlich, bläulich grünes Blatt</i>	Juli–Sept	100	○	D

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
virgatum 'Heiliger Hain' grünlich, blaugrünes Blatt	Juli–Sept	100	○	E
virgatum 'Rehbraun' bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○	D
virgatum 'Rotstrahlbusch' (Syn. 'Hänse Herms') bräunlich, Blatt früh braunrot	Juli–Sept	90	○	D
virgatum 'Shenandoah' weinrot	Juli–Sept	100	○	E
virgatum 'Strictum' braungrüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung	Juli–Sept	150	○	D
<b>Pennisetum</b> Federborstengras	<b>Poaceae</b>			
alopecuroides 'Compressum' gelb bräunlich, walzenförmige Ähren	Aug–Sept	90	○	D
alopecuroides 'Hameln' gelb bräunlich, früh, reichblühend	Juli–Okt	60	○	D
alopecuroides 'Herbstzauber' gelb bräunlich	Aug–Sept	80	○	D
alopecuroides 'Little Bunny' gelb bräunlich, niedrige Sorte	Aug–Okt	30	○	D
alopecuroides var. viridescens dicke dunkelbraune Bürste	Aug–Sept	60	○	F
<b>Phalaris</b> Glanzgras	<b>Poaceae</b>			
arundinacea 'Picta' hellgrün, grünweiß gestreifte Blätter, Ausläufer bildend	Juni–Juli	100	○	C
<b>Pleiblastus</b> Zwergbambus	<b>Poaceae</b>			
pumilus tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker		30	◐●	F
pygmaeus Ausläufer bildend		40	◐●	F
<b>Sesleria</b> Blaugras	<b>Poaceae</b>			
caerulea gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt	Juni–Juli	25	○	B
<b>Sorghastrum</b> Indianergras				
nutans 'Indian Steel' rotbraun, graugrünes Blatt	Aug–Okt	90	○	D

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Spartina</b> Goldleistengras	<b>Poaceae</b>			
pectinata 'Aureomarginata' grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt	Aug–Sept	150	○	E
<b>Spodiopogon</b> Zottenrauhgras	<b>Poaceae</b>			
sibiricus graugrüne Rispen, grünes Blatt, schöne Herbstfärbung	Juli–Sept	120	○	D
<b>Stipa</b> Federgras	<b>Poaceae</b>			
capillata Büschel-Haargras, lange Grannen, wärmeliebend	Juli–Aug	80	○	D
gigantea Riesen-Federgras, gelblich, lange Grannen	Juni–Aug	165	○	F
pennata silbrig weiß, lange Grannen	Juni–Juli	60	○	F
tenuissima Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen, feine Halme	Juni–Juli	50	○	D

## Farne

<b>Adiantum</b> Frauenhaarfarn, Venushaarfarn	<b>Adiantaceae</b>			
pedatum drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig		40	●●	G
pedatum 'Imbricatum' drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig		15	●●	G
<b>Asplenium</b> Mauerfarn, Steinfederfarn	<b>Aspleniaceae</b>			
trichomanes kleiner Farn für Mauerfugen		15	△●	E
<b>Athyrium</b> Frauenfarn	<b>Athyriaceae</b>			
filix-femina gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude		70	●●	E
filix-femina 'Frizelliae' gefiedertes Blatt		50	●●	E
niponicum 'Metallicum' Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt		50	●●	E
<b>Blechnum</b> Rippenfarn	<b>Blechnaceae</b>			
spicant lederartiges grünes Blatt, feuchter saurer Boden		30	●●	F
<b>Dryopteris</b> Wurmfarn	<b>Dryopteridaceae</b>			
affinis (Syn. borrieri) Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel		80	●	E
erythrosora Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb		65	●	E
filix-mas gefiederte trichterförmige Wedel		90	●●	E
filix-mas 'Linearis Polydactylon' Schellenbaumfarn, fein gefiedert		60	●	E
<b>Matteuccia</b> Becherfarn, Straußenfarn, Trichterfarn	<b>Onocleaceae</b>			
struthiopteris trichterförmig angeordnete Blätter, bildet Ausläufer		100	●	E



Dryopteris affinis



Allium ursinum



Foeniculum vulgare



Rosmarinus officinalis

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Onoclea</b> <i>Perlfarn</i>	<b>Onocleaceae</b>			
<i>sensibilis</i> <i>doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer</i>		50	☉●	E
<b>Osmunda</b> <i>Königsfarn</i>	<b>Osmundaceae</b>			
<i>regalis</i> <i>doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung</i>		120	●	E
<b>Phyllitis (Syn. Asplenium)</b> <i>Hirschzungenfarn</i>	<b>Aspleniaceae</b>			
<i>scolopendrium</i> <i>lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert</i>		40	☉●	E
<i>scolopendrium</i> ' <i>Cristata</i> ' <i>gekräuselte, kammerartige Blätter</i>		30	☉●	E
<b>Polypodium</b> <i>Tüpfelfarn</i>	<b>Polypodiaceae</b>			
<i>vulgare</i> <i>gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn</i>		30	☉●	E
<b>Polystichum</b> <i>Schildfarn</i>	<b>Dryopteridaceae</b>			
<i>aculeatum</i> <i>Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt</i>		80	●	E
<i>polyblepharum</i> <i>Japanischer Glanz-Schildfarn</i>		90	☉	E
<i>setiferum</i> <i>grüne Wedel</i>		40	●	E
<i>setiferum</i> ' <i>Plumosum Densum</i> ' <i>feingefiedertes Laub</i>		40	●	E
<i>setiferum</i> ' <i>Proliferum</i> ' <i>flache breite Wedel</i>		40	●	E
<i>setiferum</i> ' <i>Proliferum Herrenhausen</i> ' <i>lange breite Wedel</i>		45	●	E
<b>Woodsia</b> <i>Wimpernfarn</i>	<b>Woodsiaceae</b>			
<i>obtusa</i> <i>bildet Rhizome</i>		30	☉	E

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
-------------------------	-----------	---------------	---------------	------------------

## Gewürzpflanzen

### Allium Lauch

schoenoprasum <i>Schnittlauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark</i>	Juni–Juli	25	○	B
tuberosum <i>Schnittknoblauch, weiß</i>	Aug–Sept	50	○	C
ursinum <i>Bärlauch, weiße Blüten, Bätter für Salat, Aufläufe, als Pesto</i>	Apr–Mai	25	●	D

### Althaea Echter Eibisch

officinalis <i>rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel</i>	Juli–Sept	160	○	C
--	-----------	-----	---	---

### Angelica Engelwurz

archangelica <i>grün, Wurzel liefert ätherisches Öl</i>	Juni–Juli	250	○	E
---	-----------	-----	---	---

### Armoracia Meerrettich

rusticana <i>weiß, Wurzeln für Sauce usw.</i>	Mai–Juni	100	○	E
---	----------	-----	---	---

### Artemisia Beifuß, Estragon

absinthium <i>Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden</i>	Juli–Sept	100	○	B
dracunculus <i>Russischer Estragon, weiblich, Blätter für Saucen und Suppen</i>	Aug–Sept	120	○	B
dracunculus var. sativus <i>Französischer Estragon, weiblich, aromatisch</i>	Aug–Sept	120	○	D
vulgaris <i>Beifuß, weiblich, Blütenstände für Fleischgerichte (Gänsebraten)</i>	Juli–Aug	120	○	B

### Foeniculum Fenchel

vulgare <i>gelb, Gewürz- und Heilpflanze</i>	Juli–Aug	150	○	C
vulgare 'Atropurpureum' <i>Bronze-Fenchel, gelb, dekoratives rotes Laub</i>	Juli–Aug	100	○	D

### Fragaria Monats-Erdbeere

vesca var. semperflorens 'Alexandria' <i>Monats-Erdbeere, weiß, aromatisch</i>	Mai–Okt	15	○	B
vesca var. vesca <i>Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig</i>	Mai–Juni	15	○	B

**Preisgruppen**

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

**Zeichenerklärung**
**Standort**

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Galium (Syn. Asperula)</b> Waldmeister				
odoratum weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen, Frühstückstee	Apr–Mai	15	◐●	C
<b>Helianthus</b> Topinambur, Erdbirne				
tuberosus gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen	Sept–Okt	200	○	E
<b>Helichrysum</b> Currykraut, Steppen-Strohblume				
italicum 'Tall' gelb, silbriges Blatt, schöner wüchsiger Typ	Juli–Aug	45	○	E
<b>Hypericum</b> Johanniskraut				
perforatum gelb, Blüten als Heiltee	Mai–Juli	60	○	B
<b>Hyssopus</b> Ysop				
officinalis blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen	Juli–Aug	45	○	B
<b>Lavandula</b> Lavendel				
angustifolia violett, für Kräuterbutter, Fischsuppe, Duftkissen	Juli–Aug	40	○	B
<b>Levisticum</b> Liebstöckel				
officinale gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack	Juli–Aug	150	○	B
<b>Melissa</b> Zitronen-Melisse				
officinalis weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee	Juni–Aug	50	○	B
officinalis 'Limonii' weiß, goldgelbe Blätter, Limonenaroma	Juni–Aug	50	○	D
<b>Mentha</b> Minze				
× piperita Pfeffer-Minze, Blätter für frischen Tee, Heilpflanze	Juli–Sept	40	○	B
× piperita 'Mitcham' Mitcham-Pfeffer-Minze, dunkle Blattnerven, beliebt	Juli–Sept	30	○	C

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
× piperita var. citrata duftet nach Orangen, Teemischungen	Juli–Sept	50	○	D
× piperita var. citrata 'Eau de Cologne' violettblau	Juni–Aug	70	○	D
spicata hellviolett	Juli–Sept	70	○	B
spicata 'Black Spearmint' hellviolett	Juli–Sept	50	○	D
spicata 'Maroccan' violett, besonders würzige Sorte, Blätter für Tee	Juli–Sept	50	○	C
suaveolens 'Bowles Apfelminze' (Syn. × rot. 'Bowles') Apfel-Minze	Juli–Sept	50	○	D
<b>Origanum</b> Dost, Majoran				
vulgare rosa, Blätter zu Wurst, Braten, Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln	Juli–Sept	40	○	B
vulgare 'Compactum' rosa, dichter, kompakter Wuchs	Juli–Sept	15	○	B
vulgare 'Hot Spicy' kräftiger Geschmack, zu Pizza und Spaghetti	Juni–Sept	50	○	D
<b>Petroselinum</b> Petersilie				
crispum 'Gigante de Italica' glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen	Juni–Juli	20	○	B
crispum 'Smaragd' krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren	Juni–Juli	20	○	B
<b>Rheum</b> Rhabarber				
rhabarbarum weiß, Stiele für Kompott, Gebäck	Mai–Juni	80	○	D
rhabarbarum 'Holsteiner Blut' weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte	Mai–Juni	80	○	H
<b>Rosmarinus</b> Rosmarin				
officinalis 'Arp' kräftig blau, graugrünes Laub, besonders winterhart	März–Apr	80	○	D
officinalis 'Capri' lichtblau	Mai–Sept	75	△○	D
<b>Rumex</b> Ampfer				
rugosus (Syn. acetosa var. hortensis) Sauer-Ampfer, braunrot	Mai–Juli	80	○	B
sanguineus Blut-Ampfer, unscheinbar, für Buffetedekorationen	Juni–Aug	50	○	C
<b>Ruta</b> Wein-Raute				
graveolens gelb, Blätter als Gewürz für Fleisch, Fisch und Suppen	Juni–Juli	50	○	B
<b>Salvia</b> Echter Salbei, Apotheker-Salbei				
officinalis Salbei, Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung	Juni–Aug	50	○	B





Origanum vulgare 'Compactum'

Thymus vulgaris

Bistorta officinalis 'Superbum'

Cyperus longus ssp. longus

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Sanguisorba</b> <i>Wiesenknopf</i>				
minor <i>Pimpinelle, grünlich braun, frisch für Salate, getrocknet zu Fisch</i>	Mai–Aug	40	○●	B
<b>Satureja</b> <i>Bohnenkraut</i>				
montana ssp. montana <i>weiß, Blätter und Stängel für Speisen</i>	Juli–Sept	30	○	B
<b>Sedum</b> <i>Tripmadam</i>				
reflexum <i>gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch</i>	Juli–Aug	20	○	B
<b>Symphytum</b> <i>Arznei-Beinwell</i>				
officinale <i>violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge</i>	Mai–Juli	100	○●	D
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>				
× citriodorus 'Lemon' <i>nach Lemon duftend</i>	Juni–Juli	15	○	C
herba-barona <i>Kümmel-Thymian, Duftteppich, Gewürz zu Fleisch und Saucen</i>	Juli–Aug	10	○	D
vulgaris <i>Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten</i>	Juli–Sept	20	○	B
vulgaris ssp. fragrantissimus <i>Orangen-Thymian, violett, Duft, Aromasorte</i>	Juni–Sept	25	○	D
<b>Valeriana</b> <i>Baldrian</i>				
officinalis rosa <i>Wurzeln für Tee bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung</i>	Juni–Aug	120	○	B

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
-------------------------	-----------	---------------	---------------	------------------

## Wasserpflanzen

<b>Acorus</b> <i>Kalmus</i>	<b>Araceae</b>			
calamus –10 bis –40 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	80	○●	D
calamus 'Variegatus' –10 bis –40 cm W., gelblich grün, weißlich gestreift	Juni–Juli	60	○●	E
<b>Alisma</b> <i>Froschlöffel</i>	<b>Alismataceae</b>			
parviflorum 0 bis –10 cm W., weißrosa, rundes Blatt	Juli–Aug	60	○●	D
plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica –10 bis –30 cm W., weißrosa	Juni–Aug	90	○●	D
<b>Aponogeton</b> <i>Wasserähre</i>	<b>Aponogetonaceae</b>			
distachyos –20 bis –50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○	F
<b>Bistorta</b> <i>Gartenknöterich</i>				
officinalis 'Superbum' (Syn. Bistorta 'Superbum') hellrosa	Mai–Aug	80	○●	C
<b>Butomus</b> <i>Blumenbinse, Schwanenblume</i>	<b>Butomaceae</b>			
umbellatus –10 bis –40 cm W., rosa, für große Wasserflächen	Juni–Aug	100	○	D
<b>Calla</b> <i>Sumpfkalla, Schlangenzwurz</i>	<b>Araceae</b>			
palustris –20 bis +5 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	20	○●	D
<b>Callitriche</b> <i>Frühlings-Wasserstern</i>	<b>Callitrichaceae</b>			
palustris –10 bis –80 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Sept	4	○●	C
<b>Caltha</b> <i>Sumpf-Dotterblume</i>	<b>Ranunculaceae</b>			
palustris 0 bis –10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt	Apr–Mai	35	○●	C
palustris 'Multiplex' 0 bis –10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○●	F
palustris var. alba 0 bis –10 cm W., weiß, horstig wachsend, Sumpf	Apr–Mai	20	○●	E
<b>Cardamine</b> <i>Wiesen-Schaumkraut</i>	<b>Brassicaceae</b>			
pratensis Sumpf, hellviolett, auch Küchenkraut für Frühlingsalate	März–Mai	40	○●	C

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		


## Zeichenerklärung

## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Carex</b> Segge	<b>Cyperaceae</b>			
<i>grayi</i> Morgenstern-Segge braungrün, Feuchtwiesen, Bachufer	Juli–Aug	60	○●	C
<i>pseudocyperus</i> Scheinzypergras-Segge, 0 bis –10 cm W., grünlich, dekorativ	Juni–Juli	80	○●	C
<b>Ceratophyllum</b> Hornblatt	<b>Ceratophyllaceae</b>			
<i>demersum</i> freischwimmend, Sauerstoffspender, Nährstoff liebend	Juni–Sept	10	○●	D
<b>Crassula</b> Nadelkraut	<b>Crassulaceae</b>			
<i>recurva</i> –20 bis –60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, Unterwasserpflanze	Juli–Sept	5	○●	C
<b>Cyperus</b> Zypergras	<b>Cyperaceae</b>			
<i>longus</i> ssp. <i>longus</i> 0 bis –10 cm W., rotbraune dekorative Blüten	Juni–Aug	100	○	E
<b>Eichhornia</b> Wasserhyazinthe	<b>Pontederiaceae</b>			
<i>crassipes</i> hellviolett, tropische Schwimmpflanze, frostfrei überwintern	Juli–Okt	20	○	D
<b>Eleocharis</b> Nadelsimse	<b>Cyperaceae</b>			
<i>acicularis</i> 10 bis –60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○	D
<i>palustris</i> 0 bis –20 cm W., braun, Repositonspflanze	Juni–Aug	30	○	D
<b>Elodea</b> Wasserpest	<b>Hydrocharitaceae</b>			
<i>canadensis</i> –30 bis –200 cm W., wuchernde Unterwasserpflanze	Mai–Aug		○●	D
<b>Equisetum</b> Schachtelhalm	<b>Equisetaceae</b>			
<i>hyemale</i> var. <i>robustum</i> 0 bis –40 cm W., grünlich	Juni–Juli	120	○●	F

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Eriophorum</b> <i>Wollgras</i>	<b>Cyperaceae</b>			
<i>angustifolium</i> 0 bis -10 cm W., weißwollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai-Juni	40	○	D
<i>vaginatum</i> Scheiden-Wollgras, 0 bis -5 cm W., weiß, Horst bildend, heimisch	Mai-Juni	45	○	D
<b>Euphorbia</b> <i>Wolfsmilch</i>	<b>Euphorbiaceae</b>			
<i>palustris</i> 0 bis -10 cm W., gelb, Herbstfärbung, heimisch	Mai-Juni	80	○●	E
<b>Filipendula</b> <i>Mädesüß</i>	<b>Rosaceae</b>			
<i>ulmaria</i> +5 bis 0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni-Aug	100	○●	C
<b>Geum</b> <i>Bach-Nelkenwurz</i>	<b>Rosaceae</b>			
<i>rivale</i> +5 bis 0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai-Juni	50	○●	C
<b>Glyceria</b> <i>Süßgras</i>	<b>Poaceae</b>			
<i>maxima</i> 'Variegata' 0 bis -50 cm W., Blatt grünweiß gestreift, wuchernd	Juli-Aug	100	○	C
<b>Gratiola</b> <i>Gnadenkraut</i>	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>officinalis</i> 0 bis -5 cm W., hellgelb, rosa Lippen	Juni-Aug	40	○●	C
<b>Gunnera</b> <i>Mammutblatt</i>	<b>Gunneraceae</b>			
<i>tinctoria</i> (Syn. <i>chilensis</i> ) rotbraun, dekorative Riesenstaude, Wasserrand	Juli-Aug	120	○	H
<b>Helonias</b> <i>Sumpf-Scheinselke, Helonie</i>	<b>Liliaceae</b>			
<i>bullata</i> 0 bis -2 cm W., Moorbeet, rosaviolett, Rarität für Liebhaber	Apr-Mai	20	○●	G
<b>Hibiscus</b> <i>Sumpfeibisch</i>	<b>Malvaceae</b>			
<i>moscheutos</i> 0 bis -10 cm W., große rosa Blüten, prächtige Uferpflanze	Juli-Sept	120	○	F
<b>Hippuris</b> <i>Tannenwedel</i>	<b>Hippuridaceae</b>			
<i>vulgaris</i> 0 bis -40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni-Aug	40	○	D
<b>Hottonia</b> <i>Wasserfeder</i>				
<i>palustris</i> -5 bis -40 cm W., Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai-Juli	20	○●	D




Gunnera tinctoria



Iris ensata



Iris sibirica



Nymphoides peltata

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
<b>Hydrocharis</b> Froschbiss	<b>Hydrocharitaceae</b>			
morsus-ranae weiß, freischwimmend, bildet Überwinterungsknospen	Juli–Aug	5	☉●	D
<b>Iris</b> Schwertlilie	<b>Iridaceae</b>			
ensata (Syn. kaempferi) Japanische Sumpf-Schwertlilie, +5 bis -0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○	D
laevigata 0 bis -10 cm W., blauviolett	Juni–Juli	80	○	E
pseudacorus 0 bis -20 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○	C
pseudacorus 'Variegata' 0 bis -20 cm W., gelb	Juni–Juli	80	○	F
sibirica +5 bis 0 cm W., violett, heimisch, Feuchtwiesen	Mai–Juni	70	○	D
versicolor 0 bis -20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○	D
<b>Juncus</b> Binse	<b>Juncaceae</b>			
effusus Flatter-Binse, 0 bis -10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze	Juli–Aug	70	☉●	C
effusus 'Spiralis' Korkenzieher-Binse, 0 bis -5 cm W., gelblich braun	Juli–Aug	45	☉●	E
ensifolius Zwerg-Binse, 0 bis -10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	20	○	D
inflexus Blau-Binse, 0 bis -10 cm W., braun, blaugüne Horste	Juni–Juli	40	○	D
<b>Lysichiton</b> Scheinkalla	<b>Araceae</b>			
americanus 0 bis -10 cm W., gelb, wertvoll, benötigt viel Platz	Apr–Mai	60	☉●	G
camtschatcensis 5 bis -10 cm W., weiß, Rarität	Mai–Juni	70	☉●	G
<b>Lysimachia</b> Felberich	<b>Primulaceae</b>			
nummularia Pfennigkraut, 0 bis -3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	☉●	A

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<i>thyrsiflora</i> Strauß-Felberich, 0 bis –20 cm W., gelb, Repositionspflanze	Mai–Juli	40	○●	D
<i>vulgaris</i> Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpf, gelb, heimische Uferstaude	Juni–Juli	100	○●	C
<b>Lythrum</b> Weiderich	<b>Lythraceae</b>			
<i>salicaria</i> 0 bis –5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○●	B
<b>Mazus</b> Lippenmäulchen	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>reptans</i> 0 bis –5 cm W., feucht, violett, Bodendecker für den Uferand	Mai–Juli	10	○●	D
<b>Mentha</b> Minze	<b>Lamiaceae</b>			
<i>aquatica</i> Wasser-Minze, +5 bis –25 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○●	C
<b>Menyanthes</b> Fieberklee	<b>Menyanthaceae</b>			
<i>trifoliata</i> –10 bis –30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○●	D
<b>Mimulus</b> Gauklerblume	<b>Scrophulariaceae</b>			
<i>cupreus</i> 'Roter Kaiser' +5 bis 0 cm W., rot, Selbstaussaat	Juni–Sept	30	○●	C
<i>luteus</i> 0 bis –10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Juli	50	○●	C
<i>ringens</i> 0 bis –5 cm W., blauviolett, horstig wachsend	Juni–Aug	60	○●	D
<b>Myosotis</b> Sumpf-Vergissmeinnicht	<b>Boraginaceae</b>			
<i>palustris</i> +5 bis 0 cm W., violettblau, Repositionspflanze, Selbstaussaat	Mai–Aug	35	○●	B
<b>Myriophyllum</b> Tausendblatt	<b>Gunneraceae</b>			
<i>aquaticum</i> (Syn. <i>brasiliense</i> ) –30 bis –100 cm W., grünlich, federiger Rasen	Juni–Aug	15	○●	D
<i>verticillatum</i> –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpfl.	Juni–Aug	20	○●	D
<b>Nuphar</b> Mummel, Teichrose	<b>Nymphaeaceae</b>			
<i>lutea</i> –50 bis –200 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter	Juni–Aug	15	○●	I
<b>Nymphaea</b> Seerose	<b>Nymphaeaceae</b>			
<i>alba</i> –60 bis –200 cm W., weiß, heimisch	Juni–Aug		○	I
× <i>cultorum</i> 'Attraction' –60 bis –100 cm W., purpurrot, Blatt rund	Juni–Sept		○	I
× <i>cultorum</i> 'Fabiola' –40 bis –70 cm W., pink	Mai–Juli		○	I

## Preisgruppen

	Stückpreise in Euro exkl. MwSt.		
	1 Stück	ab 10 Stück	ab 50 Stück
A	3,45	2,40	2,20
B	4,05	2,80	2,60
C	4,85	3,40	3,10
D	5,75	3,95	3,65
E	7,50	5,10	4,80
F	9,50	6,70	6,10
G	11,70	8,20	7,40
H	15,80	10,50	9,80
I	Auf Anfrage		

## Zeichenerklärung


## Standort

- △ Steingartenstaude
- Sonne
- ◐ Lichter Schatten
- Schatten
- TC Meristemvermehrung
- ® Sortenschutz

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Standort	Preisgruppe
× cultorum 'Froebeli' Zwerg-Seerose, -20 bis -40 cm W., purpurrot	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Heaver White' (Syn. 'Hermine') -40 bis -100 cm W., weiß	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Joey Tomocik' -40 bis -50 cm W., dunkelgelb	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Marliacea Chromatella' -60 bis -90 cm W., hellgelb, wüchsig	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Marliacea Rosea' -60 bis -100 cm W., hellrosa, reichblühend	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, -30 bis -50 cm W., dunkelrot	Juni–Sept		○	I
× cultorum 'Walter Pagels' Zwerg-Seerose, -20 bis -50 cm W., creme	Juni–Sept		○	I
<b>Nymphoides</b> Seekanne	<b>Menyanthaceae</b>			
peltata -10 bis -60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter	Juni–Aug	5	○◐	D
<b>Orontium</b> Goldkeule	<b>Araceae</b>			
aquaticum -30 bis -60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze	Mai–Juni	30	○◐	G
<b>Phragmites</b> Schilf, Ried	<b>Poaceae</b>			
australis -20 bis -80 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche	Aug–Sept	250	○	B
<b>Pistia</b> Wassersalat	<b>Araceae</b>			
stratioides freischwimmend, helle Blattrossetten, frostfrei überwintern		15	○	D
<b>Pontederia</b> Hechtkraut	<b>Pontederiaceae</b>			
cordata -10 bis -30 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt	Juni–Sept	80	○	G

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Potamogeton</b> Laichkraut	<b>Potamogetonaceae</b>			
natans –30 bis –150 cm W., weiblich braun, unscheinbar, ledriges Blatt	Juni–Aug	10	○●	E
<b>Potentilla</b> Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut	<b>Rosaceae</b>			
palustris (Syn. Comarum palustre) +5 bis –10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○●	D
<b>Primula</b> Primel	<b>Primulaceae</b>			
rosea 'Gigas' feucht, purpurrosa, Teichrandpflanze	März–Apr	20	○●	A
veris ssp. veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend, heimisch	Apr–Mai	20	●	B
<b>Ranunculus</b> Hahnenfuß	<b>Ranunculaceae</b>			
acris 'Multiplex' Sumpf, gelb, kugelige gefüllte Blüten	Mai–Sept	60	○●	D
aquatilis –20 bis –100 cm W., weiß, Schwimmblätter	Mai–Aug	5	○●	D
flammula Flammender Hahnenfuß, 0 bis –20 cm W., gelb, Dauerblüher	Juli–Okt	40	○	D
lingua Zungen-Hahnenfuß, +5 bis –30 cm W., tiefgelbe Blütenschalen	Juni–Aug	90	○●	D
<b>Sagittaria</b> Pfeilkraut	<b>Alismataceae</b>			
latifolia 10 bis –30 cm W., weiß-zartrosa, pfeilartiges Blatt, wüchsig	Juni–Aug	60	○●	D
sagittifolia ssp. sagittifolia –10 bis –40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt	Juni–Aug	50	○●	D
<b>Saururus</b> Molchschwanz	<b>Saururaceae</b>			
cernuus +5 bis –10 cm W., weiblich, seltene Teichrandpflanze	Juni–Juli	50	○	D
<b>Schizostylis</b> Kaffernlilie	<b>Iridaceae</b>			
coccinea rosarot, frostfrei überwintern	Sept–Okt	60	○	E
<b>Scirpus</b> See-Simse (Syn. Schoenoplectus)	<b>Cyperaceae</b>			
lacustris 0 bis –80 cm W., Uferbefestigung, Klärteiche	Juni–Aug	200	○●	D
lacustris 'Albescens' 0 bis –50 cm W., längsgestreift	Juni–Aug	125	○●	E
lacustris ssp. tabernaemontani 'Zebrinus' 0 bis –15 cm W., quergestreift	Juni–Aug	100	○●	E
<b>Sparganium</b> Igelkolben	<b>Sparganiaceae</b>			
erectum Ästiger Igelkolben, –5 bis –30 cm W., weiß, ausbreitend	Juli–Aug	100	○●	D





Nymphoides peltata



Phragmites australis




Sagittaria sagittifolia



Sparganium erectum

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe in cm	Stand- ort	Preis- gruppe
<b>Stratiotes</b> <i>Krebsschere</i>	<b>Hydrochari- taceae</b>			
<i>aloides</i> freischwimmende Rosettenpflanze, weiß	Juni–Juli	15	○●	D
<b>Thelypteris</b> <i>Sumpffarn</i>	<b>Thelypteri- daceae</b>			
<i>palustris</i> 0 bis –20 cm W., sommergrün, Ausläufer bildend, feingefiedert		50	○●	D
<b>Trapa</b> <i>Wassernuss</i>	<b>Trapaceae</b>			
<i>natans</i> –20 bis –200 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze	Juni–Aug	1	○●	E
<b>Typha</b> <i>Rohrkolben</i>	<b>Typhaceae</b>			
<i>angustifolia</i> –20 bis –100 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben	Juli–Aug	200	○	C
<i>latifolia</i> –20 bis –40 cm W., schwarzbraune K., breitblättrig, Repositionspfl.	Juli–Aug	180	○	C
<i>laxmannii</i> –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben	Juli–Aug	150	○	C
<i>minima</i> Kleiner Rohrkolben, 0 bis –10 cm W., kleine schwarzbraune Kolben	Juni–Juli	50	○	D
<b>Veronica</b> <i>Bachbunze</i>	<b>Scrophula- riaceae</b>			
<i>beccabunga</i> 0 bis –20 cm W., blauviolett, ausbreitend	Mai–Aug	30	○●	C



Service



## BÄUME IN DER VERWENDUNG

### PLANUNGSHelfER I FÜR STADT-GRÜN, GARTEN UND LANDSCHAFT

#### Vorbemerkung

Dieser Planungshelfer I – Bäume in der Verwendung – soll Ihnen einen Überblick über unser Angebot an Meckenheimer Qualitätsbäumen vermitteln. Zusammen mit unseren Partnern aus Landschafts- und Städtebau arbeiten wir, entsprechend unseres Unternehmenskonzeptes „Bäume aus bester Schule“, beständig weiter an der Aufgabe, die zukünftige Bedarfsituation in der Begrünung zeitgemäß zu berücksichtigen. Der Klimawandel stellt gerade an innerstädtische Pflanzungen hohe Ansprüche. Wir haben die Aufgabe sehr



## BÄUME IN DER VERWENDUNG



Neu: mit unseren  
Empfehlungen zum  
Klimawandel

**PLANUNGSHELFER I FÜR STADT-  
GRÜN, GARTEN UND LANDSCHAFT**

ernst genommen, unsere Bäume zu beobachten und zu beurteilen, welche Baumarten im Hinblick auf Anpassung an den Klimawandel besonders geeignet sind. In Zusammenarbeit mit weiteren Experten ist eine Liste von Zukunftsbäumen entstanden, die wir als außerordentlich klimastresstolerant bewerten, sie sind markiert mit dem Zeichen:



Natürlich stehen nach wie vor alle altbewährten Sorten zur Verfügung, darunter auch eigene hervorragende Selektionen, wie beispielsweise der nun seit Jahren erfolgreich verwendete *Acer platanoides* 'Allershausen'.



Acer platanoides 'Rubicundus Typ I'



Acer rubrum 'Redpointe'®

Als Entscheidungshilfe für Ihre tägliche Arbeit haben wir für Sie unseren Planungshelfer I – Bäume in der Verwendung – weiterentwickelt und neu aufgelegt. Kurzinformationen zu über 360 Arten und Sorten sollen Sie bei der richtigen Auswahl unterstützen.

Absolute Aussagen zur Eignung eines einzelnen Baumes an einen bestimmten Standort können nicht getroffen werden, da zu viele standortspezifische Faktoren die Vitalität und die Entwicklung eines Baumes beeinflussen.

Bäume mit dem Prädikat **empfehlenswert** können aufgrund unserer aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen, ergänzt auch durch Ihre Beobachtungen als Verwender, für die speziellen Anforderungen eines Standortes voll zufriedenstellen. Auch vom gestalterischen Standpunkt aus sind sie als empfehlenswert einzustufen.

Bei den Arten und Sorten, die als **bedingt empfehlenswert** eingestuft worden sind, müssen Einschränkungen hinsichtlich der Eignung an die speziellen Standorte gemacht werden. Die Wuchseigenschaften können unter nicht optimalen Bedingungen nicht voll befriedigen.

Neueinführungen zumeist von Sorten, die wir aus den USA erhalten haben, stehen bei uns und an Teststandorten unter jahrelanger Beobachtung. Einige dieser neueren Sorten haben die Aufnahme in diesen Planungshelfer geschafft, da sie sich bisher sehr gut bewährt haben, wie beispielsweise Acer rubrum 'Redpointe'® und Fraxinus pennsylvanica Sorten. Andere Sorten können nach unseren Erfahrungen bisher noch nicht empfohlen werden.

## Ley-Bäume kommen aus bester Schule.

Sie tragen so zu einer nachhaltig lebenswerten Gestaltung unserer Städte und Landschaften für Generationen bei.

## Die Eignung



Bäume der Rubrik **Hochbeete, Pflanztröge** zeichnen sich durch ihre Verträglichkeit für Bodentrockenheit und Hitze aus und/oder empfehlen sich durch ihren dekorativen Habitus.



Der Bereich **Wohnsiedlung, Hausgärten** mit seiner aufgelockerten Belaubung ist kaum verkehrs- und schadstoffbelastet. Hierfür eignen sich besonders kleinkronige und mittelgroße Bäume, die außerdem durch Blüte, Frucht, Laub oder Kronenform einen zusätzlichen Zierwert besitzen können.



Im Lebensbereich **kleinräumige Standorte, schmale Straßen** werden die Arten und Sorten aufgeführt, die Anforderungen wie kleines Kronenvolumen oder schlanker Wuchs entsprechen. Dies kann für enge Hofanlagen, schmale Fußgängerbereiche oder sehr begrenzte Räume zwischen Häuserfront und Fahrbahn zutreffen.



Die Bäume der Rubrik **Straßen im städtischen Bereich, Plätze** haben einen größeren Platzbedarf. Sie zeichnen sich durch eine ausreichende Verträglichkeit gegenüber widrigen innerstädtischen Verhältnissen wie z.B. Wärmerückstrahlung, Schadstoffe, Bodenverdichtung, geringer Wurzelraum oder Überpflasterung aus.



Die Rubrik **Freiflächen im städtischen Bereich, Parks** enthält Arten und Sorten, die offene Böden wünschen oder eine geringe Immissionsverträglichkeit haben. Sie eignen sich bei genügend großem, offenem Grün- oder Randstreifen auch für breite Straßen, jedoch nicht für den stark belasteten Stadtkern.



Bäume für **Freie Landschaft, Straßen** sind meist heimische Arten und Sorten, die durch ihre große Formenvielfalt einen landschaftsprägenden Charakter besitzen.

## Die Wurzel




Herzwurzler

Generell wird zwischen einer Flach-, Herz- und Tiefwurzel unterschieden, hier haben wir noch die flachen Herzwurzler und die tiefen Herzwurzler dazu gefügt, um eine noch bessere Planung zu ermöglichen!

flache  
Herzwurzler

Auch wenn der Wurzeltyp jedes Baumes genetisch vorgegeben ist, so lässt sich eine generelle Aussage über den Wurzeltyp nicht machen. Je nach Standort prägt sich die Wurzel einer Pflanze entsprechend anders aus.

tiefe  
Herzwurzler

Die Ausprägung der Wurzel ist bedingt durch genetische Vorgabe und auch durch Bodenverdichtung, durchwurzelbarer Raum, Grundwasserspiegel.



Flachwurzler

Ein Flachwurzler wird mit Sicherheit auch Senkwurzeln entfalten, wenn er an der Oberfläche seines Standortes nicht genügend Wasser und Nährstoffe findet. Andererseits kann ein Tiefwurzler, wenn er denn an der Oberfläche ein genügend großes Angebot findet, auch weniger ausgeprägte tiefe Wurzeln entwickeln.



Tiefwurzler

Die in Baumschulen vorkultivierten und regelmäßig verpflanzten Bäume haben ein gänzlich anders entfaltetes Wurzelsystem: Hier kommt es darauf an, in Stammnähe so viele Wurzeln wie möglich zu erhalten, damit die Verpflanzung an den Endstandort erst reibungslos ermöglicht wird.

## Erläuterungen



Im Bereich **Eignung** weisen wir mit diesem Symbol darauf hin, wenn eine Pflanze für den jeweiligen Bereich **bedingt empfehlenswert** ist.



Im Bereich **Eignung** weisen wir mit diesem Symbol darauf hin, wenn eine Pflanze für den jeweiligen Bereich **empfehlenswert** ist.

Im Bereich **Besondere Merkmale** weisen wir mit diesem Symbol auf die unterschiedlichen Eigenschaften hin.

® = rechtlich geschützte Marke

© = rechtlich geschützte Sorte; unerlaubter Nachbau verboten!

## Wichtige Informationen zum Thema klimastresstolerante Bäume:












Bäume, die als besonders klimastresstolerant eingestuft sind, unsere Zukunftsbäume.

Schon seit Jahren erforschen Experten die Auswirkung der zunehmenden Klimaveränderungen auf Bäume. Auch wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Thema, zumal Bäume für ein gutes Stadtklima in Zukunft immer wichtiger werden.

Die von uns mit dem Logo markierten Bäume haben sich in jahrelanger Praxis und unter genauer Beobachtung gut bewährt. Durch eine hohe Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umweltbedingungen, vor allem im Hinblick auf Trockenheitsstress, Hitze und extreme Witterung, zeigen sie sich robust und widerstandsfähig.

Trotz allem ist eine fachgerechte Pflanzung mit Stammschutz, angepasstem Pflanzschnitt und intensiven Bewässerungsmaßnahmen unabdingbar. Dies gilt sowohl für den sogenannten „Klimabaum“, als auch für alle anderen von uns empfohlenen, bewährten Sorten.



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztroz	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Acer buergerianum							
Acer campestre							
Acer campestre 'Anny's Globe'							
Acer campestre 'Elsrijk'							
Acer campestre 'Fastigiata'							
Acer campestre 'Green Column'							
Acer campestre 'Huibers Elegant'							
Acer campestre 'Lienco'							
Acer campestre 'Nanum'							
Acer cappadocicum 'Rubrum'							
Acer capillipes							
Acer davidii							
Acer freemanii 'Autumn Blaze'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht




























































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Kleiner, kompakt wachsender Baum mit schmal aufrecht wachsender Krone, im Alter ausladend; gute rote Färbung im Herbst	
					Kleiner bis mittelgroßer Baum; selten mit durchgehender Stammverlängerung; dichte, sparrige, sehr variable Krone	
					Langsam wachsender Kugelbaum mit rundlicher Krone; schnittverträglich; windfest; kleine, gelbgrüne Blütenrispen	
					Kleiner Baum; schwächer als die Art wachsend; Stamm meist durchgehend; geschlossene, kegelförmige Krone; aufwärtsgerichtete Äste; mehlaufrei	
					Aufrecht wachsender Baum bis 12-14 m hoch; beginnt säulenförmig, im Alter kegelförmig; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich	
					Straff aufrecht wachsender Baum, ca. 10 m hoch; Herbstfärbung gelb mit rötlichen „Einschüssen“; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich	
					Kleine, dichte Krone, ca. 12 m hoch; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich; trägt Überpflasterung; windverträglich	
					Kompakte, eiförmige Krone, bis ca. 10 m hoch; gelbgrüne Blütenrispen; schnittverträglich; wertvoller Baum für die Insekten; der Austrieb ist bronze angehaucht	
					Sehr langsam wachsender Kugelbaum mit kleiner, breitrundlicher Krone; gut schnittverträglich; kleine Blätter; auf Stammbildner veredelt	
						Mittelgroßer Baum mit breiter, rundlicher Krone; Knospen und Zweige purpurrot; blutroter, allmählich vergrünender Austrieb
					Bis ca. 12 m hoch, vasenförmige Krone; auffallend gestreifte Rinde; das Laub verfärbt sich im Herbst orangerot; keine Überpflasterung; Boden kann leicht sauer sein	
					Kleiner Baum, Krone schmal trichterförmig; interessante Rindenfärbung, grün oder rötlich mit schmalen weißen Streifen	
					Dichte, breit pyramidenförmige Krone, bis ca. 15 m hoch; keine bzw. wenige Früchte; sollte nicht zu kalkreich stehen; trägt Überpflasterung; widerstandsfähig	

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Acer freemanii 'Celebration'							
Acer ginnala							
Acer griseum							
Acer monspessulanum							
Acer negundo							
Acer negundo 'Flamingo'							
Acer opalus							
Acer platanoides							
Acer plat. 'Allershausen' ©							
Acer platanoides 'Cleveland'							
Acer platanoides 'Columnare Nordrhein-Westfalen' ©							
Acer platanoides 'Columnare Typ Ley I'							
Acer platanoides 'Columnare Typ Ley II'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht


























































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Mittelgroßer, raschwüchsiger, breit aufrechter Baum mit dominantem Leittrieb; Kreuzung aus <i>A. rubrum</i> und <i>A. saccharinum</i>
					Kleiner Baum mit breitbuschiger, teils überhängender Krone
					Langsam wachsender kleiner Baum mit lockerer kegelförmiger Krone; Rinde zimtbraun und in Streifen abrollend; karminrote Herbstfärbung
					Langsam wachsender, kleiner Baum; sehr wärmeliebend; unregelmäßige, rundliche Krone
					Großer, raschwüchsiger Baum mit lockerer, ausladender, rundlicher Krone; teils überhängenden Ästen
					Kleiner Baum mit aufrecht strebender Verzweigung; Krone eiförmig und lockerbuschig; Blättchen auffallend weiß bis rosa gerandet
					Rundliche Krone, ca. 15 m hoch, 6-7 m breit; tief gefurchte Rinde, selten zu finden
					Großer Baum mit weit bis in die Krone durchgehendem Stamm; dichte, stumpfkegelige Krone
					Großer Baum mit weit bis in die Krone durchgehendem Stamm, Krone dichtgeschlossen, oval
					Mittelgroßer Baum mit meist durchgehender, gerader Stammverlängerung; dichte, geschlossene, ovale Krone
					Schmal säulenförmiger Baum; schwach wachsend, ähnlich <i>Acer plat.</i> „Columnare Typ Ley I“; Laub im Austrieb hell grün
					Kleiner Baum mit durchgehendem Stamm, säulenförmig, sehr schwach wachsend
					Mittelgroßer Baum mit bis in den Wipfel durchgehendem Stamm; sehr dichte, schmale, säulenförmige Krone, mit wenigen Hauptästen

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Acer platanoides 'Columnare Typ Ley III'							
Acer platanoides 'Crimson Sentry'							
Acer platanoides 'Deborah'							
Acer platanoides 'Drummondii'							
Acer platanoides 'Emerald Queen'							
Acer platanoides 'Eurostar®'							
Acer platanoides 'Faassen's Black'							
Acer platanoides 'Farlake's Green'							
Acer platanoides 'Globosum'							
Acer platanoides 'Olmsted'							
Acer platanoides 'Reitenbachii'							
Acer platanoides 'Royal Red'							
Acer platanoides 'Rubicundus® Typ I' 							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt

























































Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Kräftig wachsender Baum mit breit zylinderförmiger Krone und durchgehendem Stamm
				Schlanker, aufrecht schwach wachsender Baum mit schwarzrotem Laub; bis ca. 10 m hoch; schnittverträglich; sehr anspruchslos
				Gleichmäßig wachsender, pyramidaler Baum mit gutem, geradem Stamm; blutroter Austrieb; später vergrünend
				Schwach wachsender, kleinkroniger Baum mit weißgrünem Laub; braucht besten Boden um sich zu entwickeln
				Frohwüchsiger, robuster Baum mit geschlossener, aufwärts strebender Krone; auffallender, rosarötlicher Austrieb
				Robuster, gesunder, großer Baum mit dominantem Mitteltrieb; gleichmäßiger Kronenaufbau; stadtklimafest
				Mittelgroßer Baum mit schwarzrotem Laub; Stammverlängerung selten bis zur Spitze durchgehend; breitkegelliger Wuchs
				Kräftig und gleichmäßig wachsender Baum mit breit ovaler Krone
				Dichte, gleichmäßige Kugelkrone, im Alter jedoch mehr abgeplattete Form; sehr langsam wachsend; verfügbar mit verschiedenen Stammhöhen
				Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste
				Mittelgroßer, langsam wachsender Baum mit breiter, loser Krone; dunkelgrünes Laub, wird zum Herbst hin immer braunroter
				Ähnlich Acer plat. ‚Faassen’s Black‘, jedoch wüchsiger und mit etwas hellerem schwarzrotem Laub
				Schmal säulenförmiger Baum; schwach wachsend, ähnlich Acer pl. ‚Columnare Typ Ley I‘; blutroter Austrieb, später vergrünend

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Acer platanoides 'Rubicundus'® Typ II' © <span style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>							
Acer platanoides 'Schwedleri'							
Acer platanoides 'Superform'							
Acer platanoides x truncatum 'Crimson Sunset'							
Acer platanoides x truncatum 'Norwegian Sunset' <span style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU</span>							
Acer pseudoplatanus							
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'							
Acer pseudoplatanus 'Bruchem'							
Acer pseudoplatanus 'Erectum'							
Acer pseudoplatanus 'Negenia'							
Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'							
Acer pseudoplatanus 'Wilhelm' ©							
Acer rubrum							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt

























































Rinde

Wurzel-  
form

				Säulenförmiger Wuchs, ähnlich Acer pl. ‚Columnare Typ Ley II‘; blutroter Austrieb, später vergrünend
				Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste
				Großer Baum mit betont lockerwüchsiger, ausladender Krone
				Aufrechte, ovale, kompakte Krone; Laub tiefhila, im Herbst rötlich-bronze; sehr trockenheits- und hitzeverträglich
				Mittelgroßer, aufrecht pyramidal wachsender Baum; symmetrische Kronenstruktur; sehr trockenheits- und hitzeverträglich; auffallende Herbstfärbung
				Großer Baum mit ausladender, breitrunder Krone; Eignung für innerstädtisches Klima wird oft stark überschätzt
				Wüchsiger, großer Baum mit breitpyramidaler Krone; Blattoberseite dunkelgrün, unterseits braun bis violett gefärbt
				Hoher Baum mit straff aufrechten Hauptästen; eiförmige, kompakte Krone
				In der Jugend raschwüchsig; breite, säulenförmige Krone, im Alter jedoch mehr eiförmig; gute Stammverlängerung
				Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehender Stammverlängerung; breite, pyramidale Krone
				In der Jugend säulenförmig, später mehr breitkegelig; Eigenschaften und Wuchs ähnlich wie Acer pseudoplatanus ‚Erectum‘
				Großer, starkwüchsiger Baum mit durchgehendem Stamm; Krone teilt sich im oberen Bereich in 2-3 aufstrebende Hauptäste
				Mittelgroßer Baum mit sehr variabler Krone; auffallende gelbe bis orangerote Herbstfärbung



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Acer rubrum 'Armstrong'							
Acer rubrum 'October Glory'							
Acer rubrum 'Redpointe'	 						
Acer rubrum 'Red Sunset'							
Acer rubrum 'Scanlon'							
Acer rubrum 'Somerset'							
Acer rufinerve							
Acer saccharinum							
Acer saccharinum 'Pyramidale'							
Acer saccharinum 'Wieri'							
Acer saccharum							
Aesculus carnea							
Aesculus carnea 'Briottii'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt











































Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

					Mittelgroßer Baum mit säulenförmiger Krone und straff aufwärtsgerichteten Ästen; Blatt dunkler und kleiner als bei der Art
					Kleiner Baum mit breit pyramidal wachsender aufgelockerter Krone; intensive Herbstfärbung orange bis rot
					Ovale bis pyramidenförmige dichte Krone; ca.12 m hoch und ca.8 m breit; grünes Laub, roter Stiel, Herbstfärbung brillant leuchtend rot; verträgt Teilüberpflasterung; ein Zukunftsbaum, sehr schädlingsresistent
					Kleiner Baum mit gleichmäßig breit eiförmig wachsender Krone; intensive Herbstfärbung orange bis rot
					Mittelgroßer, kegelförmiger Baum mit regelmäßig beasteter Krone; glänzend grünes Blatt mit leuchtend purpurroter Herbstfärbung
					Kleiner, mittelstark wüchsiger Baum; tief dunkelrote Herbstfärbung; gleichmäßige Aststellung
					Kleiner Baum mit regelmäßiger Krone, schmal aufrecht; auffallend grünsilbrige Rinde mit weißen Längsstreifen; Herbstfärbung orange bis karminrot
					Starkwüchsiger Baum mit lockerer, kegelförmiger Krone; Herbstfärbung leuchtend gelb
					Wie die Art, jedoch mit dichterem Verzweigung; breiter, straff aufrechter Wuchs
					Großer Baum mit sehr lockerer und breiter Krone; Zweigenden sehr weit durchhängend; feingliedriges, tief eingeschnittenes Blatt
					Großer Baum, Krone oval bis rundlich; Herbstfärbung auffallend von gelb bis orangert
					Mittelgroßer Baum mit meist mehreren gleichrangigen Hauptästen; Krone rundlich bis breit gewölbt; hellrote Blüten, wenig und selten fruchtend
					Langsamer als die Art wachsend; Blütenstände größer und blutrot

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrogl	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Aesculus flava</i> 'Vestita'							
<i>Aesculus hippocastanum</i>							
<i>Aesculus hipp.</i> 'Baumannii'							
<i>Aesculus hipp.</i> 'Pyramidalis'							
<i>Ailanthus altissima</i> (derzeit Handelsverbot)							
<i>Alnus cordata</i>							
<i>Alnus glutinosa</i>							
<i>Alnus glutinosa</i> 'Imperialis'							
<i>Alnus incana</i>							
<i>Alnus spaethii</i>							
<i>Amelanchier arborea</i> 'Robin Hill'							
<i>Amelanchier</i> 'Ballerina'							
<i>Amelanchier lamarckii</i>							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

					Mittelgroßer Baum, Krone zunächst breit kegelförmig, später rundlich, hoch gewölbt
					Großer, starkwüchsiger Baum mit wuchtiger, hochgewölbter Krone; auffallend weiße Blütenstände, reich fruchtend
					Wie die Art, jedoch gefüllt mit leicht gelblichem Ton blühend; nicht fruchtend
					Starkwüchsiger als die Art; dichte, kompakte Krone; Blüten in der Krone durch Blätter und Äste verdeckt, dadurch weniger auffällig
					Raschwüchsiger, großer Baum; breite, lockere Krone; ohne durchgehende Stammverlängerung; extreme Trockenheit vertragend; Invasives Gehölz
					Mittelgroßer Baum; spitzkegelig; Stamm bis zur Spitze durchgehend; Laub glänzend grün; nur in der Jugend frostempfindlich
					Raschwüchsiger Baum mit lockerer Krone; Trockenheit und Oberflächenverdichtung schlecht vertragend
					Kleiner eleganter Baum mit lockerer Krone; Blätter kleiner als bei der Art
					Raschwüchsiger Baum mit zuerst spitzkegeliger, im Alter dann ovaler Krone; auch für trockene Standorte geeignet
					Mittelgroßer Baum mit lockerer, pyramidalen Krone und durchgehender Stammverlängerung; Erlenuntypisches, dunkelgrünes, matt glänzendes Laub
					Kleiner Baum mit stabilem Stamm; aufrechter, dichter Wuchs; Mitteltrieb in der Krone
					Kleiner Baum mit abstehenden Ästen und großen, reinweißen Blüten
					Kleiner Baum mit strauchartiger, leicht überhängender Krone

Botanischer Name

## Eignung



Pflanztrog



Hausgarten

Schmale  
StraßeStraßen,  
PlätzeFreiflächen,  
Parksfreie  
LandschaftKronen-  
form*Betula ermannii**Betula jacquemontii*  
Synonym: *Betula utilis**Betula maximowicziana**Betula nigra**Betula papyrifera**Betula pendula**Betula pendula* 'Dalecarlica'*Betula pendula* 'Fastigiata'*Betula pendula* 'Purpurea'*Betula pendula* 'Tristis'*Betula pendula* 'Youngii'*Betula pendula* 'Zwitsers Glorie'*Betula pubescens*

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht

































































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Mittelgroßer Baum mit breiter lockerer Krone; Herbstfärbung früh einsetzend, leuchtend goldgelb
					Lockere, breitkegelförmige Krone; Stammverlängerung oft gedreht; reinweiße Borke
					Raschwüchsiger mittelgroßer Baum, locker bestet mit kegelförmiger bis eiförmiger Krone
					Mittelgroßer, kegelförmiger Baum; breit ausladend; attraktive, kraus abrollende, rotbraune Borke
					Raschwüchsiger hoher Baum mit kegelförmiger Krone und lockerem Aufbau; leuchtend weiße Borke am alten Holz
					Schnell wachsender Baum mit sehr variablem Aufbau; im Alter zunehmend überhängend; flaches Wurzelwerk
					Kleiner schmalkroniger Baum mit durchgehendem Stamm und überhängenden Zweigen; Blätter tief geschlitzt
					Mittelhoher, straff säulenförmiger Baum; ohne durchgehenden Stamm; Äste oft verdreht wachsend
					Kleiner Baum, Krone locker eiförmig; Laub im Austrieb dunkelrot später olivebronze
					Mittelgroßer Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; Seitenäste ansteigend mit stark überhängenden Spitzen
					Kleine, schirmartige Trauerform; Seitenäste senkrecht herabhängend; bildet von Natur aus keinen Stamm
					Schmale, kegelförmige Krone, ca. 13 m hoch; früher Austrieb; schnell wachsend; verträgt Teilbepflasterung und Trockenheit; niedrige Bodenanforderung
					Mittelgroßer Baum; Äste aufsteigend bis waagrecht; Krone oval bis rundlich

Botanischer Name	Eignung						Kronenform	
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft		
<i>Broussonetia papyrifera</i>								
<i>Carpinus betulus</i>								
<i>Carpinus betulus</i> 'Fastigiata'								
<i>Carpinus betulus</i> 'Frans Fontaine'								
<i>Carpinus betulus</i> 'Lucas'								
<i>Carpinus betulus</i> 'Pendula'								
<i>Castanea sativa</i>								
<i>Castanea sativa</i> 'Dore de Lyon'								
<i>Catalpa bignonioides</i>								
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Aurea'								
<i>Catalpa bignonioides</i> 'Nana'								
<i>Celtis australis</i>								
<i>Celtis occidentalis</i>								

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Kleiner Baum; Krone oval bis rund; Triebe dick, steif, rötlich grau
				Langsam wachsender, vielgestaltiger, meist breiter Baum; dicht verzweigt; sehr gut schnittverträglich
				Mittelgroßer Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; bildet dichte, regelmäßige, spitzkegelige Krone
				In der Jugend nicht so geschlossen und straff aufrecht wie Carp. bet. ‚Fastigiata‘; später auch ohne Schnitt kompakte, schlanke, säulenförmige Krone
				Kompakt wachsende Säulenhainbuche mit geringerem Zuwachs, bis ca. 10 m Höhe; bleibt schlanker als ‚Fastigiata‘
				Kann sich bis ca. 5 m hoch aufbauen; fruchtlose Sorte; geringe Bodenansprüche, verträgt trockenen und feuchten Boden, aber keine Bepflasterung
				Großer, breitkroniger Baum; blüht und fruchtet erst nach vielen Jahren; im Jugendstadium frostempfindlich
				Wird bis ca. 10 m hoch; hellgelbe Blütendolden; zählt zu den besten, fruchttragenden Sorten, trägt wesentlich früher als der Sämling, Ernte je nach Wetterlage ab Mitte September
				Mittelgroßer Baum; keine durchgehende Stammverlängerung bildend; Krone erst hoch, später breit gewölbt
				Wuchs schwächer als bei der Art; Blätter im Austrieb goldgelb
				Kleiner Kugelbaum; Krone später abgeflacht; verträgt starken Schnitt; regeneriert sich bei Frostschäden aus altem Holz
				Kleiner bis mittelgroßer Baum mit breit ovaler Krone; meist breit ausladende Krone; sehr trockenheitsverträglich
				Bei uns ca. 15 m hoch, malerische Krone; purpurschwarze, runde Steinfucht; geringe Bodenforderung, verträgt Bepflasterung; Bienennährpflanze



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Cercidiphyllum japonicum</i>							
<i>Cercis canadensis</i>							
<i>Cercis canadensis</i> 'Forest Pansy'							
<i>Cercis siliquastrum</i>							
<i>Cornus mas</i>							
<i>Corylus colurna</i>							
<i>Corylus colurna</i> 'Granat'							
<i>Crataegus crus-galli</i>							
<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet'							
<i>Crataegus laevigata</i> 'Plena'							
<i>Crataegus lavalleyi</i> 'Carrierei'							
<i>Crataegus monogyna</i>							
<i>Crataegus monogyna</i> 'Stricta'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht














































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Kleiner Baum; Krone breite Kegel bildend; Herbstfärbung auffallend rot orange; Blätter duften zur Zeit des Laubfalls aromatisch
					Breitwüchsiger Kleinbaum; deutlich bessere Frosthärte als Cercis siliquastrum
					Breitwüchsiger Kleinbaum; deutlich bessere Frosthärte als Cercis siliquastrum; Laubfarbe purpurrot
					Langsamwüchsiger kleiner Baum mit strauchartiger Krone; erst im Alter ganz frosthart; wird kaum von Krankheiten und Schädlingen befallen
					Kleiner sparriger Baum mit breitbuschiger bis rundlicher Krone
					Mittelgroßer bis großer Baum; gerader Stamm, meist bis zum Wipfel durchgehend; kegel- bis eiförmige Kronenform; Hitze vertragend
					Mittelgroßer Baum; lockerkronig; Blätter im Austrieb intensiv dunkel rotbraun später matt dunkelgrün
					Kleiner Baum mit unregelmäßig aufrechten Ästen; langsam wachsend; sparrige Krone; auffällige Herbstfärbung
					Kleiner Baum mit dichter, strauchartiger Krone; gefüllte, leuchtend karmesinrote Blüten; verträgt starken Schnitt
					Kleiner Baum mit strauchartiger Krone; gefüllte, weiße Blüten
					Kleiner Baum; sparrige, unregelmäßige Krone; Triebe mit starken Dornen; verträgt starken Schnitt
					Kleiner Baum mit knorrigen Hauptästen; Krone breit rundlich
					Kleiner, langsam wachsender Baum; in der Jugend dichte, straff säulenförmige Krone; später etwas breiter werdend

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Crataegus mordenensis</i> 'Toba'							
<i>Elaeagnus angustifolia</i>							
<i>Elaeagnus multiflora</i>							
<i>Fagus sylvatica</i>							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck'							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Dawyck Purple'							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Pendula'							
<i>Fagus sylvatica</i> <i>purpurea</i>							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Latifolia'							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Purpurea Pendula'							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Riversii'							
<i>Fagus sylvatica</i> 'Swat Margret'							
<i>Fraxinus americana</i> 'Autumn Applause'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

				Kleiner Baum mit breiter, runder Krone; groß und tief eingeschnittenes, glänzendes Blatt; weiße, gefüllte Blüten
				Kleiner Baum mit unregelmäßiger breiter Krone; Äste und Zweige überhängend
				Kleiner Baum; Krone dichtbuschig aufrecht wachsend; Früchte essbar
				Großer Baum mit gerader Stammverlängerung bis in die Krone hinein; bei freiem Stand breite, ausladende Krone
				Hoher Säulenbaum; keinen durchgehenden Stamm bildend; Äste oft gedreht; Blätter größer als bei der Art
				Wuchs wie <i>Fagus sylvatica</i> ‚Dawyck‘; Blätter purpurbraun
				Hoher Baum mit wenig Hauptästen und bizarr überhängendem Wuchs; meist kein durchgehender Stamm
				Sämling; etwas schwächer als die Art wachsend; Laub zum Herbst hin und im Schatten vergrünend
				Veredelte Blutbuche mit etwas schwächerem Wuchs als die Art; schwarzrotes Laub
				Bedeutend schwach wachsender als die grünlaubige Hänge-Buche
				Großer breitkroniger Baum; Blätter sehr groß, tief schwarzbraun
				Großer breitkroniger Baum ähnlich ‚Riversii‘; Austrieb jedoch 8-10 Tage früher
				Mittelgroßer Baum mit bis weit in die Krone reichendem Stamm; weinrote Herbstfärbung

## Eignung

Botanischer Name



Pflanztrog



Hausgarten

Schmale  
StraßeStraßen,  
PlätzeFreiflächen,  
Parksfreie  
LandschaftKronen-  
form

Fraxinus americana 'Autumn Purple'



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Fraxinus excelsior



Fraxinus excelsior 'Altena'



Fraxinus excelsior 'Atlas'



Fraxinus excelsior 'Diversifolia'



Fraxinus excelsior 'Geessink'



Fraxinus excelsior 'Nana'



Fraxinus excelsior 'Pendula'



Fraxinus excelsior 'Westhof's Glorie'



Fraxinus ornus

Fraxinus ornus 'Nijmegen'  
Synonym: Fraxinus ornus 'Anita'

Fraxinus ornus 'Louisa Lady'



## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



































































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

				Mittelgroßer Baum bis 12 m hoch und 6 m breit, kegelförmig, später rundlich; Laub färbt sich im Herbst tiefpurpurn mit violetten Flecken; keine Früchte
				Mittelgroßer Baum; junge Krone dicht und schmal kegelförmig, später jedoch breiter und lockerer werdend
				Großer, breit pyramidaler Baum; später Austrieb; empfindlich gegen Oberflächenverdichtung
				Mittelgroßer Baum mit durchgehender Stammverlängerung; mäßig breite, kegelförmige Krone
				Mittelgroßer Baum, schwächer und kompakter wachsend als die Art; schlank kegelförmige Krone; rein männliche Sorte
				Mittelgroßer Baum; lockere, schmale, kegelförmige Krone; im Alter etwas breiter werdend; ein für Eschen untypisches Blatt
				Mittelgroßer, schwächer als die Art wachsender Baum mit sehr dichter, kegelförmiger Krone und guter Stammverlängerung
				Zwergform, meist als Hochstamm veredelt; ca. 1,50 m breite und hohe Kugelkrone
				Hängeform; Stamm von der Veredlungshöhe abhängig; wenige starke Hauptäste; Zweige hängen im weiten Bogen über
				Großer, raschwüchsiger, robuster Baum; Krone breit eiförmig; geschlossener Wuchs und gute Stammverlängerung
				Kleiner Baum mit sehr variabler Kronenform; selten mit gerader Stammverlängerung; im Jugendstadium frostgefährdet
				Kleiner Baum mit aufstrebenden Ästen und schlank pyramidalen Kronenform; dunkelgrünes glänzendes Blatt; reichblühend
				Kleiner Baum; Krone kegelförmig bis rundlich

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Fraxinus ornus 'Mecsek'							
Fraxinus ornus 'Obelisk'							
Fraxinus ornus 'Rotterdam'							
Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam'							
Fraxinus pennsylvanica 'Patmore'							
Fraxinus pennsylvanica 'Summit'							
Ginkgo biloba							
Ginkgo biloba 'Autumn Gold'							
Ginkgo biloba 'Fastigiata Blagon'							
Ginkgo biloba 'Mariken'							
Ginkgo biloba 'Tit'							
Ginkgo biloba 'Troll'							
Ginkgo biloba 'Princeton Sentry'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Kleiner Baum mit kugelige Krone; Blüten angenehm duftend
				Kleiner Baum mit straff, aufrechtem Wuchs, später schmal oval, langsamwüchsig; lange cremeweiße Blütenrispen mit einem angenehmen Duft
				Kleiner Baum; Krone breitkegelförmig; Stammverlängerung gabelt sich meist im Kronenbereich; reichblühend
				Anfang schmale Krone, später breit oval; anspruchslos; im Herbst auffallend orange bis purpurrot
				Stark wachsende Selektion von <i>F. pennsylvanica</i> ; Krone symmetrisch elliptisch; Laub glänzend grün, im Herbst lange haftend
				Stark wachsender Baum mit aufrecht strebender, gleichmäßiger Krone, im Alter breiter werdend; Blätter färben kurz vor dem Laubfall goldgelb
				Hoher Baum; sehr unterschiedliche Kronenform; zweihäusig; sehr widerstandsfähig gegen Immissionen
				Malerische breit pyramidale Krone, ca. 20 m hoch; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte
				Straff aufrecht wachsende Selektion, ca. 15 m hoch, ca. 3-4 m breit (bei Ginkgo ist man sich nie sicher); gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte
				Eine fast kugelige Kronenform mit einem Durchmesser von ca. 2,00-2,50 m; der jährliche Zuwachs liegt bei ca. 10-15 cm; gelbe Laubfärbung im Herbst
				Kompakte, kleine Krone; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte; langsam wachend
				Zwergform auf Hochstamm veredelt, eine kugelähnliche Krone; fruchtlose Sorte; langsam wachend
				Mittelgroßer, schlanker Baum, +/- 20 m hoch, 3-6 m breit, hier gibt es unterschiedliche Größenangaben, was für Ginkgo typisch ist; fruchtlose Sorte; langsam wachsend



Botanischer Name

## Eignung



Pflanztroz



Hausgarten

Schmale  
StraßeStraßen,  
PlätzeFreiflächen,  
Parksfreie  
LandschaftKronen-  
form

Ginkgo biloba 'Tremonia'



Gleditsia triacanthos



Gleditsia triacanthos inermis



Gleditsia triacanthos 'Shademaster'

Gleditsia triacanthos  
'Skyline'

Gleditsia triacanthos 'Sunburst'



Gymnocladus dioicus



Hamamelis intermedia 'Arnold Promise'



Ilex 'Nellie R. Stevens'



Juglans nigra



Juglans regia



Koelreuteria paniculata



Koelreuteria paniculata 'Fastigiata'



## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht


















































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

				Aufrechte, offene Krone, die sehr malerisch sein kann, geschätzte Höhe ca. 12 m; gelbe Herbstfärbung; fruchtlose Sorte
				Großer Baum; im Alter breite, lockere, schirmförmige Krone; lange, starke Dornen auch am Stamm; keinen durchgehenden Stamm bildend
				Wie die Art, jedoch ohne Dornen
				Großer Baum mit breiter Krone; Stamm löst sich im Kronenbereich auf; keine Dornen
				Großer Baum mit pyramidal geschlossener Krone; keine Dornen; glänzend grünes Blatt
				Kleiner bis mittelgroßer Baum; breite, gewölbte Krone; nur wenige, stumpfe Dornen; goldgelber Austrieb, später vergrünend
				Langsamwüchsiger, mittelhoher Baum mit unregelmäßig geformter Krone
				Lockere, trichterförmige Krone; leuchtend gelbe Blüte; auf Hochstamm eher selten
				Kleiner immergrüner Baum; Krone breit kegelförmig bis rundlich; dekorative rote Früchte
				Großer Baum mit breit ovaler Krone; große, bis 50 cm lange, gefiederte Blätter
				Großer Baum mit breit ausladender Krone; Stamm meist nicht durchgehend; Früchte essbar
				Langsamwüchsiger kleiner Baum mit ausladender breiter Krone; dekorativ im Herbst durch Fruchthülsen; hitzeverträglich
				Wuchs schmal säulenförmig, sonst wie die Art

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Laburnum watereri</i> 'Vossii'							
<i>Larix decidua</i>							
<i>Larix kaempferi</i>							
<i>Liquidambar styraciflua</i>							
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Gumball'							
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Palo Alto'							
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Red Star'							
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Slender Silhouette'							
<i>Liquidambar styraciflua</i> 'Worplesdon'							
<i>Liriodendron tulipifera</i>							
<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiata'							
<i>Magnolia kobus</i>							
<i>Magnolia loebneri</i> 'Merrill'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

				Kleiner Baum mit trichterförmiger Krone; Seitenäste leicht überhängend; lange, dichte gelbe Blütentrauben (giftig!)
				Schmal kegelförmig, später lockerer
				Breit kegelförmig, später ungleichmäßig lockerer
				Mittelgroßer bis großer Baum; Kronenform stark variierend, meist aber breitkegelig; Stamm oft bis zum Wipfel durchgehend; imposante Herbstfärbung
				Kugelige Krone; schwachwüchsig; im Herbst färben sich die Blätter leuchtend rot; ein geschützter Standort ist vorteilhaft
				Wuchs wie bei der Art; Blätter färben sich im Herbst alle gleichzeitig orangerot
				Schlank aufrecht wachsend, 10-12 m hoch, +/- 4 m breit; das Laub haftet lange am Baum; im Herbst karmin- bis dunkelrot
				Eine säulenförmige Selektion, ca. 12 m hoch und ca. 1,80 m breit; Herbstfärbung in verschiedenen Variationen von gelborange über purpurrot bis violettbraun
				Wuchs wie bei der Art; bildet keine Korkleisten; Blätter tief eingeschnitten; Herbstfärbung von orange über orangerot bis leuchtend weinrot
				Großer Baum mit breit kegelförmigem Wuchs; durchgehende, gerade Stammverlängerung; Herbstfärbung leuchtend gelb
				Breit säulenförmig wachsende Selektion des Tulpenbaumes
				Kleiner Baum; rundliche bis breit kegelförmige Krone; weiße Blüte vor dem Austrieb
				Kleiner Baum; Seitenäste stark aufwärts strebend, erst später leicht durchhängend; Blüte sternförmig aber größer als bei stellata

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
Magnolia 'Galaxy'							
Magnolia 'Wada's Memory'							
Magnolia loebneri 'Leonard Messel'							
Malus 'Butterball'							
Malus 'Evereste'							
Malus floribunda							
Malus 'Hillieri'							
Malus 'John Downie'							
Malus 'Makamik'							
Malus 'Professor Sprenger'							
Malus 'Red Sentinel'							
Malus 'Royalty'							
Malus 'Royal Raindrops'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt






Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

					Kleiner Baum; zunächst säulenförmige Krone später aufrecht kegelförmig; tulpenförmige Blüten in dunkelrosarot bis hellrosa
					Kleinkroniger Blütenbaum mit kompaktem, aufrechten Wuchs, 7 bis 9 m hoch, +/- 5 m breit; einzelne weiße Blüten vor dem Austrieb, süßlich duftend
					Kleinkroniger Blütenbaum, Höhe ca. 8 m; blüht in weiß mit schwach rosa Streifen; sehr robust
					Kleiner Baum; Krone locker, ausladend, Seitenäste überhängend; gelbe Früchte, die bis in den Winter haften bleiben; hohe Schorfresistenz
					Kleiner Baum; Krone breit pyramidal, Seitenäste im Alter überhängend; Blüte früh, weiß mit rosa Blatträndern; Frucht orangefarben, gestreift
					Kleiner Baum; dichte Krone, abstehende, weit überhängende Äste; rosa aufblühende, später weiße Blüte; gerötete, erbsengroße Frucht
					Kleiner Baum mit überhängender, sparrig verzweigter Krone; halbgefüllte hellrosa Blüte; kleine langstielige, orangegelbe Früchte
					Kräftig wachsend; meist durchgehende Stammverlängerung; breit kegelförmige Krone; weiße Blüte; große, gelbrote Früchte
					Kleiner Baum; im Alter mehr rundliche Krone; purpurrote, später verblassende Blüte mit weißem Stern in der Mitte; hellrote Früchte
					Kleiner, mittelstark wachsender Baum mit kegelförmigem Wuchs und dunkelgrünem Laub; weiße Blüte; langhaftende, orangefarbene Früchte
					Kleiner, schlanker Baum; glänzend grünes Laub; weiße Blüte; große, hellrote Früchte, die erst spät im Winter abfallen
					Kleiner Baum; breitpyramidale Krone; meist durchgehender Stamm; dunkelrotes Laub; karminrote Blüte; kugelige, dunkelrote Früchte
					Breit aufrechte Krone, ca. 8 m hoch, ca. 4 m breit; Laub ab Austrieb schwarzrot; Blüte magentapink; kleine rote Frucht, lange haltend; sehr resistent, hitze- und trockenheitsverträglich

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Malus sylvestris</i>							
<i>Malus</i> 'Street Parade'							
<i>Malus toringo</i> Synonym: ' <i>Malus Sieboldii</i> '							
<i>Malus trilobata</i>							
<i>Malus tschonoskii</i>							
<i>Malus</i> 'Whitney'							
<i>Malus</i> 'Wintergold'							
<i>Mespilus germanica</i>							
<i>Mespilus germanica</i> 'Holländische'							
<i>Metasequoia glyptostroboides</i>							
<i>Morus alba</i>							
<i>Morus nigra</i>							
<i>Nyssa sylvatica</i>							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt























































Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

					Kleiner Baum mit zunächst aufrechten, im Alter weit überhängenden Ästen; Blüte spät, weißlich rosa; Früchte kugelig, grünlich rot
					Kleiner Baum mit schmaler, eiförmige Krone; weiße, teils gefüllte Blüten; Früchte purpurrot
					Kleiner Baum mit weit ausladenden Hauptästen und überhängenden Seitenästen; Blüte mittelfrüh, einfach weiß; Früchte erbsengroß, gelborange
					Pyramidenförmige, dichte Krone, bis 8 m hoch; gelbrote Laubfärbung im Herbst; Blüte weiß; verträgt Bepflasterung; Bienennährgehölz, Nährbaum für Vögel
					Kleiner Baum; straff kegelförmige Krone; junge Zweige weißfilzig; Blüte weiß; Früchte gelbgrün mit roter Backe; orangene Herbstfärbung
					Kleiner Baum; schmale, pyramidale Krone; dickes, gesundes, glänzend grünes Laub; weiße Blüte; gelbe Früchte mit roten Streifen
					Kleiner Baum mit rundlicher Krone; Knospen rosa, dann weiß aufblühend; kugelige, goldgelbe Früchte die sehr lange am Baum haften
					Kleiner, langsam wachsender Baum; Krone unregelmäßig, im Alter oft breiter als hoch; Früchte rundlich braun, nach dem ersten Frost essbar
					Ca. 5 m hoch, langsam wachsender, sparriger Kleinbaum; weiße Blüte ab Ende Mai; die süßen, nussigen Früchte sind ab November verfügbar
					Schnellwüchsiger, großer Nadelbaum mit schmaler, spitzkegelförmiger Krone; sommergrün; verträgt auch noch sehr hohen Grundwasserstand
					Kleiner Baum mit ungleichmäßiger breitkugelig Krone; verträgt gut Trockenheit; etwas frostempfindlich
					Langsamwüchsiger, kurzstämmiger kleiner Baum; strauchartige, kugelige Krone; Früchte essbar
					Mittelgroßer, langsam wachsender Baum mit schmaler, pyramidal abgeflachter Krone; Äste hängend; für feuchte und sonnige Lagen; frosthart



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Ostrya carpinifolia</i>							
<i>Parrotia persica</i>							
<i>Parrotia persica</i> 'Vanessa'							
<i>Paulownia tomentosa</i>							
<i>Phellodendron amurense</i>							
<i>Photinia fraseri</i> 'Red Robin'							
<i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i>							
<i>Pinus sylvestris</i>							
<i>Platanus hispanica</i>							
<i>Platanus hispanica</i> 'Alphens Globe'							
<i>Platanus hispanica</i> 'Pyramidalis'							
<i>Platanus hispanica</i> 'Tremonia'							
<i>Populus alba</i> 'Nivea'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Mittelstarkwüchsiger, kurzstämmiger Baum mit meist strauchartiger Krone; anspruchslos; frosthart
					Ovale Krone, bis 10 m hoch; schöne, lang haftende Herbstfärbung in gelb/rot/lila; Blüte einfach, rot; verträgt keine Bepflasterung
					Mittelgroßer Baum mit breiter, unregelmäßiger Krone; junge Bäume frostgefährdet
					Kleiner Baum mit breitbuschiger, lockerer Krone; immergrün; etwas frostempfindlich; nur für geschützte, milde Lagen
					Großer Nadelbaum mit breit kegelförmiger Krone; gut geeignet für trockene Böden
					Großer Nadelbaum mit locker kegelförmiger Krone; verträgt Bodentrockenheit und Nährstoffarmut
					Großer Baum mit breit pyramidalen Krone; gerade Stammverlängerung bis weit in den Kronenbereich hinein; zierend abblätternde Rinde
					Platane mit kugelförmiger Krone; mittelstark wachsend
					Hoher Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone, im Alter breiter werdend
					Raschwüchsiger Baum mit schmalen kegelförmigen Wuchs
					Großer Baum; breite, unregelmäßige Krone; Blätter unterseits weißfilzig, Herbstfärbung gelblich

## Eignung

Botanischer Name



Pflanztrog



Hausgarten

Schmale  
StraßeStraßen,  
PlätzeFreiflächen,  
Parksfreie  
LandschaftKronen-  
form

Populus berolinensis							
Populus canadensis 'Robusta'							
Populus canescens							
Populus nigra							
Populus nigra 'Italica'							
Populus simonii							
Populus simonii 'Fastigiata'							
Populus tremula							
Populus tremula 'Erecta'							
Populus tremula 'Tapiau'							
Prunus 'Accolade'							
Prunus amygdalus 'Dürkheimer Krachmandel'							
Prunus amygdalus 'Rosea'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

Großer Baum; Krone kegelförmig; Äste aufrecht stehend



Raschwüchsiger, großer Baum mit regelmäßigem, geschlossenem, pyramidalem Kronenaufbau; rein männliche Sorte



Großer, raschwüchsiger Baum mit lockerer, breit ausladender Krone



Hoher Baum mit breiter Krone; Äste stark, weit ausgebreitet



Hoher, schmaler, säulenförmiger Baum; Seitenäste steil aufrecht; rein männliche Sorte



Mittelgroßer Baum mit einer schmal kegelförmigen Krone; Zweige und Triebe birkenähnlich überhängend



Kleiner Baum; schmale, dichte Säulenform; dünne, aufwärts strebende Triebe; Blätter deutlich kleiner als bei der Art



Mittelgroßer Baum, Größe ist standortbedingt; Krone variabel, locker und meist nahezu eiförmig



Mittelhoher Baum mit schmaler Säulenform; Stamm bis in den Wipfel durchgehend; Äste straff aufrecht wachsend



Raschwüchsige Zitterpappel mit gut durchgehendem Mitteltrieb und schmal ovaler Krone



Kleiner Baum mit breitbuschiger, aufrechter Krone; frühe, halbgefüllte, rosa Blüte; gelb orangefarbene Herbstfärbung



Kleiner Baum mit unregelmäßigem breiten Wuchs; Früchte essbar



Kleiner Baum mit unregelmäßigem, breit rundlichem Wuchs; Blüte vor dem Austrieb, rosa



## Eignung

Botanischer Name



Pflanztrog



Hausgarten

Schmale  
StraßeStraßen,  
PlätzeFreiflächen,  
Parksfreie  
LandschaftKronen-  
form

Botanischer Name	Pflanztrog	Hausgarten	Schmale Straße	Straßen, Plätze	Freiflächen, Parks	freie Landschaft	Kronenform
Prunus avium							
Prunus avium 'Plena'							
Prunus avium 'Pendula'							
Prunus cerasifera 'Nigra'							
Prunus fruticosa 'Globosa'							
Prunus hillieri 'Spire'							
Prunus maackii 'Amber Beauty'							
Prunus padus							
Prunus padus 'Albertii'							
Prunus padus 'Coloratus'							
Prunus padus 'Schloss Tiefurt'							
Prunus padus 'Watereri'							
Prunus 'Rancho'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht




















































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

				Mittelgroßer bis großer Baum mit breit eiförmiger Krone; Äste vorwiegend quirlig stehend; einfache weiße Blüte
				Mittelgroßer Baum mit regelmäßiger pyramidaler Krone; Stamm durchgehend; weiße, gefüllte Blüte; keine Fruchtbildung
				Schwachwüchsige Hängeform von <i>Prunus avium</i> ‚Plena‘; Äste erst waagrecht, dann stark überhängend
				Kleiner Baum; dichte, breitkegelförmige Krone; Blätter und Triebe dunkelbraunrot; lilrosa Blüte; schwacher Fruchtansatz
				Kleiner, hochstämmig veredelter Baum; dichte, kurztriebige, rundliche Krone; weiße Blüte; dunkelrote, kleine, kugelige Früchte
				Kleiner Baum mit dichter, trichterförmiger Krone; einfache rosa Blüte; auffallend gelborange Herbstfärbung
				Kleiner Baum mit ovaler, dicht verzweigter Krone; auffallende, gelbbraune, sich abschälende Rinde; cremeweiße Blüten in hängenden Doldentrauben
				Mittelgroßer Baum, oft durchgehender Stamm; breitkegelige Krone; weiße Blüten in Trauben hängend; erbsengroße, schwarze Früchte
				Breit pyramidaler Baum bis 10 m hoch; duftende, weiße Blüten im April; die seltene Frucht ist kugelig, rotschwarz und bitter (nicht giftig); Bienennährpflanze, gut für Schmetterlinge und Falter
				Breit rundlicher Wuchs, bis ca. 8 m hoch; besonders ist der purpurrote Blattaustrieb; die seltene Frucht ist kugelig, schwarz und nicht giftig
				Kleiner Baum mit dichter, geschlossener Krone; kleine, weiße Blüten; wenig fruchtend
				Wie die Art, im Alter etwas überhängend; dekorative, bis 20 cm lange, weiße Blütentrauben
				Kleiner Baum mit straff nach oben gerichteter Krone

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Prunus sargentii</i>							
<i>Prunus</i> 'Schmittii'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Royal Burgundy'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Kiku-shidare-zakura'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Shirofugen'							
<i>Prunus serrulata</i> 'Taihaku'							
<i>Prunus subhirtella</i> 'Autumnalis Rosea'							
<i>Prunus subhirtella</i> 'Fukubana'							
<i>Prunus subhirtella</i> 'Pendula'							
<i>Prunus</i> 'Umineko'							
<i>Prunus virginiana</i> 'Shubert'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt
























































Rinde

Wurzel-  
form

					Kleiner Baum mit breiter Trichterkrone; rosa Blüte; spärlicher purpurschwarzer Fruchtschwarz; orangefarbene Herbstfärbung
					Kleiner, raschwüchsiger Baum mit schmaler Krone; Stamm durchgehend; attraktive Rinde; weißrosa Blüte; schöne Herbstfärbung
					Kleiner Baum mit sehr schmaler, straff säulenförmiger Krone; Stamm selten durchgehend; Blüte hellrosa, leicht gefüllt
					Mittelgroßer Baum mit breiter, trichterförmiger Krone; gefüllte, sehr große dunkelrosa Blüte
					Kleiner Baum mit aufrecht wachsenden Hauptästen; erst trichterförmig, später schirmartig; Laub violett-purpurrot
					Kleinkronige Hängeform; Äste bis zum Boden durchhängend; gefüllte, dunkelrosa Blüten in dichten Büscheln
					Mittelgroßer, kräftiger Baum mit lockerer, weit ausladender Krone; rosa bis weiße Blüte, lang anhaltend und sehr spät
					Mittelgroßer Baum mit breit ausladender, flacher Krone; große, einfache, schneeweiße Blüten; vereinzelt rote Früchte
					Kleiner Baum, flache, trichterförmige Krone; halbgefüllte, kleine, hellrosa Blüten; je nach Witterung Teilblüte schon ab November
					Kleiner Baum mit zierlicher, breit trichterförmiger Krone; halbgefüllte dunkelrosa Blüten, später in hellrosa übergehend; reichblühend
					Trauerform mit dünnen, stark hängenden Trieben; zahlreiche kleine weißlich rosa Blüten
					Mittelstark wüchsiger Baum mit schmal säulenförmiger Krone; mehrere Hauptäste; rein weiße Blüte; Laub mit orange bis scharlachroter Herbstfärbung
					Kleiner Baum mit weißlich rosa Blütentrauben; grüner Austrieb später in rotbraun übergehend



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Prunus yedoensis</i>							
<i>Pterocarya fraxinifolia</i>							
<i>Pterocarya fraxinifolia</i> 'Kyoto Convention'							
<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer'							
<i>Pyrus canescens</i>							
<i>Pyrus caucasica</i>							
<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill'							
<i>Pyrus regelii</i>							
<i>Pyrus salicifolia</i> 'Pendula'							
<i>Quercus bicolor</i>							
<i>Quercus bimundorum</i> 'Crimson Spire'							
<i>Quercus castaneifolia</i>							
<i>Quercus cerris</i>							

NEU



## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



























































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Breit ausladender Baum; früh und einfach blühend; anfangs rosa dann reinweiß; selten Fruchtausatz; Herbstfärbung orange
					Großer, ausladender Baum; meist so breit wie hoch; Austrieb ist frostgefährdet
					Anfangs ovale, später breitere Krone; ca. 15 m hoch; Blüte unscheinbar; die an 30 cm langen Schnüren aufgefädelten Nüsschen nicht; sehr robuster Baum, auch gegenüber Seewind
					Kleiner bis mittelgroßer Baum; Stamm gerade bis zum Wipfel durchgehend; regelmäßige, dichte Kegelform; Laub erst im Winter abfallend
					Mittelgroßer Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm durchgehend; junge Blätter grauweiß behaart; kleine hellgrüne Früchte
					Kleiner bis mittelgroßer Baum mit schmaler, eiförmiger Krone; Stamm durchgehend; glänzendes, dunkelgrünes Laub; weiße Blüte
					Kleiner Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm durchgehend; weiße Blüte; hellgrünes Laub; orangegelbe Herbstfärbung
					Mittelgroße Wildbirne mit durchgehendem Stamm und eiförmiger Krone; sparriger Wuchs
					Langsamwüchsiger kleiner Baum mit schmalen Blättern; malerische Hängeform; auffallendes, silbriggraues Laub
					Mittelgroß-großer Baum, ca. 20 m hoch; rotbraune Triebe, teils auch bläulich bereift; das Laub ist oberhalb glänzend dunkelgrün, unterseits filzig weiß oder grau; Früchte sind Futter der Wildtiere
					Säulenförmig, später schmal oval, bis 15 m hoch; Herbstfärbung rotlila, die Größe der Blätter variiert zwischen 9-18 cm; eiförmige Früchte ca. 2 cm
					Hoch gewölbter Baum bis 35 m hoch; die Borke bleibt lange glatt, später mit leistenartigen Wülsten; interessant das der Castanea ähnliche Laub
					Großer Baum mit stumpfkegeliger Krone; gedeiht auch auf trockenen Böden noch sehr gut

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztroz	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Quercus coccinea</i>							
<i>Quercus dentata</i>							
<i>Quercus frainetto</i>							
<i>Quercus frainetto</i> 'Trump'							
<i>Quercus hispanica</i> 'Ambrozyana'							
<i>Quercus hispanica</i> 'Fulhamensis'							
<i>Quercus hispanica</i> 'Waasland Select'							
<i>Quercus ilex</i>							
<i>Quercus nigra</i>							
<i>Quercus palustris</i>							
<i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf'							
<i>Quercus palustris</i> 'Green Pillar'							
<i>Quercus petraea</i>							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht


























































Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Mittelgroßer Baum; Krone locker, breit kegelförmig; Herbstfärbung scharlachrot	
					Mittelgroßer Baum; rundkronig; Borke dick, tiefrissig, schwarzgrau	
					Großer Baum mit eiförmiger Krone; bei freiem Stand sehr breit werdend	
					Breitrunder Baum bis 25 m hoch; junge Zweige olivgrün; dunkelgrünes tief gelapptes Laub 10-20 cm	
					Bis 9 m hoch; wintergrünes Laub; wenige Früchte; verträgt keine Bepflasterung; ziemlich resistent gegenüber Streusalz	
						Ca. 12 m hoch; wintergrünes Laub; verträgt keine Bepflasterung; ziemlich resistent gegenüber Streusalz
						Bis 10 m hoher Baum; entdeckt in einem Park in Belgien; Laub wintergrün; schmale, zugespitzte, silbrig grüne Blätter; korkähnliche Rinde, Seewind resistent
						Bis 25 m hohe rundliche Krone, anfangs oval, später malerisch rund wachsend; Laub wintergrün; verträgt Streusalz
						Bis 20 m hohe rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; sehr anspruchslos; eigenwilliges Eichenlaub, teilweise bleibt das Laub zwei Jahre am Baum
					Großer Baum mit gleichmäßiger, kegelförmiger Krone; Stamm oft bis in den Wipfel durchgehend	
					Bis 4 m hoher Kugelbaum, mit einer Breite von ca. 150-200 cm; rote Herbstfärbung; 1 cm große, abgeflacht kugelförmige Früchte; verträgt keine Bepflasterung	
					Schmal pyramidale Wuchsform; Laub im Sommer glänzend tiefgrün; spektakuläre Herbstfärbung	
					Großer Baum mit regelmäßiger, eiförmiger Krone; Laub am Baum später austreibend und länger haftend als bei Quercus robur	

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrogl	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Quercus phellos</i>							
<i>Quercus pubescens</i>							
<i>Quercus rhysophylla</i>							
<i>Quercus robur</i>							
<i>Quercus robur</i> x <i>bicolor</i> 'Regal Prince'							
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata'							
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster'							
<i>Quercus rubra</i>							
<i>Robinia</i> 'Pink Cascade' Synonym: <i>Robinia</i> 'Casque Rouge'							
<i>Robinia pseudoacacia</i>							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Bessoniana'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Frisia'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Nyirsegi'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht


















Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

					Bis 20 m hoch mit kegel- oder rundlichem Wuchs; eigenwilliges weidenähnliches Laub; verträgt keine Bepflasterung; nahezu runde Eicheln
					18-20 m hoch, ovale, später rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; bei den Früchten sind meist 4 Eicheln zusammengefasst
					10-12 m hoch werdend; eigenwilliges, wintergrünes Laub, im Austrieb rötlich braun; verträgt keine Bepflasterung; sehr resistent
					Großer Baum mit breitkegeliger Krone; Stamm endet meist im unteren Kronenbereich
					12-15 m hoch und 3-5 m breit werdend; Laub dunkelgrün mit einer silbrigen Blattunterseite, im Herbst goldgelbes Laub; sehr resistent
					Hoher, säulenförmiger Baum; Stamm selten bis zum Wipfel durchgehend; Zweige oft gedreht
					Veredelte Säuleneiche; auch im Alter noch schlanker, kompakter Wuchs
					Großer Baum mit breitkegelförmiger, regelmäßiger Krone; Stamm meist gerade und fast ganz durchgehend
					Mittelgroßer Baum mit lockerer, breit aufrechter Krone; auffallend rosa- bis rotlilafarbene Blüten
					Hoher Baum mit lockerer, unregelmäßig beasteter Krone; raschwüchsig
					Mittelgroßer Baum; im Alter breite, rundliche Krone; sehr dicht verzweigt; Stamm meist durchgehend; wenige und nur kleine Dornen
					Kleiner bis mittelgroßer Baum mit lockerer, eiförmiger Krone; goldgelber Austrieb, der auch zum Herbst hin nur wenig vergrünt
					Großer, raschwüchsiger Baum mit geradschäftigem Stamm bis weit in die Krone

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Pyramidalis'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Sandraudiga'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Semperflorens'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Umbraculifera'							
<i>Robinia pseudoacacia</i> 'Unifoliola' Synonym: <i>Robinia pseudoacacia</i> 'Monophylla'							
<i>Salix alba</i> – als Kopfweide -							
<i>Salix alba</i> 'Belders'							
<i>Salix alba</i> 'Liempde'							
<i>Salix babylonica</i>							
<i>Salix sepulcralis</i> 'Chrysocoma' Synonym: <i>Salix alba</i> 'Tristis'							
<i>Sophora japonica</i>							
<i>Sophora japonica</i> 'Princeton Upright'							
<i>Sophora japonica</i> 'Regent'							

## Besondere Merkmale

## Kurzbeschreibung



Blüte



Frucht



Blatt






















































Rinde

Wurzel-  
form

					Hoher, säulenförmiger Baum; Stamm meist durchgehend; dünne, straff aufrechte Seitenäste
					Mittelgroßer bis großer, starkwüchsiger Baum; offene, kegelförmige Krone; windfest; rosa Blüte
					Mittelgroßer bis hoher Baum; lockere, breit eiförmige Krone; zahlreiche, weiße Blüten ab Juni sowie Nachblüte bis September
					Kleiner Kugelbaum mit sehr dichter, im freien Stand etwas abgeflachter Krone
					Mittelgroßer bis großer, raschwüchsiger Baum mit unregelmäßiger, kegelförmiger Krone; nur wenige kleine Dornen
					Weiß-Weide als Kopfweide vorformiert; Stammhöhe meist um 1,80 m
					Großer Baum mit schmaler, kegelförmiger Krone; Stamm gabelt sich im oberen Bereich; rein männliche Sorte
					Lockerer, schmal kegelförmiger Baum mit aufwärtsgerichteten Ästen; bis zum Wipfel durchgehende, gerade Stammverlängerung
					12-15 m hoch, breit hängend; verträgt keine Bepflasterung; in Europa finden nur weibliche Bäume Verwendung; wächst kleiner und kompakter als Salix alba Tristis
					Große, breitkronige Hängeform; fadenförmige Seitenäste, oft senkrecht bis zum Boden durchhängend
					Mittelgroßer Baum mit breiter, rundlicher Krone; durchgehende Stammverlängerung selten
					Offene eiförmige Krone; 12-15 m hoch; später Austrieb; cremeweiße Blütenrispen; wertvoller Baum für Schmetterlinge, Bienennährgehölz; verträgt bepfflasterte Standorte
					Schnellwüchsiger, mittelgroßer Baum mit breit eiförmiger Krone; Wuchs gleichmäßiger als bei der Art, widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit



Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica'							
<i>Sorbus aria</i> 'Majestica'							
<i>Sorbus arnold.</i> 'Golden Wonder'							
<i>Sorbus aucuparia</i>							
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis'							
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Fastigiata'							
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Pendula'							
<i>Sorbus aucuparia</i> 'Sheerwater Seedling'							
<i>Sorbus commixta</i> 'Embley' Synonym: <i>Sorbus discolor</i> ©							
<i>Sorbus decora</i>							
<i>Sorbus</i> 'Dodong'							
<i>Sorbus domestica</i>							
<i>Sorbus hybrida</i> 'Gibbsii'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt






























































Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Kleiner Baum mit gerade durchgehendem Stamm; spitzkegelige, straff aufwärtsgerichtete Krone; später Laubfall
				Kleiner Baum; Krone in der Jugend kegelförmig, später breit gewölbt; Blattunterseite weißfilzig
				Stark wachsender, mittelgroßer Baum mit großen Blättern und großen, orangefelben Früchten
				Mittelgroßer Baum; Stamm je nach Anlage meist durchgehend; Krone anfangs keilförmig, später rundlicher
				Gleichmäßiger und schlanker Wuchs als die Art; geschlossene, kegelförmige Krone
				Kleiner, langsam wachsender Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; Krone schmal säulenförmig; dichte, geschlossene Verzweigung
				Eine hängende Krone, bis 5 m hoch werdend; weiße Blüte in Schirmrispen; leuchtend rote Früchte, sieht man sehr selten; Vogel-nährgehölz
				Mittelgroßer Baum mit schlanker, kegelförmiger Krone; Stamm bis zum Wipfel durchgehend
				Kleiner bis mittelgroßer Baum mit schlanken, überhängenden Zweigen; dunkelgrünes, behaartes Laub
				Kleiner Baum; Krone kompakt, eiförmig, später breit rundlich, Früchte ab August kräftig rot
				Aufrecht wachsender Baum bis ca. 10 m hoch; Herbstfärbung orange, rot; weiße Blütendolden; nicht giftige Früchte in orangerot; wertvoller Baum für Schmetterlinge; Bienennährgehölz
				Langsam wachsender Baum mit breit ausladender Krone; besonders für trockene Lagen geeignet
				Kleiner Baum mit geschlossener, breiter, ausladender Krone; Äste aufwärtsgerichtet; tiefrote, glänzende Früchte

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Sorbus intermedia</i>							
<i>Sorbus intermedia</i> 'Brouwers'							
<i>Sorbus latifolia</i>							
<i>Sorbus serotina</i>							
<i>Sorbus thuringiaca</i> 'Fastigiata'							
<i>Sorbus torminalis</i>							
<i>Tilia americana</i> 'Nova'							
<i>Tilia americana</i> 'Redmond'							
<i>Tilia cordata</i>							
<i>Tilia cordata</i> 'Cordaley' ©							
<i>Tilia cordata</i> 'Erecta'							
<i>Tilia cordata</i> 'Green Globe'							
<i>Tilia cordata</i> 'Greenspire'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt























































Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Kleiner bis mittelgroßer Baum; Stammverlängerung selten durchgehend; Krone dicht geschlossen; erst kegelig, später breit rundlich
				Wie die Art, jedoch mit kompakter, pyramidalen Krone und mit durchgehender Stammverlängerung
				Breitpyramidale Krone, 12-14 m hoch; blüht in ca. 10 cm langen Trugdolden; rotorangefarbene ungiftige Früchte; anspruchslos; Bienennährpflanze, Nährbaum für Vögel; verträgt Bepflasterung
				Kleiner, geschlossen pyramidal wachsender Baum; glänzend dunkelgrünes Laub; scharlachrote Herbstfärbung
				Kleiner Baum mit kompakter, kegelförmiger, im Alter fast eirunder Krone; Stammverlängerung erst im oberen Kronenbereich endend
				Mittelhoher Baum mit eirunder, meist strauchartiger Krone
				Großer, raschwüchsiger Baum mit meist durchgehender Stammverlängerung; Krone breit kegelförmig
				Kegelförmige Krone; 12-15 m hoch; verträgt Bepflasterung; anspruchsarm; wertvoller Baum für Schmetterlinge, Bienennährgehölz
				Großer Baum; Stammverlängerung sich im Kronenbereich auflösend; Krone rundlich bis eiförmig
				Mittelgroßer Baum mit bis zum Wipfel durchgängigem Stamm; breitkegelförmige Krone
				Mittelgroßer Baum; wesentlich kleiner als die Art bleibend; durchgehende Stammverlängerung; regelmäßige, kegelförmige Krone
				Kleiner, kugelig Baum, wird je nach Veredlungshöhe 4-6-8 m hoch und 2-3 m breit; später breitkugelig; gelbe Herbstfärbung
				Mittelgroßer Baum; meist durchgehende Stammverlängerung; regelmäßige, breitkegelige, dichte Krone

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Tilia cordata</i> 'Rancho'							
<i>Tilia cordata</i> 'Roelvo'							
<i>Tilia euchlora</i>							
<i>Tilia europaea</i>							
<i>Tilia europaea</i> 'Pallida'							
<i>Tilia europaea</i> 'Pallida Jubilee'							
<i>Tilia flavescens</i> 'Glenleven'							
<i>Tilia henryana</i>							
<i>Tilia mongolica</i>							
<i>Tilia platyphyllos</i>							
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Örebro'							
<i>Tilia platyphyllos</i> 'Rubra'							
<i>Tilia tomentosa</i>							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht



Blatt














Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

				Mittelgroßer Baum; Stamm durchgehend; gleichmäßige, schmale, kegelförmige Krone
				Mittelgroße Linde mit guter Stammverlängerung und regelmäßiger, breitkegelförmiger Krone
				Mittelgroßer bis großer Baum; gerade, durchgehende Stammverlängerung; geschlossene, eiförmige Krone mit überhängendem Wuchs
				Großer Baum mit gerade durchgehendem Stamm; breit kegelförmige Krone
				Großer Baum mit gerader, durchgehender Stammverlängerung; breite, pyramidale Krone; sehr gleichmäßig wachsend
				Wie die Art, jedoch schwächer wachsend; frisches, gelblich grünes Laub, das zum Herbst hin etwas vergrünt
				Mittelgroßer, in der Jugend raschwüchsiger Baum; Stamm bis zum Wipfel durchgehend; gleichmäßige, breit kegelförmige Krone
				Bis 15 m Höhe, rundliche Krone; verträgt keine Bepflasterung; wertvoller Baum für Schmetterlinge; Bienennährgehölz
				Kleiner, dicht verzweigter Baum mit kompakter runder Krone; überhängende Äste; auffallend grob gesägtes Blatt
				Großer Baum mit geradem Stamm; breit kegelförmige Krone mit ausladenden Seitenästen
				In der Jugend schmal pyramidal, später breit eiförmige Linde mit mehreren Haupttrieben; langsam wachsend
				Wie die Art; gleichmäßige, breitkegelförmige Krone mit geradem Stamm; im Winter auffallende, korallenrote Triebe
				Großer Baum; Stamm oft im oberen Kronenbereich sich aufgabelnd; geschlossene, breit eiförmige Krone; später Laubfall

Botanischer Name	Eignung						Kronenform
	 Pflanztrog	 Hausgarten	 Schmale Straße	 Straßen, Plätze	 Freiflächen, Parks	 freie Landschaft	
<i>Tilia tomentosa</i> 'Brabant'							
<i>Tilia tomentosa</i> 'Szeleste'							
<i>Ulmus</i> 'Columella'							
<i>Ulmus glabra</i>							
<i>Ulmus glabra</i> 'Pendula'							
<i>Ulmus hollandica</i> 'Clusius'							
<i>Ulmus hollandica</i> 'Dodoens'							
<i>Ulmus hollandica</i> 'Lobel'							
<i>Ulmus hollandica</i> 'Plantijn'							
<i>Ulmus laevis</i>							
<i>Zelkova serrata</i>							
<i>Zelkova serrata</i> 'Green Vase'							
<i>Zelkova serrata</i> 'Musashino'							

## Besondere Merkmale



Blüte



Frucht




















Blatt



Rinde

Wurzel-  
form

## Kurzbeschreibung

					Großer Baum mit meist gerade bis zum Wipfel durchgehender Stammverlängerung; kompakte Krone; auffallenderes Laub als die Art
					Bis 20 m hoher Baum, anfangs schmal eiförmig, später breit werdend; Blattunterseite weißfilzig; gelbe, stark duftende Blüte; wertvoller Baum für Schmetterlinge, Bienennährgehölz
					Schnellwüchsiger mittelgroßer Baum; hoher Widerstand gegenüber der Ulmenkrankheit
					Großer, breit eiförmiger Baum bis 35 m hoch; gelbe Herbstfärbung; dichte braunviolette Blütenbüschel; wertvoller Baum für Schmetterlinge
					5-7 m hoch, schirmartige Krone die 7-10 m breit werden kann; gelbe Herbstfärbung; dichte braunviolette Blütenbüschel; verträgt keine Bepflasterung
					Anfangs schmal, dann breiter wachsend, 12-15 m hoch, 6-8 m breit; widerstandsfähig, auch für Küstengebiete
					Mittelgroßer Baum mit bis weit in die Krone hineinreichender, gerader Stammverlängerung; lockere, breit kegelförmige Krone
					Mittelgroßer Baum mit bis zum Wipfel durchgehendem Stamm; schmale, spitzkegelige Krone
					Mittelgroßer bis großer, raschwüchsiger Baum; Stamm meist im oberen Kronenbereich endend; breite, ovale Krone
					Hoher Baum mit breiter, unregelmäßiger Krone; Äste überhängend
					Mittelgroßer, rundkroniger Baum; weit ausladender Wuchs; Stamm teilt sich in viele Hauptäste; Herbstfärbung von braungelb bis leuchtend rot
					Ein mittelgroßer Baum, 12-15 m hoch, 9-10 m breit; im Herbst gelb/orange/rot; verträgt Bepflasterung
					Schlanke, aufrechte Krone, 10-12 m hoch; im Herbst färbt sich das Laub von hellgelb bis rostrot; ein Baum mit sehr großer Zukunft



## Blütenkalender

## ■ Januar

Erica carnea-Hybriden	
Hamamelis int.-Hybriden	
- japonica-Sorten	
Jasminum nudiflorum	gelb
Viburnum bod. 'Dawn'	hellrosa
- farreri	rosa bis weiß
- tinus	weiß-rosaweiß

## ■ Februar

Daphne mez. 'Rubra Select'	rosarot
Erica carnea-Hybriden	
Hamamelis int.-Hybriden	
- japonica-Sorten	
- mollis	intensiv gelb
Jasminum nudiflorum	gelb
Mahonia bealei	hellgelb
Viburnum bod. 'Dawn'	hellrosa
- farreri	rosa bis weiß
- tinus	weiß-rosaweiß

## ■ März

Acer n. 'Aureo-variegatum'	gelblich weiß
- neg. 'Odessanum'	gelblich weiß
- neg. 'Variegatum'	gelblich weiß
Amelanchier a. 'Robin Hill'	rosaweiß
Cornus mas	gelb
Daphne mezereum	rosa
- mezereum 'Alba'	rahmweiß
- mez. 'Rubra Select'	rosarot
Erica carnea-Hybriden	
Forsythia intermedia-Sorten	in gelben Tönen
Hamamelis int.-Hybriden	
- japonica-Sorten	
- mollis	intensiv gelb
Hippophae rhamnoides	grünlich braun
Jasminum nudiflorum	gelb
Magnolia stellata	weiß
Mahonia bealei	hellgelb
Parrotia persica	rot

Pieris japonica	weiß
- jap. 'Splendens'	weiß
Prunus-Zierkirschen	ab S. 343
Rhododendron	
- Arten / Sorten	ab S. 395
Viburnum bod. 'Dawn'	hellrosa
- farreri	rosa bis weiß
- tinus	weiß bis rosaweiß

## ■ April

Acer jap. 'Aconitifolium'	purpurn
- n. 'Aureo-variegatum'	gelblich weiß
- neg. 'Odessanum'	gelblich weiß
- neg. 'Variegatum'	gelblich weiß
- platanoides	gelbgrün
- platanoides-Sorten	gelb/gelbgrün
Aesculus hippocastanea	weiß
Amelanchier a. 'Robin Hill'	rosaweiß
- 'Ballerina'	reinweiß
- laevis	weiß
- lamarckii	cremeweiß
- ovalis	weiß
Berberis buxifolia 'Nana'	orangegelb
Cercidiphyllum japonicum	rot
Cercis siliquastrum	rosa
Chaenomeles Arten/Sorten	
Clematis alpina	violett bis rötlich
Cornus mas	gelb
Corylopsis pauciflora	hellgelb
Cytisus praecox-Hybriden	
Daphne cneorum	karminrosa
- mezereum	rosa
- mezereum 'Alba'	rahmweiß
Erica carnea-Hybriden	
Forsythia intermedia-Sorten	in gelben Tönen
Halesia carolina	weiß
Hippophae rhamnoides	grünlich braun
Jasminum nudiflorum	gelb
Kerria japonica	dottergelb
Lonicera caerulea	gelblich weiß
Magnolia kobus	weiß
- liliflora 'Nigra'	rubinrot

- liliiflora 'Susan'	rubinrot	Aesculus carnea	hellrot
- loebneri 'Merrill'	weiß	- carnea 'Briotii'	leuchtend blutrot
- soulangiana	weiß mit rosa	- hippocastanum	weiß
- stellata	weiß	- hip. 'Baumannii'	weiß
Mahonia aquifolium	tiefgelb	Akebia quinata	bräunlich violett
- aquifolium 'Apollo'	tiefgelb	Amelanchier 'Ballerina'	reinweiß
- aquif. 'Atropurpurea'	goldgelb	- ovalis	weiß
- bealei	hellgelb	Aronia melanocarpa	weiß
Malus Zierapfel-Sorten	ab S. 297	Berberis buxifolia 'Nana'	orange-gelb
Paulownia tomentosa	violettblau	- candidula	gelb
Pieris floribunda	weiß	- frikartii 'Verrucandii'	gelb
- japonica	weiß	- gagnepainii lanceifolia	gelb
- jap. 'Forest Flame'	weiß	- julianae	gelb
- jap. 'Splendens'	weiß	- media 'Parkjuweel'	gelb
Prunus-Zierkirschen	ab S. 343	- ottawensis 'Superba'	gelbrot
Rhododendron		- stenophylla	gelborange
-Arten und Sorten	ab S. 395	- thunbergii	rötlich gelb
Ribes alpinum 'Schmidt'		- thun. 'Atropurpurea'	rötlich gelb
- divaricatum	gelblich grün	- thun. 'Atropurp. Nana'	rötlich gelb
- sang. 'Atrorubens'	dunkelrot	- thun. 'Green Carpet'	rosa bis rot
- s. 'King Edward VII'	knallrot	- thun. 'Red Chief'	gelb
Sambucus racemosa	gelbgrün	- verruculosa	goldgelb
Skimmia jap. 'Foremanii'	weißrosa	- vulgaris	gelb
Spirea arguta	weiß	Caragana arborescens	gelb
- cinerea 'Grefsheim'	schneeweiß	Clematis alpina	violett bis rötlich
- thunbergii	weiß	- montana 'Rubens'	rosarot
Viburnum bod. 'Dawn'	hellrosa	- montana 'Superba'	weiß
- burkwoodii	rosa bis weiß	- Hybriden	
- carlesii	rosa bis weiß	Cornus alba und Sorten	gelblich weiß
- tinus	weiß bis rosaweiß	- alternifolia	gelbweiß
		- florida	weiß
		- florida rubra	rosa bis rot
		- kousa	weiß
		- kousa chinensis	weiß
		- nuttallii	cremeweiß
		- sanguinea	weiß
		- stol. 'Flaviramea'	gelblich weiß
		- stol. 'Kelsey'	gelblich weiß
		Corylopsis pauciflora	hellgelb
		Cotoneaster acutifolius	rötlich weiß
		- adpressus	rosa
		- bullatus	rötlich weiß
		- horizontalis	rötlich weiß
		- micr. 'Cochleatus'	weiß
		- micr. 'Streib's Findling'	rötlich weiß

## ■ Mai

Acer capillipes	gelblich
- ginnala	gelblich weiß
- jap. 'Aconitifolium'	purpurn
- negl. 'Annæ'	gelbgrün
- palmatum	purpurfarben
- pensylvanicum	gelb
- pseudoplatanus	gelblich grün
- pseudoplat.-Sorten	gelb/gelblich grün
- rufinerve	rostrot
Actinidia arguta	weiß
- kolomikta	weiß

- multiflorus	weiß	Kolkwitzia amabilis	rosaweiß
- praecox	rosa	Laburnum anagyroides	gelb
- watereri 'Pendulus'	weiß	- watereri 'Vossii'	tiefgelb
Crataegus coccinea	weiß bis rosa	Leucothoe walteri	weiß
- crus galli	weiß	Liriodendron tulipifera	gelborange
- grignonensis	weiß	Lonicera brow. 'Fuchsioides'	dunkelorange
- laev. 'Paul's Scarlet'	rot	- caerulea	gelblich weiß
- laev. 'Plena'	weiß	- caprifolium	gelblich weiß
- lavallei 'Carrierei'	weiß bis rosa	- ledebourii	rötlich gelb
- monogyna	weiß	- maackii	gelblich weiß
- monogyna 'Compacta'	weiß	- morrowii	gelblich weiß
- monogyna 'Stricta'	weiß	- nitida 'Elegant'	cremeweiß
- mordenensis 'Toba'	weiß, später rosa	- pileata	cremeweiß
- prunifolia	weiß	- tatarica	weiß bis rot
Cytisus beanii	tiefgelb	- tellmaniana	gelborange
- decumbens	goldgelb	- xylosteum	gelblich weiß
- praecox-Hybriden		- xyl. 'Clavey's Dwarf'	gelblich weiß
- purpureus	purpurrosa	Magnolia kobus	weiß
- scoparius-Hybriden		- liliiflora 'Nigra'	rubinrot, innen weiß
Daphne burk. 'Somerset'	rosa, dann weiß	- liliiflora 'Susan'	rubinrot, innen weiß
- cneorum	karminrosa	- loebneri 'Merrill'	weiß
Davidia inv. vilmoriniana	cremeweiß	- soulangiana	weiß mit rosa
Dacaisnea fargesii	grüngelb	Mahonia aquifolium	tiefgelb
Deutzia gracilis	weiß	- aquifolium 'Apollo'	tiefgelb
Elaeagnus angustifolia	gelblich	Mahonia aq. 'Atropurpurea'	goldgelb
- commutata	silbrig	Malus Zierapfel-Sorten	ab S. 297
- multiflora	hellgelb	Mespilus germanica	weiß
Enkianthus campanulatus	hellgelb	Morus alba	gelblich grün
Erica carnea-Hybriden		- nigra	gelblich grün
Euonymus alatus	gräulich gelb	Paeonia suff.-Hybriden	siehe S. 321
- europaeus	gelblich grün	Paulownia tomentosa	violettblau
- fortunei 'Vegetus'	grüngelb	Pernettya mucronata	weiß bis rosa
- planipes	gräulich gelb	Philadelphus-Sorten	siehe S. 326
Exochorda mac. 'The Bride'	reinweiß	Photinia fraseri 'Red Robin'	weiß
- racemosa	weiß	- villosa	weiß
Fothergilla monticola	rahmweiß	Pieris floribunda	weiß
Fraxinus ornus	cremeweiß	- japonica	weiß
Genista lydia	goldgelb	- jap. 'Forest Flame'	weiß
- radiata	gelb	Potentilla fruticosa	gelb
Halesia carolina	weiß	Potentilla-Sorten	siehe S. 341
- monticola	weiß	Prunus-Zierkirschen	ab S. 343
Kalmia latifolia	zartrosa	- lauroc. 'Rotundifolia'	weiß
- latifolia 'Ostbo Red'	rosa und rot	- lauroc. 'Herbergii'	weiß
Kerria japonica	dottergelb	- lauroc. 'Otto Luyken'	weiß
- japonica 'Pleniflora'	dottergelb	- l. 'Schip. Macrophylla'	weiß



Berberis frik. 'Verrucandii	gelb	- watereri	weiß
- gagnep. lanceifolia	gelb	- watereri 'Cornubia'	weiß
- julianae	gelb	- watereri 'Pendulus'	weiß
- media 'Parkjuweel'	gelb	Crataegus crus-galli	weiß
- ottawensis 'Superba'	gelbrot	- grignonensis	weiß
- verruculosa	goldgelb	- laev. 'Paul's Scarlet'	rot
Buddleja alternifolia	purpurliila	- laev. 'Plena'	weiß
Calycanthus floridus	dunkelrot	- monogyna	weiß
Campsis radicans	orangerot	- monogyna 'Compacta'	weiß
- tag. 'Mme. Galen'	orangerot	- monogyna 'Stricta'	weiß
Castanea sativa	grünlich	- mordenensis 'Toba'	weiß, später rosa
Catalpa bignonioides	weiß	- prunifolia	weiß
Celastrus orbiculatus	grüngelb	Cytisus decumbens	goldgelb
Chionanthus virginicus	weiß	- kewensis	gelblich weiß
Clematis alpina	violett bis rötlich	- purpureus	purpurrosa
- montana 'Rubens'	rosarot	- scoparius-Hybriden	
- montana 'Superba'	weiß	Daboecia cantab.-Hybriden	
- tangutica	gelb	- scotica-Hybriden	
- Hybriden		Daphne burk. 'Somerset'	rosa, dann weiß
Colutea arborescens	gelb	- cneorum	karminrosa
Cornus alba-Sorten	gelblich weiß	Davidia inv. vilmoriniana	cremeweiß
- alternifolia	gelbweiß	Dacaisnea fargesii	grüngelb
- canadensis	weiß	Deutzia gracilis	weiß
- controversa	weiß	- hybrida 'Mont Rose'	rosa
- florida	weiß	- kalmiiiflora	weißlich rosa bis rötlich
- florida rubra	rosa bis rot	- magnifica	reinweiß
- kousa	weiß	- rosea	rosa, innen weiß
- kousa chinensis	weiß	- scabra 'Plena'	weißlich rosa
- sanguinea	weiß	Elaeagnus angustifolia	gelblich
- stol. 'Flaviramea'	gelblich weiß	- commutata	silbrig
- stol. 'Kelsey'	gelblich weiß	Erica cinerea-Hybriden	
Cotinus coggygria	gelblich grün	- tetralix-Hybriden	
- cog. 'Royal Purple'	gelblich rot	Euonymus alatus	gräulich gelb
Cotoneaster acutifolius	rötlich weiß	- europaeus	gelblich grün
- adpressus	rosa	- fortunei-Sorten	gräulich weiß
- bullatus	rötlich weiß	- fortunei 'Vegetus'	grüngelb
- dielsianus	rosa bis weiß	- planipes	gräulich gelb
Cotoneaster divaricatus	rötlich weiß	Genista lydia	goldgelb
- franchettii	rötlich weiß	- radiata	gelb
- horizontalis	rötlich weiß	Genista sagittalis	dottergelb
- micr. 'Cochleatus'	weiß	- tinctoria	goldgelb
- micr. 'Streib's Findling'	rötlich weiß	Gleditsia triacanthos	gelbgrün
- multiflorus	weiß	Hydrangea arb. 'Annabelle'	rahmweiß
- praecox	rosa	- macrophylla-Hybriden	
- sal. floccosus	weiß	- petiolaris	weiß

- serrata-Hybriden	
<i>Hypericum calycinum</i>	gelb
<i>Kalmia angustifolia</i> 'Rubra'	intensiv rosa
- latifolia	zartrosa
<i>Kerria japonica</i> 'Pleniflora'	dottergelb
<i>Kolkwitzia amabilis</i>	rosaweiß
<i>Laburnum anagyroides</i>	gelb
- watereri 'Vossii'	tiefgelb
<i>Leucothoe walteri</i>	weiß
<i>Liriodendron tulipifera</i>	gelborange
<i>Lonicera</i> b. 'Dropm. Scarlet'	orangerot
- brownii 'Fuchsioides'	dunkelorange
- caprifolium	gelblich weiß
- heckrottii	rot und gelb
- heckrottii 'Goldflame'	orangerot
- henryi	gelb bis rot
- japonica repens	cremegelb
- ledebourii	rötlich gelb
- maackii	gelblich weiß
- morrowii	gelblich weiß
- tatarica	weiß bis rot
- tellmaniana	gelborange
- xylostium	gelblich weiß
- xyl. 'Clavey's Dwarf'	gelblich weiß
<i>Lycium barbarum</i>	purpur
<i>Magnolia sieboldii</i>	cremeweiß
<i>Malus</i> Zierapfel-Sorten	ab S. 297
<i>Mespilus germanica</i>	weiß
<i>Morus alba</i>	gelblich grün
- nigra	gelblich grün
<i>Pernettya mucronata</i>	weiß bis rosa
<i>Philadelphus</i> -Sorten	siehe S. 326
<i>Photinia fraseri</i> 'Red Robin'	weiß
- villosa	weiß
<i>Physocarpus opulifolius</i>	hellrosa
<i>Potentilla fruticosa</i>	gelb
<i>Potentilla</i> -Sorten	siehe S. 341
<i>Rhamnus catharticus</i>	gelblich grün
- frangula	grünlich weiß
<i>Rhododendron</i>	
- Arten / Sorten	ab S. 395
<i>Rhus typhina</i>	grünlich
<i>Rhus typhina</i> 'Dissecta'	grünlich
<i>Robinia</i> 'Casque Rouge'	violettrosa bis rosarot
- hispida 'Macrophylla'	lilarosa

- pseudoacacia	weiß
- pseudoacacia 'Frisia'	weiß
- pseudoac. 'Nyirsegi'	weiß
- pseud. 'Monophylla'	weiß
- ps. 'Sandraudiga'	zartrosa
- ps. 'Semperflorens'	weiß

## ■ Juni (Fortsetzung)

<i>Rosa</i> Wild-/Edelrosen	ab S. 423
<i>Rubus fruticosus</i>	weiß bis rosa
- henryi	hellrot
- idaeus	weiß
- odoratus	purpur
<i>Sambucus nigra</i>	cremeweiß
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	cremeweiß
<i>Sorbus americana</i>	weiß
- aria	weiß
- aria 'Lutescens'	weiß
- aria 'Magnifica'	weiß
- aria 'Majestica'	weiß
- arn. 'Brilliant Yellow'	weiß
- arn. 'Golden Wonder'	weiß
- aucuparia	weiß
- aucuparia 'Edulis'	weiß
- aucuparia 'Fastigiata'	weiß
- auc. 'Rossica Major'	weiß
- auc. 'Sheerw. Seedling'	weiß
- decora	weiß
- discolor	weiß
- domestica	weiß
- intermedia	weiß
- intermedia 'Brouwers'	weiß
- serotina	weiß
- thuringiaca 'Fastigiata'	weiß
- th. 'Leonh. Sprenger'	weiß
- torminalis	weiß
- vilmorinii	weiß
<i>Spiraea betulifolia</i>	weiß
- billardii 'Triumphans'	kräftig rosa
- bumalda 'Dart's Red'	tiefrot
- decumbens	weiß
- jap. 'Little Princess'	reinrosa
- nipponica	weiß
- nip. 'Snowmound'	weiß

- vanhouttei	weiß	Aristolochia macrophylla	purpurbraun
Stephanandra incisa 'Crispa'	weiß	Buddleja davidii-Sorten	
Stranvaesia davidiana	weiß	Callicarpa bod. 'Profusion'	lilarosa
Symphoricarpos al. laevigatus	rosaweiß	Calycanthus floridus	dunkelrot
- a. l. 'White Hedge'	weiß	Campsis radicans	orangerot
- chenaultii	rosa	- tag. 'Mme. Galen'	orangerot
- door. 'Magic Berry'	rosa	Caryopteris c. 'A. Simmonds'	hellblau
- orbiculatus	gelblich weiß	Castanea sativa	grünlich
Syringa josikaea	helllila	Catalpa bignonioides	weiß
- meyeri 'Palibin'	hellrosa	Ceanothus d. 'Gloire de Ver.'	violett bis hellblau
- microphylla 'Superba'	lilarosa	- pal. 'Marie Simon'	lachsrosa
- reflexa	rosa	Clematis tangutica	gelb
- vulgaris	violett	- vitalba	gelblich weiß
- vulgaris-Veredlungen	siehe S. 471	- Hybriden	
Tamarix parviflora	rosa	Clethra alnifolia	gelblich weiß
Tilia euchlora	gelb	Colutea arborescens	gelb
- europaea	gelb	Cotinus coggygria	gelblich grün
- europaea 'Pallida'	gelb	- cog. 'Royal Purple'	gelblich rot
- mongolica	gelb	Cotoneaster adpressus	rosa
- platyphyllos	gelb	- dielsianus	rosa bis weiß
Vaccinium vitis-id. 'Koralle'	weiß bis rosa	- divaricatus	rötlich weiß
Viburnum davidii	weißlich rosa	- franchettii	rötlich weiß
- lantana	cremeweiß	- sal. floccosus	weiß
- opulus	cremeweiß	- watereri	weiß
- opulus 'Roseum'	weiß, später rosa	- watereri 'Cornubia'	weiß
- plicatum	weiß	Cytisus kewensis	gelblich weiß
- plicatum 'Mariesii'	rahmweiß	Daboecia cantab.-Hybriden	
- plicatum tomentosum	weiß	- scotica-Hybriden	
- 'Pragense'	weiß	Deutzia hybrida 'Mont Rose'	rosa
- rhytidophyllum	cremeweiß	- rosea	rosa, innen weiß
Vinca major	blau	- scabra 'Plena'	weißlich rosa
Weigela florida	rosaweiß	Elaeagnus commutata	silbrig
- florida 'Purpurea'	dunkelrosa	Erica cinerea-Hybriden	
- 'Bristol Ruby'	karminrot	- tetralix-Hybriden	
- 'Eva Ratke'	karminrot	Genista sagittalis	dottergelb
- 'Newport Red'	tiefrot	- tinctoria	goldgelb
- 'Styriaca'	karminrosa	- tinctoria 'Plena'	goldgelb
Wisteria floribunda	violett	Gleditsia triacanthos	gelbgrün
- sinensis	violettblau	Hibiscus syriacus-Hybriden	
		Holodiscus discolor ariifolius	gelblich weiß
		Humulus lupulus	grün
		Hydrangea arb. 'Annabelle'	rahmweiß
		- arbor. 'Grandiflora'	cremeweiß
		- aspera	rosaviolett
		- aspera 'Macrophylla'	rosaviolett

## ■ Juli

Aesculus parviflora	weiß
Ailanthus altissima	grünlich
Amorpha fruticosa	violettblau





- tinctoria 'Plena'	goldgelb	Rubus fruticosus	weiß bis rosa
Gleditsia triacanthos	gelbgrün	- idaeus	weiß
Hibiscus syriacus-Hybriden		- odoratus	purpur
Holodiscus discolor ariifolius	gelblich weiß	- tricolor	weiß
Humulus lupulus	grün	Sophora japonica	cremeweiß
Hydrangea arb. 'Annabelle'	rahmweiß	Sorbaria sorbifolia	cremeweiß
- arbor. 'Grandiflora'	cremeweiß	Spiraea bill. 'Triumphans'	kräftig rosa
- aspera	rosaviolett	- b. 'Anthony Waterer'	rubinrot
- aspera 'Macrophylla'	rosaviolett	- bumalda 'Dart's Red'	tiefrot
- macrophylla-Hybriden		- bumalda 'Froebelii'	malvenfarben
- pan. 'Grandiflora'	cremeweiß	- japonica 'Albiflora'	weiß
- paniculata 'Kyushu'	cremeweiß	- jap. 'Little Princess'	reinrosa
- petiolaris	weiß	- japonica 'Shirobana'	weiß mit rosa
- quercifolia	weiß	Stephanandra incisa	gräulich weiß
- sargentiana	weiß und helllila	- incisa 'Crispa'	weiß
- serrata-Hybriden		Symphoricarpos a. laevig.	rosaweiß
Hypericum calycinum	gelb	- a. l. 'White Hedge'	weiß
- 'Hidcote'	gelb	- chenaultii	rosa
Hypericum patulum henryi	gelb	- door. 'Magic Berry'	rosa
Kalmia angustifolia 'Rubra'	intensiv rosa	- orbiculatus	gelblich weiß
Koelreuteria paniculata	gelb	Tamarix pentandra	rosa
Lonicera b. 'Dropm. Scarlet'	orangerot	- ramosissima	hellrosa
- brownii 'Fuchsoides'	dunkelorangerot	Tilia americana 'Nova'	gelblich
- heckrottii	rot und gelb	- cordata	gelblich weiß
- heckrottii 'Goldflame'	orangerot	- euchlora	gelb
- henryi	gelb bis rot	- europaea 'Pallida'	gelb
- japonica repens	cremegelb	- flavescens 'Glenleven'	gelblich weiß
- tellmaniana	gelborange	- mongolica	gelb
Lycium barbarum	purpur	- platyphyllos	gelb
Magnolia sieboldii	cremeweiß	- tomentosa	gelbgrün
Pernettya mucronata	weiß bis rosa	Vinca major	blau
Perovskia abrotanoides	violettblau	Weigela florida 'Purpurea'	dunkelrosa
Philadelphus-Sorten	siehe S. 326	- 'Bristol Ruby'	karminrot
Photinia villosa	weiß	- 'Eva Ratke'	karminrot
Polygonum aubertii	weiß	- 'Newport Red'	tiefrot
Potentilla fruticosa	gelb		
Potentilla-Sorten	siehe S. 341		
Rhododendron			
- Arten / Sorten	ab S. 395		
Rhus typhina	grünlich		
- typhina 'Dissecta'	grünlich		
Robinia hisp. 'Macrophylla'	lilarosa		
- ps. 'Sandraudiga'	zartrosa		
Rosa Wild-/Edelrosen	ab S. 423		

## ■ August

Aesculus parviflora	weiß
Amorpha fruticosa	violettblau
Aralia elata	elfenbeinweiß
Aristolochia macrophylla	purpurbraun
Buddleja davidii-Sorten	
Calluna vulgaris-Sorten	
Campsis radicans	orangerot

- tag. 'Mme. Galen'	orangerot	Potentilla fruticosa	gelb
Caryopteris c. 'A. Simmonds'	hellblau	Potentilla-Sorten	siehe S. 341
- cl. 'Heavenly Blue'	dunkelblau	Rosa Wild-/Edelrosen	ab S. 423
Ceanothus d. 'Gloire de Ver.'	violett bis hellblau	Rubus odoratus	purpur
- pal. 'Marie Simon'	lachsrosa	- tricolor	weiß
Clematis paniculata	weiß	Sophora japonica	cremeweiß
- tangutica	gelb	Spiraea b. 'Anthony Waterer'	rubinrot
- vitalba	gelblich weiß	- bumalda 'Dart's Red'	tiefrot
- viticella	rotviolett	- bumalda 'Froebelii'	malvenfarben
- Hybriden		- japonica 'Albiflora'	weiß
Clethra alnifolia	gelblich weiß	- japonica 'Shirobana'	weiß mit rosa
Colutea arborescens	gelb	Symphoricarpos a. laev.	rosaweiß
Daboecia cantabrica-Hybriden		- a. l. 'White Hedge'	weiß
- scotica-Hybriden		- chenaultii	rosa
Erica cinerea-Hybriden		Tamarix pentandra	rosa
- tetralix-Hybriden		- ramosissima	hellrosa
- vagans-Hybriden		Vinca major	blau
Genista tinctoria	goldgelb		
- tinctoria 'Plena'	goldgelb		
Hibiscus syriacus-Hybriden		<b>■ September</b>	
Holodiscus discolor ariifolius	gelblich weiß	Buddleja davidii-Sorten	
Humulus lupulus	grün	Calluna vulgaris-Sorten	
Hydrangea arb. 'Annabelle'	rahmweiß	Campsis radicans	orangerot
- aspera	rosaviolett	- tag. 'Mme. Galen'	orangerot
- aspera 'Macrophylla'	rosaviolett	Caryopteris c. 'A. Simmonds'	hellblau
- macrophylla-Hybriden		- cl. 'Heavenly Blue'	dunkelblau
Hydrangea p. 'Grandiflora'	cremeweiß	- cl. 'Kew Blue'	dunkelblau
- paniculata 'Kyushu'	cremeweiß	Ceanothus d. 'Gloire de Ver.'	violett bis hellblau
- paniculata 'Unique'	rahmweiß	- pal. 'Marie Simon'	lachsrosa
- quercifolia	weiß	Clematis paniculata	weiß
- sargentiana	weiß und helllila	- tangutica	gelb
- serrata-Hybriden		- vitalba	gelblich weiß
Hypericum calycinum	gelb	- viticella	rotviolett
- 'Hidcote'	gelb	- Hybriden	
- patulum henryi	gelb	Clethra alnifolia	gelblich weiß
Ilex verticillata	weiß	Colutea arborescens	gelb
Koeleruteria paniculata	gelb	Daboecia cantab.-Hybriden	
Lespedeza thunbergii	purpurrosa	- scotica-Hybriden	
Lonicera b. 'Dropm. Scarlet'	orangerot	Erica cinerea-Hybriden	
- brownii 'Fuchsoides'	dunkelorange	- tetralix-Hybriden	
- heckrottii	rot und gelb	- vagans-Hybriden	
- heckrottii 'Goldflame'	orangerot	Hibiscus syriacus-Hybriden	
Lycium barbarum	purpur	Hydrangea arb. 'Annabelle'	rahmweiß
Perovskia abrotanoides	violettblau	- macrophylla-Hybriden	
Polygonum aubertii	weiß	- paniculata 'Kyushu'	cremeweiß

- paniculata 'Unique' rahmweiß
- sargentiana weiß und helllila
- serrata-Hybriden

## ■ September (Fortsetzung)

- Hypericum calycinum gelb
- 'Hidcote' gelb
- patulum henryi gelb
- Lespedeza thunbergii purpurrosa
- Lonicera b. 'Dropm. Scarlet' orangert
- heckrottii rot und gelb
- heckrottii 'Goldflame' orangert
- Lycium barbarum purpur
- Perovskia abrotanoides violettblau
- Polygonum aubertii weiß
- Potentilla fruticosa gelb
- Potentilla-Sorten siehe S. 341
- Rosa Wild-/Edelrosen ab S. 423
- Spiraea b. 'Anthony Waterer' rubinrot
- bumalda 'Dart's Red' tiefrot
- bumalda 'Froebelii' malvenfarben
- Symphoricarpos a. laev. rosaweiß
- a. l. 'White Hedge' weiß
- Tamarix pentandra rosa
- ramosissima hellrosa
- Vinca major blau
- minor blau

## ■ Oktober

- Buddleja davidii-Sorten
- Calluna vulgaris-Sorten
- Caryopteris c. 'Heav. Blue' dunkelblau
- cl. 'Kew Blue' dunkelblau
- Ceanothus d. 'Gloire de Ver.' violett bis hellblau
- pal. 'Marie Simon' lachsrosa
- Clematis paniculata weiß
- tangutica gelb
- viticella rotviolett
- Hybriden
- Daboecia cantab.-Hybriden
- scotica-Hybriden
- Elaeagnus ebbingei weiß
- pungens 'Maculata' silbrigweiß

- Erica cinerea-Hybriden
- vagans-Hybriden
- Hamamelis virginiana hellgelb
- Hypericum calycinum gelb
- 'Hidcote' gelb
- Lespedeza thunbergii purpurrosa
- Perovskia abrotanoides violettblau
- Potentilla fruticosa gelb
- Potentilla-Sorten siehe S. 341
- Rosa Wild-/Edelrosen ab S. 423

## ■ November

- Calluna vulgaris-Sorten
- Clematis viticella rotviolett
- Elaeagnus ebbingei weiß
- pungens 'Maculata' silbrig weiß
- Hamamelis virginiana hellgelb
- Hypericum 'Hidcote' gelb
- Viburnum bod. 'Dawn' hellrosa
- farreri rosa bis weiß
- tinus weiß bis rosaweiß

## ■ Dezember

- Erica carnea-Hybriden
- Hamamelis intermedia-Hybriden
- virginiana hellgelb
- Jasminum nudiflorum gelb
- Viburnum bod. 'Dawn' hellrosa
- farreri rosa bis weiß
- tinus weiß bis rosaweiß

# Vogelschutz und Vogelspeise

mit auffallendem Fruchtschmuck

Pflanze	Fruchtfarbe ab/bis	Fruchtreife
<b>Bäume/Großsträucher</b>		
<i>Alnus glutinosa</i>	schwarz	Winter
- <i>incana</i>	grün-graubraun	Winter
<i>Cornus mas</i>	dunkelrot	Aug.
<i>Corylus avellana</i>	braun	Sep.-Okt.
<i>Cotoneaster sal. flocc.</i>	orangerot	Aug.-Feb.
<i>Crataegus coccinea</i>	scharlachrot	Aug.-Winter
- <i>crus galli</i>	scharlachrot	ab Sep.
- <i>lav. 'Carrierei'</i>	orangerot	Aug.-Dez.
- <i>monogyna</i>	dunkelrot	Aug.-Okt.
- <i>prunifolia</i>	scharlachrot	Sep.
<i>Fagus sylvatica</i>	braun	ab Sep.
<i>Malus</i> (Zier-Äpfel)	versch. Farben	Sep-Dez.
<i>Prunus avium</i>	rot	Juli
- <i>mahaleb</i>	schwarzrot	Aug.-Sep.
- <i>padus</i>	rotschwarz	Aug.
- <i>serotina</i>	dunkelpurpurn	Aug.
<i>Quercus petraea</i>	braun	Herbst
- <i>robur</i>	braun	Herbst
<i>Sambucus nigra</i>	schwarz	Aug.
<i>Sorbus aucuparia</i>	rot	Aug.-Okt.
<i>Viburnum lantana</i>	schwarz	Aug.-Sep.
<b>Nadelgehölze</b>		
<i>Juniperis med. 'Hetzii'</i>	blaugrün	Herbst-Winter
- <i>virg. 'Canaertii'</i>	blau	Sep.
<i>Picea orientalis</i>	violettbraun	Sommer bis folgendes Frühjahr
- <i>pungens glauca</i>	hellbraun	Herbst-Winter
<i>Pinus contorta</i>	hellbraun	Sommer
<i>Taxus baccata</i>	rot	Sep.-Winter
<i>Thuja occidentalis</i>	hellbraun	Herbst-Winter
<i>Tsuga canadensis</i>	hellbraun	Herbst-Winter
<b>Sträucher</b>		
<i>Berberis julianae</i>	blauschwarz	ab Sep.
- <i>ottaw. 'Superba'</i>	rot	Sep.-Winter
<i>Chaenomeles japonica</i>	gelb	Aug.-Frost
- <i>speciosa</i>	gelbgrün	Aug.-Frost
<i>Colutea arborescens</i>	graubraun	Aug.-Winter
<i>Cotoneaster acutifolius</i>	schwarz	ab Sep.
- <i>dielsianus</i>	rot	Aug.-Winter
<i>Cotoneaster divaricatus</i>	rot	Aug.-Okt.
- <i>franchetii</i>	orangerot	Aug.-Winter
- <i>multiflorus</i>	rot	Aug.-Nov.

Pflanze	Fruchtfarbe ab/bis	Fruchtreife
Elaeagnus commutata	silbrig	ab Aug.
- multiflora	dunkelbraun	Jul.-Aug.
Euonymus europaeus	rosarot	Aug.-Okt.
Hippophae rhamnoides	orange	Sep.-Okt.
Ilex aquifolium	knallrot	Sep.-Winter
Ligustrum obt. regel.	schwarz	ab Sep.
- vulgare	schwarz	ab Sep.
- vulgare 'Atrovirens'	schwarz	ab Sep.
Lonicera maackii	leuchtend rot	ab Aug.
- tatarica	hellrot	Aug.-Sep.
- xylosteum	rot	Aug.-Sep.
Lycium barbarum	scharlachrot	ab Aug.
Photinia villosa	rot	Okt.-Winter
Pyracantha coccinea	gelb/orange/rot	Sep.-Winter
Rhamnus catharticus	rotschwarz	ab Sep.
- frangula	rotschwarz	ab Sep.
Ribes divaricatum	schwarzrot	ab Aug.
Rosa canina	rot	Jul.-Winter
- carolina	rot	ab Sep.
- glauca	rot	ab Aug.-Sep.
- multiflora	rot	Aug.-Winter
- pimpinellifolia	schwarz	ab Sep.
- rubiginosa	orangerot	Sep.-Winter
- rugosa	scharlachrot	Aug.-Frost
Rubus fruticosus	schwarz	Sep.
- henryi	schwarz	Sep.
- idaeus	rot	Aug.-Sep.
Sambucus racemosa	rot	Juli-Winter
Symphoricarpos		
- albus laevigatus	weiß	Sep.-Winter
- chenaultii	rötlich rosa	Sep.-Nov.
- orbiculatus	rötlich bis weiß	Sep.-Nov.

### Flache, niedrige Gehölze

Cotoneaster horiz.	rot	Aug.-Winter
Daphne mezereum	rot	ab Juni
Rosa nitida	rot	Sep.-Dez.

### Kletterpflanzen

Celastrus orbiculatus	rot	Okt.-Feb.
Hedera helix	schwarzblau	Frühjahr
- helix hibernica	schwarzblau	Frühjahr
Lonicera caprifolium	orangerot	Sep.-Nov.
- heckrottii	rot	Sep.-Winter
Parthenocissus		
- quinquefolia	blauschwarz	Okt.-Winter

## Gefährliche Pflanzen für Kinder

**Diese Liste enthält Pflanzen, die für eine Verwendung in Bereichen von beispielsweise Kinderspielplätzen, Kindergärten, Schulen und Freibädern ungeeignet sind, da Pflanzenteile giftig sind.**

Pflanzenname	betroffene Pflanzenteile	Gefährlichkeit/ kritischer Teil
<b>Laubgehölze</b>		
Cytisus-Arten	ganze Pflanze	! besonders Samen
Daphne-Arten	ganze Pflanze	!!! besonders Frucht
Euonymus	ganze Pflanze - außer nichtfruchtende Arten	!! Frucht und Samen
Genista-Arten	ganze Pflanze	! (Samen)
Hedera helix 'Arborescens'	Beeren	!! Beeren
Ilex-Arten (weibl. Pflanzen)	Frucht	!! Frucht
Kalmia-Arten	Triebe	! Samen
Laburnum-Arten	ganze Pflanze	!!! Samen
Ligustrum-Arten	ganze Pflanzen	!!! Frucht
Lonicera-beerentragende	ganze Pflanzen  - außer pileata, nitida 'Elegant'	!!! Frucht
Lycium-Arten		! (Frucht)
Pieris japonica	ganze Pflanze	! Samen
Prunus laurocerasus	Blatt, Rinde	! Samen
Rhamnus-Arten		!! Frucht
Robinia-Arten	Rinde u.a.	!! Samen
Sambucus racemosa	Triebe	!! Frucht
Symphoricarpos-Arten		! Frucht
Viburnum-beerentragende		!! Frucht
	- außer sterile Formen: V. op. 'Sterile', plicatum, pl. 'Mariesii'	
Wisteria sinensis	ganze Pflanze	! (Blüte)
<b>Nadelgehölze</b>		
Juniperus sabina	Trieb, Frucht	!! Frucht
Juniperus communis	Trieb, Frucht außer männliche und nichtfruchtende Formen	!! Frucht
Taxus baccata	Trieb, Samen außer männliche Formen	!! Samen
Thuja-Arten	Trieb Verzehr durch Kinder bisher nicht beobachtet	!! (Trieb)

! = giftig; Vergiftungen können vorkommen

!! = gefährlich; auch wegen „lockender“ Früchte

!!! = größte Vorsicht geboten!

## Informationen über Wuchs und Eigenschaften (Auswahl)

### Kleinkronige Bäume, kleinbleibend oder langsamwachsend

Acer campestre 'Anny's Globe'

- campestre 'Elsrijk'
- campestre 'Nanum'
- cappadocicum 'Rubrum'
- negundo-Veredlungen
- plat. 'Columnare Typ Ley I'
- plat. 'Columnare Typ Ley II'
- plat. 'Globosum'
- rubrum
- rubrum 'Armstrong'
- rubrum 'Scanlon'

Alnus cordata

- incana 'Aurea'

Amelanchier arborea 'Robin Hill'

- 'Ballerina'
- lamarckii

Betula albosinensis

- pendula 'Youngii'
- pendula 'Purpurea'

Catalpa big. 'Nana'

Cercidophyllum japonicum

Crataegus lavalleyi 'Carrierei'

- crus galli
- laev. 'Paul's Scarlet'

Davidia inv. vilmoriniana

Fraxinus ornus und Sorten

Gleditsia tr. 'Sunburst'

Laburnum 'Vossii'

Liquidambar styraciflua

Magnolia kobus

Malus Zierapfel-Sorten

Prunus cerasifera 'Nigra'

- serr. 'Kanzan'
- serr. 'Kiku-shidare-sakura'
- serr. 'Shirofugen'

Pyrus call. 'Chanticleer'

Quercus palustris 'Green Dwarf'

Quercus tur. 'Pseudoturmeri'

Robinia ps. 'Umbraculifera'

Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'

Tilia cordata 'Green Globe'

Ulmus glabra 'Pendula'

### Baumartige Großsträucher

Acer rufinerve

Amelanchier lamarckii

Cercidophyllum japonicum

Cornus controversa

- florida
- kousa
- mas

Cotoneaster watereri 'Cornubia'

Crataegus monogyna

- prunifolia

Elaeagnus angustifolia

Ilex aquifolium

Laburnum 'Vossii'

Magnolia soulangiana

Malus Zierapfel-Sorten

Nothofagus antarctica

Prunus cerasifera 'Nigra'

- mahaleb
- padus
- sargentii
- serrulata-Sorten
- sub. 'Autumnalis Rosea'
- yedoensis

Pyrus salicifolia 'Pendula'

Robinia ps. 'Tortuosa'

Salix caprea 'Mas'

- daphnoides
- matsudana 'Tortuosa'
- smithiana

Sambucus nigra

Sorbus americana

- decora

Syringa vulgaris

Ulmus hollandica 'Wredei'

### Säulenformen

#### A. Laubgehölze

Acer campestre 'Fastigiata'

Acer plat. 'Columnare Typ Ley I'

- plat. 'Columnare Typ Ley II'

- plat. 'Rubicundus'® Typ I' S
- plat. 'Rubicundus'® Typ II' S

Betula pendula 'Fastigiata'

Carpinus betulus 'Fastigiata'

- betulus 'Frans Fontaine'
- betulus 'Lucas'

Crataegus monogyna 'Stricta'

Fagus sylvatica 'Dawyck'

- sylvatica 'Dawyck Purple'

Liquidambar styraciflua  
'Slender Silhouette'

Platanus Hispanica 'Tremonia'

Populus nigra 'Italica'

- simonii 'Fastigiata'
- tremula 'Erecta'

Prunus serr. 'Amanogawa'

Quercus palustris 'Green Pillar'®

Quercus robur 'Fastigiata'

- robur 'Fastigiata'

Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'

Sorbus auc. 'Fastigiata'

- thur. 'Fastigiata'

## B. Nadelgehölze

Chamaecyparis laws. 'Alumii'

- laws. 'Columnaris'

Ginkgo biloba 'Fastigiata'

- biloba 'Fastigiata Blagon'®

Juniperus com. 'Hibernica'

- scop. 'Skyrocket'
- virg. 'Canaertii'
- virg. 'Glauca'

Pinus sylv. 'Fastigiata'

Taxus bacc. 'Fastigiata' u.a.

Thuja occ. 'Columna'

## Formgehölze

### Kastenform

Carpinus betulus

Tilia europaea 'Pallida'

### Spalierform

Carpinus betulus

Pyrus callieriana 'Chanticleer'

Tilia europaea 'Pallida'

### Dachform,

### einetagig und mehretagig

Platanus hispanica

Tilia europaea 'Pallida'

## Großbonsai

Cornus mas

Pinus nigra nigra

Pinus sylvestris

Neben diesen regelmäßig im Sortiment geführten Pflanzen und Formen, produzieren wir natürlich auch andere Formgehölze speziell nach ihren Wünschen.

## Feuchte Standorte

### A. Laubgehölze

Bambus-Arten/Sorten

Betula-Arten/Sorten

Calycanthus floridus

Catalpa big. und Sorten

Cercidiphyllum japonicum

Clematis montana

- paniculata

Cornus-Arten/Sorten

Deutzia-Arten/Sorten

Elaeagnus multiflora

Enkianthus campanulatus

Fraxinus excelsior und Sorten

Gaultheria procumbens

Hydrangea-Arten/Sorten

Kalmia angustifolia 'Rubra'

Lonicera henryi

Morus nigra

Pieris-Arten/Sorten

Prunus padus und Sorten

Quercus palustris

- tur. 'Pseudoturneri'

Rhamnus frangula

Rhododendron-Arten/Sorten

Rubus-Arten/Sorten

Salix-Arten/Sorten

Skimmia-Arten/Sorten

Viburnum opulus

- opulus 'Roseum'

### B. Nadelgehölze

Metasequoia glyptostroboides

Sciadopytis verticillata

Taxodium distichum



**Trockene Standorte****A. Laubgehölze**

Berberis-Arten/Sorten  
 Betula pendula  
 Buddleja-Arten/Sorten  
 Buxus sempervirens und Sorten  
 Calluna vulgaris Kultursorten  
 Caragana arborescens  
 Caryopteris-Sorten  
 Cercis siliquastrum  
 Colutea arborescens  
 Cornus mas  
 - sanguinea  
 Cotinus coggygria  
 - cog. 'Royal Purple'  
 Cotoneaster-Arten/Sorten  
 Crataegus-Arten/Sorten  
 Cytisus-Arten/Sorten  
 Elaeagnus-Arten/Sorten  
 Fraxinus ornus und Sorten  
 Genista-Arten/Sorten  
 Gleditsia triacanthos und Sorten  
 Hedera helix und Sorten  
 Hibiscus syriacus-Sorten  
 Hippophae rhamnoides  
 Hypericum-Arten/Sorten  
 Ilex aquifolium und Sorten  
 Koelreuteria paniculata  
 Kolkwitzia amabilis  
 Laburnum-Arten/Sorten  
 Lespedeza thunbergii  
 Lycium barbarum  
 Malus sylvestris  
 Morus alba  
 Paulownia tomentosa  
 Populus tremula und Sorten  
 Prunus mahaleb  
 Pyracantha-Sorten  
 Quercus cerris  
 - frainetto  
 - petraea  
 - turneri 'Pseudoturneri'  
 Robinia pseudoacacia und Sorten  
 Rubus fruticosus  
 Sophora-Arten/Sorten  
 Sorbus aria und Sorten  
 - latifolia 'Henk Vink'

- terminalis  
 Syringa josikaea  
 - vulgaris und Sorten  
 Tamarix-Arten/Sorten  
 Wisteria sinensis

**B. Nadelgehölze**

Juniperus-Arten/Sorten  
 Pinus-Arten/Sorten

**Auffallende Herbstfärbung****A. Laubgehölze**

Acer campestre und Sorten  
 - capillipes  
 - cappadocicum 'Rubrum'  
 - ginnala  
 - jap. 'Acconitifolium'  
 - pennsylvanicum  
 - platanoides und Sorten  
 - pseudopl. und Sorten  
 - rubrum und Sorten  
 - rufinerve  
 - saccharinum und Sorten  
 - truncatum 'Pacific Sunset'  
 Amelanchier-Arten/Sorten  
 Betula jacquemontii  
 - nigra  
 Calycanthus floridus  
 Celastrus orbiculatus  
 Cercidiphyllum japonicum  
 Chionanthus virginicus  
 Cornus florida  
 - florida 'Rubra'  
 - kousa  
 - kousa chinensis  
 - nuttallii  
 - sanguinea  
 Corylopsis-Arten  
 Corylus colurna  
 Crataegus-Arten/Sorten  
 Enkianthus campanulatus  
 Euonymus alatus  
 - planipes  
 Fagus sylvatica und Sorten  
 Fothergilla monticola  
 Fraxinus americana 'Autumn Purple'  
 - ang. 'Raywood'  
 - ornus und Sorten

Gleditsia triacanthos und Sorten  
Hydrangea petiolaris  
Koelreuteria paniculata  
Liquidambar styraciflua und Sorten  
Liriodendron tulipifera  
Morus-Arten  
Nothofagus antarctica  
Parrotia persica  
Parthenocissus-Arten/Sorten  
Photinia villosa  
Prunus-Arten/Sorten  
Pyrus-Arten/Sorten  
Quercus-Arten/Sorten  
Rhododendron pontica-Sämlinge  
Rhus-Arten/Sorten  
Rosa-Arten/Sorten  
Sophora-Arten/Sorten  
Stranvesia davidiana  
Syringa reflexa  
- swegiflexa  
Tilia-Arten/Sorten  
Ulmus-Arten/Sorten  
Viburnum-Arten/Sorten

## **B. Nadelgehölze**

Ginkgo biloba  
Larix-Arten/Sorten  
Metasequoia glyptostroboides  
Taxodium distichum

## Allgemeine Abkürzungen

1 j.S.	1-jähriger Sämling	o.B.	ohne Ballen
2 j.v.S.	2-jährig verpflanzter Sämling	m.B.	mit Ballen
3 j.v.S.	3-jährig verpflanzter Sämling	m.Db.	mit Drahtballen
4 j.v.S.	4-jährig verpflanzter Sämling	lStr.	leichte Sträucher
1j.bew.Sth.	1-jährig bewurzelt Steckholz	vStr.	verpflanzte Sträucher
lHei. 1xv.	leichte Heister, einmal verpflanzt	Sol.	Solitärgehölze
vHei.	Heister, verpflanzt	Ha.	Halbstamm
m.Tb.	mit Topfballen	H.	Hochstamm
Co.	Container (evtl. mit Literangabe)	Stb.	Stammbusch
		St.U.	Stammumfang (in 1 m Höhe gemessen)
		mehrst.	mehrstämmig
		Gst.	Grundstämme
		Tr.	Triebe

## Größenkennzeichnung:

Pflanzen, die für den Verkauf vorgesehen sind, werden normalerweise mit einem Band markiert. Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. hat Richtlinien festgesetzt, nach denen bestimmte Größen oder Stärken einer hierfür festgelegten Farbe zugeordnet werden:

St.U. in cm	Farbe	Durchmesser in cm	Höhe in cm	Farbe	
7- 8	blau	Ø 2,25- 2,5	15- 20	blau	
8- 10	gelb	Ø 2,5- 3	20- 30	gelb	sowie 20- 25
10- 12	rot	Ø 3- 4	25- 30	rot	
12- 14	weiß	Ø 4- 4,5	30- 40	weiß	sowie 30- 35
14- 16	blau	Ø 4,5- 5	40- 60	blau	sowie 40- 50
16- 18	gelb	Ø 5- 5,5	50- 60	gelb	
18- 20	rot	Ø 5,5- 6	60- 80	rot	sowie 60- 70
20- 25	weiß	Ø 6- 8	70- 80	weiß	
25- 30	blau	Ø 8- 10	80- 100	gelb	sowie 80- 90
30- 35	gelb	Ø 10- 12	90- 100	blau	
35- 40	rot	Ø 12- 14	100- 125	weiß	
40- 45	weiß	Ø 14- 16	125- 150	blau	
45- 50	blau	Ø 16- 18	150- 200	rot	sowie 150- 175
50- 60	gelb	Ø 18- 20	175- 200	gelb	
60- 70	rot	Ø 20- 22	200- 250	blau	sowie 200- 225
70- 80	weiß	Ø 22- 25	225- 250	weiß	
			250- 300	gelb	sowie 250- 275
			275- 300	rot	

## Gewichte und Ballengrößen von Alleebäumen

Bei den angegebenen Gewichten handelt es sich um Durchschnittswerte. Abweichungen aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen sind möglich.

Stammumfang in cm	Ballendurchmesser in cm	Ballenhöhe in cm	Gewicht in kg
16-18	50-60	40	150
18-20	60-70	40-50	200
20-25	70	40-50	250
25-30	80	50-60	350
30-35	90-100	60-70	500
35-40	100	60-70	650
40-45	110-120	60-70	900
45-50	120-140	60-70	1.100
50-60	140	60-70	1.600
60-70	150-160	60-70	2.500
70-80	180-200	70-80	4.000
80-90	200-220	70-80	5.500
90-100	230-250	80-90	7.500

## Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

### § 1 – Allgemeines – Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.
2. Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

3. Ausdrücklich widersprechen wir Einkaufs- oder Auftragsbedingungen bzw. sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, diesen entgegenstehen oder diese ergänzen; selbst bei Kenntnisnahme dieser anderweitigen Bedingungen werden diese nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt.

## ■ § 2 – Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend entsprechend unserer Verfügbarkeit.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Auftragsbestätigung verbunden werden.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert, die Gegenleistung wird, soweit bereits geleistet, unverzüglich zurückerstattet.
5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per eMail zugesandt.

## ■ § 3 – Preise und Zahlungsbedingungen

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsstelle ohne Verpackung und Transport in Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Bei Neuerscheinungen des Kataloges / der Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit. Beim Versandkauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich Versandkosten.
2. Ausländische Zahlungsmittel werden, soweit nicht die Rechnung in dieser Währung ausgestellt ist, nach dem bei der Deutschen Bundesbank am Tage der Rechnungsstellung notierten amtlichen Briefkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet.
3. Bei persönlichem Ausschauen der Pflanzen in unserem Betrieb haben Listenpreise keine Gültigkeit.
4. Wir behalten uns vor, Aufträge gegen Nachnahme auszuführen.
5. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung von Fernkommunikationsmitteln keine zusätzlichen Kosten.
6. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware binnen einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum den Kaufpreis spätestens zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren

Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

7. Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur zulässig aus Umständen, die aus derselben Lieferung herrühren. Im kaufmännischen Rechtsverkehr ist die Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts oder eines Zurückbehaltungsrechts seitens unserer Unternehmer-Kunden ausgeschlossen.
8. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen. Hieraus entstandene Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.
9. Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistung von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer angemessenen Nachfrist bei Untätigbleiben unserer Kunden sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

## ■ § 4 – Gefahrübergang, Versand und Verpackung

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Ware auf den Käufer über.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
4. Im Falle des Zukaufs durch uns hat der Verkäufer die Verpackung ordnungsgemäß und sorgfältig auszuführen. Offene Wagenladungen sind abzudecken. Die einzelnen Lieferpositionen sind deutlich zu kennzeichnen.
5. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten unserer Kunden abgeschlossen.
6. Einwegverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Baumschulpaletten) bleiben unser Eigentum und müssen auf Kosten unseres Kunden zurückgeführt werden.
7. Verpackungs- und Transportkosten sowie Rollgelder können nachberechnet werden.
8. Eine Anlieferung per LKW kann nur über frei befahrbare Straßen erfolgen.

## ■ § 5 – Lieferpflichten

1. Im Falle von Wetterkatastrophen, wie z.B. Dürre, Frost oder Hagel oder anderen unvorhergesehenen und unverschuldeten Umständen wie z.B. Seuchen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen jeglicher Art, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Währungsveränderungen oder behördliche Eingriffe, verlängert sich die Lieferfrist für die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung

unmöglich, so werden wir von der Lieferpflicht frei. In diesen Fällen kann der Kunde Schadensersatz nicht geltend machen.

2. Feste Liefertermine sind für uns lediglich bei schriftlicher Bestätigung bindend.
3. Teillieferungen werden ausdrücklich vorbehalten.
4. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Bei allen Baumschulpflanzen können als Ersatz für Güteklasse A Pflanzen der Güteklasse B zu dem hierfür gültigen Preis geliefert werden, falls dies nicht ausdrücklich verboten ist.

## ■ § 6 – Maße und Muster

1. Sämtliche Maße sind Cirka-Maße. Abweichungen in einer Größenordnung von 10 % nach oben oder unten sind zulässig.
2. Muster zeigen lediglich die Durchschnittsbeschaffenheit auf. Es müssen nicht sämtliche Pflanzen wie das Muster ausfallen.

## ■ § 7 – Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.

Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung einschließlich Nebenforderungen vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wurde.

2. Unser Eigentum an der Vorbehaltsware geht nicht dadurch verloren, dass der Unternehmer als Käufer die gelieferten Pflanzen bis zur Weiterveräußerung auf seinem oder fremden Grundstück einschlägt oder einpflanzt. Die Vorbehaltsware ist von übrigen Pflanzen getrennt zu lagern, einzuschlagen oder einzupflanzen und dabei so zu kennzeichnen, dass sie als von uns kommend erkennbar ist. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware unentgeltlich pfleglich zu behandeln. Hierzu gehören insbesondere richtige Lagerung, Pflanzung, Düngung und Bewässerung.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen unter Angabe von Namen und Anschrift des Pfändungsgläubigers. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 2 und 3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte und einschließlich etwaiger Saldoforderungen tritt der Unternehmer hiermit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen

Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.

6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Vermischung mit uns nicht gehörender Ware, so erwerben wir an der vermischten Ware das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu der sonstigen Ware.

## ■ § 8 – Garantie und Gewährleistung

1. Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Verlangt der Kunde ausdrücklich eine Anwachsgarantie, so kann hierfür ein gesonderter Betrag in Rechnung gestellt werden. Eine gewährte Anwachsgarantie erstreckt sich auf die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung und setzt voraus, dass der Kunde den Pflanzen die für diese Pflanzenart richtige Behandlung hat zuteil werden lassen. Hierzu gehören insbesondere die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie nicht umfasst. Bei der Anwachsgarantie handelt es sich nicht um eine Garantie im Rechtssinne.

2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen. Bei Obstgehölzen wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Auslieferung an übernommen. Die Gewähr für Beerenobst, Rosen und andere Gehölzen läuft nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Auslieferung an. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Garantie übernommen. Bei Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen übernehmen wir Gewähr für die Echtheit der gelieferten Sorten nur bis zum Ablauf eines Jahres ab dem Tage der Lieferung.

3. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

4. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

5. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.

6. Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware festgestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels. Die Beweislast



für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Verbraucher. Wurde der Verbraucher durch unzutreffende Prospektaussagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn insoweit die Beweislast. Ist eine lebende Pflanze Kaufsache, hat der Verbraucher im Falle des Absterbens, des Befalls mit Schädlingen oder einer anderweitigen Erkrankung der Pflanze die Beweislast dafür, dass diese Tatbestände nicht auf unsachgemäße Behandlung der Pflanze nach deren Übergabe zurückzuführen ist.

7. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.

Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.

8. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 6 dieser Bestimmung).

9. Der Kauf von patentrechtlich und sortenschutzrechtlich geschützten Rosensorten sowie solcher, deren Namen warenzeichenrechtlich geschützt sind, verpflichtet den Unternehmer als Käufer dazu, die Sorten ausschließlich mit den Originaletiketten weiterzuverkaufen, die mit den Pflanzen mitgeliefert wurden, sowie die erworbenen Rosenpflanzen oder Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf solcher Rosenpflanzen im Ausland zu unterlassen. Der Unternehmer als Käufer verpflichtet sich, in den Fällen der Weiterveräußerung diese Maßnahme auch seinen Käufern gegenüber aufzuerlegen.

## ■ § 9 – Haftungsbeschränkungen

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiterhin gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens des Kunden.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

## ■ § 10 – Widerrufs- und Rückgaberecht Fernabsatzvertrag mit Widerrufs Klausel

1. Der Verbraucher hat das Recht, seine auf den Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der Ware zu widerrufen, es sei denn, es handelt sich bei der Ware um lebende Pflanzen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Ware

gegenüber dem Verkäufer zu erklären; Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

2. Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rücksendung verpflichtet, wenn die Ware durch Paket versandt werden kann. Die Kosten der Rücksendung trägt bei Ausübung des Widerrufsrechts bei einem Bestellwert bis zu € 40 der Verbraucher, es sei denn, die gelieferte Ware entspricht nicht der bestellten Ware. Bei einem Bestellwert über € 40 hat der Verbraucher die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen.

3. Der Verbraucher hat Wertersatz für eine durch bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware entstandene Verschlechterung zu leisten. Der Verbraucher darf die Ware vorsichtig und sorgsam prüfen. Den Wertverlust, der durch die über die reine Prüfung hinausgehende Nutzung dazu führt, dass die Ware nicht mehr als „neu“ verkauft werden kann, hat der Verbraucher zu tragen.

## ■ § 11 – Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dessen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

Informationen zum Datenschutz können über folgenden Link abgerufen werden:  
<https://Ley-baumschule.de/service/#downloads>

## ■ Informationen zum Datenschutz

Wir erheben personenbezogene Daten (z. B. Kontaktdaten von Ansprechpartnern bei unseren Kunden) zum Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung vertraglicher und vorvertraglicher Pflichten sowie zur Direktwerbung (z. B. Katalogversand). Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Verwendung personenbezogener Daten für Werbezwecke stellt ein berechtigtes Interesse unseres Unternehmens dar (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Eine Weitergabe der Daten an Dritte in der EU und/oder ein Drittland findet nur statt, wenn dies zur Auftrags Erfüllung (z. B. Reklamationen) notwendig ist. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Es besteht ein Beschwerderecht bei einer für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte verwenden Sie bitte im Katalog genannten Kontaktdaten.

## Translation of used terminology:

abbreviation	German terminology	English terminology
1 j.S.	1-jähriger Sämling	1 year seedling
2 j.v.S.	2-jährig verpflanzter Sämling	2 year transpl. seedling
3 j.v.S.	3-jährig verpflanzter Sämling	3 year transpl. seedling
4 j.v.S.	4-jährig verpflanzter Sämling	4 year transpl. seedling
lHei.	leichte Heister	light whip
vHei.	Heister, verpflanzt	whip, transplanted
m.Tb. (=P)	mit Topfballen	pot grown plant
Co.	Container (evtl. mit Literangabe)	container
o.B.	ohne Ballen	bare rute
m.B.	mit Ballen	rootball
m.Db.	mit Drahtballen	wired rootball
lStr.	leichte Sträucher	light shrubs
vStr.	verpflanzte Sträucher	transplanted shrubs
Sol.	Solitärgehölze	specimen / solitaire
Ha.	Halbstamm	half-stem
H.	Hochstamm	standard tree
Stb.	Stammbusch	feathured tree
St.U.	Stammumfang	circumference
mehrst.	mehrstämmig	multistem
Gst.	Grundstämme	breaks
Tr.	Triebe	branches

## Traduction de la terminologie utilisée:

abréviation	terminologie allemande	terminologie française
1 j.S.	1-jähriger Sämling	Semis 1 an
2 j.v.S.	2-jährig verpflanzter Sämling	Semis 2 ans repiqué
3 j.v.S.	3-jährig verpflanzter Sämling	Semis 3 ans repiqué
4 j.v.S.	4-jährig verpflanzter Sämling	Semis 4 ans repiqué
lHei. 1xv.	leichte Heister, einmal verpflanzt	Jeune baliveau 1 x transplanté
vHei.	Heister, verpflanzt	Baliveau 2 x transplanté
m.Tb.	mit Topfballen	en godet
Co.	Container (evtl. mit Literangabe)	Conteneur
o.B.	ohne Ballen	Racines nues
m.B.	mit Ballen	Motte
m.Db.	mit Drahtballen	Motte grillagée
lStr.	leichte Sträucher	Touffette
vStr.	verpflanzte Sträucher	Touffe transplantée
Sol.	Solitärgehölze	Solitaires
Ha.	Halbstamm	Demi-tige
H.	Hochstamm	Haute-tige
Stb.	Stammbusch	Forme naturelle branchue de la base
St.U.	Stammumfang	Circonférence
mehrst.	mehrstämmig	Cepée
Gst.	Grundstämme	troncs de cepée
Tr.	Triebe	Branches

## Weiteres Informationsmaterial und Arbeitshilfen für Ihre Planungen:



DAS GRÜNE  
SORTENBUCH

### Das Grüne Sortenbuch, 4. Auflage

Umfassende Beschreibungen von über 2.000 Arten und Sorten auf mehr als 450 Seiten. ISBN-Nr.: 978-3-944976-23-5

**Schutzgebühr: 27,50 €**

Bestellen Sie online unter der Rubrik „Service“ auf unserer Homepage [www.Ley-Baumschule.de](http://www.Ley-Baumschule.de), per E-Mail an [info@Ley-Baumschule.de](mailto:info@Ley-Baumschule.de), per Fax unter +49/ (0) 22 25- 91 44-90, oder auf dem Postweg.

## Planungshelfer I für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Bäume in der Verwendung“



mit Kurzbeschreibungen von 250 Arten und Sorten in übersichtlicher Tabelle.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer II für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Obstbäume in der Verwendung“



mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von über 200 Obstarten und -sorten in übersichtlicher Tabelle.

Besondere Hinweise verdienen hier die alten Wirtschaftssorten der Äpfel und Birnen.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer III für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Flächendeckende Gehölze in der Verwendung“



mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von über 200 Arten und Sorten, inkl. detaillierter Mengenangaben pro m<sup>2</sup>.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

## Planungshelfer IV für Stadtgrün, Garten und Landschaft: „Sträucher in der Verwendung“



mit Kurzbeschreibungen und Verwendungsmöglichkeiten von fast 500 Arten und Sorten in übersichtlicher Tabelle.

**Schutzgebühr: 2,50 €**

Bestellen Sie online unter der Rubrik „Service“ auf unserer Homepage [www.Ley-Baumschule.de](http://www.Ley-Baumschule.de), per E-Mail an [info@Ley-Baumschule.de](mailto:info@Ley-Baumschule.de), per Fax unter +49/ (0) 22 25- 91 44-90, oder auf dem Postweg.

## LAGE- UND ANFAHRTSBESCHREIBUNG

**A 61 –**

**von Köln/Koblenz**

Ausfahrt Rheinbach,  
nach Meckenheim,

2. Ampel links

**A 565 – von Bonn**

Ausfahrt

Meckenheim-Nord,

3. Ampel rechts



## WILHELM LEY BAUMSCHULEN



Wilhelm Ley GmbH  
Baumschulen  
Baumschulenweg 20  
53340 Meckenheim  
DEUTSCHLAND

E-Mail: [info@Ley-Baumschule.de](mailto:info@Ley-Baumschule.de)  
Internet: [www.Ley-Baumschule.de](http://www.Ley-Baumschule.de)

Postfach 1208  
53334 Meckenheim  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 (0) 22 25 / 91 44-0  
Fax: +49 (0) 22 25 / 91 44-90